

31971R2706

L 280/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

21.12.1971

**РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2706/71 НА КОМИСИЯТА**  
**от 20 декември 1971 година**  
**относно метода за определяне на активността на пероксидазата в някои продукти, получени от**  
**преработката на зърнени култури**

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 120/67 на Съвета от 13 юни 1967 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури <sup>(1)</sup>, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1550/71 <sup>(2)</sup> и по-специално член 1б, параграф 6 от него,

като има предвид, че възстановяването при износ трябва да държи сметка за качеството на продуктите, получени от преработката на зърнени култури, които могат да се ползват от него, така че да се избегне изразходването на обществени средства за износа на продукти с ниско качество; като има предвид, че за тази цел е необходимо в някои продукти, получени от преработката на зърнени култури, пероксидазата да бъде практически неактивна; като има предвид, че за да се гарантира еднаквото приложение на разпоредбите за предоставяне на възстановяване при износ за продуктите, които отговарят на това изискване, следва да се предвиди общностен метод за определяне на активността на пероксидазата;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

*Член 1*

Когато за предоставяне на възстановяване при износ за някои продукти, получени от преработката на зърнени култури, се изисква пероксидазата да бъде практически неактивна, проверката за това се извършва по метода, описан в приложението.

*Член 2*

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 1971 година.

*За Комисията*

*Председател*

Franco M. Malfatti

<sup>(1)</sup> ОВ № 117, 19.6.1967 г., стр. 2269/67.

<sup>(2)</sup> ОВ L 164, 22.7.1971 г., стр. 1.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

**Метод за определяне на активността на пероксидазата**

В хаван се стриват 5 г проба с малко дестилирана вода. Сместа се пресипва в градуирана колба с обем 100 мл и се допълва с дестилирана вода до марката. Сместа се оставя да престои в продължение на 30 минути и се филтрира с нагънат филтър.

5 мл от избистрения разтвор се пресипват с пипета в епруветка. Добавят се 1 мл 10 % разтвор от кристален гваякол и 96 % етанол, както и 1 мл 1 %  $\text{H}_2\text{O}_2$  (водороден прекис). Двата реактивни разтвора трябва да бъдат прясно приготвени. Проверява се концентрацията на разтвора на водородния прекис. След половин час не трябва да има промяна в оцветяването или да се появи само леко оцветяване в кафяво-червено спрямо паралелно проведен празен тест.

Тестът за оцветяването се провежда два пъти.

---