

ПОПРАВКИ

Поправка на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине

(Официален вестник на Европейския съюз L 43 от 21 февруари 2017 г.)

На страница 257, в точка 2.1. Емисии на амоняк от свинеферми

вместо:

„10. Боксове с постеля с комбинирана обработка на оборския тор (полутечен и твърд оборски тор)	Опрасени свине майки	Не се прилага за съществуващи инсталации без плътен циментов под.“
11. Боксове за хранене/лежане с плътен под (в случаите, когато се използват боксове с постеля)	Свине за разплод и бременни свине	

да се четат:

„10. Боксове с постеля с комбинирана обработка на оборския тор (полутечен и твърд оборски тор)	Опрасени свине майки	Може да не е общоприложима за съществуващи инсталации по технически и/или икономически съображения.
11. Боксове за хранене/лежане с плътен под (в случаите, когато се използват боксове с постеля)	Свине за разплод и бременни свине	Не се прилага за съществуващи инсталации без плътен циментов под.“

На страница 277, в точка 4.13.1. Техники за намаляване на емисиите на амоняк от помещения за кокошки носачки, пилета за разплод на бройлери или ярки

вместо:

„Отстраняване на оборския тор по транспортни ленти (в случаите на системи за отглеждане в уголемени или неуголемени клетки) поне със следната периодичност: — отстраняване веднъж седмично със сушене с въздух; или — отстраняване два пъти седмично без сушене с въздух.	Лентите за отстраняване на оборския тор се поставят под клетките. Честотата на отстраняване може да е веднъж всяка седмица (със сушене с въздух) или по-често (без сушене с въздух). Лентата за събиране може да се вентилира с цел сушене на оборския тор. Може също да се използва ускорено сушене с въздух на лентата с оборски тор.“
---	--

да се четат:

„Система за отглеждане	Описание
Отстраняване на оборския тор по транспортни ленти (в случаите на системи за отглеждане в уголемени или неуголемени клетки) поне със следната периодичност: — отстраняване веднъж седмично със сушене с въздух; или — отстраняване два пъти седмично без сушене с въздух. Лентите за отстраняване на оборския тор се поставят под клетките. Честотата на отстраняване може да е веднъж всяка седмица (със сушене с въздух) или по-често (без сушене с въздух). Лентата за събиране може да се вентилира с цел сушене на оборския тор. Може също да се използва ускорено сушене с въздух на лентата с оборски тор.	Лентите за отстраняване на оборския тор се поставят под клетките. Честотата на отстраняване може да е веднъж всяка седмица (със сушене с въздух) или по-често (без сушене с въздух). Лентата за събиране може да се вентилира с цел сушене на оборския тор. Може също да се използва ускорено сушене с въздух на лентата с оборски тор.“