

31993L0079

14.10.1993

ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

L 256/25

SMĚRNICE KOMISE 93/79/EHS

ze dne 21. září 1993,

kteřou se stanoví dodatečná prováděcí ustanovení týkající se odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 92/34/EHS

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce ⁽¹⁾, ve znění rozhodnutí Komise 93/401/EHS ⁽²⁾, a zejména na čl. 9 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že na mezinárodní úrovni již existuje systém pro sestavování uvedených odrůdových seznamů; že tento systém vypracovala Unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV);

vzhledem k tomu, že systém Společenství by se měl opírat o zkušenosti získané na mezinárodní úrovni;

vzhledem k tomu, že na dodavatele, jejichž činnost se omezuje na uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin na trh, by se měly vztahovat méně přísné požadavky;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rozmnožovací materiál a rostliny ovocných rodů a druhů,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice stanoví dodatečná prováděcí pravidla týkající se odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, které vedou dodavatelé podle čl. 9 odst. 2 bodu ii) směrnice 92/34/EHS.

Článek 2

1. Odrůdové seznamy vedené dodavateli musí obsahovat

- i) název odrůdy a případně údaj o jeho obecně známých synonymech;

ii) údaje o udržovacím šlechtění a způsobu rozmnožování odrůdy;

iii) popis odrůdy alespoň na základě znaků a jejich projevů podle připojené přílohy;

iv) je-li to možné, údaj o tom, do jaké míry se odrůda liší od nejbližší podobné odrůdy.

2. Ustanovení odst. 1 bodů ii) a iv) se nevztahují na dodavatele, jejichž činnost se omezuje na uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin na trh.

Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 1994. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. září 1993.

Za Komisi

René STEICHEN

člen Komise

⁽¹⁾ Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 10.

⁽²⁾ Úř. věst. L 177, 21.7.1993, s. 28.

PŘÍLOHA

ZNAKY ODRŮD A STUPNĚ JEJICH PROJEVU

Rod Citrus

Roční výhon: anthokyanové zabarvení špičky (10 až 15 cm od špičky)

chybějící
přítomné

Plod: tvar distálního konce

pokleslý
tupý
zakulacený
lehce bradavičnatý
silně bradavičnatý

Plod: barva povrchu

zelená
zelená až žlutá
žlutá
žlutá až oranžová
oranžová
oranžová až červená
růžová
červená
purpurová

Období zralosti

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

Corylus avellana L.

Doba rozvití pupence listu (když z pupence vystupují dva lístky)

velmi brzy
velmi brzy až brzy
brzy
brzy až středně
středně
středně až pozdě
pozdě
pozdě až velmi pozdě
velmi pozdě

Doba květu samčích květů

velmi brzy
velmi brzy až brzy
brzy
brzy až středně
středně
středně až pozdě
pozdě
pozdě až velmi pozdě
velmi pozdě

Doba květu samičích květů

velmi brzy
velmi brzy až brzy
brzy

brzy až středně
středně
středně až pozdě
pozdě
pozdě až velmi pozdě
velmi pozdě

Obal plodu: délka v porovnání s obalem plodu

kratší
stejně dlouhá
delší

Obal plodu: zvrásnění

nepatrné
střední
silné

Obal plodu: hloubka záhybů

nepatrná
střední
silná

Plod: velikost

velmi malý
malý
střední
velký
velmi velký

Plod: tvar

kulovitý
kuželovitý
vejčitý
krátký válcovitý
dlouhý válcovitý

Doba zralosti

velmi brzy
velmi brzy až brzy
brzy
brzy až středně
středně
středně až pozdě
pozdě
pozdě až velmi pozdě
velmi pozdě

Plod: procento zrnitosti (hmotnostní)

velmi malé
malé
střední
vysoké
velmi vysoké

Cydonia Mill.

Rostlina: forma růstu

vzpřímená
polovzpřímená
rozložitá

List: celkový tvar

elipsový
obrácený vejčitý
vejčitý
okrouhlý

Plod: celkový tvar

kulovitý
vejčitý
hruškovitý
uprostřed zúžený
nepravidelný
obdélníkový

Fragaria x. ananassa Duch.

Stav květů: poloha v poměru k listům

pod listem
ve výši listu
nad listem

Plod: velikost

velmi malý
malý
střední
velký
velmi velký

Plod: převažující tvar

ledvinovitý
velmi kulatý
zakulacený
kulovitý
dvojitě kulovitý
téměř válcovitý
klínovitý
vejčitý
srdcovitý

Plod: barva

bělavě žlutá
světle oranžová
oranžová
oranžovočervená
červená
purpurová
tmavopurpurová

Doba zralosti (50 % rostlin se zralými plody)

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

Sklon korunky

neskloněná
částečně skloněná
skloněná

Juglans regia L.

Doba rozvítí pupence listu

velmi brzy
velmi brzy až brzy
brzy
brzy až středně
středně

středně až pozdě
pozdě
pozdě až velmi pozdě
velmi pozdě

Kmen: typ samičích květů

jednotlivé
ve skupinách

Kmen: typ větvení větvíček se samičími květy

neomezené
omezené

Doba zralosti

brzy
brzy až středně
středně
středně až pozdě
pozdě

Malus Mill.

Kmen: síla vzrůstu

malá
střední
velká

Plod: tvar

kulovitý
kulovitě kuželovitý
krátký kulovitě kuželovitý
zploštělý
zploštělý kulovitý
kuželovitý
dlouhý kuželovitý
tupý kuželovitý
eliptický
eliptický kuželovitý
obdélníkový
obdélníkově kuželovitý
obdélníkový, uprostřed zúžený

Plod: barva povrchu slupky

oranžová
červená
purpurová
rezavá

Doba začátku květu (10 % rozvítých květů)

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

Odrůdy podnože

Strom: síla vzrůstu (ve foliovníku)

malá
střední
silná

Strom: počet základních výhonů (ve foliovníku)

velmi malý
malý
střední
velký
velmi velký

***Olea europaea* L.**

Plod: tvar

podlouhlý
elipsovité
kulovité

Plod: nasazená špička

chybějící
přítomná

Plod: tvar základny

okrouhlý
ztupený
pokleslý

Plod: šířka stopky

tenká
střední
široká

***Prunus amygdalus* Batsch**

Doba začátku květu

velmi brzy
velmi brzy až brzy
brzy
brzy až středně
středně
středně až pozdě
pozdě
pozdě až velmi pozdě
velmi pozdě

Květ: barva korunních lístků

bílá
růžovobílá
růžová
tmavorůžová

Doba zralosti

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

Sušený plod: tvar vrcholku

zploštělý
okrouhlý
špičatý

Jádro: tvar

tenký elipsovité
elipsovité
široký elipsovité
velmi široký elipsovité

***Prunus armeniaca* L.**

Plod: velikost

malý
střední
velký

Plod: hloubka dutiny stopky

mělká
střední

hluboká

Plod: základní barva slupky

bílá
krémová až žlutá
světle oranžová
oranžová
tmavooranžová

Plod: barva dužiny

bílá
krémová
světle oranžová
oranžová
tmavooranžová

Doba počátku květu (když strom vykazuje některé plně rozvité květy)

brzy
středně
pozdě

Doba zralosti

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

***Prunus avium* L. a *Prunus cerasus* L.**

Doba květu

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

Plod: velikost

velmi malý
malý
střední
velký
velmi velký

Plod: barva slupky

žlutá
oranžovočervená
rumělkově červená s oranžovožlutým podkladem
rumělkově červená
purpurová
černá

Plod: doba zralosti

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

***Prunus domestica* L.**

Plod: velikost (v době fyziologické zralosti plodu)

velmi malý
malý
střední
velký
velmi velký

Plod: tvar z profilu (v době fyziologické zralosti plodu)

zploštěle okrouhlý
okrouhlý
podlouhlý
prodloužený

Plod: základní barva slupky (včetně zbarvení, v době fyziologické zralosti plodu)

bělavá (průsvitná)
zelená
žlutavě zelená
žlutá
oranžovožlutá
červená
purpurová
fialovomodrá

Plod: barva dužiny (v době fyziologické zralosti plodu)

bělavá
žlutá
žlutozelená
zelená
oranžová
červená

Pecka: přilnutí k dužině (v době fyziologické zralosti plodu)

nelnoucí k dužině
částečně lnoucí k dužině
lnoucí k dužině

Pecka: velikost v poměru k velikosti plodu (v době fyziologické zralosti plodu)

malá
střední
velká

Doba zralosti

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

***Prunus persica* (L.) Batsch.**

Kmen: typ

běžný
malý

Skutečný výhon nesoucí plod: anthokyanové zbarvení

chybějící
přítomné

Doba začátku květu

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

Květ: tvar

růžovitý
zvonkovitý

Okvětní lístek: tvar

velmi malý
malý
střední
velký
velmi velký

Řapík: nektarium

chybějící
přítomný

Řapík: tvar nektaria

kulatý
ledvinovitý

Plod: ochmýření

chybějící
přítomné

Plod: základní barva dužiny

bílá
žlutá až žlutooranžová
červená

Pecka: přilnutí k dužině

chybějící
přítomné

Doba zralosti

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

***Prunus salicina* L.**

Plod: velikost

velmi malý
malý
střední
velký
velmi velký

Plod: základní barva slupky

bělavá (průsvitná)
zelená
žlutavá až zelená
žlutá
oranžová až žlutá
červená
purpurová
fialovomodrá
tmavomodrá

Plod: barva dužiny

bělavá
žlutá
žlutavá až zelená
zelená
oranžová
červená

Doba květu

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

Doba zralosti

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

***Pyrus communis* L.**

Doba květu (datum plného květu)

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

Plod: velikost

velmi malý
malý
střední
velký
velmi velký

Plod: tvar stran (v podélném průřezu)

konkávní
rovný
konvexní

Plod: délka v poměru k největšímu průměru

velmi krátký
krátký
střední
dlouhý
velmi dlouhý

Plod: základní barva slupky (v době zralosti)

zelená
žlutozelená
žlutá
červená

Plod: délka stopky

krátká
střední
dlouhá

Doba zralosti ke sklizni

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

***Ribes silvestre* Mert et Koch a *Ribes niveum* Lindl.
(červený a bílý rybíz)**

Doba zralosti

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

Plodenství: délka včetně stopky

velmi krátká
krátká
střední
dlouhá
velmi dlouhá

Bobule: velikost

velmi malá

malá
střední
velká
velmi velká

Bobule: barva

bílá
bělavě žlutá
růžová
červená

***Ribes uva crisper* L. (angrešt)**

Rostlina: tvar

otočený vejčitý
kulovitý
příčně elipsovité

Plod: velikost

velmi malý
malý
střední
velký
velmi velký

Plod: tvar

kulovitý
elipsovité
hruškovité

Plod: barva

žlutá
žlutozelená
zelená s bílým zbarvením
zelená
červená

Doba zralosti

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

***Ribes nigrum* L. (černý rybíz)**

Rostlina: poměr výška/průměr

malá
střední
velká

Plod: velikost

velmi malý
malý
střední
velký
velmi velký

Doba zralosti

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi a Ursini (ostružiník) a hybridy*Rostlina: tvar růstu*

vzpřímený
vzpřímený až polovzpřímený
polovzpřímený
polovzpřímený až plazivý
plazivý

Zimní keřík: trny

chybějící
přítomné

Plod: velikost

velmi malý
malý
střední
velký
velmi velký

Doba zralosti

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě

Rubus idaeus L. (maliník)*Rostlina: počet mladých výhonů*

velmi malý
malý
střední
mnoho
velmi mnoho

Pouze odrůdy, které rodí na loňském keříku
v létě

Zimní keřík: barva

šedavě hnědá
šedavě hnědá až hnědá
hnědá
hnědá až purpurově hnědá
purpurově hnědá

Plod: barva

žlutá
světle červená
středně červená
tmavočervená
oranžová
purpurová
černá

Plod: velikost

velmi malý
malý
střední
velký
velmi velký

Plod: poměr délka/šířka

stejně dlouhý jako široký
širší než delší
mnohem delší než širší

Hlavní sklizeň:

na loňském keříku v létě
na keříku daného roku na podzim

Doba zralosti plodů na loňských keřících

velmi brzy
brzy
středně
pozdě
velmi pozdě