



2024/2419

16.9.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/2419

ze dne 13. září 2024,

**o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Soft Care Med H5“ v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012**

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání ⁽¹⁾, a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Dne 29. března 2019 předložila společnost Diversey Europe Operations B.V. Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek s názvem „Soft Care Med H5“, který představuje typ přípravku 1 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Nizozemska, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-MF050448-40.
- (2) Přípravek „Soft Care Med H5“ obsahuje účinné látky propan-1-ol a propan-2-ol, které jsou obě zařazeny na seznam schválených účinných látek Unie uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro typ přípravku 1.
- (3) Dne 17. července 2023 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 agentuře zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení.
- (4) V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 14. prosince 2023 Komisi své stanovisko ⁽²⁾, návrh souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro přípravek „Soft Care Med H5“ a závěrečnou zprávu o posouzení tohoto jednotlivého biocidního přípravku.
- (5) Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že přípravek „Soft Care Med H5“ spadá do definice „jednotlivý biocidní přípravek“ uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. r) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilý pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 uvedeného nařízení.
- (6) Dne 3. ledna 2024 agentura Komisi předala návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.
- (7) Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro přípravek „Soft Care Med H5“.
- (8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

⁽¹⁾ Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 22. listopadu 2023 k povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Soft Care Med H5“ (ECHA/BPC/401/2023), <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Diversey Europe Operations B.V. se uděluje povolení Unie s číslem EU-0032018-0000 pro dodávání na trh a používání jednotlivého biocidního přípravku „Soft Care Med H5“ v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku stanoveným v příloze.

Povolení Unie je platné od 6. října 2024 do 30. září 2034.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2024.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA
SOUHRN VLASTNOSTÍ BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU

Soft Care Med H5

Typ přípravku (typy přípravků)

PT01: Osobní hygiena

Číslo povolení: EU-0032018-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0032018-0000

Kapitola 1. ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1. Obchodní název (názvy) přípravku

Obchodní název (názvy)	Soft Care Med H5 Soft Care Med DivoCare Alco P VR203 DivoCare Alco P Soft Care Alcoplus Soft Care Impact Med PrimeSource MED Soft Care Alcogel PrimeSource Alcoplus PrimeSource Alcogel PrimeSource Hand Sanitizer STAPLES Med STAPLES Alcogel STAPLES Alcoplus STAPLES Hand Sanitizer Optimax Hand Sanitizer Optimax Med Optimax Alcogel Optimax Alcoplus Trust MED
------------------------	---

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresa	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Číslo povolení	EU-0032018-0000	
Číslo záznamu v registru R4BP	EU-0032018-0000	
Datum udělení povolení	6. října 2024	
Datum skončení platnosti povolení	30. září 2034	

1.3. Výrobce (výrobci) přípravku

Jméno (název) výrobce	Diversey Europe Operations B.V.
-----------------------	---------------------------------

Adresa výrobce	Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Itálie Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Nizozemsko Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes, Alferton Spojené království Velké Británie a Severního Irska Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro, Madrid Španělsko Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Německo

Jméno (název) výrobce	Multifill B.V.
Adresa výrobce	Constructieweg 25a, P.O. Box 367 3640 Mijdrecht Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25a, P.O. Box 367 3640 AJ Mijdrecht Nizozemsko

1.4. Výrobce (výrobci) účinné látky (účinných látek)

Účinná látka	Propan-1-ol
Jméno (název) výrobce	BASF SE
Adresa výrobce	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Německo
Umístění výrobních závodů	BASF SE site 1 Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Německo

Účinná látka	Propan-1-ol
Jméno (název) výrobce	OXEA Corporation
Adresa výrobce	2001 FM 3057 TX 77414 Bay City Spojené státy americké
Umístění výrobních závodů	OXEA Corporation site 1 2001 FM 3057 TX 77414 Bay City Spojené státy americké

Účinná látka	Propan-2-ol
Jméno (název) výrobce	SASOL Solvents Germany GmbH
Adresa výrobce	Anckelmannsplatz D-20537 Hamburg Německo

Umístění výrobních závodů	SASOL Solvents Germany GmbH site 1 Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Německo SASOL Solvents Germany GmbH site 2 Römerstr. 733 D-47443 Moers Německo
Účinná látka	Propan-2-ol
Jméno (název) výrobce	Shell Chemicals Europe B.V.
Adresa výrobce	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 Shell Nederland Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Nizozemsko
Účinná látka	Propan-2-ol
Jméno (název) výrobce	Exxon Mobil Chemicals
Adresa výrobce	Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgie
Umístění výrobních závodů	Exxon Mobil Chemicals site 1 ExxonMobil's Baton Rouge Refinery and Chemical Plant, 4045 Scenic Hwy LA 70805 Baton Rouge Spojené státy americké Exxon Mobil Chemicals site 2 Esso Refinery Fawley SO45 1TX Southampton Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Účinná látka	Propan-2-ol
Jméno (název) výrobce	Novapex
Adresa výrobce	21 Chemin de la Sauvegarde - 21 Ecully Parc - CS 33167 69134 Écully Cedex Francie
Umístění výrobních závodů	Novapex site 1 Novapex SAS Usine de Rousillon, Rue Gaston Monmousseau 38556 Saint Maurice l'Exil Francie

Kapitola 2. SLOŽENÍ A TYP SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení přípravku

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Propan-1-ol		účinná látka	71-23-8	200-746-9	2,96 % (w/w)
Propan-2-ol		účinná látka	67-63-0	200-661-7	70 % (w/w)

2.2. Typ (typy) složení

AL Jakákoliv jiná kapalina

Kapitola 3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Standardní věty o nebezpečnosti	H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený. P261: Zamezte vdechování par. P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P370 + P378: V případě požáru: K hašení použijte vodu. P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P405: Skladujte uzamčené. P501: Odstraňte obsah chemický odpad. P103: Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

Kapitola 4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ

4.1. Popis použití

Tabulka 1

PT01 – Hygienická dezinfekce na ruce

Typ přípravku	PT01: Osobní hygiena
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: žádné údaje Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: Obaleným virům Vývojové stadium: žádné údaje

	Latinský název: žádné údaje Obecný název: Viry s omezeným spektrem Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: Bacily tuberkulózy Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorech použití ve venkovním prostředí Dezinfekční prostředek na ruce připravený k použití v nemocnicích a jiných zdravotnických, institucionálních a průmyslových oblastech, restauracích a velkokapacitních jídelnách a rekreačních zařízeních. Není určeno pro domácí použití.
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Dávkování Podrobný popis: Pro dávkovač nebo vak s dávkovačem: Dezinfekční prostředek připravený k použití aplikujte na ruce. Naneste jej tak, aby zcela pokryl čisté ruce. Pro lahvičku s odklápěcím uzávěrem nebo víčkem: Nalijte tekutinu připravenou k použití do dlaně jedné ruky vytvarované do tvaru kelímku. Naneste ji tak, aby zcela pokryla čisté ruce.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Dospělý: 3 ml (množství kapaliny by se mělo podobat velikosti velké mince) se rovnají 3 načerpáním z dávkovače – Děti do 12 let: 2 ml se rovnají 2 načerpáním z dávkovače – Děti do 6 let: 1 ml se rovná 1 načerpání dávkovačem Ředění (%): Připraveno k použití Počet a načasování aplikace: Profesionální a průmyslový uživatel: Až 25 aplikací denně Neprofesionální uživatel: — Dospělí: Až 11 aplikací denně — Děti: Až 3 aplikace denně
Kategorie uživatelů	průmysl ; odborníci ; široká veřejnost (neodborná)
Velikost balení a obalový materiál	Profesionální a průmyslový uživatel: Pevná nádoba (odklápěcí uzávěr) z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE): 100, 150, 200, 500 ml Pevná nádoba (dávkovač/víčko) (HDPE): 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 900, 950, 1000 litrů Flexibilní nádoba (vak s dávkovačem/uzávěrem) z polyethylenu s nízkou hustotou (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 litru Neprofesionální: Pevná nádoba (odklápěcí uzávěr) (HDPE): 100, 150, 200, 500 ml Pevná nádoba (dávkovač/víčko) (HDPE): 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5 litrů Flexibilní nádoba (vak s čerpadlem/uzávěrem) (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 litru

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Dodržujte návod k použití.

Přípravek používejte na viditelně čisté ruce.

Krok 1: Použijte následující množství dezinfekčního prostředku:

- Dospělý: 3 ml (množství kapaliny by se mělo podobat velikosti velké mince) se rovnají 3 načerpáním z dávkovače
- Děti do 12 let: 2 ml se rovnají 2 načerpáním z dávkovače
- Děti do 6 let: 1 ml se rovná 1 načerpání dávkovačem

Vmasírujte do dlaně. Promněte si dlaně a rozetřete dezinfekční prostředek na celé ruce a prsty.

Krok 2: Promněte si hřbet levé ruky dlaní pravé ruky. Opakujte postup na druhé ruce.

Krok 3: Roztáhněte prsty a promněte si prostory mezi nimi. Opakujte postup na druhé ruce.

Krok 4: Promněte si dlaně s propojenými prsty (5krát).

Krok 5: Promněte si palec každé ruky krouživým pohybem.

Krok 6: Krouživými pohyby promněte špičky prstů vůči protější dlaní. Promněte si zápěstí oběma rukama. Nechte ruce zcela uschnout.

Udržujte pokožku vlhkou po dobu 30 sekund pro ochranu proti bakteriím, kvasinkám, bakteriím tuberkulózy a obaleným virům nebo 2 minuty proti virům s omezeným spektrem.

Neoplachujte.

Pokud potřebujete ruce znovu vydezinfikovat, postup opakujte.

Děti a batolata smí provádět dezinfekci rukou pouze pod dohledem dospělých: nejprve naneste množství pro dítě/batole na vlastní ruku, produkt naneste na ruce dítěte/batole a promněte je, dokud nebudou obě ruce zcela suché (viz pokyny v 6 krocích). Dbejte na to, aby se dítě/batole před uschnutím nedotýkalo očí nebo úst.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

Použití dětmi pouze pod dohledem dospělé osoby.

Zákaz použití pro děti do 1 roku.

Ujistěte se, že uživatel produkt aplikuje v oblasti, kde nebudou delší dobu přítomni další lidé.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

4.2. Popis použití

Tabulka 2

PT01 – chirurgická dezinfekce rukou

Typ přípravku	PT01: Osobní hygiena
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: žádné údaje Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: Viry s omezeným spektrem Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: Bacily tuberkulózy Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Chirurgický dezinfekční prostředek na ruce a předloktí připravený k použití v nemocnicích a jiných zdravotnických oblastech.
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Dispense Podrobný popis: Dezinfekční prostředek připravený k použití aplikujte nejméně 3krát (1 ml v každé dávce) na ruce (platí pro dávkovač / vak s dávkovačem) a promněte, abyste zcela pokryli čisté ruce a paže. NEBO Nalijte tekutinu připravenou k použití do dlaně jedné ruky vytvarované do tvaru kelímku (lahvička s odklápěcím uzávěrem nebo víčkem) a naneste ji tak, aby zcela pokryla čisté ruce a paže.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Porce 3 ml až 12 ml celkem Ředění (%): Připraveno k použití Počet a načasování aplikace: Až 4 aplikace denně.
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Pevná nádoba (odklápěcí uzávěr) z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE): 100, 150, 200, 500 ml Pevná nádoba (dávkovač/víčko) (HDPE): 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200 litrů Flexibilní nádoba (vak s dávkovačem/uzávěrem) z polyethylenu s nízkou hustotou (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 litru

4.2.1. Návod k danému způsobu použití

Přípravek používejte na viditelně čisté ruce a paže.

Nedoplňujte ani neslévejte produkty používané pro dezinfekci v chirurgickém prostředí.

Pro dávkovač / vak s dávkovačem:

Aplikujte nejméně 3krát (1 ml v každé dávce) na ruce a promněte, abyste zcela pokryli čisté ruce a paže až k lokti. Opakujte postup a použijte více 3ml porcí, abyste udrželi ruce a paže vlhké po dobu 2 minut.

Proti bakteriím, kvasinkám, bakteriím tuberkulózy a virům s omezeným spektrem je vhodné nechat pokožku vlhkou 2 minuty.

Neoplachujte.

Pokud potřebujete ruce znovu vydezinfikovat, postup opakujte. (Až 4 aplikace denně).

Pro lahvičku s odklápěcím uzávěrem nebo víčkem:

Nalijte tekutinu do dlaně jedné ruky vytvarované do tvaru kelímku a naneste ji tak, aby zcela pokryla čisté ruce a paže až k lokti. Opakujte postup a použijte více 3ml porcí, abyste udrželi ruce a paže vlhké po dobu 2 minut.

Proti bakteriím, kvasinkám, bakteriím tuberkulózy a virům s omezeným spektrem je vhodné nechat pokožku vlhkou 2 minuty.

Neoplachujte.

Pokud potřebujete ruce znovu vydezinfikovat, postup opakujte. (Až 4 aplikace denně).

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

Kapitola 5. **OBEČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ** ⁽¹⁾

5.1. **Návod k použití**

Viz konkrétní pokyny k použití pro jednotlivé účely

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Zabraňte kontaktu s očima.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

Vdechnutí: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Styk s kůží: Při běžném použití nejsou známy žádné účinky nebo příznaky.

Zasažení očí: Způsobuje silné podráždění.

Požítí: Požití může vést k nevolnosti a zvracení v důsledku lokálního podráždění a systémovým účinkům, jako je ospalost, ospalost, v některých případech bezvědomí a nízká hladina cukru v krvi (zejména u dětí).

⁽¹⁾ Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití.

PŘI VDECHNUTÍ: Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. V případě příznaků: Zavolejte 112/záchranku pro lékařskou pomoc. Pokud nemáte žádné příznaky: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Informace pro zdravotnický personál / lékaře: V případě potřeby zahajte opatření na podporu života a poté kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM.

PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Pokud dojde k podráždění, omyjte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě neúmyslného kontaktu s kůží omyjte vodou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování alespoň 5 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

Opatření na ochranu životního prostředí:

Zabraňte (přínému) úniku (nezředěného produktu) do životního prostředí / kanalizace.

Rozlitou látku zřed'te vodou a vytřete mopem.

5.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu

Zlikvidujte v souladu s národními nebo místními předpisy.

5.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování

Skladovatelné po dobu 2 roky.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Skladujte mimo dosah tepla a přímého slunečního světla.

Kapitola 6. DALŠÍ INFORMACE
