

I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2728/81

af 10. september 1981

om ændring af forordning (EØF) nr. 1727/70, (EØF) nr. 1728/70, (EØF) nr. 2603/71, (EØF) nr. 638/74 og (EØF) nr. 410/76 for så vidt angår deres anvendelse for de forskellige tobakssorter inden for fællesskabsproduktionen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse, særlig artikel 73,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 727/70 af 21. april 1970 om oprettelse af en fælles markedsordning for råttobak⁽¹⁾, senest ændret ved akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 3, første afsnit, artikel 5, stk. 6, artikel 6, stk. 10 og artikel 7, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1697/71 af 26. juli 1971 om finansiering af interventionsudgifter for råttobak⁽²⁾, ændret ved forordning (EØF) nr. 330/74⁽³⁾, særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

Rådets forordning (EØF) nr. 1534/81 af 19. maj 1981 om fastsættelse for 1981-høsten af målpriserne, interventionspriserne og de præmier, der ydes til købere af tobak i blade, samt de afledte interventionspriser for tobak i baller⁽⁴⁾ indeholder listen over de tobakssorter, der dyrkes i Grækenland, samt definitionen på deres referenckvaliteter; derfor bør der ske en tilpasning af de forordninger, hvis bestemmelser vedrører de forskellige tobakssorter og referenckvaliteter, nemlig følgende forordninger:

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 1727/70 af 25. august 1970 om gennemførelsesbestemmelserne for intervention inden for råttobaksektoren⁽⁵⁾, senest ændret ved forordning (EØF) nr. 290/81⁽⁶⁾,

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 2603/71 af 6. december 1971 om den nærmere udformning af kontrakter om en første bearbejdning og behandling af tobak, som interventionsorganerne ligger inde med⁽⁷⁾, senest ændret ved forordning (EØF) nr. 290/81,

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 638/74 af 20. marts 1974 om fastsættelse af tolerancegrænsen på den manko, der fremkommer som følge af oplagring af råttobak ved interventionsorganets foranstaltning⁽⁸⁾, ændret ved forordning (EØF) nr. 1979/79⁽⁹⁾,

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 410/76 af 23. februar 1976 om fastsættelse af det maksimumsvægttab, der er tilladt ved kontrollen efter den første bearbejdning og behandling af tobakken⁽¹⁰⁾, senest ændret ved forordning (EØF) nr. 290/81;

en tabel over tillæg og fradrag for de sorter, der dyrkes i Grækenland, blev ved bilag I i akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse indført i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1728/70⁽¹¹⁾, senest ændret ved forordning (EØF) nr. 290/81; den mere dybtgående bedømmelse af de græske tobakkers forskellige kvaliteter samt klassificeringen af de græske tobakssorter ved forordning (EØF) nr. 1534/81 gør dog en ændring af denne tabel nødvendig;

for tobaksblade, der opkøbes af interventionsorganerne, skal, ifølge artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 327/71⁽¹²⁾, kontrakterne om den første bearbejdning og behandling indgås efter licitation, hvor de mest fordelagtige tilbud kun kan antages på betingelse af, at de ikke overstiger et beløb, der skal fastsættes for hver sort;

⁽¹⁾ EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 1.

⁽²⁾ EFT nr. L 175 af 4. 8. 1971, s. 8.

⁽³⁾ EFT nr. L 37 af 9. 2. 1974, s. 5.

⁽⁴⁾ EFT nr. L 156 af 15. 6. 1981, s. 1.

⁽⁵⁾ EFT nr. L 191 af 27. 8. 1970, s. 5.

⁽⁶⁾ EFT nr. L 32 af 4. 2. 1981, s. 9.

⁽⁷⁾ EFT nr. L 269 af 8. 12. 1971, s. 11.

⁽⁸⁾ EFT nr. L 77 af 22. 3. 1974, s. 30.

⁽⁹⁾ EFT nr. L 228 af 8. 9. 1979, s. 23.

⁽¹⁰⁾ EFT nr. L 50 af 26. 2. 1976, s. 11.

⁽¹¹⁾ EFT nr. L 191 af 27. 8. 1970, s. 18.

⁽¹²⁾ EFT nr. L 39 af 17. 2. 1971, s. 3.

disse beløb blev fastsat i forordning (EØF) nr. 2603/71; siden den seneste ajourføring af beløbene har beregnings-elementerne ændret sig betydeligt for visse sorters vedkommende; beløbene bør derfor på ny ajourføres;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for Tobak –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1727/70 foretages følgende ændringer:

1. Bilag I ændres i overensstemmelse med bilag I til denne forordning.
2. Bilag II ændres i overensstemmelse med bilag II til denne forordning.
3. Bilag IV ændres i overensstemmelse med bilag III til denne forordning.

Artikel 2

I forordning (EØF) nr. 1728/70 foretages følgende ændringer:

1. Bilag I ændres i overensstemmelse med bilag IV til denne forordning.
2. Bilag II ændres i overensstemmelse med bilag V til denne forordning.

Artikel 3

Bilaget til forordning (EØF) nr. 2603/71 erstattes af bilag VI til denne forordning.

Artikel 4

Bilaget til forordning (EØF) nr. 638/74 erstattes af bilag VII til denne forordning.

Artikel 5

Forordning (EØF) nr. 410/76 ændres i overensstemmelse med bilag VIII til denne forordning.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Den anvendes første gang for tobak fra 1981-høsten.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 1981.

På Kommissionens vegne

Poul DALSGER

Medlem af Kommissionen

BILAG I

I bilag I til forordning (EØF) nr. 1727/70 foretages følgende ændringer:

I. Sortsbetegnelsen i løbenr. 1 ændres til:

»1. BADISCHER GEUDERTHEIMER«.

II. Nr. 10 affattes således:

»10. a) KENTUCKY og hybrider, b) MORO DI CORI, c) SALENTO.

- Kategori A: Store blade, fuldmodne, med fast og elastisk bladvæv, omhyggeligt tørrede og velkonserverede, af brun farve, uden beskadigelser, med god kombustibilitet.
- Kategori B: Fuldmodne blade med fast bladvæv uden tørrings- og konserveringsfejl, af brun farve, med nogle beskadigelser, med god kombustibilitet⁽¹⁾.
- Kategori C: Blade af tilstrækkelig modenhed, også med let eller groft bladvæv, med konserveringsfejl, af uensartet brun farve, også med fremtrædende beskadigelser.«

III. Sortsbetegnelsen i løbenr. 11 ændres til:

»11. a) FORCHHEIMER HAVANNA II c; b) NOSTRANO DEL BRENTA; c) RESISTENTE 142; d) GOJANO«.

IV. Følgende rubrikker tilføjes:

»17. BASMA

- Kvalitet I/II: Modne, ubeskadigede, sunde blade uden tørringsfejl; tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), længde op til 15 cm, farve: gylden, orange til rødgul, meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde; tyndkornede og af god tekstur; med kraftig behagelig aroma; god kombustibilitet.
- Kvalitet III: Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl; nogle spor af sygdom; tages fra alle bladpositioner; op til 20 cm lange; farve: lysegul, gulgrøn, rødlig eller lysebrun; af temmelig løs struktur og god tekstur; middel elastiske; med moderat glans; moderat kødfulde; meget god kombustibilitet; med kraftig behagelig aroma.
- Kvalitet IV: Magre, papirtynde eller umodne blade med udprægede tørringsfejl fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve, udprægede andre fejl, sygdoms- og insektangrebne, mild aroma; opfylder mindstekravene til intervention.
- Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde blade uden tørringsfejl; tages fra alle-bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), længde op til 15 cm, farve: gylden, orange til rødgul, meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde; tyndkornede og af god tekstur, med kraftig behagelig aroma og god kombustibilitet.

Den ovenfor beskrevne blade udgør 45 % af kvalitet I/III.

Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl; nogle spor af sygdom; tages fra alle bladpositioner; op til 20 cm lange; farve: lysegul, gulgrøn, rødlig eller lysebrun; af temmelig løs struktur og god tekstur; middel elastiske; med moderat glans; moderat kødfulde, med kraftig behagelig aroma og meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Kvalitetsreference.

18. KATERINI og lignende sorter

- Kvalitet I/II: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomata«), op til 20 cm lange, farve: lysegul eller orange til rødlig, af løs struktur, meget elastiske, med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet.
- Kvalitet III: Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, nogle spor af sygdom, tages fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul, orange, gulgrøn, rødlig eller lysebrun, af løs struktur, gennemsnitlig elasticitet og skinnende, moderat kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet.
- Kvalitet IV: Magre, papirtynde eller umodne blade med udprægede tørringsfejl fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve, udprægede fejl og stærkt sygdomsangrebne; opfylder mindstekravene til intervention.
- Kvalitet I/III: Modne, beskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), op til 20 cm lange, farve: lysegul eller orange til rødlig, af løs struktur, meget elastiske, med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet.

De ovennævnte blade udgør 45 % af kvalitet I/III.

Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, nogle spor af sygdom, tages fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul, orange, gulgrøn, rødlig eller lysebrun, af løs struktur, gennemsnitlig elasticitet og skinnende moderat kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III ⁽¹⁾.

19. Klassisk KABA KOULAK

- Kvalitet I/II: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topblade, op til 25 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og op til 20 cm lange for Karatzova og Kontoula, farve: middelgul til mørkegul, elastiske og med glans; af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet.
- Kvalitet III: Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, med små sygdomsspor, tages fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og 25 cm lange for Karatzova og Kontoula, farve: gul, gulgrøn, rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, middel elastiske og med moderat glans, meget god kombustibilitet.
- Kvalitet IV: Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med udprægede tørringsfejl og skader fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve; opfylder mindstekravene til intervention.
- Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topblade, op til 25 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og op til 20 cm lange for Karatzova og Kontoula, farve: middelgul til mørkegul, elastiske og med glans; af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III.

Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, med små sygdomsspor tages fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og 25 cm lange for Karatzova og Kontoula, farve: gul, gulgrøn, rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, middel elastiske og med moderat glans, meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III ⁽¹⁾.

(1) Kvalitetsreference.

20. a) Ikke-klassisk KABA KOULAK

b) ELASSONA, MYRODATA SMYRNE, TRAPEZOUS og PHI 1

Kvalitet I/II: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 20 cm for Ellassona og Phi 1 og op til 15 cm for Myrodata Smyrne, farve: lysegul til rødlig, meget elastiske og med glans, af temmelig løs struktur, god tekstur og udmærket kombustibilitet.

Kvalitet III: Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, tages fra alle bladpositioner, op til 35 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 25 cm lange for Ellassona og Phi 1 og op til 20 cm for Myrodata Smyrne, farve: gul, gulgrøn eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, meget god kombustibilitet.

Kvalitet IV: Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med udprægede tørringsfejl og alvorligt angrebne fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve; opfylder mindstekravene til intervention.

Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 20 cm for Ellassona og Phi 1 og op til 15 cm for Myrodata Smyrne, farve: lysegul til rødlig, meget elastiske og med glans, af temmelig løs struktur, god tekstur og udmærket kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III.

Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor tages fra alle bladpositioner, op til 35 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 25 cm lange for Ellassona og Phi 1 og op til 20 cm for Myrodata Smyrne, farve: gul, gulgrøn eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III ⁽¹⁾.

21. MYRIDATA AGRINION

Kvalitet I/II: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, stammer fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), op til 25 cm lange, farve: gul til mørkeorange, meget elastiske og med glans; af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet.

Kvalitet III: Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, stammer fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange, farve: gul, gulgrøn eller lys rødlig, temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske med glans, meget god kombustibilitet.

Kvalitet IV: Tilstrækkeligt modne og ubeskadigede blade med udprægede tørringsfejl og stærkt sygdomsangrebne fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve; opfylder minimumskravene til intervention.

Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, stammer fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), op til 25 cm lange, farve: gul til mørkeorange, meget elastiske og med glans; af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III.

Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor stammer fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange, farve: gul, gulgrøn eller lys rødlig, temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske med glans, meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Kvalitetsreference.

22. ZICHNOMYRODATA

- Kvalitet I/II: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 20 cm lange, farve: lysegul til lys orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet.
- Kvalitet III: Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med få lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, tages fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul, gulgrøn eller lys rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, meget god kombustibilitet.
- Kvalitet IV: Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade, med udprægede tørringsfejl og stærkt sygdomsangrebne fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve; opfylder mindstekravene til intervention.
- Kvalitet I/III: Modne ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 20 cm lange, farve: lysegul til lys orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III.

Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med få lette tørringsfejl, med små sygdomsspor tages fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul, gulgrøn eller lys rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III ⁽¹⁾.

23. TSEBELIA

- Kvalitet I/II: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, stammer fra alle bladpositioner med undtagelse af den første, op til 35 cm lange, farve: rødgul, orange til rødlig, af løs struktur, elasticitet og med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet.
- Kvalitet III: Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med nogle lette tørringsfejl, stammer fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: lysegul, gulgrøn, rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig elastiske og med middel glans, temmelig kødfulde, af temmelig god tekstur og meget god kombustibilitet. Denne kategori omfatter endvidere lettere angrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser.
- Kvalitet IV: Magre, papirtynde eller umodne blade med udprægede tørringsfejl fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve, udprægede fejl og stærkt sygdomsangrebne; opfylder minimumskravene til intervention.
- Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, stammer fra alle bladpositioner med undtagelse af den første, op til 35 cm lange, farve: rødgul, orange til rødlig, af løs struktur, elasticitet og med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 45 % af kvalitet I/III.

Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med nogle lette tørringsfejl, stammer fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: lysegul, gulgrøn rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig elastiske og med middel glans, temmelig kødfulde, af temmelig god tekstur og meget god kombustibilitet. Denne kategori omfatter endvidere lettere angrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser.

De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Kvalitetsreference.

24. MAVRA

Kvalitet I/II: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første («protomana»), op til 30 cm lange, farve: fra rødlig gul til orange og det rødlige, af løs struktur, god tekstur, god elasticitet, og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet.

Kvalitet III: Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, stammer fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: gullig, grøngul (citron), rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet. Denne kategori omfatter endvidere lettere angrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser.

Kvalitet IV: Magre, papirtynde eller umodne blade med udprægede tørringsfejl fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve, udprægede fejl og tydeligt sygdomsangrebne; opfylder mindstekravene til intervention.

Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første («protomana»), op til 30 cm lange, farve: fra rødlig gul til orange og det rødlige, af løs struktur, god tekstur, god elasticitet og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne udgør 45 % af kvalitet I/III.

Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, stammer fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: gullig, grøngul (citron), rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet. Denne kategori omfatter endvidere lettere angrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser.

De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III (1).

25. BURLEY GR

Kvalitet A: Helmodne blade, fuldstændig udviklede, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra midterpositionen, farve: ensartet middelbrun til rødbrun, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet (1).

Kvalitet B: Modne og tilstrækkeligt udviklede blade med mindre tørringsfejl, tilstrækkeligt ubeskadigede, let angrebne især fra de nederste positioner, farve: nøddebrun i forskellige nuancer, middelporøs struktur, middelfin tekstur og særdeles god kombustibilitet.

Kvalitet C: Modne, men ikke fuldt udviklede blade (grove), delvis beskadigede og tydeligt sygdomsangrebne, uanset størrelse, priming og farve, udprægede tørringsfejl (umodne, forbrændte), opfylder mindstekravene til intervention.

26. VIRGINIA GR

Kvalitet A: Helmodne, fuldstændigt udviklede, sunde og ubeskadigede blade uden tørringsfejl, farve: ensartet citrongul til middel orange, kødfulde, af god tekstur og god kombustibilitet, tages hovedsagelig fra midterpositionen (1).

Kvalitet B: Modne og udviklede blade, tilstrækkeligt ubeskadigede, let sygdomsangrebne og med mindre tørringsfejl, farve: let varierende citrongul, orange eller lyserød med let grønligt skær, god kombustibilitet, plukkes hovedsagelig fra de nederste positioner.

Kvalitet C: Modne, men ikke fuldt udviklede blade, tilstrækkeligt ubeskadigede, tydeligt angrebne uanset størrelse og priming, udprægede tørringsfejl, farve: varierende (fra gul til nøddebrun eller lysegrøn), opfylder mindstekravene til intervention.

(1) Kvalitetsreference.

BILAG II

I bilag II til forordning (EØF) nr. 1727/70 foretages følgende ændringer:

I. Sortsbetegnelsen i løbenr. 1 ændres til:

»1. BADISCHER GEUDERTHEIMER«.

II. Nr. 10.I. affattes således:

»10. a) KENTUCKY og hybrider, b) MORO DI CORI, c) SALENTO.

I. Tobak fra høsten i 1980 og senere år:

- Kategori A: Store blade, fuldmodne, med fast og elastisk bladvæv, godt tørrede og velkonserverede, af brun farve, uden beskadigelser, med god kombustibilitet.
- Kategori B: Fuldmodne blade med fast bladvæv uden tørrings- og konserveringsfejl, af brun farve, med nogle beskadigelser, med god kombustibilitet ⁽¹⁾.
- Kategori C: Blade af tilstrækkelig modenhed, også med let eller groft bladvæv, med konserveringsfejl, af uensartet brun farve, med fremtrædende beskadigelser.

III. Sortsbetegnelsen i løbenr. 11 ændres til:

»11. a) FORCHHEIMER HAVANNA II c), b) NOSTRANO DEL BRENTA, c) RESISTENTE 142, d) GOJANA«.

IV. Følgende rubrikker tilføjes:

17. BASMA

- Kvalitet I/II: Modne, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade; tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (protomana), op til 15 cm lange; farve: gylden, orange til rødgul; meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde, af løs struktur og god tekstur; med kraftig behagelig aroma; god kombustibilitet.
- Kvalitet III: Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, nogle spor af sygdom, op til 20 cm lange, farve: lysegul, rødlig eller lysebrun; af temmelig løs struktur og god tekstur, middel elastiske og med middel glans, moderat kødfulde; med kraftig behagelig aroma; meget god kombustibilitet.
- Kvalitet IV: Magre, papirtynde eller umodne blade med udprægede håndteringsfejl fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve, udprægede andre fejl, mild aroma, sygdoms- eller insektangrebne; opfylder kravene til intervention.
- Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade; tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (protomana), op til 15 cm lange; farve: gylden, orange til rødgul; meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde, af løs struktur og god tekstur med kraftig behagelig aroma god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 45% af kvalitet I/III.

Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, nogle spor af sygdom, op til 20 cm lange, farve: lysegul, rødlig eller lysebrun; af temmelig løs struktur og god tekstur, middel elastiske og med middel glans, moderat kødfulde; med kraftig behagelig aroma meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 55% af kvalitet I/III ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ Kvalitetsreference.

18. KATERINI og lignende sorter

- Kvalitet I/II: Modne, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade, tages fra alle bladpositioner (protomana), op til 20 cm lange, farve: lysegul eller orange til rødlig, af løs struktur, meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet.
- Kvalitet III: Modne blade med nogle beskadigelser og tørringsfejl, nogle spor af sygdom, stammer fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul, orange, gulgrøn, rødlig eller lysebrun, af løs struktur, temmelig kødfulde, god tekstur, gennemsnitlig elasticitet og skinnende, meget god kombustibilitet.
- Kvalitet IV: Magre, papirtynde eller umodne blade med udprægede håndteringsfejl fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve, udprægede andre fejl og stærkt sygdomsangrebne; opfylder mindstekravene til intervention.
- Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade, tages fra alle bladpositioner (protomana), op til 20 cm lange, farve: lysegul eller orange til rødlig, af løs struktur, meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 45 % af kvalitet I/III.

Modne blade med nogle beskadigelser og tørringsfejl, nogle spor af sygdom, stammer fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul, orange, gulgrøn, rødlig eller lysebrun, af løs struktur, temmelig kødfulde, god tekstur, gennemsnitlig elasticitet og skinnende og meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III ⁽¹⁾.

19. Klassisk KABA KOULAK

- Kvalitet I/II: Modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 25 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og op til 20 cm lange for Karatzova og Kontoula, farve: middelgul til mørkegul, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og udmærket kombustibilitet.
- Kvalitet III: Modne blade med lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og 25 cm for Karatzova og Kontoula, farve: gul til rødlig, af temmelig god tekstur, middel-elastiske og med glans, meget god kombustibilitet.
- Kvalitet IV: Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade, med udprægede håndteringsfejl og alvorlige skader fra alle primings uanset størrelse, farve: gulgrøn, grøn eller brun; opfylder mindstekravene til intervention.
- Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 25 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og op til 20 cm lange for Karatzova og Kontoula, farve: middelgul til mørkegul, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og udmærket kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III.

Modne blade med lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og 25 cm for Karatzova og Kontoula, farve: gul til rødlig, af temmelig god tekstur, middel-elastiske og med glans, meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Kvalitetsreference.

20. a) Ikke-klassisk KABA KOULAK

b) ELASSONA, MYRODATA SMYRNE, TRAPEZOUS og PHI 1

Kvalitet I/II: Modne, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade, stammer fra alle bladpositioner, med undtagelse af topbladene, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 20 cm lange for Ellassona og Phi 1, og op til 15 cm lange for Myrodata Smyrne, farve: lysegul til rødlig, meget elastiske og med glans, af temmelig løs struktur, god tekstur og med god kombustibilitet.

Kvalitet III: Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, tages fra alle bladpositioner, op til 35 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 25 for Ellassona og Phi 1, og op til 20 cm for Myrodata Smyrne, farve: gul til lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet.

Kvalitet IV: Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med udprægede håndteringsfejl og alvorligt angrebne fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve, men opfylder mindstekravene til intervention.

Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade, stammer fra alle bladpositioner, med undtagelse af topbladene, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 20 cm lange for Ellassona og Phi 1, og op til 15 cm lange for Myrodata Smyrne, farve: lysegul til rødlig, meget elastiske og med glans, af temmelig løs struktur, god tekstur og med god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 47 % af kvalitet I/III.

Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, tages fra alle bladpositioner, op til 35 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 25 for Ellassona og Phi 1, og op til 20 cm for Myrodata Smyrne, farve: gul til lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III ⁽¹⁾.

21. MYRODATA AGRINION

Kvalitet I/II: Modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, stammer fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (protomana), op til 25 cm lange, farve: gul til mørk orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet.

Kvalitet III: Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, stammer fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange, farve: gul til lys rødlig, temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet.

Kvalitet IV: Tilstrækkeligt modne og ubeskadigede blade med udprægede håndteringsfejl og alvorligt sygdomsangrebne fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve; opfylder mindstekravene til intervention.

Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, stammer fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (protomana), op til 25 cm lange, farve: gul til mørk orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 47 % af kvalitet I/III.

Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, stammer fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange, farve: gul til lys rødlig, temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Kvalitetsreference.

22. ZICHNOMYRODATA

- Kvalitet I/II:** Modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 20 cm lange, farve: lysegul til lys orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet.
- Kvalitet III:** Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, tages fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul til lys rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet.
- Kvalitet IV:** Magre, papirtynde eller umodne blade med udprægede håndteringsfejl og stærkt sygdomsangrebne fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve; opfylder kravene til intervention.
- Kvalitet I/III:** Modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 20 cm lange, farve: lysegul til lys orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III.

Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, tages fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul til lys rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III ⁽¹⁾.

23. TSEBELIA

- Kvalitet I/II:** Modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (protomana), op til 30 cm lange, farve: rødgul, orange til rødlig, af løs struktur, elastiske og med glans, temmelig kødfulde, god tekstur, og meget god kombustibilitet.
- Kvalitet III:** Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: lysegul til rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, temmelig kødfulde, temmelig god tekstur og meget god kombustibilitet. Denne kategori omfatter endvidere lettere sygdomsangrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser.
- Kvalitet IV:** Magre, papirtynde eller umodne blade med udprægede håndteringsfejl fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve, udprægede fejl og alvorligt sygdomsangrebne; opfylder mindstekravene til intervention.
- Kvalitet I/III:** Modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (protomana), op til 30 cm lange, farve: rødgul, orange til rødlig, af løs struktur, elastiske og med glans, temmelig kødfulde, god tekstur, og meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 45 % af kvalitet I/III.

Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: lysegul til rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, temmelig kødfulde, temmelig god tekstur og meget god kombustibilitet. Denne kategori omfatter endvidere lettere sygdomsangrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser.

De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Kvalitetsreference.

24. MAVRA

- Kvalitet I/II: Modne, ubeskadigede, sunde og omhyggeligt tørrede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første («protomana»), op til 30 cm lange, farve: fra rødgul eller orange til rødlig, af løs struktur, god tekstur, elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet.
- Kvalitet III: Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: gullig til rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet. Denne kategori omfatter også lettere sygdomsangrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser.
- Kvalitet IV: Magre, papirtynde eller umodne blade med udprægede håndteringsfejl fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve, alvorlige fejl og tydeligt sygdomsangrebne; opfylder mindstekravene til intervention.
- Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og omhyggeligt tørrede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første («protomana»), op til 30 cm lange, farve: fra rødgul eller orange til rødlig, af løs struktur, god tekstur, elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 45 % af kvalitet I/III.

Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: gullig til rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet. Denne kategori omfatter også lettere sygdomsangrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser.

De ovenfor nævnte blade udgør 55 % af kvalitet I/III (1).

25. BURLEY GR

- Kvalitet A: Helmodne, fuldstændig udviklede, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade, tages fra midterpositionen, farve: fra en ensartet middel nøddebrun til en ensartet middel rødbrun, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet (1).
- Kvalitet B: Modne og tilstrækkelig udviklede blade med mindre håndteringsfejl, tilstrækkelig ubeskadigede, let angrebne for det meste fra de lavere positioner, farve: forskellige nøddebrune nuancer, middelporøs struktur, middelfin tekstur og særdeles god kombustibilitet.
- Kvalitet C: Modne, men ikke fuldt udviklede (grove) blade, delvis beskadigede, tydelig sygdomsangrebne, uanset størrelse, priming eller farve, udprægede håndteringsfejl; opfylder mindstekravene til intervention.

26. VIRGINIA GR

- Kvalitet A: Helt modne og fuldstændig udviklede blade, tages fra midterpositionen, sunde, ubeskadigede, velplejede, farve: ensfarvet gul, der går fra citrongul til middelgul, af god tekstur og god kombustibilitet (1).
- Kvalitet B: Modne og udviklede blade hovedsagelig fra de nederste positioner, tilstrækkelig ubeskadigede, let sygdomsangrebne og med mindre håndteringsfejl, farve: skiftende mellem gul, citron, orange eller lyserød med let grønligt skær, god kombustibilitet.
- Kvalitet C: Modne, med ikke fuldt udviklede blade, tilstrækkelig ubeskadigede, tydelig angrebne, uanset størrelse og priming, udprægede håndteringsfejl, farve: varierende (fra gul til nøddebrun eller lysegrøn); opfylder mindstekravene til intervention.

(1) Kvalitetsreference.

BILAG III

I bilag IV til forordning (EØF) nr. 1727/70 foretages følgende ændringer:

I. Sortsbetegnelsen i løbenr. 1 ændres til:

»1. Badischer Geudertheimer«.

II. Angivelserne i løbenr. 11 ændres til:

»11.	a) Forchheimer Havanna II c)	}	26 %	16 %
	b) Nostrano del Brenta			
	c) Resistente 142			
	d) Gojano«.			

III. Følgende rubrikker tilføjes:

Løbenr.	Sort	Fugtighed	
		Tobak i blade	Tobak i baller
»17	Basma	17 %	13 %
18	Katerini og lignende sorter	16 %	13 %
19	Klassisk Kaba Koulak	17 %	13 %
20	a) Ikke-klassisk Kaba Koulak b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous og PHI 1	}	17 %
21	Myrodata Agrinion		
22	Zichnomyrodata	17 %	13 %
23	Tsebelia	14 %	13 %
24	Mavra	14 %	13 %
25	Burley GR	22 %	13 %
26	Virginia GR	19 %	13 %«

BILAG IV

I bilag I til forordning (EØF) nr. 1728/70 foretages følgende ændringer:

I. Sortsbetegnelsen i løbenr. 1 ændres til:

»1. Badischer Geudertheimer«.

II. Sortsbetegnelsen i løbenr. 11 ændres til:

»11. a) Forchheimer Havanna II c)
b) Nostrano del Brenta
c) Resistente 142
d) Gojano«.

III. Følgende rubrikker tilføjes:

Løbenr.	Sort	Kvalitet	Klasse I	Klasse II	Klasse III
17	Basma	I/III	112	100 ⁽¹⁾	
		I/II	139	124	
		III	91	81	
		IV	34	30	
18	Katerini og lignende sorter	I/III	100 ⁽¹⁾		
		I/II	124		
		III	81		
		IV	30		
19	Klassisk Kaba Koulak	I/III	100 ⁽¹⁾		
		I/II	112		
		III	89		
		IV	30		
20	a) Ikke-klassisk Kaba Koulak b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous og Phi 1	I/III	100 ⁽¹⁾	109	
		I/II	112	122	
		III	89	97	
		IV	30	33	
21	Myrodata Agrinion	I/III	100 ⁽¹⁾		
22	Zichnomyrodata	I/II	112		
		III	89		
		IV	30		
23	Tsebelia	I/III	128	115	100 ⁽¹⁾
		I/II	159	143	124
		III	104	93	81
		IV	38	35	30
24	Mavra	I/III	100 ⁽¹⁾	128	
		I/II	124	159	
		III	81	104	
		IV	30	38	
25	Burley GR	A	104	100 ⁽¹⁾	
		B	68	65	
		C	50	48	
26	Virginia GR	A	100 ⁽¹⁾		
		B	65		
		C	50		

⁽¹⁾ Referencekvalitet.

BILAG V

I bilag II til forordning (EØF) nr. 1728/70 foretages følgende ændringer:

I. Sortsbetegnelsen i løbenr. 1 ændres til:

- »1. Badischer Geudertheimer«.

II. Sortsbetegnelsen i løbenr. 11 ændres til:

- »11. a) Forchheimer Havanna II c)
b) Nostrano del Brenta
c) Resistente 142
d) Gojano«.

III. Følgende rubrikker tilføjes:

Løbenr.	Sort	Kvalitet	Klasse I	Klasse II	Klasse III
17	Basma	I/III	112	100 ⁽¹⁾	
		I/II	139	124	
		III	91	81	
		IV	34	30	
18	Katerini og lignende sorter	I/III	100 ⁽¹⁾		
		I/II	124		
		III	81		
		IV	30		
19	Klassisk Kaba Koulak	I/III	100 ⁽¹⁾		
		I/II	112		
		III	89		
		IV	30		
20	a) Ikke-klassisk Kaba Koulak b) Ellassona, Myrodata Smyrne, Trapezous og Phi 1	I/III	100 ⁽¹⁾	109	
		I/II	112	122	
		III	89	97	
		IV	30	33	
21	Myrodata Agrinion	I/III	100 ⁽¹⁾		
22	Zichnomyrodata	I/II	112		
		III	89		
		IV	30		
23	Tsebelia	I/III	128	115	100 ⁽¹⁾
		I/II	159	143	124
		III	104	93	81
		IV	38	35	30
24	Mavra	I/III	100 ⁽¹⁾	128	
		I/II	124	159	
		III	81	104	
		IV	30	38	
25	Burley GR	A	104	100 ⁽¹⁾	
		B	68	65	
		C	50	48	
26	Virginia GR	A	100 ⁽¹⁾		
		B	65		
		C	50		

⁽¹⁾ Referencekvalitet.

BILAG VI

Beløb omhandlet i artikel 1, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 327/71

Løbenr.	Sort	Beløb ECU/kg tobak i blade
1	Badischer Geudertheimer	0,684
2	Badischer Burley E	0,682
3	Virgin D	0,641
4	a) Paraguay og hybrider heraf b) Dragon vert og hybrider heraf Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	0,510
5	Nijkerk	0,410
6	a) Misionero og hybrider heraf b) Rio Grande og hybrider heraf	0,511
7	Bright	0,692
8	Burley I	0,644
9	Maryland	0,644
10	a) Kentucky og hybrider heraf b) Moro di Cori c) Salento	0,627
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	0,684
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio og lignende sorter	0,474
13	Xanti-Yakà	1,088
14	a) Perustitza b) Samsun	0,741
15	Erzegovina og lignende sorter	0,677
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	8,000
17	Basma	0,986
18	Katerini og lignende sorter	1,006
19	Klassisk Kaba Koulak	0,908
20	a) Ikke-klassisk Kaba Koulak b) Ellassona, Myrodata Smyrne, Trapezous og Phi 1	0,908
21	Myrodata Agrinion	0,908
22	Zichnomyrodata	0,908
23	Tsebelia	0,908
24	Mavra	0,908
25	Burley GR	0,501
26	Virginia GR	0,692

BILAG VII

TOLERANCER I PROCENT AF NETTOVÆGTEN

I. Tobak i blade opkøbt af interventionsorganet

Sort	I løbet af købsåret
Dark, air-cured (1, 4, 5, 6, 11, 12)	8 %
Fire-cured (10)	8 %
Særlige tobakker (10)	8 %
Light, air-cured (2, 8, 9, 25)	5 %
Flue-cured (3, 7, 26)	5 %
Sun-cured (13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)	8 %

II. Tobak i baller opkøbt af interventionsorganet

Sort	I løbet af købsåret	I løbet af de følgende år
Dark, air-cured (1, 4, 5, 6, 11, 12)	1,5 %	0,7 %
Fire-cured (10)	1,5 %	0,7 %
Særlige tobakker (16)	1,5 %	0,7 %
Light, air-cured (2, 8, 9, 25)	1,0 %	0,6 %
Flue-cured (3, 7, 26)	1,0 %	0,8 %
Sun-cured (13, 14, 15)	1,0 %	0,6 %
(17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)	2,0 %	1,0 %

BILAG VIII

I bilaget til forordning (EØF) nr. 410/76 foretages følgende ændringer:

I. Sortbetegnelsen i løbenr. 1 ændres til:

»1. Badischer Geudertheimer«.

II. Angivelserne i løbenr. 11 ændres til:

»11. a) Forchheimer Havanna II c)
b) Nostrano del Brenta
c) Resistente 142
d) Gojano«.

} 26%

III. Følgende rubrikker tilføjes:

Løbenr.	Sort	Maksimumsvægttab (i procent af nettovægten af tobak i blade) (1)
17	Basma	13,7
18	Katerini og lignende sorter	17,6
19	Klassisk Kaba Koulak	14,9
20	a) Ikke-klassisk Kaba Koulak b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous og Phi 1	14,9
21	Myrodata Agrinion	13,4
22	Zichnomyrodata	14,9
23	Tsebelia	14,9
24	Mavra	14,9
25	Burley GR	24,9
26	Virginia GR	14,0

(1) Disse satser forhøjes med 4 points for tobak, der har undergået tærskning.