

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1738/91

af 13. juni 1991

om fastsættelse for 1991-høsten af målpriser, interventionspriser og præmier til købere af tobak i blade, afledte interventionspriser for tobak i baller, referencekvaliteter og produktionsområder samt de maksimale garantimængder og om ændring af forordning (EØF) nr. 1331/90

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 727/70 af 21. april 1970 om oprettelse af en fælles markedsordning for råttobak ⁽¹⁾, senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1737/91 ⁽²⁾, særlig artikel 2, stk. 5, artikel 4, stk. 4 og 5, og artikel 6, stk. 8,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ⁽³⁾,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ⁽⁴⁾,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ⁽⁵⁾, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved fastsættelsen af priserne for råttobak bør der tages hensyn til målsætningerne for den fælles landbrugspolitik; den fælles landbrugspolitik har bl.a. til formål at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, at sikre forsyningerne og at sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsvarer;

målpriserne og interventionspriserne for tobak i blade bør fastsættes efter de kriterier, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 727/70, med henblik på at fremme en produktionsudvikling i retning af en omlægning af avlen til de sorter, der er mest efterspurgt og mest konkurrencedygtige samt mindst sundhedsfarlige;

for 1991-høsten bør der endvidere fastsættes afledte interventionspriser for de sorter, for hvilke der inden iværksættelsen af den fælles markedsordning, eller for sorter dyrket i Grækenland, Spanien og Portugal, før disse landes tiltrædelse fandtes en prisgaranti for tobak i baller, samt for de sorter, der hovedsagelig dyrkes i Tyskland, for at tage hensyn til handelssædvanerne i dette land;

da der for 1992-høsten vil blive forelagt en reform af fællesskabsbestemmelserne vedrørende tobak, er der ingen

grund til for nævnte høst at fastsætte en maksimal garantimængde for hver sort eller sortsgruppe af tobak, som produceres i Fællesskabet;

ved anvendelsen af bestemmelserne vedrørende ordningen med priser, præmier og kvantitativ kontrol med produktionen må der tages hensyn til kvalitetsforskelle som følge af jordbunds- og klimaforhold; dette gør sig gældende for sorterne Badischer Burley og Paraguay; der bør derfor fastsættes priser, præmier og maksimale garantimængder for specifikke produktionsområder for disse sorter;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 1331/90 ⁽⁶⁾ er der fastsat maksimale garantimængder for hver sort eller sortsgruppe tobak fra 1991-høsten; som følge af Tysklands forening bør de maksimale garantimængder for visse sorter ændres af hensyn til producenterne;

formålet med den præmie, der ydes til køberne af tobak, som produceres i Fællesskabet, er at gøre det muligt for dem at betale producenterne af tobak i blade en pris, som ligger på samme niveau som målprisen, under hensyntagen til prisudviklingen på verdensmarkedet og til det prisniveau, som er en følge af forholdet mellem udbud og efterspørgsel på Fællesskabets marked;

ovennævnte priser og præmien bør fastsættes for hver sort, der dyrkes i de anerkendte produktionszoner, og for en referencekvalitet, der er defineret således, at tobakkens kvalitet kan bedømmes så objektivt som muligt;

for 1991-høsten er det hensigtsmæssigt at anføre de anerkendte produktionsområder for hver enkelt tobakssort og benytte de definitioner af referencekvaliteter, som blev fastsat ved forordning (EØF) nr. 1331/90 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For 1991-høsten fastsættes de i artikel 2, stk. 3, litra b) og c), i forordning (EØF) nr. 727/70 omhandlede referencekvaliteter og anerkendte produktionsområder for hver af de i Fællesskabet producerede tobakssorter i blade som angivet i henholdsvis bilag I og bilag III til nærværende forordning.

⁽¹⁾ EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 1.

⁽²⁾ Se side 11 i denne Tidende.

⁽³⁾ EFT nr. C 104 af 19. 4. 1991, s. 88.

⁽⁴⁾ EFT nr. C 158 af 17. 6. 1991.

⁽⁵⁾ EFT nr. C 159 af 17. 6. 1991.

⁽⁶⁾ EFT nr. L 132 af 23. 5. 1990, s. 28.

Artikel 2

For 1991-høsten fastsættes de i artikel 6, stk. 3, litra b) og c), i forordning (EØF) nr. 727/70 omhandlede referencekvaliteter og anerkendte produktionsområder for hver af de i Fællesskabet producerede tobakssorter i baller, for hvilke der er fastsat en afledt interventionspris, som angivet i henholdsvis bilag II og bilag III til nærværende forordning.

Artikel 3

1. For 1991-høsten fastsættes de i artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 727/70 omhandlede målpriser, interventionspriser og præmier, der ydes til køberne af tobak i blade, samt de i artikel 6 i samme forordning omhandlede afledte interventionspriser for tobak i baller som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

2. Priserne og præmierne finder kun anvendelse, såfremt hver af disse sorter er blevet dyrket i de tilsvarende produktionsområder som angivet i bilag III, jf. dog artikel 7a i forordning (EØF) nr. 727/70.

3. Uanset artikel 4, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 727/70 fastsættes der ingen maksimale garantimængder for tobak i blade for 1992-høsten.

Artikel 4

Bilag V til forordning (EØF) nr. 1331/90 erstattes med det bilag V, som findes i bilag V til nærværende forordning.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. juni 1991.

På Rådets vegne

A. BODRY

Formand

BILAG I

Tobak i blade: sorter og deres referencekvalitet for 1991-høsten

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	Hauptgut (Leaves) af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede blade af mørkebrun til meleret farve, af ensartet længde Præsentation: Sorteret tobak, i bundter, i foreløbige baller eller i anden emballage, eventuelt bundet med et andet materiale end tobak Fugtighed: 26 %
2	Badischer Burley E og hybrider deraf	Hauptgut (Leaves) af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede, skærefaste blade af rødligbrun til lysebrun farve, af ensartet længde Præsentation: Sorteret tobak, i bundter, i foreløbige baller eller i anden emballage, eventuelt bundet med et andet materiale end tobak Fugtighed: 25 %
3	Virgin D og hybrider deraf	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede blade af gul til rødgul farve: afvigelser i brunlige til grønliggule farver er tilladt op til en tredjedel af bladfladen Præsentation: Sorteret tobak, i bundter, i foreløbige baller eller i anden emballage, eventuelt bundet med et andet materiale end tobak Fugtighed: 19 %
4	a) Paraguay og hybrider deraf b) Dragon vert og hybrider deraf, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Midterste blade (Leaves) af klasse 2 Klasse 2: Sunde blade med lette farvnings-, bladvævs- og modenhedsfejl, men med tilstrækkelig kombustibilitet Præsentation: Sorteret og bundtet eller sammenrullet tobak Fugtighed: 27 %
5	Nijkerk	Øverste blade (Tips) af klasse 2 Klasse 2: — enten blade af anden længde (45 cm eller derunder), med meget trækfast, kødfuldt, ubeskadiget modstandsdygtigt og elastisk bladvæv, uden fremtrædende åring, af god modenhed, der viser sig ved en brun til mørkebrun farve, af varm tone — eller blade af første længde (over 45 cm), med trækfast, kødfuldt, endnu ubeskadiget, modstandsdygtigt bladvæv, med mere eller mindre fremtrædende åring, af alle farver med undtagelse af flaskegrøn Præsentation: Sorteret og bundtet eller sammenrullet tobak Fugtighed: 27 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
6	a) Misionero og hybrider deraf b) Rio Grande og hybrider deraf	Blade af 2. kvalitet 2. kvalitet: Fuldt udviklede blade af længde over 45 cm, uden groft bladvæv, med en lys, noget gullig farve, af en varm eller temmelig varm tone, tilstrækkeligt faste og stort set ubeskadigede, med forholdsvis god kombustibilitet Præsentation: Sorteret og bundtet eller sammenrullet tobak, (capsé) Fugtighed: 27 %
7	Bright	Blade af kategori A Kategori A: Blade af tilstrækkelig modenhed, uden tørringsfejl, af åben tekstur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af gul farve i forskellige schatteringer Præsentation: I foreløbige baller på 30 til 40 kg Fugtighed: 16 %
8	Burley I	Blade af kategori A Kategori A: Blade af tilstrækkelig modenhed, uden tørringsfejl, af åben tekstur, også faste, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af mere eller mindre varm nøddebrun farve Præsentation: I foreløbige baller på 30 til 40 kg eller i bundter på 25 til 30 blade bundet med et andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 19 %
9	Maryland	Blade af kategori A Kategori A: Blade af tilstrækkelig modenhed, med lette tørringsfejl, med meget få bronzefarvede nuancer, med et bladvæv af middel tekstur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af en rødligbrun, nærmest varm farve Præsentation: I foreløbige baller på 30 til 40 kg eller i bundter på 25 til 30 blade bundet med andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 19 %
10	a) Kentucky og hybrider deraf b) Moro di Cori c) Salento	Blade af kategori B Kategori B: Fuldmodne blade med fast bladvæv, uden fejl som følge af tørring og opbevaring, af brun farve, med nogle beskadigelser, med god kombustibilitet Præsentation: I bundter på 25 til 30 blade bundet med andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 23 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Hybrider af Badischer Geudertheimer	Blade af kategori B Kategori B: Blade med fast eller magert bladvæv, uden tørringsfejl, af brun eller grønlig farve; med visse beskadigelser; modne, sunde blade af mørkebrun til meleret farve (hybrider af Badischer Geudertheimer) Præsentation: Sorteret tobak, i bundter eller i foreløbige baller, bundet med et andet materiale end tobak Fugtighed: 26 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio og lignende sorter	Blade af kategori B Kategori B: Blade af tilstrækkelig modenhed, med fast eller endog groft eller magert bladvæv, med ubetydelige fejl som følge af tørring, fermentering og beskadigelse Præsentation: I bundter på 25 til 30 blade bundet med et andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 24 %
13	Xanti-Yaka	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse af oval-elliptisk form, med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest åben-vinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet De midterste blades længde overstiger ikke 20 cm Præsentation: I foreløbige baller på 15 til 20 kg eller i kasser med »guirlander« af blade på 30 til 40 kg Fugtighed: 17 %
14	a) Perustitza b) Samsun	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse (Perustitza) eller med stilk (Samsun), elliptisk-lancetformede med tynde spidser (Perustitza) eller elliptisk runde (Samsun), med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest spidsvinklede årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve (Perustitza) eller henimod det rødlige (Samsun), med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet De midterste blades længde overstiger ikke 25 cm Præsentation: I foreløbige baller på 15 til 20 kg eller i kasser med »guirlander« af blade på 30 til 40 kg Fugtighed: 17 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet						
15	Erzegovina og lignende sorter	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse, af oval eller elliptisk form med nogenlunde fremtrædende ribber og nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet De midterste blades længde overstiger ikke 35 cm Præsentation: I foreløbige baller på 15 til 20 kg eller i kasser med »guirlander« af blade på 30 til 40 kg Fugtighed: 17 %						
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Blade af kategori B Kategori B: Midterste nedre blade, sorteret efter længde i følgende størrelsesforhold: <table><tr><td>første længde (38 cm og derover)</td><td>60 %</td></tr><tr><td>anden længde (på 32 cm og derover, men under 38 cm)</td><td>35 %</td></tr><tr><td>tredje længde (på 25 cm og derover, men under 32 cm)</td><td>5 %</td></tr></table> Blade af god form, fuldmodne og af ensartet farve, sunde, ubeskadigede, af fint bladvæv, elastiske og modstandsdygtige, uden fremtrædende ribber og årer, tilpas fermenteret og godt bevaret, af god kombustibilitet, med typisk smag og aroma, egnet til cigardæksblad med ca. 25 % beskadigede blade Præsentation: I bundter bundet med et andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 22 %	første længde (38 cm og derover)	60 %	anden længde (på 32 cm og derover, men under 38 cm)	35 %	tredje længde (på 25 cm og derover, men under 32 cm)	5 %
første længde (38 cm og derover)	60 %							
anden længde (på 32 cm og derover, men under 38 cm)	35 %							
tredje længde (på 25 cm og derover, men under 32 cm)	5 %							
17	Basmas	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde blade uden tørringsfejl; tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), længde op til 15 cm, farve: gylden, orange til rødgul, meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde, tyndkornede og af god tekstur, med kraftig behagelig aroma, god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 45 % af kvalitet I/III Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, nogle spor af sygdom, tages fra alle bladpositioner, op til 20 cm lange, farve: lysegul, gulgrøn, rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur og god tekstur, middelelastiske, med moderat glans, moderat kødfulde, med kraftig behagelig aroma, meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: Bondeballer på 15 til 25 kg, præsenteret på traditionel vis i to rækker pasteller (i lignende blade). (Det bør bemærkes, at områderne Astakos og Chrysoupolis præsenterer tobakken i »armathodema«) Fugtighed: 17 %						

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
18	Katerini og lignende sorter	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde blade uden tørringsfejl, fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (protomana), op til 20 cm lange, farve: lysegul eller orange til rødlig, af løs struktur, meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 45 % af kvalitet I/III Modne blade med nogle beskadigelser og/eller tørringsfejl, nogle spor af sygdom, fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul, orange, gulgrøn, rødlig eller lysebrun, af løs struktur, temmelig kødfulde, god tekstur, gennemsnitlig elasticitet og skinnende og meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: Guirlanderne samles for det meste efter præsentationsmåden »Baski« før emballeringen. Præsentation i baller på 25 til 35 kg efter den traditionelle metode kaldet »Kalup« Fugtighed: 16 %
19	a) Klassisk Kaba Koulak b) Ellassona	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde blade uden tørringsfejl, fra alle bladpositioner med undtagelse af topblade, op til 25 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og op til 20 cm lange for Ellassona, Karatzeva og Kontoula, farve: middelgul til mørkegul, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur, og udmærket kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III Modne blade med lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, nogle spor af sygdom, fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og 25 cm for Ellassona, Karatzova og Kontoula, farve: gul, gulgrøn, rødlig, af temmelig god tekstur, middelelastiske og med glans, ekstra god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: Bondeballer på 15 til 30 kg, præsenteret på traditionel vis i to rækker armathodema Fugtighed: 17 %
20	a) Ikke-klassisk Kaba Koulak b) Myrodata Smyrna, Trapezous og Phi 1	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde blade uden tørringsfejl, fra alle bladpositioner, med undtagelse af topblade, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 20 cm lange for Phi 1, og op til 15 cm lange for Myrodata Smyrna, farve: lysegul til rødlig, meget elastiske og med glans, af temmelig løs struktur, god tekstur og ekstra god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, fra alle bladpositioner, op til 35 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 25 cm for

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
20 (fortsat)	a) Ikke-klassisk Kaba Koulak b) Myrodata Smyrna, Trapezous og Phi 1	Phi 1, og op til 20 cm for Myrodata Smyrna, farve: gul, gulgrøn eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: Bondeballer på 25 til 35 kg, præsenteret på traditionel vis i armathodema, eller på 35 til 50 kg i form af Kalup Fugtighed: 17 %
21	Myrodata Agrinion	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde blade uden tørringsfejl, fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (Protomana), op til 25 cm lange, farve: gul til mørk orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange, farve: gul, gulgrøn eller lys rødlig, temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, ekstra god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: I bondeballer på 15 til 30 kg præsenteret på traditionel vis i to rækker armathodema Fugtighed: 15 %
22	Zichnomyrodata	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde blade uden tørringsfejl, fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 20 cm lange, farve: lysegul til lys orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og ekstra god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul til lys rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, ekstra god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: I bondeballer på 15 til 30 kg, præsenteret på traditionel vis i to rækker armathodema Fugtighed: 17 %
23	Tsebelia	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde blade uden tørringsfejl, fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (protomana), op til 35 cm lange, farve: rødgul, orange til rødlig, af løs struktur, elastiske og med glans, temmelig kødfulde, god tekstur og meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 45 % af kvalitet I/III

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
23 (fortsat)	Tsebelia	Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: lysegul, gulgrøn, rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, temmelig kødfulde, temmelig god tekstur og meget god kombustibilitet. Denne kategori omfatter endvidere lettere sygdomsangrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: I bondeballer på 30 til 40 kg, præsenteret i to rækker armathodema Fugtighed: 14 %
24	Mavra	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde blade uden tørringsfejl, fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (protomana) op til 30 cm lange, farve: fra rødgul til orange og rødlig, af løs struktur, god tekstur, elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 45 % af kvalitet I/III Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: gullig, gulgrøn (citron), rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet. Denne kategori omfatter også lettere sygdomsangrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: I bondeballer på 30 til 50 kg, præsenteret i to rækker armathodema Fugtighed: 14 %
25	Burley EL	Blade af kvalitet A Kvalitet A: Helmodne, fuldstændigt udviklede, ubeskadigede, sunde blade uden tørringsfejl, midterpositionen, farve: fra en ensartet middel nøddebrun til en ensartet middel rødbrun, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet Præsentation: I bondeballer på 50 til 70 kg, præsenteret i to rækker armathodema, uden snor (i løse blade) Fugtighed: 22 %
26	Virginia EL	Blade af kvalitet A Kvalitet A: Helt modne, fuldstændigt udviklede, sunde, ubeskadigede blade uden tørringsfejl, farve: ensfarvet citrongul til middelgul, kødfuld, af god tekstur og god kombustibilitet hovedsagelig fra midterpositionen Præsentation: I bondeballer på 30 til 40 kg, præsenteret i to rækker armathodema, uden snor (i løse blade) Fugtighed: 19 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
27	Santa Fé	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde blade uden tørringsfejl, med fuldstændigt reduceret midterribbe, af brun farve, med nogle beskadigelser Præsentation: Sorteret tobak i homogene foreløbige baller Fugtighed: 18 %
28	Fermenteret Burley	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde blade uden tørringsfejl, med fuldstændigt reduceret midterribbe, af god kombustibilitet, af nødde- til kanelbrun farve, med nogle beskadigelser Præsentation: Sorteret tobak i homogene foreløbige baller Fugtighed: 18 %
29	Havanna E	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde blade med fint bladvæv, med ikke for fremtrædende midterribbe og årer, uden tørringsfejl, med fuldstændigt reduceret midterribbe, af brun, lysebrun eller grønlig farve, med nogle beskadigelser Præsentation: Sorteret tobak i homogene foreløbige baller Fugtighed: 18 %
30	Round Scafati	Blade af klasse 1 Klasse 1: Blade af tilstrækkelig størrelse, af god modenhed, af ensartet farve, sunde, uden større beskadigelser, med fint bladvæv, elastiske og modstandsdygtige, med fin midterribbe og fine årer, godt bevarede, af god kombustibilitet, med typisk smag og aroma, anvendelige til cigardæksblade. Ca. 25 % beskadigede blade kan tolereres Præsentation: I homogene foreløbige baller indeholdende bundter bundet med et andet materiale end tobak Fugtighed: 18 %
31	Virginia E	Blade af klasse 1 Klasse 1: Blade af tilstrækkelig modenhed, uden tørringsfejl, med åben tekstur, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af citrongul eller orange farve Præsentation: I homogene foreløbige baller på 33 til 45 kg ubundtet tobak, sorteret efter bladposition Fugtighed: 16 %
32	Burley E	Blade af klasse 1 Klasse 1: Blade af tilstrækkelig modenhed, uden tørringsfejl, med åben tekstur, med ikke for fremtrædende midterribbe og årer, sunde, af kanelbrun farve i forskellige nuancer Præsentation: I homogene foreløbige baller på 33 til 45 kg ubundtet tobak, sorteret efter bladposition Fugtighed: 18 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
33	Virginia P	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne blade, med åben og elastisk tekstur, glatte, af citrongul til orange farve, med glans, længere end 40 cm, de første og sidste bladpositioner dog ikke medregnet Præsentation: I foreløbige baller på 45 kg med ordnede blade Fugtighed: 17 %
34	Burley P	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne blade, med åben og elastisk tekstur, af skinnende farve, længde på over 40 cm, de første og sidste bladpositioner dog undtaget Præsentation: I foreløbige baller på 35 kg med ordnede blade Fugtighed: 22 %

BILAG II

Tobaksballer: sorter og deres referencekvaliteter for 1991-høsten

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	Hauptgut (Leaves) af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede blade af meleret til mørkebrun farve, af ensartet længde, normalt fermenteret Præsentation: I baller eller kasser på ca. 75 til 220 kg eller i fade på ca. 225 til 450 kg Fugtighed: 16 %
2	Badischer Burley E og hybrider deraf	Hauptgut (Leaves) af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede, skærefaste blade af lysebrun, rødligbrun til mørkebrun farve, af ensartet længde, normalt fermenteret Præsentation: I baller eller kasser på ca. 75 til 220 kg eller i fade på ca. 225 til 450 kg Fugtighed: 15 %
3	Virgin D og hybrider deraf	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede blade af gul, gulrød til brunliggul farve, normalt fermenteret Præsentation: I baller eller kasser på ca. 75 til 220 kg eller i fade på ca. 225 til 450 kg Fugtighed: 13 %
7	Bright	Blade af kategori A Kategori A: Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt behandlet, af åben tekstur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af gul farve i forskellige scharteringer Præsentation: I fade på ca. 280 til 450 kg eller i kasser på ca. 150 til 210 kg Fugtighed: 13 %
8	Burley I	Blade af kategori A Kategori A: Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt behandlet, af åben tekstur, også faste, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af mere eller mindre varm nøddebrun farve Præsentation: I fade på ca. 280 til 450 kg eller i kasser på ca. 150 til 210 kg Fugtighed: 13 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
9	Maryland	Blade af kategori A Kategori A: Blade af tilstrækkelig modenhed, med lette tørringsfejl, selv med meget få bronzefarvede nuancer, med et bladvæv af middel tekstur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af en rødligbrun mere eller mindre varm farve Præsentation: I fade på 280 til 450 kg eller i kasser på ca. 150 til 210 kg Fugtighed: 13 %
10	a) Kentucky og hybrider deraf b) Moro di Cori c) Salento	Blade af kategori B Kategori B: Fuldmodne blade med fast bladvæv uden fejl som følge af behandling og opbevaring, af brun farve, med nogle beskadigelser, med god kombustibilitet Præsentation: I fade på ca. 280 til 450 kg, i baller på ca. 170 til 200 kg eller i kasser på ca. 150 til 200 kg Fugtighed: 16 %
11	a) Forchheimer Havanna II C b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Hybrider af Badischer Geudertheimer	Blade af kategori B Kategori B: Blade med fast eller magert bladvæv, sunde, uden tørringsfejl, af brun til grønlig farve, med visse beskadigelser; modne, sunde, blade af let meleret til mørkebrun farve, normalt fermenteret (hybrider af Badischer Geudertheimer) Præsentation: I baller eller kasser på ca. 75 til 200 kg eller i fade på ca. 225 til 450 kg Fugtighed: 16 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio og lignende sorter	Blade af kategori B Kategori B: Blade af tilstrækkelig modenhed, med fast eller endog groft eller magert bladvæv, med ubetydelige fejl som følge af behandling, fermentering og beskadigelse Præsentation: I baller på ca. 120 kg eller i fade på ca. 330 kg Fugtighed: 16 %
13	Xanti-Yakà	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse, af oval-elliptisk form, med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest åben-vinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet De midterste blades længde overstiger ikke 20 cm Præsentation: I små baller på ca. 18 til 50 kg Fugtighed: 13 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet						
14	a) Perustitza b) Samsun	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse (Perustitza) eller med stilk (Samsun), elliptisk-lancetformede med tynde spidser (Perustitza) eller elliptisk-runde (Samsun), med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest spidsvinklede årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet De midterste blades længde overstiger ikke 25 cm Præsentation: I små baller på ca. 18 til 50 kg Fugtighed: 13 %						
15	Erzegovina og lignende sorter	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse af oval eller elliptisk form med nogenlunde fremtrædende ribber og nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet De midterste blades længde overstiger ikke 35 cm Præsentation: I små baller på ca. 18 til 50 kg Fugtighed: 13 %						
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Blade af kategori B Kategori B: Midterste nedre blade sorteret efter længde i følgende størrelsesforhold: <table><tr><td>første længde (38 cm og derover)</td><td>60 %</td></tr><tr><td>anden længde (på 32 cm og derover, men under 38 cm)</td><td>35 %</td></tr><tr><td>tredje længde (på 25 cm og derover, men under 32 cm)</td><td>5 %</td></tr></table> Blade af god form; fuldmodne og af ensartet farve, sunde, ubeskadigede, af fint bladvæv, elastiske og modstandsdygtige, uden fremtrædende ribber og årer, tilpas fermenteret og godt bevaret, af god kombustibilitet, med typisk smag og aroma egnet til cigardæksblad, med ca. 25 % beskadigede blade Præsentation: I baller på ca. 70 til 90 kg eller i kasser på ca. 180 til 210 kg Fugtighed: 16 %	første længde (38 cm og derover)	60 %	anden længde (på 32 cm og derover, men under 38 cm)	35 %	tredje længde (på 25 cm og derover, men under 32 cm)	5 %
første længde (38 cm og derover)	60 %							
anden længde (på 32 cm og derover, men under 38 cm)	35 %							
tredje længde (på 25 cm og derover, men under 32 cm)	5 %							
17	Basmas	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde, veltørrede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), længde op til 15 cm, farve: gylden, orange til rødgul, meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde, tyndkornede og af god tekstur, med kraftig behagelig aroma, god kombustibilitet						

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
17 (fortsat)	Basmas	De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 45 % af kvalitet I/III Modne, tilstrækkeligt ubeskadigede blade med nogle lette tørringsfejl, nogle spor af sygdom, op til 20 cm lange, farve: lysegul, gulgrøn, rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur og god tekstur, middel elastiske, med moderat glans, moderat kødfulde, med typisk kraftig aroma, meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13 %
18	Katerini og lignende sorter	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede og sunde, veltørrede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), op til 20 cm lange, farve: lysegul eller orange til rødlig, af løs struktur, meget elastiske, med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet De ovennævnte blade (I/II) udgør 45 % af kvalitet I/III Modne blade med nogle lette beskadigelser og tørringsfejl, nogle spor af sygdom, tages fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul, orange, gulgrøn, rødlig eller lysebrun, af løs struktur, gennemsnitlig elasticitet og skinnende moderat kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13 %
19	a) Klassisk Kaba Koulak b) Ellassona	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde blade omhyggeligt behandlede fra alle bladpositioner med undtagelse af topblade, op til 25 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og op til 20 cm lange for Ellassona, Karatzova og Kontoula, farve: middelgul til mørkegul, elastiske og med glans; af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, med små sygdomsspor tages fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og 25 cm lange for Ellassona, Karatzova og Kontoula, farve: gul til rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, middel elastiske og med glans, ekstra god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
20	a) Ikke-klassisk Kaba Koulak b) Myrodata Smyrna, Trapezous og Phi 1	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde veltørrede blade, fra alle bladpositioner med undtagelse af topblade, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 20 cm for Phi I og op til 15 cm for Myrodata Smyrna, farve: lysegul til rødlig, meget elastiske og med glans, af temmelig løs struktur, god tekstur og ekstra god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 47 % af kvalitet I/III Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, tages fra alle bladpositioner, op til 35 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 25 cm lange for Phi 1 og op til 20 cm for Myrodata Smyrna, farve: gul til lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13 %
21	Myrodata Agrinion	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde blade, omhyggeligt behandlet, fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), op til 25 cm lange, farve: gul til mørkeorange, meget elastiske og med glans; af løs struktur, god tekstur og ekstra god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 47 % af kvalitet I/III Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor stammer fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange, farve: gul, gulgrøn eller lys rødlig, temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske med glans, ekstra god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 14 %
22	Zichnomyrodata	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde blade, omhyggeligt behandlet, fra alle bladpositioner med undtagelse af topblade, op til 20 cm lange, farve: lysegul til lys orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og ekstra god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III Modne, og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul til lysrødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, ekstra god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
23	Tsebelia	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde blade, omhyggeligt behandlet, fra alle bladpositioner med undtagelse af den første, op til 30 cm lange, farve: rødgul, orange til rødlig, af løs struktur, god elasticitet og med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 45 % af kvalitet I/III Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med nogle lette tørringsfejl, fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: lysegul til rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig elastiske og med middel glans, temmelig kødfulde, af temmelig god tekstur og meget god kombustibilitet. Denne kategori omfatter endvidere blade med lette sygdomsangreb og/eller lette beskadigelser De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13 %
24	Mavra	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde, omhyggeligt behandlede blade, fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), op til 30 cm lange, farve: fra rødgul eller orange til rødlig, af løs struktur, god tekstur, god elasticitet og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet De ovenfor beskrevne udgør 45 % af kvalitet I/III Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: gullig til rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet Denne kategori omfatter endvidere blade med lette sygdomsangreb og/eller lette beskadigelser De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13 %
25	Burley EL	Blade af kvalitet A Kvalitet A: Helmodne blade, fuldstændigt udviklede, ubeskadigede, sunde, veltørrede blade, tages fra midterpositionen, farve: ensartet middelbrun til rødbrun, af løs struktur, god tekstur og ekstra god kombustibilitet Præsentation: I baller på ca. 100 kg eller i kasser på ca. 200 kg eller i fade på ca. 240 til 280 kg Fugtighed: 13 %
26	Virginia EL	Blade af kvalitet A Kvalitet A: Helmodne, fuldstændigt udviklede, sunde, omhyggeligt behandlede blade, tages fra midterpositionen, farve: ensartet gul fra citrongul til middel orange, af god tekstur og god kombustibilitet Præsentation: I baller på ca. 100 kg Fugtighed: 13 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
27	Santa Fé	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, godt fermenterede blade, af brun eller mørkebrun farve, med nogle beskadigelser Præsentation: I baller på 80 til 100 kg eller i kasser på 150 til 210 kg Fugtighed: 14 %
28	Fermenteret Burley	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, godt fermenterede blade, af brun farve, med nogle beskadigelser Præsentation: I baller på 80 til 100 kg eller i kasser på 150 til 210 kg Fugtighed: 14 %
29	Havanna E	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde blade, med fint bladvæv, med ikke for fremtrædende midterribber og årer, godt fermenterede, af brun, lysebrun eller grønlig farve, med nogle beskadigelser Præsentation: I baller på 80 til 100 kg eller i kasser på 150 til 210 kg Fugtighed: 14 %
30	Round Scafati	Blade af klasse 1 Klasse 1: Blade af tilstrækkelig størrelse, af god modenhed, af ensartet farve, sunde, uden større beskadigelser, med fint bladvæv, elastiske og modstandsdygtige, med fin midterribbe og fine årer, godt bevarede, af god kombustibilitet, med typisk smag og aroma, godt fermenterede, anvendelige til cigardæksblade Ca. 25 % beskadigede blade kan tolereres Præsentation: I baller på 70 til 100 kg eller i kasser på 180 til 210 kg Fugtighed: 14 %
31	Virginia E	Blade af klasse 1 Klasse 1: Blade af tilstrækkelig modenhed, med åben tekstur, med ikke for fremtrædende midterribber og årer, sunde, af gul farve i forskellige nuancer fra citrongul til orange Præsentation: I kasser på 170 til 210 kg Fugtighed: 14 %
32	Burley E	Blade af klasse 1 Klasse 1: Blade af tilstrækkelig modenhed, med åben tekstur, med ikke for fremtrædende midterribber og årer, sunde, af kanelbrun farve i forskellige nuancer Præsentation: I kasser på 150 til 210 kg Fugtighed: 14 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
33	Virginia P	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne blade, omhyggeligt behandlet, med åben og elastisk tekstur, glatte, af citrongul til orange farve, med glans, længde på over 40 cm, den første og sidste bladposition dog undtaget Præsentation: I kasser med ubundtet tobak på 200 kg Fugtighed: 12,5 %
34	Burley P	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne blade, omhyggeligt behandlet, med åben og elastisk tekstur, af skinnende farve, længde på over 40 cm, den første og sidste bladposition dog undtaget Præsentation: I kasser med ubundtet tobak på 180 kg Fugtighed: 13 %

BILAG III

Anerkendte produktionsområder for de i Fællesskabet producerede sorter af tobak

Sort	Land	Produktionsområde
1. Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	Tyskland Frankrig	Rhinsletten og de tilstødende dale, Midtfranken, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine, Val-de-Loire, Poitou-Bretagne og Centre
2. Badischer Burley E og hybrider deraf	Tyskland Frankrig Italien	Rhinsletten og de tilstødende dale, Midtfranken, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen A(*) { Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Val-de-Loire, Centre, Poitou-Bretagne, Bourgogne, Charente og Languedoc-Roussillon B(*) Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna
3. Virgin D og hybrider deraf	Tyskland Frankrig	Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Franken, Rhinsletten med tilstødende dale, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Provence, Val-de-Loire, Centre, Poitou-Bretagne, Charente, Languedoc-Roussillon, Normandie, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie og Ile-de-France
4. a) Paraguay og hybrider deraf	Frankrig Italien Belgien	A(*) { Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne-Limousin, Poitou-Bretagne, Charente, Val-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence, Franche-Comté, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Normandie og Bourgogne B(*) Molise og Campania C(*) Flandern
b) Dragon vert og hybrider deraf, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Frankrig Belgien	A(*) Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Val-de-Loire og Alsace-Lorraine B(*) Flandern, Hainaut, Namur og Luxembourg
5. Nijkerk	Frankrig	Departementerne Lot og Aveyron
6. Misionero	Frankrig	Ile de la Réunion
7. Bright	Italien	Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicata, Puglia og Calabria
8. Burley I	Italien	Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicata, Puglia og Sicilia
9. Maryland	Italien	Friuli, Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise og Campania
10. Kentucky	Italien Spanien	Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania Extremadura, Andalucía
11. a) F. Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Hybrider af Badischer Geudertheimer	Italien Italien	Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise og Campania Veneto, Toscana, Molise, Campania, Lazio og Puglia
12. Beneventano Brasile Selvaggio	Italien	Campania Sicilia
13. Xanti-Yakà	Italien	Abruzzi, Campania, Basilicata og Puglia

Sort	Land	Produktionsområde
14. a) Perustitza b) Samsun	Italien	Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia og Sicilia
15. Erzegovina	Italien	Lazio, Abruzzi og Puglia
16. Round Tip	Grækenland Italien	Midtmakedonia Campania
17. Basmás	Grækenland	Thraki, Makedonia, Midtgrækenland og Thessalia
18. a) Katerini b) Lignende sorter	Grækenland	Makedonia Makedonia, Midtgrækenland, Ipiros og Thessalia
19. a) Klassisk Kaba Koulak b) Ellassona	Grækenland Grækenland	Makedonia Thessalia
20. Ikke-klassisk Kaba Koulak	Grækenland	Makedonia, Thessalia, Midtgrækenland, Thraki, Ipiros, Peloponnes og øerne
21. Myrodata Agrinion	Grækenland	Midtgrækenland
22. Zichnomyrodata	Grækenland	Thessalia
23. Tsebelia	Grækenland	Ipiros og Midtgrækenland
24. Mavra	Grækenland	Thessalia, Peloponnes og Midtgrækenland
25. Burley EL	Grækenland	Makedonia og Thessalia
26. Virginia EL	Grækenland	Midtgrækenland, Thessalia, Makedonia, Thraki, Peloponnes og Ipiros
27. Santa Fé	Spanien	Andalucía
28. Burley fermenteret	Spanien	Extremadura, Andalucía, Castilla-Léon, Castilla-la Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, Rioja, Cataluna, Madrid
29. Havana E	Spanien	Castilla-Léon, Navarra, Galicia, Asturias, Cantabria
30. Round Scafati	Spanien	Galicia, Asturias, Navarra, Castilla-Léon, Cantabria
31. Virginia E	Spanien	Extremadura, Andalucía, Castilla-Léon, Castilla-la Mancha
32. Burley E	Spanien	Extremadura, Andalucía, Castilla-Léon, Castilla-la Mancha
33. Virginia P	Portugal	Beira Interior, Ribatejo Oeste, Alentejo, Regiao Autonoma dos Açores
34. Burley P	Portugal	Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Duoro e Minho, Trás-os-Montes, Regiao Autonoma dos Açores

(*) Specifikt produktionsområde, jf. artikel 4, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 727/70.

BILAG IV

Målpriser, interventionspriser og præmier for tobak i blade for 1991-høsten

Afløste interventionspriser for tobak i baller for 1991-høsten

(ECU/kg)

Løbe-nummer	Sort	Målpris	Interventions-pris	Præmie	Afløst interventions-pris
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	3,637	3,091	2,530	4,636
2	Badischer Burley E og hybrider heraf	4,504	3,829	2,956	5,417
3	Virgin D og hybrider heraf	4,618	3,925	2,922	5,171
4	a) Paraguay og hybrider deraf (område A og C) b) Dragon vert og hybrider deraf, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appel terre c) Paraguay og hybrider deraf (område B)	3,394 2,953	2,885 2,510	2,348 2,043	— —
5	Nijkerk	3,351	2,849	2,128	—
6	a) Misionero og hybrider deraf b) Rio Grande og hybrider deraf	3,123	2,654	2,155	—
7	Bright	4,063	3,454	2,457	4,756
8	Burley I	2,474	2,102	1,748	3,202
9	Maryland	3,307	2,811	1,872	4,007
10	a) Kentucky og hybrider heraf b) Moro di Cori c) Salento	2,791	2,373	1,902	3,341
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Hybrider af Badischer Geudertheimer	2,351	1,763 ⁽¹⁾	1,658	2,957 ⁽¹⁾
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio og lignende sorter	1,270	1,079	0,935	1,825
13	Xanti-Yakà	3,056	2,598	2,251	4,324
14	a) Perustitza b) Samsun	2,893	2,459	2,142 2,085	3,737 3,761
15	Erzegovina og lignende sorter	2,599	2,209	1,930	3,371
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	13,816	11,744	8,345	18,731
17	Basmas	6,080	5,168	3,067	6,902
18	Katerini og lignende sorter	5,064	4,305	2,729	6,185
19	a) Klassisk Kaba Koulak b) Ellassona	3,774	3,208	1,950	4,687
20	a) Ikke-klassisk Kaba Koulak b) Myrodata Smyrna, Trapezous og Phi I	2,843	2,417	1,335	3,799
21	Myrodata Agrinion	3,752	3,189	1,970	4,608
22	Zichnomyrodata	3,898	3,313	2,078	4,805
23	Tsebelia	2,359	1,769 ⁽¹⁾	1,914	3,072 ⁽¹⁾

Løbe-nummer	Sort	Målpris	Interventions-pris	Præmie	Afledt interventions-pris
24	Mavra	2,303	1,727 ⁽¹⁾	1,565	3,025 ⁽¹⁾
25	Burley EL	2,247	1,910 ⁽¹⁾	1,496	3,031 ⁽¹⁾
26	Virginia EL	3,572	3,036	2,951	4,240
27	Santa Fé	1,381	1,174	0,300	2,031
28	Burley fermenteret	2,236	1,901	0,929	2,918
29	Havana E	2,873	2,442	1,949	3,627
30	Round Scafati	7,529	6,400	5,134	11,408
31	Virginia E	4,252	3,614	2,209	5,031
32	Burley E	2,960	2,516	1,717	3,782
33	Virginia P	4,256	3,617	2,350	4,944
34	Burley P	3,067	2,607	1,717	3,890

⁽¹⁾ Under hensyntagen til anvendelsen af artikel 13 i forordning (EØF) nr. 727/70.

BILAG V

»BILAG V

Maksimale garantimængder for hver sort og sortsgruppe for tobak i blade fra 1991-høsten

(tons)

Gruppe og sort (løbenummer)	Maksimal garantimængde for 1991
GRUPPE I	
3 Virgin D	14 050
7 Bright	46 750
31 Virginia E	20 000
33 Virginia P	4 500
17 Basmas	30 000
18 Katerini	23 000
26 Virginia EL	17 000
I alt	155 300
GRUPPE II	
2 Badischer Burley	
— for område A	11 200
— for område B	4 300
8 Burley I	46 750
9 Maryland	3 500
25 Burley EL	11 000
28 Fermenteret Burley	22 000
32 Burley E	
34 Burley P	
I alt	101 250
GRUPPE III	
1 Badischer Geudertheimer	5 050
4 Paraguay	
— for område A	16 000
— for område B	2 700
— for område C	2 000
5 Nijkerk	1 500
6 Misionero	
27 Santa Fé	
29 Havana E	8 500
10 Kentucky	
16 Round Tip	
30 Round Scafati	200
I alt	35 950
GRUPPE IV	
13 Xanti-Yakà	20 000
14 Perustitza	
15 Erzegovine	
19 Klassisk Kaba Koulak	30 000
20 Ikke-klassisk Kaba Koulak	
21 Myrodata	
22 Zychnomyrodata	
I alt	50 000
GRUPPE V	
11 a) Forchheimer Havanna II c	21 000
b) Nostrano del Brenta	
c) Resistente 142	
d) Gojano	
e) Hybrider af Badischer Geudertheimer	
12 Beneventano	26 500
23 Tsebelia	
24 Mavra	
I alt	47 500«