

Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

**► B** **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
της 9ης Μαρτίου 2012

σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 83 της 22.3.2012, σ. 1)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
► <b><u>M1</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1050/2012 της Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 2012	L 310	45	9.11.2012
► <b><u>M2</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 25/2013 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2013	L 13	1	17.1.2013
► <b><u>M3</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 497/2013 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2013	L 143	20	30.5.2013
► <b><u>M4</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 724/2013 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2013	L 202	11	27.7.2013
► <b><u>M5</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 739/2013 της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 2013	L 204	35	31.7.2013
► <b><u>M6</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 816/2013 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2013	L 230	1	29.8.2013
► <b><u>M7</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 817/2013 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2013	L 230	7	29.8.2013
► <b><u>M8</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1274/2013 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2013	L 328	79	7.12.2013
► <b><u>M9</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 264/2014 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2014	L 76	22	15.3.2014
► <b><u>M10</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 298/2014 της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2014	L 89	36	25.3.2014
► <b><u>M11</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 497/2014 της Επιτροπής της 14ης Μαΐου 2014	L 143	6	15.5.2014
► <b><u>M12</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 506/2014 της Επιτροπής της 15ης Μαΐου 2014	L 145	35	16.5.2014
► <b><u>M13</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 685/2014 της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2014	L 182	23	21.6.2014
► <b><u>M14</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 923/2014 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2014	L 252	11	26.8.2014
► <b><u>M15</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 957/2014 της Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 2014	L 270	1	11.9.2014
► <b><u>M16</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 966/2014 της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2014	L 272	1	13.9.2014
► <b><u>M17</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2015/463 της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2015	L 76	42	20.3.2015
► <b><u>M18</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2015/649 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2015	L 107	17	25.4.2015
► <b><u>M19</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1725 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2015	L 252	12	29.9.2015
► <b><u>M20</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1739 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2015	L 253	3	30.9.2015
► <b><u>M21</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1814 της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2016	L 278	37	14.10.2016
► <b><u>M22</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2017/324 της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 2017	L 49	4	25.2.2017
► <b><u>M23</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1399 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2017	L 199	8	29.7.2017
► <b><u>M24</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2018/75 της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2018	L 13	24	18.1.2018

► <b><u>M25</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2018/98 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2018	L 17	14	23.1.2018
► <b><u>M26</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2018/681 της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2018	L 116	1	7.5.2018
► <b><u>M27</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1461 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2018	L 245	1	1.10.2018
► <b><u>M28</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1462 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2018	L 245	6	1.10.2018
► <b><u>M29</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1472 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2018	L 247	1	3.10.2018
► <b><u>M30</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1481 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2018	L 251	13	5.10.2018
► <b><u>M31</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2020/763 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2020	L 182	8	10.6.2020
► <b><u>M32</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2020/771 της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2020	L 184	25	12.6.2020
► <b><u>M33</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1156 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2021	L 249	87	14.7.2021
► <b><u>M34</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2022/650 της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2022	L 119	65	21.4.2022
► <b><u>M35</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1023 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2022	L 172	5	29.6.2022
► <b><u>M36</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1037 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2022	L 173	52	30.6.2022
► <b><u>M37</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1396 της Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2022	L 211	182	12.8.2022
► <b><u>M38</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1922 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2022	L 264	1	11.10.2022
► <b><u>M39</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2023/440 της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 2023	L 64	4	1.3.2023
► <b><u>M40</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2023/447 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2023	L 65	16	2.3.2023
► <b><u>M41</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1329 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2023	L 166	66	30.6.2023
► <b><u>M42</u></b>	Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1428 της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2023	L 175	6	10.7.2023

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

της 9ης Μαρτίου 2012

σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

*Άρθρο 1***Προδιαγραφές για πρόσθετα τροφίμων**

Στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού καθορίζονται προδιαγραφές για τα πρόσθετα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των χρωστικών ουσιών και των γλυκαντικών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.

*Άρθρο 2***Καταργήσεις**

Οι οδηγίες 2008/60/ΕΚ, 2008/84/ΕΚ και 2008/128/ΕΚ καταργούνται από την 1η Δεκεμβρίου 2012.

*Άρθρο 3***Μεταβατικά μέτρα**

Τα τρόφιμα που περιέχουν πρόσθετα τροφίμων τα οποία κυκλοφόρησαν νόμιμα στην αγορά πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2012, αλλά δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό, επιτρέπεται να κυκλοφορούν έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματά τους.

*Άρθρο 4***Έναρξη ισχύος**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2012.

Ωστόσο, οι προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα για τα πρόσθετα τροφίμων γλυκοζίτες στεβιόλης (E 960) και βασικό μεθακρυλικό συμπολυμερές (E 1205) εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

**▼ B****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ****▼ M37**

Δεν επιτρέπεται η χρήση αιθυλενοξειδίου ως συντηρητικού στα πρόσθετα τροφίμων.

Δεν περιέχεται κανένα κατάλοιπο πάνω από 0,1 mg/kg, ανεξαρτήτως προέλευσης, αιθυλενοξειδίου [άθροισμα αιθυλενοξειδίου και 2-χλωροαιθανόλης εκφραζόμενο ως αιθυλενοξείδιο<sup>(1)</sup>], στα πρόσθετα τροφίμων που απαριθμούνται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων προσθέτων τροφίμων.

**▼ B**

**Λάκκες αργιλίου προοριζόμενες για χρήση σε χρωστικές ύλες, μόνο όταν αυτό αναφέρεται ρητά**

**Ορισμός:**

Ύλες αδιάλυτες σε HCl  
Ύλες αδιάλυτες σε NaOH  
Ύλες εκχυλίσμενες με αιθέρα

Οι λάκκες αργιλίου παρασκευάζονται με χημική αντίδραση χρωστικών υλών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια καθαρότητας που καθορίζονται στις αντίστοιχες μονογραφίες προδιαγραφών, με οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) σε υδατικό περιβάλλον. Η αλουμίνα είναι συνήθως υλικό που έχει παρασκευαστεί πρόσφατα, χωρίς να ξηραθεί, με χημική αντίδραση θεικού ή χλωριούχου αργιλίου με ανθρακικό ή όξινο ανθρακικό νάτριο ή ασβέστιο ή αμμωνία. Μετά το σχηματισμό της λάκκας, το προϊόν διηθείται, εκπλύνεται με νερό και ξηραίνεται. Το τελικό προϊόν ενδέχεται να περιέχει αλουμίνα που δεν έχει αντιδράσει.

0,5 % κατ' ανώτατο όριο

0,5 % κατ' ανώτατο όριο, μόνο για το E 127 ερυθροσίνη

0,2 % κατ' ανώτατο όριο (σε ουδέτερο περιβάλλον)

Ισχύουν επίσης τα ειδικά κριτήρια καθαρότητας για την εκάστοτε χρωστική ύλη.

**E 100 ΚΟΥΡΚΟΥΜΙΝΗ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. Colour Index (CI)

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

Κίτρινο CI natural 3· κίτρινο κουρκούμης· διφερούλο-μεθάνιο

Η κουρκουμίνη λαμβάνεται με εκχύλιση με διαλύτες της κουρκούμης, δηλαδή του ριζώματος στελεχών του φυτού *Curcuma longa* L. Για να ληφθεί σκόνη συμπυκνωμένης κουρκουμίνης, το εκχύλισμα καθαρίζεται με κρυστάλλωση. Το προϊόν συνίσταται κυρίως από κουρκουμίνες, δηλαδή τη χρωμοφόρο ομάδα [1,7-δισ(4-υδροξυ-3-μεθοξυ-φαινυλ)επταδιενο-1,6-διόνη-3,5] και τα δύο διμεθοξυπαράγωγά της σε διάφορες αναλογίες. Ενδέχεται επίσης να περιέχει μικρές ποσότητες ελαίων και ρητινών που αποτελούν φυσικά συστατικά της κουρκούμης.

Η κουρκουμίνη χρησιμοποιείται, επίσης, με τη μορφή λάκκας αργιλίου· η περιεκτικότητα σε αργίλιο είναι 30 % κατ' ανώτατο όριο.

Για την εκχύλιση επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον οι εξής διαλύτες: οξικός αιθυλεστέρας, ακετόνη, διοξείδιο του άνθρακα, διχλωρομεθάνιο, κ-βουτανόλη, μεθανόλη, αιθανόλη, εξάνιο, προπανόλη-2.

75300

207-280-5

I 1,7-δισ(4-υδροξυ-3-μεθοξυφαινυλ)επταδιενο-1,6-διόνη-3,5

II 1-(4-Υδροξυ-φαινυλ)-7-(4-υδροξυ-3-μεθοξυ-φαινυλ)επταδιενο-1,6-διόνη-3,5

III 1,7-Δισ(4-υδροξυ-φαινυλ)επταδιενο-1,6-διόνη-3,5

I C<sub>21</sub>H<sub>20</sub>O<sub>6</sub>

II C<sub>20</sub>H<sub>18</sub>O<sub>5</sub>

III C<sub>19</sub>H<sub>16</sub>O<sub>4</sub>

I. 368,39

II. 338,39

III. 308,39

Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 90 %

E<sub>1cm</sub><sup>1%</sup> 1 607 σε μήκος κύματος περίπου 426 nm σε αιθανόλη

(<sup>1</sup>) δηλαδή αιθυλενοξείδιο + 0,55 \* 2-χλωροαιθανόλη.

▼ B

<b>Περιγραφή</b>	Πορτοκαλοκίτρινη κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε αιθανόλη στα 426 nm περίπου
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	179 °C—182 °C
<b>Καθαρότητα</b>	
Κατάλοιπα διαλυτών	Οξικός αιθυλεστέρας } Ακετόνη } κ-βουτανόλη } 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνοι ή σε Μεθανόλη } συνδυασμό Αιθανόλη } Εξάνιο } Προπανόλη-2 }
	Διχλωρομεθάνιο: 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργιλίου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**E 101 (i) ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Λακτοφλαβίνη
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. CI	
Αριθ. EINECS	201-507-1
Χημική ονομασία	7,8-Διμεθυλο-10-(D-ριβοζο-2,3,4,5-τετραϋδροξυ-πεντυλο)βενζο(g)πτεριδινό-διόνη-2,4(3H, 10H)· 7,8-διμεθυλο-10-(1'-D-ριβιτυλ)ισοαλλοξαζίνη
Χημικός τύπος	C <sub>17</sub> H <sub>20</sub> N <sub>4</sub> O <sub>6</sub>
Μοριακό βάρος	376,37
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί άνυδρης ουσίας E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 328 σε μήκος κύματος περίπου 444 nm σε υδατικό διάλυμα
<b>Περιγραφή</b>	Κίτρινη έως πορτοκαλοκίτρινη κρυσταλλική σκόνη με ελαφρά οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Ο λόγος A <sub>375</sub> /A <sub>267</sub> κυμαίνεται μεταξύ 0,31 και 0,33 } Ο λόγος A <sub>444</sub> /A <sub>267</sub> κυμαίνεται μεταξύ 0,36 και 0,39 } σε υδατικό διάλυμα
	Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 375 nm περίπου
Ειδική στροφική ικανότητα	[α] <sub>D</sub> <sup>20</sup> : μεταξύ - 115° και - 140° σε διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 0,05 N
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	1,5 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)

**▼ B**

Θεική τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως ανιλίνη)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M14**

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκες αργιλίου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**▼ B****E 101 (ii) 5'-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Άλας με νάτριο της 5'-φωσφορικής ριβοφλαβίνης			
<b>Ορισμός</b>	Οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν για τα μείγματα 5'-φωσφορικής ριβοφλαβίνης με μικρές ποσότητες ελεύθερης ριβοφλαβίνης και διφωσφορικής ριβοφλαβίνης.			
Αριθ. CI				
Αριθ. EINECS	204-988-6			
Χημική ονομασία	Άλας με νάτριο του φωσφορικού (2R,3R,4S)-5-(3')10'-διυδρο-7',8'-διμεθυλο-2',4'-διοξο-10'-βενζο[γ]πτεριδινυλο)-2,3,4-τριυδροξυ-πεντυλεστέρα· άλας με νάτριο του 5'-φωσφορικού εστέρα της ριβοφλαβίνης			
Χημικός τύπος	Διένυδρη ουσία: $C_{17}H_{20}N_4NaO_9P \cdot 2H_2O$ Ανυδρη ουσία: $C_{17}H_{20}N_4NaO_9P$			
Μοριακό βάρος	514,36			
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 95 %, υπολογιζόμενη ως $C_{17}H_{20}N_4NaO_9P \cdot 2H_2O$ $E_{1cm}^{1\%}$ 250 σε μήκος κύματος περίπου 375 nm σε υδατικό διάλυμα			
<b>Περιγραφή</b>	Κίτρινη έως πορτοκαλόχρωμη κρυσταλλική υγροσκοπική σκόνη με ελαφρά οσμή			
<b>Ταυτοποίηση</b>				
Φασματομετρία	<table> <tr> <td>Ο λόγος <math>A_{375}/A_{267}</math> κυμαίνεται μεταξύ 0,30 και 0,34</td> <td rowspan="2">} σε υδατικό διάλυμα</td> </tr> <tr> <td>Ο λόγος <math>A_{444}/A_{267}</math> κυμαίνεται μεταξύ 0,35 και 0,40</td> </tr> </table>	Ο λόγος $A_{375}/A_{267}$ κυμαίνεται μεταξύ 0,30 και 0,34	} σε υδατικό διάλυμα	Ο λόγος $A_{444}/A_{267}$ κυμαίνεται μεταξύ 0,35 και 0,40
Ο λόγος $A_{375}/A_{267}$ κυμαίνεται μεταξύ 0,30 και 0,34	} σε υδατικό διάλυμα			
Ο λόγος $A_{444}/A_{267}$ κυμαίνεται μεταξύ 0,35 και 0,40				
	Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 375 nm περίπου			
Ειδική στροφική ικανότητα	$[\alpha]_D^{20}$ : μεταξύ + 38° και + 42° σε διάλυμα HCl 5M			
<b>Καθαρότητα</b>				
Απώλεια κατά την ξήρανση	8 % κατ' ανώτατο όριο (100 °C, 5 ώρες υπό κενό υπεράνω $P_2O_5$ ) για τη διένυδρη ουσία			
Θεική τέφρα	25 % κατ' ανώτατο όριο			
Ανόργανες φωσφορικές ενώσεις	1,0 % κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως $PO_4$ επί άνυδρης ουσίας)			
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	Ριβοφλαβίνη (ελεύθερη): 6 % κατ' ανώτατο όριο Διφωσφορική ριβοφλαβίνη: 6 % κατ' ανώτατο όριο			
Πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες	70 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως ανιλίνη)			

**▼ B**

Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M14**

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκες αργιλίου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**▼ B****E 102 ΤΑΡΤΡΑΖΙΝΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Κίτρινο CI food 4
<b>Ορισμός</b>	Η ταρτραζίνη παρασκευάζεται από διαζωτωμένο με υδροχλωρικό οξύ και νιτρόδες νάτριο 4-αμινο-βενζολοσουλφονικό οξύ. Ακολουθεί σύζευξη της διαζωνιακής ένωσης με 4,5-διυδρο-5-οξο-1-(4-σουλφοφαινυλο)-1H-πυραζολο-3-καρβοξυλικό οξύ ή με τον μεθυλεστέρα, τον αιθυλεστέρα ή ένα άλας αυτού του καρβοξυλικού οξέος. Η χρωστική που προκύπτει καθαρίζεται και απομονώνεται ως άλας με νάτριο. Η ταρτραζίνη συνίσταται κυρίως από 5-υδροξυ-1-(4-σουλφοφαινυλο)-4-(4-σουλφοφαινυλαζω)-H-πυραζολο-3-καρβοξυλικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, μαζί με χλωριούχο και/ή θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωμο συστατικό. Η ταρτραζίνη περιγράφεται ως το άλας με νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων με ασβέστιο και κάλιο.
Αριθ. CI	19140
Αριθ. EINECS	217-699-5
Χημική ονομασία	5-υδροξυ-1-(4-σουλφοφαινυλο)-4-(4-σουλφοφαινυλαζω)-H-πυραζολο-3-καρβοξυλικό νάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>16</sub> H <sub>9</sub> N <sub>4</sub> Na <sub>3</sub> O <sub>9</sub> S <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	534,37
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 85 %, υπολογιζόμενη ως άλας με νάτριο E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 530 σε μήκος κύματος περίπου 426 nm σε υδατικό διάλυμα
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή κόκκοι χρώματος ανοικτού πορτοκαλί
Όψη υδατικού διαλύματος	Κίτρινο
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 426 nm περίπου
<b>Καθαρότητα</b>	
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών:	
4-υδραζινο-βενζολοσουλφονικό οξύ	} Συνολικά 0,5 % κατ' ανώτατο όριο
4-αμινοβενζολο-1-σουλφονικό οξύ	
5-οξο-1-(4-σουλφοφαινυλο)-2-πυραζολινο-3-καρβοξυλικό οξύ	
4,4'-διαζω-αμινο-δι(βενζολοσουλφονικό οξύ)	
Τετραυδροξυ-ηλεκτρικό οξύ	

## ▼ B

Μη σουλφονωμένες πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες	0,01 % κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως ανιλίνη)
Ύλες εκχυλίσμας με αιθέρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο σε ουδέτερο περιβάλλον
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργιλίου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**E 104 ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ****Συνώνυμα**

Κίτρινο CI food 13

**Ορισμός**

Το κίτρινο κινολίνης παρασκευάζεται με σουλφωση της 2-(2-κινολυλ)ινδανοδιόνης-1,3 ή μείγματος περιέχοντος περίπου δύο τρίτα 2-(2-κινολυλ)ινδανοδιόνη-1,3 και ένα τρίτο 2-(2-(6-μεθυλοκινολυλ)ινδανοδιόνη-1,3. Το κίτρινο κινολίνης συνίσταται κυρίως από τα άλατα με νάτριο μείγματος δισουλφονικών (κυρίως), μονοσουλφονικών και τρισουλφονικών παραγώγων των παραπάνω ενώσεων και από βοηθητικές χρωστικές ύλες, μαζί με χλωριούχο και/ή θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωμο συστατικό.

Το κίτρινο κινολίνης περιγράφεται ως το άλας με νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων με ασβέστιο και κάλιο.

Αριθ. CI

47005

Αριθ. EINECS

305-897-5

Χημική ονομασία

Άλατα με νάτριο των δισουλφονικών παραγώγων της 2-(2-κινολυλ)ινδανοδιόνης-1,3 (κύριο συστατικό)

Χημικός τύπος

C<sub>18</sub>H<sub>9</sub>N Na<sub>2</sub>O<sub>8</sub>S<sub>2</sub> (κύριο συστατικό)

Μοριακό βάρος

477,38 (κύριο συστατικό)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 70 %, υπολογιζόμενη ως άλας με νάτριο

Το κίτρινο κινολίνης πρέπει να έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Από το σύνολο των περιεχομένων χρωστικών υλών:

— τουλάχιστον το 80 % πρέπει να είναι άλας με νάτριο του δισουλφονικού παραγώγου της 2-(2-κινολυλ)ινδανοδιόνης-1,3

— το 15 % κατ' ανώτατο όριο πρέπει να είναι άλας με νάτριο του μονοσουλφονικού παραγώγου της 2-(2-κινολυλ)ινδανοδιόνης-1,3

— το 7,0 % κατ' ανώτατο όριο πρέπει να είναι άλας με νάτριο του τρισουλφονικού παραγώγου της 2-(2-κινολυλ)ινδανοδιόνης-1,3

E<sub>1cm</sub><sup>1%</sup> 865 (κύριο συστατικό) σε μήκος κύματος 411 nm περίπου σε υδατικό διάλυμα οξικού οξέος**Περιγραφή**

Σκόνη ή κόκκοι κίτρινου χρώματος

Όψη υδατικού διαλύματος

Κίτρινο

**Ταυτοποίηση**

Φασματομετρία

Μέγιστο απορρόφησης σε υδατικό διάλυμα οξικού οξέος με pH 5 σε μήκος κύματος 411 nm περίπου



## ▼ B

**Καθαρότητα**

Υγες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	4,0 % κατ' ανώτατο όριο
Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών:	
2-μεθυλο-κινολίνη	} Συνολικά 0,5 % κατ' ανώτατο όριο
2-μεθυλοκινολινοσουλφονικό οξύ	
Φθαλικό οξύ	
2,6-διμεθυλο-κινολίνη	
2,6-διμεθυλοκινολινοσουλφονικό οξύ	
2-(2-κινολυλ)ινδανοδιόνη-1,3	4 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μη σουλφονωμένες πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες	0,01 % κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως ανιλίνη)
Υγες εκχυλίσιμες με αιθέρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο σε ουδέτερο περιβάλλον
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργίλιου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**E 110 ΚΙΤΡΙΝΟ SUNSET FCF****Συνώνυμα**

Κίτρινο CI food 3· κίτρινοπορτοκαλί S

**Ορισμός**

Το κίτρινο Sunset FCF συνίσταται κυρίως από 2-υδροξυ-1-(4-σουλφοφαινυλαζω)ναφθαλινο-6-σουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, μαζί με χλωριούχο και/ή θειικό νάτριο ως τα κύρια άχρωμα συστατικά. Το κίτρινο sunset FCF παρασκευάζεται από διαζωτωμένο με υδροχλωρικό οξύ και νιτρώδες νάτριο ή θειικό οξύ και νιτρώδες νάτριο 4-αμινο-βενζολοσουλφονικό οξύ. Η διαζω-νιακή ένωση υποβάλλεται σε σύζευξη με 6-υδροξυ-2-ναφθαλινοσουλφονικό οξύ. Η χρωστική απομονώνεται ως άλας με νάτριο και ξηραίνεται.

Το κίτρινο Sunset FCF περιγράφεται ως το άλας με νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων με ασβέστιο και κάλιο.

Αριθ. CI	15985
Αριθ. EINECS	220-491-7
Χημική ονομασία	2-υδροξυ-1-(4-σουλφοφαινυλαζω)ναφθαλινο-6-σουλφονικό νάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>16</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>7</sub> S <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	452,37
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 85 %, υπολογιζόμενη ως άλας με νάτριο E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 555 σε μήκος κύματος 485 nm περίπου σε υδατικό διάλυμα με pH 7

▼ **B**

<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή κόκκοι πορτοκαλοκόκκινου χρώματος
Όψη υδατικού διαλύματος	Πορτοκαλί
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε νερό σε μήκος κύματος 485 nm περίπου σε pH 7
<b>Καθαρότητα</b>	
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	5,0 % κατ' ανώτατο όριο
1-(φαινολαζω)ναφθαλινόλη-2 (Sudan I)	0,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών:	
4-αμινοβενζολο-1-σουλφονικό οξύ	} Συνολικά 0,5 % κατ' ανώτατο όριο
3-υδροξυ-ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό οξύ	
6-υδροξυ-ναφθαλινο-σουλφονικό οξύ	
7-υδροξυ-ναφθαλινο-1,3- δισουλφονικό οξύ	
4,4'-διαζω-αμινο-δι(βενζολοσουλφονικό οξύ)	
6,6'-οξύ-δι(ναφθαλινο-2- σουλφονικό οξύ)	
Μη σουλφονωμένες πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες	0,01 % κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως ανιλίνη)
Ύλες εκχυλίσιμες με αιθέρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο σε ουδέτερο περιβάλλον
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργιλίου αυτής της χρωστικής ύλης.*

▼ **M29****E 120 ΚΑΡΜΙΝΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΑΡΜΙΝΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Κόκκινο CI natural 4
<b>Ορισμός</b>	Το καρμινικό οξύ λαμβάνεται από υδατικά, υδροαλκοολικά ή αλκοολικά εκχυλίσματα κοχενίλης, η οποία συνίσταται σε αποξηραμένα σώματα θηλυκών εντόμων του είδους <i>Dactylopius coccus</i> Costa. Οι καρμίνες είναι λάκκες αργιλίου από καρμινικό οξύ στις οποίες η γραμμομοριακή αναλογία αργιλίου/καρμινικού οξέος θεωρείται ότι είναι 1:2. Η χρωστική είναι το καρμινικό οξύ. Μικρές ποσότητες της αμινικής μορφής του, του 4-αμινοκαρμινικού οξέος, μπορεί επίσης να είναι παρούσες. Τα προϊόντα του εμπορίου μπορεί να περιέχουν τη χρωστική καρμινικό οξύ μαζί με κατιόντα αμμωνίου, ασβεστίου, καλίου ή νατρίου, μόνα ή σε συνδυασμό, τα οποία ενδέχεται να απαντούν σε περίσσεια. Τα προϊόντα του εμπορίου ενδέχεται να περιέχουν επίσης πρωτεϊνικό υλικό προερχόμενο από το έντομο-πηγή.
Αριθ. CI	75470
Αριθ. Eίनेες	Καρμινικό οξύ 215-023-3· Καρμίνη: 215-724-4.
Χημική ονομασία	7-β-D-γλυκοκυπρανοζυλο-3,5,6,8-τετραϋδροξυ-1-μεθυλο-9,10-διοξοανθρακено-2-καρβοξυλικό οξύ (καρμινικό οξύ)· η καρμίνη είναι το υδρογονωμένο χηλικό σύμπλοκο του οξέος αυτού με αργίλιο
Χημικός τύπος	C <sub>22</sub> H <sub>20</sub> O <sub>13</sub> (καρμινικό οξύ)
Μοριακό βάρος	492,39 (καρμινικό οξύ)

▼ **M29**

Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε καρμινικό οξύ τουλάχιστον 90 %· τουλάχιστον 50 % προκειμένου για χηλικά σύμπλοκα. Εύθρυπτο στερεό ή σκόνη κόκκινου έως βαθυκόκκινου χρώματος.
<b>Περιγραφή</b>	
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Καρμινικό οξύ: Μέγιστο απορρόφησης σε υδατικό διάλυμα αμμωνίας στα 518 nm περίπου Μέγιστο απορρόφησης σε αραιό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος στα 494 nm περίπου E 1 %/1cm 139 στην κορυφή στα 494 nm περίπου σε αραιό υδροχλωρικό οξύ 4- αμινοκαρμινικό οξύ: Μέγιστο απορρόφησης σε υδατικό διάλυμα αμμωνίας στα 535 nm περίπου Μέγιστο απορρόφησης σε αραιό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος στα 530 nm περίπου E 1 %/1cm 260 στην κορυφή στα 535 nm περίπου σε υδατικό διάλυμα αμμωνίας pH 9,5 Σε προϊόντα του εμπορίου, το καρμινικό οξύ μπορεί να διακριθεί από την αμίνη του με HPLC
<b>Καθαρότητα</b>	
Υπολείμματα διαλυτών	Αιθανόλη: 150 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Μεθανόλη: 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Ολική τέφρα	Καρμινικό οξύ: 5 % κατ' ανώτατο όριο
Πρωτεΐνη (N × 6,25)	Καρμίνη: 12 % κατ' ανώτατο όριο Καρμινικό οξύ: 2,2 % κατ' ανώτατο όριο
4-αμινοκαρμινικό οξύ	Καρμίνη: 25 % κατ' ανώτατο όριο
Ύλες αδιάλυτες σε διάλυμα αμμωνίας	Όχι περισσότερο από 3 % σε σχέση με το καρμινικό οξύ
Αρσενικό	Καρμίνη: 1 % κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	0,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<i>Salmonella</i> spp	Απουσία σε 10 g

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργίλου αυτής της χρωστικής ύλης*

▼ **B****E 122 ΑΖΩΡΟΥΜΠΙΝΗ, ΚΑΡΜΟΪΣΙΝΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Κόκκινο CI food 3
<b>Ορισμός</b>	Η αζωρουμπίνη συνίσταται κυρίως από 4-υδροξυ-3-(4-σουλφο-1-ναφθυλαζω)ναφθαλινο-1-σουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, μαζί με χλωριούχο και/ή θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωμο συστατικό. Η αζωρουμπίνη περιγράφεται ως το άλας με νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων με ασβέστιο και κάλιο.
Αριθ. CI	14720
Αριθ. EINECS	222-657-4
Χημική ονομασία	4-υδροξυ-3-(4-σουλφο-1-ναφθυλαζω)ναφθαλινο-1-σουλφονικό νάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>20</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>7</sub> S <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	502,44
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 85 %, υπολογιζόμενη ως άλας με νάτριο E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 510 σε μήκος κύματος περίπου 516 nm σε υδατικό διάλυμα

▼ B

<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή κόκκοι χρώματος κόκκινου έως καστανού
Όψη υδατικού διαλύματος	Κόκκινο
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 516 nm περίπου
<b>Καθαρότητα</b>	
Υλεις αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	1 % κατ' ανώτατο όριο
Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών:	
4-αμινο-ναφθαλινο-1-σουλφονικό οξύ	} Συνολικά 0,5 % κατ' ανώτατο όριο
4-υδροξυ-ναφθαλινο-1-σουλφονικό οξύ	
Μη σουλφονωμένες πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες	0,01 % κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως ανιλίνη)
Υλεις εκχυλίσμενες με αιθέρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο σε ουδέτερο περιβάλλον
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργιλίου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**E 123 ΑΜΑΡΑΝΘΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Κόκκινο CI food 9
<b>Ορισμός</b>	Η αμαράνθη συνίσταται κυρίως από 2-υδροξυ-1-(4-σουλφο-1-ναφθυλαζω)ναφθαλινο-3,6-δισουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, μαζί με χλωριούχο και/ή θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωμο συστατικό. Η αμαράνθη παρασκευάζεται με σύζευξη 4-αμινο-1-ναφθαλινο-σουλφονικού οξέος με 3-υδροξυ-2,7-ναφθαλινοδισουλφονικό οξύ. Η αμαράνθη περιγράφεται ως το άλας με νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων με ασβέστιο και κάλιο.
Αριθ. CI	16185
Αριθ. EINECS	213-022-2
Χημική ονομασία	2-υδροξυ-1-(4-σουλφο-1-ναφθυλαζω)ναφθαλινο-3,6-δισουλφονικό νάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>20</sub> H <sub>11</sub> N <sub>2</sub> Na <sub>3</sub> O <sub>10</sub> S <sub>3</sub>
Μοριακό βάρος	604,48
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 85 %, υπολογιζόμενη ως άλας με νάτριο E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 440 σε μήκος κύματος περίπου 520 nm σε υδατικό διάλυμα

## ▼ B

<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή κόκκοι χρώματος καστανοκόκκινου
Όψη υδατικού διαλύματος	Κόκκινο
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 520 nm περίπου
<b>Καθαρότητα</b>	
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	3,0 % κατ' ανώτατο όριο
Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών:	
4-αμινο-ναφθαλινο-1-σουλφονικό οξύ	} Συνολικά 0,5 % κατ' ανώτατο όριο
3-υδροξυ-ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό οξύ	
6-υδροξυ-ναφθαλινο-2-σουλφονικό οξύ	
7-υδροξυ-ναφθαλινο-1,3-δισουλφονικό οξύ	
7-υδροξυ-ναφθαλινο-1,3,6-τρισουλφονικό οξύ	
Μη σουλφονωμένες πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες	0,01 % κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως ανιλίνη)
Ύλες εκχυλίσιμες με αιθέρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο σε ουδέτερο περιβάλλον
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργιλίου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**E 124 ΠΟΝΣΩ 4R, ΕΡΥΘΡΟ ΤΗΣ ΚΟΧΕΝΙΛΗΣ Α**

<b>Συνώνυμα</b>	Κόκκινο CI food 7· νέα κοξίνη
<b>Ορισμός</b>	Το πονσώ 4R συνίσταται κυρίως από 2-υδροξυ-1-(4-σουλφο-1-ναφθυλαζω)ναφθαλινο-6,8-δισουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, μαζί με γλωριούχο και/ή θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωμο συστατικό. Το πονσώ 4R παρασκευάζεται με σύζευξη διαζωτωμένου ναφθονικού οξέος με οξύ G (2-ναφθολο-6,8-δισουλφονικό οξύ) και μετατροπή του προϊόντος σύζευξης σε άλας με νάτριο. Το πονσώ 4R περιγράφεται ως το άλας με νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων με ασβέστιο και κάλιο.
Αριθ. CI	16255
Αριθ. EINECS	220-036-2
Χημική ονομασία	2-υδροξυ-1-(4-σουλφο-1-ναφθυλαζω)ναφθαλινο-6,8-δισουλφονικό νάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>20</sub> H <sub>11</sub> N <sub>2</sub> Na <sub>3</sub> O <sub>10</sub> S <sub>3</sub>
Μοριακό βάρος	604,48

## ▼ B

Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 80 %, υπολογιζόμενη ως άλας με νάτριο
<b>Περιγραφή</b>	$E_{1\text{cm}}^{1\%}$ 430 σε μήκος κύματος περίπου 505 nm σε υδατικό διάλυμα
Όψη υδατικού διαλύματος	Σκόνη ή κόκκοι κοκκινωπού χρώματος
<b>Ταυτοποίηση</b>	Κόκκινο
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 505 nm περίπου
<b>Καθαρότητα</b>	
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών:	
4-αμινο-ναφθαλινο-1-σουλφονικό οξύ	} Συνολικά 0,5 % κατ' ανώτατο όριο
7-υδροξυ-ναφθαλινο-1,3-δισουλφονικό οξύ	
3-υδροξυ-ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό οξύ	
6-υδροξυ-ναφθαλινο-2-σουλφονικό οξύ	
7-υδροξυ-ναφθαλινο-1,3,6-τρισουλφονικό οξύ	
Μη σουλφονωμένες πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες	0,01 % κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως ανιλίνη)
Ύλες εκχυλίσσιμες με αιθέρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο σε ουδέτερο περιβάλλον
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργίλιου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**E 127 ΕΡΥΘΡΟΣΙΝΗ****Συνώνυμα**

Κόκκινο CI food 14

**Ορισμός**

Η ερυθροσίνη συνίσταται κυρίως από μονοένυδρο 2-(2,4,5,7-τετραϊωδο-3-οξειδο-6-οξοξανθεν-9-υλο)βενζοϊκό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, μαζί με νερό και γλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως τα κύρια άχρωμα συστατικά. Η ερυθροσίνη παρασκευάζεται με ιωδίωση φλουορεσκεΐνης, που είναι το προϊόν συμπύκνωσης ρεσορκινόλης και φθαλικού ανυδρίτη

Η ερυθροσίνη περιγράφεται ως το άλας με νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων με ασβέστιο και κάλιο.

Αριθ. CI

45430

Αριθ. EINECS

240-474-8

Χημική ονομασία

Μονοένυδρο 2-(2,4,5,7-τετραϊωδο-3-οξειδο-6-οξοξανθεν-9-υλο)βενζοϊκό νάτριο

Χημικός τύπος

 $C_{20}H_6I_4Na_2O_5 \cdot H_2O$

## ▼ B

Μοριακό βάρος	897,88
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 87 %, υπολογιζόμενη ως άνυδρο άλας με νάτριο E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 1 100 σε μήκος κύματος περίπου 526 nm σε υδατικό διάλυμα με pH 7
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή κόκκοι χρώματος κόκκινου
Όψη υδατικού διαλύματος	Κόκκινο
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 526 nm περίπου σε pH 7
<b>Καθαρότητα</b>	
Ανόργανα ιωδιούχα άλατα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως ιωδιούχο νάτριο)
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες (πλην φλουορεσκεΐνης)	4,0 % κατ' ανώτατο όριο
Φλουορεσκεΐνη	20 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών:	
Τριωδο-ρεσορκινόλη	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
2-(2,4-διυδροξυ-3,5-διωδοβενζοϋλο)βενζοϊκό οξύ	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Ύλες εκχυλισίμες με αιθέρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο από διάλυμα με pH 7-8
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργίλιου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**E 129 ΕΡΥΘΡΟ ALLURA AC**

<b>Συνώνυμα</b>	Κόκκινο CI food 17
<b>Ορισμός</b>	Το ερυθρό allura AC συνίσταται κυρίως από 2-υδροξυ-1-(2-μεθοξυ-5-μεθυλο-4-σουλφοφαινυλαζω)ναφθαλινο-6-σουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, μαζί με χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωμο συστατικό. Το ερυθρό allura AC παρασκευάζεται με σύζευξη διαζωτωμένου 5-αμινο-4-μεθοξυ-2-τολουολοσουλφονικού οξέος με 6-υδροξυ-2-ναφθαλινοσουλφονικό οξύ Το ερυθρό allura AC περιγράφεται ως το άλας με νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων με ασβέστιο και κάλιο.
Αριθ. CI	16035
Αριθ. EINECS	247-368-0
Χημική ονομασία	2-υδροξυ-1-(2-μεθοξυ-5-μεθυλο-4-σουλφοφαινυλαζω)ναφθαλινο-6-σουλφονικό νάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>18</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>8</sub> S <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	496,42

## ▼ B

Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 85 %, υπολογιζόμενη ως άλας με νάτριο E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 540 σε μήκος κύματος περίπου 504 nm σε υδατικό διάλυμα με pH 7
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή κόκκοι χρώματος βαθυκόκκινου
Όψη υδατικού διαλύματος	Κόκκινο
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 504 nm περίπου
<b>Καθαρότητα</b>	
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	3,0 % κατ' ανώτατο όριο
Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών:	
6-υδροξυ-2-ναφθαλινο-σουλφονικό νάτριο	0,3 % κατ' ανώτατο όριο
4-αμινο-5-μεθοξυ-2-μεθυλο-βενζολο-σουλφονικό οξύ	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
6,6-οξυδισ(2-ναφθαλινοσουλφονικό) νάτριο	1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Μη σουλφονωμένες πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες	0,01 % κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως ανιλίνη)
Ύλες εκχυλίσιμες με αιθέρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο από διάλυμα με pH 7
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργίλιου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**E 131 ΠΑΤΕΝΤ ΜΠΛΕ V**

<b>Συνώνυμα</b>	Μπλε CI food 5
<b>Ορισμός</b>	Το πάτεντ μπλε V συνίσταται κυρίως από την ένωση με ασβέστιο ή νάτριο του εσωτερικού άλατος του υδροξειδίου του [4-[α-(4-διαιθυλαμινοφαινυλ)-5-υδροξυ-2,4-δισουλφοφαινυλο-μεθυλιδENO)-2,5-κυκλοεξαδιεν-1-υλιδENO]διαιθυλαμμωνίου και από βοηθητικές χρωστικές ύλες μαζί με χλωριούχο νάτριο και/ή θειικό νάτριο και/ή θειικό ασβέστιο ως τα κύρια άχρωμα συστατικά. Επιτρέπεται επίσης η χρήση του άλατος με κάλιο.
Αριθ. CI	42051
Αριθ. EINECS	222-573-8
Χημική ονομασία	Ένωση με ασβέστιο ή νάτριο του εσωτερικού άλατος του υδροξειδίου του [4-[α-(4-διαιθυλαμινοφαινυλ)-5-υδροξυ-2,4-δισουλφοφαινυλο-μεθυλιδENO)-2,5-κυκλοεξαδιεν-1-υλιδENO]διαιθυλαμμωνίου



**▼ B**

Χημικός τύπος	Ένωση με ασβέστιο: $C_{27}H_{31}N_2O_7S_2Ca_{1/2}$ Ένωση με νάτριο: $C_{27}H_{31}N_2O_7S_2Na$
Μοριακό βάρος	Ένωση με ασβέστιο: 579,72 Ένωση με νάτριο: 582,67
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 85 %, υπολογιζόμενη ως άλας με νάτριο $E_{1cm}^{1\%}$ 2 000 σε μήκος κύματος περίπου 638 nm σε υδατικό διάλυμα με pH 5
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή κόκκοι χρώματος βαθυκίανου
Όψη υδατικού διαλύματος	Μπλε
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 638 nm σε pH 5
<b>Καθαρότητα</b>	
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	2,0 % κατ' ανώτατο όριο
Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών:	
3-υδροξυ-βενζαλδεΐδη	} Συνολικά 0,5 % κατ' ανώτατο όριο
3-υδροξυ-βενζοϊκό οξύ	
3-υδροξυ-4-σουλφοβενζοϊκό οξύ	
N,N-διαιθυλαμινο-βενζολοσουλφονικό οξύ	
Λευκοένωση	4,0 % κατ' ανώτατο όριο
Μη σουλφονωμένες πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες	0,01 % κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως ανιλίνη)
Ύλες εκχυλίσμενες με αιθέρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο από διάλυμα με pH 5
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργίλιου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**E 132 ΙΝΔΙΚΟΤΙΝΗ, ΙΝΔΙΚΟΚΑΡΜΙΝΗ****Συνώνυμα**

Μπλε CI food 1

**Ορισμός**

Η ινδικοτίνη συνίσταται κυρίως από μείγμα 3,3'-διοξο-2,2'-διηδολυλιδανο-5,5'-δισουλφονικού νατρίου με 3,3'-διοξο-2,2'-διηδολυλιδανο-5,7'-δισουλφονικό νάτριο και από βοηθητικές χρωστικές ύλες, μαζί με γλωριούχο και/ή θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωμο συστατικό.

Η ινδικοτίνη περιγράφεται ως το άλας με νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων με ασβέστιο και κάλιο.

Η ινδικοκαρμίνη παράγεται με σουλφωση του ινδικού (λουλάκι), η οποία επιτυγχάνεται με τη θέρμανση ινδικού (ή πάστας ινδικού) παρουσία θειικού οξέος. Η χρωστική απομονώνεται και υποβάλλεται σε διαδικασίες καθαρισμού.

## ▼ B

Αριθ. CI	73015
Αριθ. EINECS	212-728-8
Χημική ονομασία	3,3'-διοξο-2,2'-δινδολυλιδενο-5,5'-δισουλφονικό νάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>16</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>8</sub> S <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	466,36
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 85 %, υπολογιζόμενη ως άλας με νάτριο. 3,3'-διοξο-2,2'-δινδολυλιδενο-5,7'-δισουλφονικό νάτριο: 18 % κατ' ανώτατο όριο E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 480 σε μήκος κύματος περίπου 610 nm σε υδατικό διάλυμα
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή κόκκοι χρώματος βαθυκίανου
Όψη υδατικού διαλύματος	Μπλε
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 610 nm περίπου
<b>Καθαρότητα</b>	
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	Εκτός από 3,3'-διοξο-2,2'-δινδολυλιδενο-5,7'-δισουλφονικό νάτριο: 1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών:	
Ισατινο-5-σουλφονικό οξύ	} Συνολικά 0,5 % κατ' ανώτατο όριο
5-σουλφο-ανθρανιλικό οξύ	
Ανθρανιλικό οξύ	
Μη σουλφονωμένες πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες	0,01 % κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως ανιλίνη)
Ύλες εκχυλίσιμες με αιθέρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο σε ουδέτερο περιβάλλον
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργίλιου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**E 133 ΛΑΜΠΡΟ ΚΥΑΝΟ FCF**

<b>Συνώνυμα</b>	Μπλε CI food 2
<b>Ορισμός</b>	Το λαμπρό κυανό FCF συνίσταται κυρίως από α-[[[(4-N-αιθυλο-3-σουλφοβενζυλαμινο)φαινυλ]-α-(4-N-αιθυλο-3-σουλφοβενζυλαμινο)κυκλοεξαδιεν-2,5-υλιδενο]τολουολο-2-σουλφονικό νάτριο και τα ισομερή του, καθώς και από βοηθητικές χρωστικές ύλες, μαζί με χλωριούχο και/ή θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωμο συστατικό. Το λαμπρό κυανό FCF περιγράφεται ως το άλας με νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων με ασβέστιο και κάλιο.
Αριθ. CI	42090
Αριθ. EINECS	223-339-8

## ▼ B

Χημική ονομασία	α-[[[(4-N-αιθυλο-3-σουλφοβενζυλαμινο)φαινυλ]-α-(4-N-αιθυλο-3-σουλφοβενζυλαμινο)κυκλοεξαδιεν-2,5-υλιδενο]τολουολο-2-σουλφο-νικό νάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>37</sub> H <sub>34</sub> N <sub>2</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>9</sub> S <sub>3</sub>
Μοριακό βάρος	792,84
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 85 %, υπολογιζόμενη ως άλας με νάτριο E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 1 630 σε μήκος κύματος περίπου 630 nm σε υδατικό διάλυμα
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή κόκκοι χρώματος κυανοκοκκινωπού
Όψη υδατικού διαλύματος	Μπλε
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 630 nm περίπου
<b>Καθαρότητα</b>	
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	6,0 % κατ' ανώτατο όριο
Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών:	
Άθροισμα 2-, 3- και 4-φορμυλο-βενζολο-σουλφονικού οξέος	1,5 % κατ' ανώτατο όριο
3-[(αιθυλο)(4-σουλφοφαινυλ)αμινο]-μεθυλο-βενζολο-σουλφονικό οξύ	0,3 % κατ' ανώτατο όριο
Λευκοένωση	5,0 % κατ' ανώτατο όριο
Μη σουλφονωμένες πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες	0,01 % κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως ανιλίνη)
Ύλες εκχυλίσιμες με αιθέρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο σε pH 7
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργιλίου αυτής της χρωστικής ύλης.

## E 140 (i) ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΕΣ

## Συνώνυμα

Πράσινο CI natural 3· μαγνησιοχλωροφύλλη· μαγνησιοφαιοφυτίνη

## Ορισμός

Οι χλωροφύλλες λαμβάνονται με εκχύλιση με διαλύτες ποικιλιών βροσίμων φυτικών υλών, αγρωστωδών, τριφυλλίου και τσουκνίδας. Ακολουθεί απομάκρυνση του διαλύτη, κατά την οποία μπορεί επίσης να απομακρυνθεί πλήρως ή μερικώς, το φυσικώς συμπλοκοποιημένο μαγνήσιο, οπότε προκύπτουν οι αντίστοιχες φαιοφυτίνες. Οι κύριες χρωστικές ύλες είναι οι φαιοφυτίνες και οι μαγνησιοχλωροφύλλες. Το εκχύλισμα, από το οποίο έχει απομακρυνθεί ο διαλύτης, περιέχει επίσης άλλες χρωστικές, όπως καροτενοειδή, καθώς και έλαια, λίπη και κηρούς προερχόμενα από την πρώτη ύλη. Μόνο οι κατωτέρω διαλύτες δύνανται να χρησιμοποιούνται για την εκχύλιση: ακετόνη, μεθυλαιθυλκετόνη, διγλωρομεθάνιο, διοξειδίο του άνθρακα, μεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη-2 και εξάνιο.

▼ **B**

Αριθ. CI	75810											
Αριθ. EINECS	Χλωροφύλλες: 215-800-7, χλωροφύλλη α: 207-536-6, χλωροφύλλη β: 208-272-4											
Χημική ονομασία	Οι κύριες χρωμοφόρες ενώσεις είναι: (13 <sup>2</sup> R, 17S,18S)-3-[8-αιθυλ-13 <sup>2</sup> -μεθοξυκαρβονυλο-2,7,12,18-τετραμεθυλ-13'-οξο-3-βινυλο-13 <sup>1</sup> ,13 <sup>2</sup> ,17,18-τετραϋδρο-κυκλοπεντα(at)-πορφυριν-17-υλο]προπιονικό φυτύλιο (φαιοφυτίνη α) ή με τη μορφή συμπλόκου με μαγνήσιο (χλωροφύλλη α) (13 <sup>2</sup> R,17S,18S)-3-[8-αιθυλο-7-φορμυλο-13 <sup>2</sup> -μεθοξυκαρβονυλο-2,12,18-τριμεθυλ-13'-οξο-3-βινυλο-13 <sup>1</sup> ,13 <sup>2</sup> ,17,18-τετραϋδρο-κυκλοπεντα(at)-πορφυριν-17-υλο]προπιονικό φυτύλιο (φαιοφυτίνη β) ή με τη μορφή συμπλόκου με μαγνήσιο (χλωροφύλλη β)											
Χημικός τύπος	Χλωροφύλλη α, σύμπλοκο με μαγνήσιο: C <sub>55</sub> H <sub>72</sub> MgN <sub>4</sub> O <sub>5</sub> Χλωροφύλλη α: C <sub>55</sub> H <sub>74</sub> N <sub>4</sub> O <sub>5</sub> Χλωροφύλλη β, σύμπλοκο με μαγνήσιο: C <sub>55</sub> H <sub>70</sub> MgN <sub>4</sub> O <sub>6</sub> Χλωροφύλλη β: C <sub>55</sub> H <sub>72</sub> N <sub>4</sub> O <sub>6</sub>											
Μοριακό βάρος	Χλωροφύλλη α, σύμπλοκο με μαγνήσιο: 893,51 Χλωροφύλλη α: 871,22 Χλωροφύλλη β, σύμπλοκο με μαγνήσιο: 907,49 Χλωροφύλλη β: 885,20											
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε συνδυασμό ολικών χλωροφυλλών και των συμπλόκων τους με μαγνήσιο τουλάχιστον 10 % E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 700 σε μήκος κύματος περίπου 409 nm σε χλωροφόρμιο											
<b>Περιγραφή</b>	Κηρώδες στερεό, του οποίου το χρώμα ποικίλλει από πράσινο της ελιάς έως βαθύ πράσινο ανάλογα με την περιεκτικότητα σε συμπλοκοποιημένο μαγνήσιο.											
<b>Ταυτοποίηση</b>												
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε χλωροφόρμιο στα 409 nm περίπου											
<b>Καθαρότητα</b>												
Κατάλοιπα διαλυτών	<table border="0"> <tr> <td>Ακετόνη</td> <td rowspan="6">}</td> <td rowspan="6">50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνι ή σε συνδυασμό</td> </tr> <tr> <td>Μεθυλαιθυλκετόνη</td> </tr> <tr> <td>Μεθανόλη</td> </tr> <tr> <td>Αιθανόλη</td> </tr> <tr> <td>Προπανάλη-2</td> </tr> <tr> <td>Εξάνιο</td> </tr> <tr> <td>Διχλωρομεθάνιο:</td> <td></td> <td>10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο</td> </tr> </table>	Ακετόνη	}	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνι ή σε συνδυασμό	Μεθυλαιθυλκετόνη	Μεθανόλη	Αιθανόλη	Προπανάλη-2	Εξάνιο	Διχλωρομεθάνιο:		10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Ακετόνη	}	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνι ή σε συνδυασμό										
Μεθυλαιθυλκετόνη												
Μεθανόλη												
Αιθανόλη												
Προπανάλη-2												
Εξάνιο												
Διχλωρομεθάνιο:		10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο										
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο											
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο											
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο											
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο											

## ▼ B

## E 140 (ii) ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΙΝΕΣ

<b>Συνώνυμα</b>	Πράσινο CI natural 5· χλωροφυλλινικό νάτριο· χλωροφυλλινικό κάλιο								
<b>Ορισμός</b>	<p>Τα άλατα των χλωροφυλλινών με αλκάλια λαμβάνονται με σαπωνοποίηση εκχυλισμάτων με διαλύτες ποικιλιών βρώσιμων φυτικών υλών, αγρωστωδών, τριφυλλίου και τσουκνίδας. Με τη σαπωνοποίηση απομακρύνονται οι μεθυλεστερικές και φυτολεστερικές ομάδες ενώ είναι δυνατόν να διασπαστεί μερικώς ο κυκλοπεντενικός δακτύλιος. Οι όξινες ομάδες εξουδετερώνονται προς σχηματισμό των αλάτων με κάλιο και/ή νάτριο.</p> <p>Μόνο οι κατωτέρω διαλύτες δύνανται να χρησιμοποιούνται για την εκχύλιση: ακετόνη, μεθυλαιθυλκετόνη, διχλωρομεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, μεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη-2 και εξάνιο.</p>								
Αριθ. CI	75815								
Αριθ. EINECS	287-483-3								
Χημική ονομασία	<p>Οι κύριες χρωμοφόρες ενώσεις σε μορφή οξέος είναι:</p> <p>— 3-Προπιονικό 10-καρβοξυλ-4-αιθυλο-1,3,5,8-τετραμεθυλ-9-οξο-2-βινυλοφορβιν-7-ύλιο (χλωροφυλλίνη α)</p> <p>και</p> <p>— 3-Προπιονικό 10-καρβοξυλ-4-αιθυλο-3-φορμυλο-1,5,8-τριμεθυλ-9-οξο-2-βινυλοφορβιν-7-ύλιο (χλωροφυλλίνη β)</p> <p>Ανάλογα με το βαθμό υδρόλυσης, είναι δυνατόν να διασπαστεί ο κυκλοπεντενικός δακτύλιος, οπότε ελευθερώνεται και τρίτη καρβοξυλομάδα.</p> <p>Είναι επίσης δυνατόν να απαντούν και σύμπλοκα με μαγνήσιο.</p>								
Χημικός τύπος	<p>Χλωροφυλλίνη α (σε μορφή οξέος): <math>C_{34}H_{34}N_4O_5</math></p> <p>Χλωροφυλλίνη β (σε μορφή οξέος): <math>C_{34}H_{32}N_4O_6</math></p>								
Μοριακό βάρος	<p>Χλωροφυλλίνη α: 578,68</p> <p>Χλωροφυλλίνη β: 592,66</p> <p>Σε περίπτωση διάσπασης του κυκλοπεντενικού δακτυλίου, κάθε μοριακό βάρος αυξάνεται κατά 18 Dalton.</p>								
Δοκιμασία	<p>Περιεκτικότητα σε ολικές χλωροφυλλίνες τουλάχιστον 95 %, προσδιοριζόμενη σε δείγμα που έχει ξηρανθεί στους 100 °C περίπου, επί μια ώρα</p> <p><math>E_{1\text{cm}}^{1\%}</math> 700 σε μήκος κύματος περίπου 405 nm σε υδατικό διάλυμα με pH 9</p> <p><math>E_{1\text{cm}}^{1\%}</math> 140 σε μήκος κύματος περίπου 653 nm σε υδατικό διάλυμα με pH 9</p>								
<b>Περιγραφή</b>	Βαθυπράσινη έως κυανόμαυρη σκόνη								
<b>Ταυτοποίηση</b>									
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε υδατικό ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών ιόντων με pH 9 στα 405 nm περίπου και στα 653 nm περίπου								
<b>Καθαρότητα</b>									
Κατάλοιπα διαλυτών	<table border="0"> <tr> <td>Ακετόνη</td> <td rowspan="5">} 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνιμο ή σε συνδυασμό</td> </tr> <tr> <td>Μεθυλαιθυλκετόνη</td> </tr> <tr> <td>Μεθανόλη</td> </tr> <tr> <td>Αιθανόλη</td> </tr> <tr> <td>Προπανόλη-2</td> </tr> <tr> <td>Εξάνιο</td> <td></td> </tr> </table> <p>Διχλωρομεθάνιο: 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο</p>	Ακετόνη	} 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνιμο ή σε συνδυασμό	Μεθυλαιθυλκετόνη	Μεθανόλη	Αιθανόλη	Προπανόλη-2	Εξάνιο	
Ακετόνη	} 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνιμο ή σε συνδυασμό								
Μεθυλαιθυλκετόνη									
Μεθανόλη									
Αιθανόλη									
Προπανόλη-2									
Εξάνιο									
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο								
Μόλυβδος	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο								
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο								
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο								

## ▼ B

## E 141 (i) ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΧΑΛΚΟ

<b>Συνώνυμα</b>	Πράσινο CI natural 3· χαλκοχλωροφύλλη· χαλκοφαιοφυτίνη											
<b>Ορισμός</b>	Οι χαλκοχλωροφύλλες λαμβάνονται με την προσθήκη αλάτων χαλκού στην ουσία που προκύπτει από την εκχύλιση με διαλύτες ποικιλιών βρωσίμων φυτικών υλών, αγρωστοδών, τριφυλλιού και τσουκνίδας. Το προϊόν, από το οποίο έχει απομακρυνθεί ο διαλύτης, περιέχει επίσης άλλες χρωστικές, όπως καροτενοειδή, καθώς και λίπη και κηρούς προερχόμενα από την πρώτη ύλη. Οι κύριες χρωστικές ύλες είναι οι χαλκοφαιοφυτίνες. Μόνο οι κατωτέρω διαλύτες δύνανται να χρησιμοποιούνται για την εκχύλιση: ακετόνη, μεθυλαιθυλκετόνη, διχλωρομεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, μεθανόλη, αιθανόλη, προπανάλη-2 και εξάνιο.											
Αριθ. CI	75810											
Αριθ. EINECS	Χαλκοχλωροφύλλη α: 239-830-5· χαλκοχλωροφύλλη β: 246-020-5											
Χημική ονομασία	Σύμπλοκο χαλκού (II) με (13 <sup>2</sup> R,17S,18S)-3-[8-αιθυλ-13 <sup>2</sup> -μεθοξυκαρβονυλο-2,7,12,18-τετραμεθυλ-13'-οξο-3-βινυλο-13 <sup>1</sup> ,13 <sup>2</sup> ,17,18-τετραϋδρο-κυκλοπενταν(at)-πορφυριν-17-υλο] προπιονικό φυτύλιο (χαλκοχλωροφύλλη α) Σύμπλοκο χαλκού (II) με (13 <sup>2</sup> R,17S,18S)-3-[8-αιθυλο-7-φορμυλο-13 <sup>2</sup> -μεθοξυκαρβονυλο-2,12,18-τριμεθυλ-13'-οξο-3-βινυλο-13 <sup>1</sup> ,13 <sup>2</sup> ,17,18-τετραϋδρο-κυκλοπενταν(at)-πορφυριν-17-υλο] προπιονικό φυτύλιο (χαλκοχλωροφύλλη β)											
Χημικός τύπος	Χαλκοχλωροφύλλη α: C <sub>55</sub> H <sub>72</sub> Cu N <sub>4</sub> O <sub>5</sub> Χαλκοχλωροφύλλη β: C <sub>55</sub> H <sub>70</sub> Cu N <sub>4</sub> O <sub>6</sub>											
Μοριακό βάρος	Χαλκοχλωροφύλλη α: 932,75 Χαλκοχλωροφύλλη β: 946,73											
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χαλκοχλωροφύλλες τουλάχιστον 10 % E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 540 σε μήκος κύματος περίπου 422 nm σε χλωροφόρμιο E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 300 σε μήκος κύματος περίπου 652 nm σε χλωροφόρμιο											
<b>Περιγραφή</b>	Κηρώδες στερεό, του οποίου το χρώμα ποικίλλει από κυανοπράσινο έως βαθύ πράσινο ανάλογα με την πρώτη ύλη											
<b>Ταυτοποίηση</b>												
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε χλωροφόρμιο στα 422 nm περίπου και στα 652 nm περίπου											
<b>Καθαρότητα</b>												
Κατάλοιπα διαλυτών	<table border="0"> <tr> <td>Ακετόνη</td> <td rowspan="6">}</td> <td rowspan="6">50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνι ή σε συνδυασμό</td> </tr> <tr> <td>Μεθυλαιθυλκετόνη</td> </tr> <tr> <td>Μεθανόλη</td> </tr> <tr> <td>Αιθανόλη</td> </tr> <tr> <td>Προπανάλη-2</td> </tr> <tr> <td>Εξάνιο</td> </tr> <tr> <td>Διχλωρομεθάνιο:</td> <td></td> <td>10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο</td> </tr> </table>	Ακετόνη	}	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνι ή σε συνδυασμό	Μεθυλαιθυλκετόνη	Μεθανόλη	Αιθανόλη	Προπανάλη-2	Εξάνιο	Διχλωρομεθάνιο:		10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Ακετόνη	}	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνι ή σε συνδυασμό										
Μεθυλαιθυλκετόνη												
Μεθανόλη												
Αιθανόλη												
Προπανάλη-2												
Εξάνιο												
Διχλωρομεθάνιο:		10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο										
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο											
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο											
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο											
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο											

## ▼ B

Ιόντα χαλκού	200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Ολικός χαλκός	8,0 % των ολικών χαλκοφαιοφυτινών κατ' ανώτατο όριο

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργίλιου αυτής της χρωστικής ύλης.

## E 141 (ii) ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΙΝΩΝ ΜΕ ΧΑΛΚΟ

<b>Συνώνυμα</b>	Χαλκοχλωροφυλλινικό νάτριο· χαλκοχλωροφυλλινικό κάλιο· πράσινο CI natural 5								
<b>Ορισμός</b>	<p>Τα άλατα των χλωροφυλλινών με αλκάλια λαμβάνονται με την προσθήκη χαλκού στο προϊόν που προκύπτει από τη σαπωνοποίηση εκχυλισμάτων με διαλύτες ποικιλιών βρώσιμων φυτικών υλών, αγρωστωδών, τριφυλλίου και τσουκνίδας. Με τη σαπωνοποίηση απομακρύνονται οι μεθυλεστερικές και φυτολεστερικές ομάδες, ενώ είναι δυνατόν να διασπαστεί μερικώς ο κυκλοπεντενικός δακτύλιος. Μετά την προσθήκη του χαλκού στις καθαρές χλωροφυλλίνες, οι όξινες ομάδες εξουδετερώνονται προς σχηματισμό των αλάτων με κάλιο και/ή νάτριο.</p> <p>Μόνο οι κατωτέρω διαλύτες δύνανται να χρησιμοποιούνται για την εκχύλιση: ακετόνη, μεθυλαιθυλκετόνη, διγλωρομεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, μεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη-2 και εξάνιο.</p>								
Αριθ. CI	75815								
Αριθ. EINECS									
Χημική ονομασία	Οι κύριες χρωμοφόρες ενώσεις σε μορφή οξέος είναι το σύμπλοκο χαλκού με 3-προπιονικό 10-καρβοξυλο-4-αιθυλ-1,3,5,8-τετραμεθυλ-9-οξο-2-βινυλοφορβιν-7-ύλιο (χαλκοχλωροφυλλίνη α) και το σύμπλοκο χαλκού με 3-προπιονικό 10-καρβοξυλο-4-αιθυλο-3-φορμυλο-1,5,8-τριμεθυλ-9-οξο-2-βινυλοφορβιν-7-ύλιο (χαλκοχλωροφυλλίνη β)								
Χημικός τύπος	Χαλκοχλωροφυλλίνη α (σε μορφή οξέος): $C_{34}H_{32}Cu N_4O_5$ Χαλκοχλωροφυλλίνη β (σε μορφή οξέος): $C_{34}H_{30}Cu N_4O_6$								
Μοριακό βάρος	Χαλκοχλωροφυλλίνη α: 640,20 Χαλκοχλωροφυλλίνη β: 654,18 Σε περίπτωση διάσπασης του κυκλοπεντενικού δακτυλίου, κάθε μοριακό βάρος αυξάνεται κατά 18 Dalton.								
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χαλκοχλωροφυλλίνες τουλάχιστον 95 %, προσδιοριζόμενη σε δείγμα που έχει ξηραθεί στους 100 °C επί μία ώρα $E_{1\text{cm}}^{1\%}$ 565 σε μήκος κύματος περίπου 405 nm σε υδατικό ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών ιόντων με pH 7,5 $E_{1\text{cm}}^{1\%}$ 145 σε μήκος κύματος περίπου 630 nm σε υδατικό ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών ιόντων με pH 7,5								
<b>Περιγραφή</b>	Βαθυπράσινη έως κιανόμαυρη σκόνη								
<b>Ταυτοποίηση</b>									
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε υδατικό ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών ιόντων με pH 7,5 στα 405 nm περίπου και στα 630 nm περίπου								
<b>Καθαρότητα</b>									
Κατάλοιπα διαλυτών	<table> <tr> <td>Ακετόνη</td> <td rowspan="5">} 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνοι ή σε συνδυασμό</td> </tr> <tr> <td>Μεθυλαιθυλκετόνη</td> </tr> <tr> <td>Μεθανόλη</td> </tr> <tr> <td>Αιθανόλη</td> </tr> <tr> <td>Προπανόλη-2</td> </tr> <tr> <td>Εξάνιο</td> <td></td> </tr> </table>	Ακετόνη	} 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνοι ή σε συνδυασμό	Μεθυλαιθυλκετόνη	Μεθανόλη	Αιθανόλη	Προπανόλη-2	Εξάνιο	
Ακετόνη	} 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνοι ή σε συνδυασμό								
Μεθυλαιθυλκετόνη									
Μεθανόλη									
Αιθανόλη									
Προπανόλη-2									
Εξάνιο									

**▼ B**

	Διγλωρομεθάνιο:	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό		3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος		5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος		1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο		1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Ιόντα χαλκού		200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Ολικός χαλκός		8,0 % των ολικών χαλκογλωροφυλλινών κατ' ανώτατο όριο

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργίλιου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**E 142 ΠΡΑΣΙΝΟ S**

<b>Συνώνυμα</b>	Πράσινο CI food 4· λαμπρό πράσινο BS
<b>Ορισμός</b>	<p>Το πράσινο S συνίσταται κυρίως από άλας με νάτριο του N-[4-[[4-(διμεθυλαμινο)φαινυλ](2-υδροξυ-3,6-δισουλφο-ναφθαλινυλο)μεθυλενο]-2,5-κυκλοεξαδιεν-1-υλιδενο]-N-μεθυλομεθαναμινίου και βοηθητικές χρωστικές ύλες, μαζί με χλωριούχο και/ή θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωμο συστατικό.</p> <p>Το πράσινο S περιγράφεται ως το άλας με νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων με ασβέστιο και κάλιο.</p>
Αριθ. CI	44090
Αριθ. EINECS	221-409-2
Χημική ονομασία	Άλας με νάτριο του N-[4-[[4-(διμεθυλαμινο)φαινυλ](2-υδροξυ-3,6-δισουλφο-ναφθαλινυλο)μεθυλενο]-2,5-κυκλοεξαδιεν-1-υλιδενο]-N-μεθυλομεθαναμινίου 5-[4-διμεθυλ-αμινο-α-(4-διμεθυλιμινο-κυκλοεξαδιεν-2,5-υλιδενο)βενζυλ]-6-υδροξυ-7-σουλφοναφθαλινο-2-σουλφονικό νάτριο (εναλλακτική χημική ονομασία)
Χημικός τύπος	C <sub>27</sub> H <sub>25</sub> N <sub>2</sub> NaO <sub>7</sub> S <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	576,63
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 80 %, υπολογιζόμενη ως άλας με νάτριο E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 1 720 σε μήκος κύματος περίπου 632 nm σε υδατικό διάλυμα
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή κόκκοι χρώματος βαθυκίανου ή βαθυπράσινου
Όψη υδατικού διαλύματος	Μπλε ή πράσινο
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 632 nm περίπου
<b>Καθαρότητα</b>	
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών:	
4,4'-δισ(διμεθυλαμινο)-βενζυδρόλη	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
4,4'-δισ(διμεθυλαμινο)-βενζοφαινόνη	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
3-υδροξυ-ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό οξύ	0,2 % κατ' ανώτατο όριο



**▼ B**

Λευκοένωση	5,0 % κατ' ανώτατο όριο
Μη σουλφονωμένες πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες	0,01 % κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως ανιλίνη)
Υλεις εκχυλίσσιμες με αιθέρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο σε ουδέτερο περιβάλλον
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργιλίου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**E 150a ΑΠΛΟ ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΡΩΜΑ**

<b>Συνώνυμα</b>	Καυστικό καραμελόχρωμα
<b>Ορισμός</b>	Το απλό καραμελόχρωμα παρασκευάζεται με ελεγχόμενη θερμική κατεργασία υδατανθράκων (θρεπτικές γλυκαντικές ύλες του εμπορίου, κατάλληλες για τρόφιμα, που είναι τα μονομερή γλυκόζη και φρουκτόζη και/ή τα πολυμερή τους, π.χ. σιρόπια γλυκόζης, σακχαρόζη ή/και σιρόπια ιμπερτοσακχάρου και δεξτρόζη). Για να υποβοηθηθεί η καραμελοποίηση, μπορούν να χρησιμοποιούνται οξέα, αλκάλια και άλατα, εκτός από ενώσεις του αμμωνίου και του θειώδους οξέος.
Αριθ. CI	
Αριθ. EINECS	232-435-9
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Υγρά ή στερεά χρώματος σκοτεινού καστανού έως μαύρου
<b>Ταυτοποίηση</b>	
<b>Καθαρότητα</b>	
Χρωστική ύλη δεσμευόμενη από κυτταρίνη DEAE	50 % κατ' ανώτατο όριο
Χρωστική ύλη δεσμευόμενη από φωσφορυλιωμένη κυτταρίνη	50 % κατ' ανώτατο όριο
Χρωματική ένταση <sup>(1)</sup>	0,01—0,12
Ολικό άζωτο	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Ολικό θείο	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

<sup>(1)</sup> Η χρωματική ένταση ορίζεται ως η απορρόφηση υδατικού διαλύματος στερεών υλών καραμελοχρώματος με συγκέντρωση 0,1 % (w/v) στα 610 nm μέσα σε κυψελίδα του 1 cm.

▼ **B****E 150b ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΘΕΙΩΔΕΣ ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΡΩΜΑ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Το καυστικό θειώδες καραμελόχρωμα παρασκευάζεται με ελεγχόμενη θερμική κατεργασία υδατανθράκων (θρεπτικές γλυκαντικές ύλες του εμπορίου κατάλληλες για τρόφιμα, που είναι τα μονομερή γλυκόζη και φρουκτόζη και/ή τα πολυμερή τους, π.χ. σιρόπια γλυκόζης, σακχαρόζη και/ή σιρόπια ιμβερτοσακχάρου και δεξτρόζη), με ή χωρίς οξέα ή αλκάλια, παρουσία ενώσεων του αμμωνίου (υδροξείδιο του αμμωνίου, ανθρακικό και όξινο ανθρακικό αμμώνιο και φωσφορικό αμμώνιο). Δεν χρησιμοποιούνται ενώσεις του αμμωνίου.
Αριθ. CI	
Αριθ. EINECS	232-435-9
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Υγρά ή στερεά χρώματος σκοτεινού καστανού έως μαύρου
<b>Ταυτοποίηση</b>	
<b>Καθαρότητα</b>	
Χρωστική ύλη δεσμευόμενη από κυτταρίνη DEAE	Άνω του 50 %
Χρωματική ένταση <sup>(1)</sup>	0,05—0,13
Ολικό άζωτο	0,3 % κατ' ανώτατο όριο <sup>(2)</sup>
Διοξείδιο του θείου	0,2 % κατ' ανώτατο όριο <sup>(2)</sup>
Ολικό θείο	0,3—3,5 % <sup>(2)</sup>
Θείο δεσμευόμενο από κυτταρίνη DEAE	Άνω του 40 %
Λόγος απορρόφησης της χρωστικής ύλης που δεσμεύεται από κυτταρίνη DEAE	19—34
Λόγος απορρόφησης (A <sub>280/560</sub> )	Μεγαλύτερος από 50
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 150c ΕΝΑΜΜΩΝΙΟ ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΡΩΜΑ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Το εναμμόνιο καραμελόχρωμα παρασκευάζεται με ελεγχόμενη θερμική κατεργασία υδατανθράκων (θρεπτικές γλυκαντικές ύλες του εμπορίου κατάλληλες για τρόφιμα, που είναι τα μονομερή γλυκόζη και φρουκτόζη και/ή τα πολυμερή τους, π.χ. σιρόπια γλυκόζης, σακχαρόζη και/ή σιρόπια ιμβερτοσακχάρου και δεξτρόζη), με ή χωρίς οξέα ή αλκάλια, παρουσία ενώσεων του αμμωνίου (υδροξείδιο του αμμωνίου, ανθρακικό και όξινο ανθρακικό αμμώνιο και φωσφορικό αμμώνιο). Δεν χρησιμοποιούνται θειώδεις ενώσεις.

<sup>(1)</sup> Η χρωματική ένταση ορίζεται ως η απορρόφηση υδατικού διαλύματος στερεών υλών καραμελόχρωματος με συγκέντρωση 0,1 % (w/v) στα 610 nm μέσα σε κυψελίδα του 1 cm.

<sup>(2)</sup> Εκφραζόμενη σε ισοδύναμη χρωστική ύλη, δηλαδή σε προϊόν του οποίου η χρωματική ένταση είναι 0,1 μονάδες απορρόφησης.

**▼ B**

Αριθ. CI	
Αριθ. EINECS	232-435-9
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Υγρά ή στερεά χρώματος σκοτεινού καστανού έως μαύρου
<b>Ταυτοποίηση</b>	
<b>Καθαρότητα</b>	
Χρωστική ύλη δεσμευόμενη από κυτταρίνη DEAE	50 % κατ' ανώτατο όριο
Χρωστική ύλη δεσμευόμενη από φωσφορυλιωμένη κυτταρίνη	Άνω του 50 %
Χρωματική ένταση <sup>(1)</sup>	0,08—0,36
Αμμωνιακό άζωτο	0,3 % κατ' ανώτατο όριο <sup>(2)</sup>
4-μεθυλιμιδαζόλιο	200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο <sup>(2)</sup>
2-ακετυλο-4-τετραϋδροξυ-βουτυλιμιδαζόλιο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο <sup>(2)</sup>
Ολικό θείο	0,2 % κατ' ανώτατο όριο <sup>(2)</sup>
Ολικό άζωτο	0,7—3,3 % <sup>(2)</sup>
Λόγος απορρόφησης της χρωστικής ύλης που δεσμεύεται από φωσφορυλιωμένη κυτταρίνη	13—35
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 150d ENAMMΩΝΙΟ ΘΕΙΩΔΕΣ ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΡΩΜΑ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Το εναμμόνιο θειώδες καραμελόχρωμα παρασκευάζεται με ελεγχόμενη θερμική κατεργασία υδατανθράκων (θρεπτικές γλυκαντικές ύλες του εμπορίου κατάλληλες για τρόφιμα, που είναι τα μονομερή γλυκόζη και φρουκτόζη και/ή τα πολυμερή τους, π.χ. σιρόπια γλυκόζης, σακχαρόζη και/ή σιρόπια ιμβερτοσακχάρου και δεξτρόζη), με ή χωρίς οξέα ή αλκάλια, παρουσία ενώσεων και του θειώδους οξέος και του αμμωνίου (θειώδες οξύ, θειώδες και όξινο θειώδες κάλιο, θειώδες και όξινο θειώδες νάτριο, υδροξείδιο του αμμωνίου, ανθρακικό και όξινο ανθρακικό αμμώνιο, φωσφορικό αμμώνιο, θειικό αμμώνιο, θειώδες και όξινο θειώδες αμμώνιο).

Αριθ. CI

Αριθ. EINECS

232-435-9

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

<sup>(1)</sup> Η χρωματική ένταση ορίζεται ως η απορρόφηση υδατικού διαλύματος στερεών υλών καραμελόχρωματος με συγκέντρωση 0,1 % (W/V) στα 610 nm μέσα σε κυψελίδα του 1 cm.

<sup>(2)</sup> Εκφραζόμενη σε ισοδύναμη χρωστική ύλη, δηλαδή σε προϊόν του οποίου η χρωματική ένταση είναι 0,1 μονάδες απορρόφησης.

**▼ B**

Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Υγρή ή στερεά χρώματος σκοτεινού καστανού έως μαύρου
<b>Ταυτοποίηση</b>	
<b>Καθαρότητα</b>	
Χρωστική ύλη δεσμευόμενη από κυτταρίνη DEAE	Άνω του 50 %
Χρωματική ένταση <sup>(1)</sup>	0,10 - 0,60
Αμμωνιακό άζωτο	0,6 % κατ' ανώτατο όριο <sup>(2)</sup>
Διοξειδίο του θείου	0,2 % κατ' ανώτατο όριο <sup>(2)</sup>
4-μεθυλιμιδαζόλιο	250 mg/kg κατ' ανώτατο όριο <sup>(2)</sup>
Ολικό άζωτο	0,3 - 1,7 % <sup>(2)</sup>
Ολικό θείο	0,3 - 2,5 % <sup>(2)</sup>
Λόγος αζώτου προς θείο του ιζήματος που λαμβάνεται με αλκοόλη	0,7 - 2,7
Λόγος απορρόφησης του ιζήματος που λαμβάνεται με αλκοόλη <sup>(3)</sup>	8 - 14
Λόγος απορρόφησης (A <sub>280/560</sub> )	50 κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M8****E 151 ΛΑΜΠΡΟ ΜΑΥΡΟ PN****▼ B**

**Συνώνυμα** Μαύρο CI food 1

**▼ M8**

**Ορισμός** Το λαμπρό μαύρο PN αποτελείται κυρίως από 4-ακεταμιδο-5-υδροξυ-6-[7-σουλφο-4-(4-σουλφοφαινυλαζω)-1-ναφθυλαζω]ναφθαλινο-1,7-δισουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, μαζί με χλωριούχο και/ή θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωμο συστατικό. Το λαμπρό μαύρο PN περιγράφεται ως το άλας με νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων με ασβέστιο και κάλιο.

**▼ B**

Αριθ. CI	28440
Αριθ. EINECS	219-746-5
Χημική ονομασία	4-ακεταμιδο-5-υδροξυ-6-[7-σουλφο-4-(4-σουλφοφαινυλαζω)-1-ναφθυλαζω]ναφθαλινο-1,7-δισουλφονικό νάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>28</sub> H <sub>17</sub> N <sub>5</sub> Na <sub>4</sub> O <sub>14</sub> S <sub>4</sub>
Μοριακό βάρος	867,69

<sup>(1)</sup> Η χρωματική ένταση ορίζεται ως η απορρόφηση υδατικού διαλύματος στερεών υλών καραμελοχρώματος με συγκέντρωση 0,1 % (W/V) στα 610 nm μέσα σε κυψελίδα του 1 cm.

<sup>(2)</sup> Εκφραζόμενη σε ισοδύναμη χρωστική ύλη, δηλαδή σε προϊόν του οποίου η χρωματική ένταση είναι 0,1 μονάδες απορρόφησης.

<sup>(3)</sup> Ο λόγος απορρόφησης του ιζήματος που λαμβάνεται με αλκοόλη ορίζεται ως το πηλίκο της απορρόφησης του ιζήματος στα 280 nm διά της απορρόφησης του στα 560 nm (κυψελίδα του 1 cm).

## ▼ B

Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 80 %, υπολογιζόμενη ως άλας με νάτριο
<b>Περιγραφή</b>	$E_{1cm}^{1\%}$ 530 σε μήκος κύματος περίπου 570 nm σε υδατικό διάλυμα
Όψη υδατικού διαλύματος	Σκόνη ή κόκκοι χρώματος μαύρου
<b>Τυποποίηση</b>	Μαύρο-υποκόνανο
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 570 nm περίπου
<b>Καθαρότητα</b>	
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	4 % κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί της περιεκτικότητας σε χρωστική)
Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών:	
4-ακεταμιδο-5-υδροξυ-ναφθαλινο-1,7-δισουλφονικό οξύ	} Συνολικά 0,8 % κατ' ανώτατο όριο
4-αμινο-5-υδροξυ-ναφθαλινο-1,7-δισουλφονικό οξύ	
8-αμινο-ναφθαλινο-2-σουλφονικό οξύ-	
4,4'-διαζωαμινο-δι(βενζολοσουλφονικό) οξύ	
Μη σουλφονωμένες πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες	0,01 % κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως ανιλίνη)
Ύλες εκχυλίσιμες με αιθέρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο σε ουδέτερο περιβάλλον
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργίλου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**E 153 ΦΥΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	Φυτικό μαύρο
<b>Ορισμός</b>	Ο φυτικός ενεργός άνθρακας παράγεται με απανθράκωση φυτικών υλών, όπως ξύλο, κατάλοιπα κυτταρίνης, τύρφη και φλοιός κοκκοκαρύου και άλλων καρπών. Ο ενεργός άνθρακας που παράγεται με τον τρόπο αυτόν αλέθεται σε κυλινδρόμυλο και ο υψηλής δραστηκότητας κονιοποιημένος άνθρακας που προκύπτει υποβάλλεται σε κατεργασία σε κυκλώνα. Η λεπτόκοκκη σκόνη που εξέρχεται από τον κυκλώνα καθαρίζεται με έκπλυση με υδροχλωρικό οξύ, εξουδετερώνεται και στη συνέχεια ξηραίνεται. Το προϊόν της διαδικασίας αυτής είναι γνωστό παραδοσιακά με την ονομασία φυτικό μαύρο. Προϊόντα με μεγαλύτερη χρωστική ικανότητα παράγονται από τη λεπτόκοκκη σκόνη με περαιτέρω κατεργασία σε κυκλώνα ή επιπλέον άλεση, την οποία ακολουθεί έκπλυση με οξύ, εξουδετέρωση και ξήρανση. Αποτελείται κυρίως από λεπτομερισμένο άνθρακα και μπορεί να περιέχει μικρές ποσότητες αζώτου, υδρογόνου και οξυγόνου. Μετά την παρασκευή, το προϊόν ενδέχεται να απορροφήσει κάποιο ποσοστό υγρασίας.

**▼ B**

Αριθ. CI	77266
Αριθ. EINECS	231-153-3
Χημική ονομασία	Ανθρακας
Χημικός τύπος	C
Ατομικό βάρος	12,01
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε άνθρακα τουλάχιστον 95 %, υπολογιζόμενη επί άνδρης και απαλλαγμένης από τέφρα ουσίας
Απώλεια κατά την ξήρανση	12 % κατ' ανώτατο όριο (120 °C, 3H)
<b>Περιγραφή</b>	Μαύρη άοσμη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτη στο νερό και στους οργανικούς διαλύτες
Καύση	Όταν πυρακτώνεται, καίεται αργά χωρίς φλόγα
<b>Καθαρότητα</b>	
Τέφρα (ολική)	4,0 % κατ' ανώτατο όριο (θερμοκρασία ανάφλεξης: 625 °C)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες	Βενζο[α]πυρένιο σε συγκέντρωση μικρότερη των 50 μg/kg στο εκχύλισμα που λαμβάνεται με εκχύλιση 1 g προϊόντος με 10 g καθαρού κυκλοεξανίου σε συσκευή συνεχούς εκχύλισης.
Ύλες διαλυτές σε αλκάλια	Το διήθημα που λαμβάνεται με βρασμό 2 g δείγματος με 20 ml κανονικού διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου και διήθηση, πρέπει να είναι άχρωμο

**E 155 ΚΑΣΤΑΝΟ HT**

<b>Συνώνυμα</b>	Καστανό CI food 3, καστανό της σοκολάτας HT
<b>Ορισμός</b>	Το καστανό HT συνίσταται κυρίως από 4,4'-(2,4-διυδροξυ-5-υδροξυμεθυλο-1,3-φαινυλενοδιαζω)-δι(ναφθαλινο-1-σουλφονικό) νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, μαζί με γλωριούχο και/ή θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωμο συστατικό. Το καστανό HT περιγράφεται ως το άλας με νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων με ασβέστιο και κάλιο.
Αριθ. CI	20285
Αριθ. EINECS	224-924-0
Χημική ονομασία	4,4'-(2,4-διυδροξυ-5-υδροξυμεθυλο-1,3-φαινυλενοδιαζω)-δι(ναφθαλινο-1-σουλφονικό) νάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>27</sub> H <sub>18</sub> N <sub>4</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>9</sub> S <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	652,57
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 70 %, υπολογιζόμενη ως άλας με νάτριο E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 403 σε μήκος κύματος περίπου 460 nm σε υδατικό διάλυμα με pH 7
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή κόκκοι χρώματος καστανοκόκκινου
Όψη υδατικού διαλύματος	Καστανό

**▼ B**

<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε νερό με pH 7 στα 460 nm περίπου
<b>Καθαρότητα</b>	
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	10 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος TLC)
Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών:	
4-αμινο-ναφθαλινο-1-σουλφονικό οξύ	0,7 % κατ' ανώτατο όριο
Μη σουλφονωμένες πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες	0,01 % κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως ανιλίνη)
Ύλες εκχυλίσματες με αιθέρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο σε διάλυμα με pH 7
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργίλιου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**E 160a (i) Β-ΚΑΡΟΤΕΝΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Πορτοκαλί CI food 5
<b>Ορισμός</b>	Οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν κατά κύριο λόγο για όλα τα trans ισομερή του β-καροτενίου, συνοδευόμενα από μικρές ποσότητες άλλων καροτενοειδών. Τα αραιωμένα και σταθεροποιημένα παρασκευάσματα είναι δυνατόν να περιέχουν τα cis και trans ισομερή σε διαφορετικές αναλογίες.
Αριθ. CI	40800
Αριθ. EINECS	230-636-6
Χημική ονομασία	β-καροτένιο, β, β-καροτένιο
Χημικός τύπος	C <sub>40</sub> H <sub>56</sub>
Μοριακό βάρος	536,88
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 96 % (εκφραζόμενη ως β-καροτένιο) E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 2 500 σε μήκος κύματος 440 nm έως 457 nm περίπου σε κυκλοεξάνιο
<b>Περιγραφή</b>	Κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη χρώματος κόκκινου ή καστανοκόκκινου
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστα απορρόφησης σε κυκλοεξάνιο στα 453 έως 456 nm
<b>Καθαρότητα</b>	
Θεική τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	Καροτενοειδή εκτός από β-καροτένιο: 3,0 % των ολικών χρωστικών υλών κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## ▼ B

## E 160a (ii) ΦΥΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΕΝΙΑ

<b>Συνώνυμα</b>	Πορτοκαλί CI food 5													
<b>Ορισμός</b>	<p>Φυτικά καροτένια λαμβάνονται από ποικιλίες εδώδιμων φυτών, καρότα, φυτικά έλαια, αγρωστώδη, τριφύλλι (μηδική) και τσουκνίδα με εκχύλιση με διαλύτη.</p> <p>Η κύρια χρωμοφόρος ομάδα αποτελείται από καροτενοειδή, μεταξύ των οποίων υπερισχύει το β-καροτένιο. Ενδέχεται να περιέχονται επίσης α-καροτένιο, γ-καροτένιο και άλλες χρωστικές. Εκτός από τις χρωστικές, το προϊόν ενδέχεται να περιέχει έλαια, λίπη και κηρούς που αποτελούν φυσικά συστατικά της πρώτης ύλης.</p> <p>Μόνο οι κατωτέρω διαλύτες δύνανται να χρησιμοποιούνται για την εκχύλιση: ακετόνη, μεθυλαιθυλκετόνη, μεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη-2, εξάνιο <sup>(1)</sup>, διχλωρομεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα.</p>													
Αριθ. CI	75130													
Αριθ. EINECS	230-636-6													
Χημική ονομασία														
Χημικός τύπος	β-Καροτένιο: C <sub>40</sub> H <sub>56</sub>													
Μοριακό βάρος	β-Καροτένιο: 536,88													
Δοκιμασία	<p>Περιεκτικότητα σε καροτένια (υπολογιζόμενη ως β-καροτένιο) 5 % τουλάχιστον. Για προϊόντα λαμβανόμενα με εκχύλιση φυτικών ελαίων: περιεκτικότητα σε βρώσιμα λίπη 0,2 % τουλάχιστον</p> <p>E<sub>1cm</sub><sup>1%</sup> 2 500 σε μήκος κύματος 440 nm έως 457 nm περίπου σε κυκλοεξάνιο</p>													
<b>Περιγραφή</b>														
<b>Ταυτοποίηση</b>														
Φασματομετρία	Μέγιστα απορρόφησης σε κυκλοεξάνιο στα 440 nm έως 457 nm και στα 470 nm έως 486 nm													
<b>Καθαρότητα</b>														
Κατάλοιπα διαλυτών	<table border="0"> <tr> <td>Ακετόνη</td> <td rowspan="5">}</td> <td rowspan="5">50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνοι ή σε συνδυασμό</td> </tr> <tr> <td>Μεθυλαιθυλκετόνη</td> </tr> <tr> <td>Μεθανόλη</td> </tr> <tr> <td>Προπανόλη-2</td> </tr> <tr> <td>Εξάνιο</td> </tr> <tr> <td>Αιθανόλη</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Διχλωρομεθάνιο</td> <td></td> <td>10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο</td> </tr> </table>	Ακετόνη	}	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνοι ή σε συνδυασμό	Μεθυλαιθυλκετόνη	Μεθανόλη	Προπανόλη-2	Εξάνιο	Αιθανόλη			Διχλωρομεθάνιο		10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Ακετόνη	}	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνοι ή σε συνδυασμό												
Μεθυλαιθυλκετόνη														
Μεθανόλη														
Προπανόλη-2														
Εξάνιο														
Αιθανόλη														
Διχλωρομεθάνιο		10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο												
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο													

E 160a (iii) Β-ΚΑΡΟΤΕΝΙΟ από *Blakeslea trispora*

<b>Συνώνυμα</b>	Πορτοκαλί CI food 5
<b>Ορισμός</b>	<p>Λαμβάνεται με διαδικασία ζύμωσης με χρήση μεικτής καλλιέργειας των δύο συζεύξιμων τύπων (+) και (-) ποικιλιών του μύκητα <i>Blakeslea trispora</i> που αναπαράγονται αμφιγονικά. Το β-καροτένιο εκχυλίζεται από τη βιομάζα με οξικό αιθυλεστέρα ή οξικό ισοβουτυλεστέρα και προπανόλη-2 και κρυσταλλώνεται. Το κρυσταλλικό προϊόν αποτελείται κυρίως από trans β-καροτένιο. Λόγω της φυσικής διαδικασίας περίπου το 3 % του προϊόντος αποτελείται από μείγμα καροτενοειδών, που είναι χαρακτηριστικό για το προϊόν.</p>

<sup>(1)</sup> Βενζόλιο σε μέγιστη συγκέντρωση 0,05 % v/v.



**▼ B**

Αριθ. CI	40800
Αριθ. EINECS	230-636-6
Χημική ονομασία	β-καροτένιο, β, β-καροτένιο
Χημικός τύπος	C <sub>40</sub> H <sub>56</sub>
Μοριακό βάρος	536,88
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 96 % (εκφραζόμενη ως β-καροτένιο) E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 2 500 σε μήκος κύματος περίπου 440 nm έως 457 nm σε κυκλοεξάνιο
<b>Περιγραφή</b>	Κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη χρώματος κόκκινου, καστανοκόκκινου ή πορφυροΐδους (το χρώμα διαφέρει ανάλογα με το διαλύτη που χρησιμοποιήθηκε για την εκχύλιση και με τις συνθήκες κρυστάλλωσης)
<b>Τυποποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε κυκλοεξάνιο στα 453 έως 456 nm
<b>Καθαρότητα</b>	
Κατάλοιπα διαλυτών	Οξικός αιθυλεστέρας } 0,8 % κατ' ανώτατο όριο, μόνι ή σε συνδυασμό Αιθανόλη }
	Οξικός ισοβουτυλεστέρας: 1,0 % κατ' ανώτατο όριο
	Προπανόλη-2: 0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Θεϊκή τέφρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	Καροτενοειδή εκτός από β-καροτένιο: 3,0 % των ολικών χρωστικών υλών κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
Μύκητες	100 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
Ζυμομύκητες	100 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
<i>Salmonella</i> spp.	Απουσία σε 25 g
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 5 g

**E 160a (iv) ΚΑΡΟΤΕΝΙΑ ΑΠΟ ΦΥΚΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Πορτοκαλί CI food 5
<b>▼ M8</b>	
<b>Ορισμός</b>	Μείγματα καροτενίων παράγονται επίσης από ποικιλίες των φυκών <i>Dunaliella salina</i> . Το β-καροτένιο λαμβάνεται με εκχύλιση με αιθέριο έλαιο. Το παρασκεύασμα είναι εναιώρημα 20 ως 30 % σε βρώσιμο έλαιο. Η αναλογία των ισομερών trans και cis είναι της τάξης του 50/50 ως 71/29. Η κύρια χρωμοφόρος ομάδα αποτελείται από καροτενοειδή, μεταξύ των οποίων υπερικχύνει το β-καροτένιο. Ενδέχεται να περιέχονται επίσης α-καροτένιο, λουτεΐνη, ζεαξανθίνη και β-κρυπτοξανθίνη. Εκτός από τις χρωστικές, το προϊόν ενδέχεται να περιέχει έλαια, λίπη και κηρούς που αποτελούν φυσικά συστατικά της πρώτης ύλης.

**▼ B**

Αριθ. CI	75130
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	β-καροτένιο: C <sub>40</sub> H <sub>56</sub>
Μοριακό βάρος	β-καροτένιο: 536,88

▼ **B**

Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε καροτίνη (υπολογιζόμενη ως β-καροτένιο) 20 % τουλάχιστον. E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 2 500 σε μήκος κύματος περίπου 440 nm έως 457 nm σε κυκλοεξάνιο
<b>Περιγραφή</b>	
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστα απορρόφησης σε κυκλοεξάνιο στα 440 nm έως 457 nm και στα 474 nm έως 486 nm
<b>Καθαρότητα</b>	
Φυσικές τοκοφερόλες σε βρώσιμα έλαια	0,3 % κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **M32****E 160 b (i) ANNATTO ΜΠΙΞΙΝΗ**

(I) ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΠΙΞΙΝΗΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΗ

<b>Συνώνυμα</b>	Annatto B, Orlean, Terre orellana, L. Orange, Πορτοκαλί CI natural 4
<b>Ορισμός</b>	Το εκχύλισμα μπιξίνης με διαλύτη λαμβάνεται με την εκχύλιση του εξωτερικού περιβλήματος των σπερμάτων του δένδρου αννάττο ( <i>Bixa orellana</i> L.) με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κατάλληλους για τρόφιμα διαλύτες: ακετόνη, μεθανόλη, εξάνιο, αιθανόλη, ισοπροπυλική αλκοόλη, οξικό αιθυλεστέρα, αλκαλική αλκοόλη ή το υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα. Το προκύπτον παρασκεύασμα μπορεί να οξινίζεται και, στη συνέχεια, γίνεται αφαίρεση του διαλύτη, ξήρανση και άλεση. Το εκχύλισμα μπιξίνης με διαλύτη περιέχει αρκετά χρωματισμένα συστατικά: η κύρια χρωστική ουσία είναι η cis-μπιξίνη, δευτερεύουσα χρωστική ουσία είναι η trans-μπιξίνη· τα προϊόντα θερμικής διάσπασης της μπιξίνης μπορεί επίσης να είναι παρόντα ως αποτέλεσμα της μεταποίησης.
Αριθ. CI	75120
Αριθ. Eines	230-248-7
Χημική ονομασία	cis-μπιξίνη: (9-cis)-υδρογονο-6,6'-διαπο-Ψ,Ψ'-καροτενοδιοϊκός μεθυλεστέρας
Χημικός τύπος	cis-μπιξίνη: C <sub>25</sub> H <sub>30</sub> O <sub>4</sub>
Μοριακό βάρος	394,5
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 85 % χρωστικές ύλες (εκφράζονται σε μπιξίνη) E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 3090 σε μήκος κύματος περίπου 487 nm σε τετραϋδροφουράνιο και ακετόνη
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη σκούρου καστανοκόκκινου έως κοκκινοπορφυρού χρώματος
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτη στο νερό, πολύ λίγο διαλυτή στην αιθανόλη
Φασματομετρία	Το δείγμα σε ακετόνη παρουσιάζει μέγιστα απορρόφησης σε περίπου 425, 457 και 487 nm
<b>Καθαρότητα</b>	
Νορμπιξίνη	5 % των ολικών χρωστικών υλών κατ' ανώτατο όριο
Κατάλοιπα διαλυτών	Ακετόνη: 30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Μεθανόλη: 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Εξάνιο: 25 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Αιθανόλη: Ισοπροπυλική αλκοόλη 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνοι ή σε συνδυασμό Οξικός αιθυλεστέρας:
Αρσενικό	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **M32**

Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	0,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## (II) ΥΔΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΜΠΙΞΙΝΗ

**Συνώνυμα**

Annatto E, Orlean, Terre orellana, L. Orange, Πορτοκαλί CI natural 4

**Ορισμός**

Η υδροκατεργασμένη μπιξίνη λαμβάνεται με την εκχύλιση του εξωτερικού περιβλήματος των σπερμάτων του δένδρου αννάττο (*Bixa orellana* L.) με απόξεση των σπερμάτων παρουσία κρύου, ελαφρώς αλκαλικού νερού: Το προκύπτον παρασκεύασμα οξινίζεται με σκοπό την κατακρήμνιση της μπιξίνης, η οποία στη συνέχεια διηθείται, ξηραίνεται και αλέθεται.

Η υδροκατεργασμένη μπιξίνη περιέχει αρκετά χρωματισμένα συστατικά· η κύρια χρωστική ουσία είναι η cis-μπιξίνη, δευτερεύουσα χρωστική ουσία είναι η trans-μπιξίνη· προϊόντα θερμικής διάσπασης της μπιξίνης μπορεί επίσης να είναι παρόντα ως αποτέλεσμα της μεταποίησης.

Αριθ. CI	75120
Αριθ. Eines	230-248-7
Χημική ονομασία	cis-μπιξίνη: (9-cis)-υδρογονο-6,6'-διαπο-Ψ,Ψ-καροτενοδιοϊκός μεθυλεστέρας
Χημικός τύπος	cis-μπιξίνη: C <sub>25</sub> H <sub>30</sub> O <sub>4</sub>
Μοριακό βάρος	394,5
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 25 % χρωστικές ύλες (εκφράζονται σε μπιξίνη)

E<sup>1</sup><sub>1cm</sub> 3090 σε μήκος κύματος περίπου 487 nm σε τετραυδροφουράνιο και ακετόνη

**Περιγραφή**

Σκόνη σκούρου καστανοκόκκινου έως κοκκινοπορφυρού χρώματος

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα	Αδιάλυτη στο νερό, πολύ λίγο διαλυτή στην αιθανόλη
Φασματομετρία	Το δείγμα σε ακετόνη παρουσιάζει μέγιστα απορρόφησης σε περίπου 425, 457 και 487 nm

**Καθαρότητα**

Νορμπιξίνη	7 % των ολικών χρωστικών υλών κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	0,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 160 b (ii) ANNATTO ΝΟΡΜΠΙΞΙΝΗ**

## (I) ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΝΟΡΜΠΙΞΙΝΗΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΗ

**Συνώνυμα**

Annatto C, Orlean, Terre orellana, L. Orange, Πορτοκαλί CI natural 4

**Ορισμός**

Το εκχύλισμα νορμπιξίνης με διαλύτη λαμβάνεται από το εξωτερικό περίβλημα των σπερμάτων του δένδρου αννάττο (*Bixa orellana* L.) με το πλύσιμο με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κατάλληλους για τρόφιμα διαλύτες: ακετόνη, μεθανόλη, εξάνιο, αιθανόλη, ισοπροπυλική αλκοόλη, οξικό αιθυλεστέρα, αλκαλική αλκοόλη ή υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα και στη συνέχεια απομάκρυνση διαλύτη, κρυστάλλωση και ξήρανση. Στην προκύπτουσα σκόνη προστίθεται υδατικό διάλυμα αλκάλειος, το οποίο στη συνέχεια θερμαίνεται για να υδρολύσει τις χρωστικές και ψύχεται. Το υδατικό διάλυμα διηθείται και οξινίζεται ώστε να κατακρήμνιστεί η νορμπιξίνη. Το ίζημα διηθείται, πλένεται, ξηραίνεται και αλέθεται, για να καταστεί κοκκώδης σκόνη.

▼ **M32**

Αριθ. CI	75120
Αριθ. Eines	208-810-8
Χημική ονομασία	cis-νορμπιζίνη: 6,6'-διαπο-Ψ,Ψ-καροτενοδιοϊκό οξύ δικάλιο άλας cis-νορμπιζίνης: 6,6'-διαπο-Ψ,Ψ-καροτενοδιοϊκό δικάλιο δινάτριο άλας cis-νορμπιζίνης: 6,6'-διαπο-Ψ,Ψ-καροτενοδιοϊκό δινάτριο
Χημικός τύπος	cis-νορμπιζίνη: C <sub>24</sub> H <sub>28</sub> O <sub>4</sub> δικάλιο άλας cis-νορμπιζίνης: C <sub>24</sub> H <sub>26</sub> K <sub>2</sub> O <sub>4</sub> δινάτριο άλας cis-νορμπιζίνης: C <sub>24</sub> H <sub>26</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>4</sub>
Μοριακό βάρος	380,5 (οξύ), 456,7 (δικάλιο άλας), 424,5 (δινάτριο άλας)
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 85 % χρωστικές ύλες (εκφραζόμενες ως νορμπιζίνη) E <sup>1</sup> % <sub>1cm</sub> 2870 σε μήκος κύματος περίπου 482 nm σε διάλυμα 0,5 % υδροξειδίου του καλίου
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη σκούρου καστανοκόκκινου έως κοκκινοπορφυρού χρώματος
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτή στο νερό, πολύ λίγο διαλυτή στην αιθανόλη
Φασματομετρία	Το δείγμα σε 0,5 % διάλυμα υδροξειδίου παρουσιάζει μέγιστα απορρόφησης σε περίπου 453, 457 και 482 nm
<b>Καθαρότητα</b>	
Κατάλοιπα διαλυτών	Ακετόνη: 30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Μεθανόλη: 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Εξάνιο: 25 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Αιθανόλη: Ισοπροπυλική αλκοόλη 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, Οξικός αιθυλεστέρας: μόνιι ή σε συνδυασμό
Αρσενικό	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	0,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## (II) ΝΟΡΜΠΙΞΙΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΟΞΥ

<b>Συνώνυμα</b>	Annatto F, Orlean, Terre orellana, L. Orange, Πορτοκαλί CI natural 4
<b>Ορισμός</b>	Η νορμπιζίνη κατεργασμένη με άλκαλι (κατακρημνισμένη με οξύ) παρασκευάζεται με την εκχύλιση του εξωτερικού περιβλήματος των σπερμάτων του δένδρου ανάττο ( <i>Bixa orellana</i> L.) με γνρό άλκαλι. Η μπιζίνη υδρολύεται σε νορμπιζίνη σε θερμό αλκαλικό διάλυμα και οξινίζεται για να κατακρημνιστεί η νορμπιζίνη. Το ίζημα διηθείται, ξηραίνεται και αλέθεται, για να καταστεί κοκκώδης σκόνη. Η νορμπιζίνη κατεργασμένη με άλκαλι περιέχει αρκετά χρωματισμένα συστατικά· η κύρια χρωστική ουσία είναι η cis-νορμπιζίνη, δευτερεύουσα χρωστική ουσία είναι η trans-νορμπιζίνη· προϊόντα θερμικής διάσπασης της νορμπιζίνης μπορεί επίσης να είναι παρόντα ως αποτέλεσμα της μεταποίησης.
Αριθ. CI	75120

▼ **M32**

Αριθ. Einecs	208-810-8
Χημική ονομασία	cis-νορμπιζίνη: 6,6'-διαπο-Ψ,Ψ-καροτενοδιοϊκό οξύ δικάλιο άλας cis-νορμπιζίνης: 6,6'-διαπο-Ψ,Ψ-καροτενοδιοϊκό δικάλιο δινάτριο άλας cis-νορμπιζίνης: 6,6'-διαπο-Ψ,Ψ-καροτενοδιοϊκό δινάτριο
Χημικός τύπος	cis-Νορμπιζίνη: C <sub>24</sub> H <sub>28</sub> O <sub>4</sub> δικάλιο άλας cis-νορμπιζίνης: C <sub>24</sub> H <sub>26</sub> K <sub>2</sub> O <sub>4</sub> δινάτριο άλας cis-νορμπιζίνης: C <sub>24</sub> H <sub>26</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>4</sub>
Μοριακό βάρος	380,5 (οξύ), 456,7 (δικάλιο άλας), 424,5 (δινάτριο άλας)
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 35 % χρωστικές ύλες (εκφραζόμενες ως νορμπιζίνη) E <sup>1</sup> % <sub>1cm</sub> 2870 σε μήκος κύματος περίπου 482 nm σε διάλυμα 0,5 % υδροξειδίου του καλίου
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη σκούρου καστανοκόκκινου έως κοκκινοπορφυρού χρώματος
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτή στο νερό, πολύ λίγο διαλυτή στην αιθανόλη
Φασματομετρία	Το δείγμα σε 0,5 % διάλυμα υδροξειδίου παρουσιάζει μέγιστα απορρόφησης σε περίπου 453, 457 και 482 nm
<b>Καθαρότητα</b>	
Αρσενικό	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	0,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## (III) ΝΟΡΜΠΙΞΙΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗ ΜΕ ΟΞΥ

<b>Συνώνυμα</b>	Annatto F, Orlean, Terre orellana, L. Orange, Πορτοκαλί CI natural 4
<b>Ορισμός</b>	Η νορμπιζίνη κατεργασμένη με <i>άλκαλι</i> (χωρίς κατακρήμνιση με οξύ) παρασκευάζεται με την εκχύλιση του εξωτερικού περιβλήματος των σπυρμάτων του δένδρου ανάττο ( <i>Bixa orellana</i> L.) με υγρό <i>άλκαλι</i> . Η μπιζίνη υδρολύεται σε νορμπιζίνη σε θερμό αλκαλικό διάλυμα. Το ίζημα διηθείται, ξηραίνεται και αλέθεται, για να καταστεί κοκκώδης σκόνη. Τα εκχυλίσματα περιέχουν κυρίως το <i>άλας</i> καλίου ή νατρίου της νορμπιζίνης ως κύρια χρωστική ουσία. Η νορμπιζίνη κατεργασμένη με <i>άλκαλι</i> (χωρίς κατακρήμνιση με οξύ) περιέχει αρκετά χρωματισμένα συστατικά· η κύρια χρωστική ουσία είναι η <i>cis</i> -νορμπιζίνη, δευτερεύουσα χρωστική ουσία είναι η <i>trans</i> -νορμπιζίνη· προϊόντα θερμικής διάσπασης της νορμπιζίνης μπορεί επίσης να είναι παρόντα ως αποτέλεσμα της μεταποίησης.
Αριθ. CI	75120
Αριθ. Einecs	208-810-8
Χημική ονομασία	cis-νορμπιζίνη: 6,6'-διαπο-Ψ,Ψ-καροτενοδιοϊκό οξύ δικάλιο άλας cis-νορμπιζίνης: 6,6'-διαπο-Ψ,Ψ-καροτενοδιοϊκό δικάλιο δινάτριο άλας cis-νορμπιζίνης: 6,6'-διαπο-Ψ,Ψ-καροτενοδιοϊκό δινάτριο
Χημικός τύπος	cis-νορμπιζίνη: C <sub>24</sub> H <sub>28</sub> O <sub>4</sub> δικάλιο άλας cis-νορμπιζίνης: C <sub>24</sub> H <sub>26</sub> K <sub>2</sub> O <sub>4</sub> δινάτριο άλας cis-νορμπιζίνης: C <sub>24</sub> H <sub>26</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>4</sub>

▼ **M32**

Μοριακό βάρος	380,5 (οξύ), 456,7 (δικάλιο άλας), 424,5 (δινάτριο άλας)
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 15 % χρωστικές ύλες (εκφραζόμενες ως νορμπιζίνη) $E^{1\%}_{1\text{cm}}$ 2870 σε μήκος κύματος περίπου 482 nm σε διάλυμα 0,5 % υδροξειδίου του καλίου
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη σκούρου καστανοκόκκινου έως κοκκινοπορφυρού χρώματος
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτή στο νερό, πολύ λίγο διαλυτή στην αιθανόλη
Φασματομετρία	Το δείγμα σε 0,5 % διάλυμα υδροξειδίου παρουσιάζει μέγιστα απορρόφησης σε περίπου 453, 457 και 482 nm
<b>Καθαρότητα</b>	
Αρσενικό	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	0,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **B****E 160c ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΑΠΡΙΚΑΣ, ΚΑΨΑΝΘΙΝΗ, ΚΑΨΟΡΟΥΜΠΙΝΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Ελαιορητήνη πάπρικας
<b>Ορισμός</b>	Το εκχύλισμα πάπρικας λαμβάνεται με εκχύλιση με διαλύτες της πάπρικας, δηλαδή του αλεσμένου καρπού — με ή χωρίς σπέρματα — ποικιλιών του φυτού <i>Capsicum annuum</i> L., και περιέχει τις κυριότερες χρωμοφόρες ομάδες αυτού του καρυκείου, που είναι η καψανθίνη και η καψορουμπίνη. Περιέχει επίσης μεγάλη ποικιλία άλλων χρωμοφόρων ενώσεων.  Μόνο οι κατωτέρω διαλύτες δύνανται να χρησιμοποιούνται για την εκχύλιση: μεθανόλη, αιθανόλη, ακετόνη, εξάνιο, διγλωρομεθάνιο, οξικός αιθυλεστέρας, προπανόλη-2 και διοξείδιο του άνθρακα.
Αριθ. CI	
Αριθ. EINECS	Καψανθίνη: 207-364-1, καψορουμπίνη: 207-425-2
Χημική ονομασία	Καψανθίνη: (3R, 3'S, 5'R)-3,3'-διυδροξυ-β,κ-καροτενόνη-6 Καψορουμπίνη: (3S, 3'S, 5R, 5'R)-3,3'-διυδροξυ-κ,κ-καροτενοδιόνη-6,6'
Χημικός τύπος	Καψανθίνη: $C_{40}H_{56}O_3$ Καψορουμπίνη: $C_{40}H_{56}O_4$
Μοριακό βάρος	Καψανθίνη: 584,85 Καψορουμπίνη: 600,85
Δοκιμασία	Εκχύλισμα πάπρικας: περιεκτικότητα σε καροτενοειδή τουλάχιστον 7,0 % Καψανθίνη/καψορουμπίνη: τουλάχιστον 30 % σε ολικά καροτενοειδή $E^{1\%}_{1\text{cm}}$ 2 100 σε μήκος κύματος περίπου 462 nm σε ακετόνη

**▼ B**

<b>Περιγραφή</b>	Βαθυκόκκινο παχύρρευστο υγρό							
<b>Ταυτοποίηση</b>								
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε ακετόνη στα 462 nm περίπου							
Χρωματική αντίδραση	Μια σταγόνα δείγματος σε 2-3 σταγόνες χλωροφορμίου παρέχει με την προσθήκη μιας σταγόνας θειικού οξέος βαθυκύανη χρώση							
<b>Καθαρότητα</b>								
Κατάλοιπα διαλυτών	<table border="0"> <tr> <td>Οξικός αιθυλεστέρας</td> <td rowspan="6">} 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνοι ή σε συνδυασμό</td> </tr> <tr> <td>Μεθανόλη</td> </tr> <tr> <td>Αιθανόλη</td> </tr> <tr> <td>Ακετόνη</td> </tr> <tr> <td>Εξάνιο</td> </tr> <tr> <td>Προπανάλη-2</td> </tr> </table>	Οξικός αιθυλεστέρας	} 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνοι ή σε συνδυασμό	Μεθανόλη	Αιθανόλη	Ακετόνη	Εξάνιο	Προπανάλη-2
Οξικός αιθυλεστέρας	} 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνοι ή σε συνδυασμό							
Μεθανόλη								
Αιθανόλη								
Ακετόνη								
Εξάνιο								
Προπανάλη-2								
	Διχλωρομεθάνιο: 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο							
Καψαϊκίνη	250 mg/kg κατ' ανώτατο όριο							
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο							
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο							
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο							
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο							

**E 160d ΛΥΚΟΠΕΝΙΟ****(i) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΥΚΟΠΕΝΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Λυκοπένιο από χημική σύνθεση
<b>Ορισμός</b>	Το συνθετικό λυκοπένιο είναι μείγμα γεωμετρικών ισομερών λυκοπενίων και παράγεται με συμπύκνωση Wittig των συνθετικών ενδιάμεσων προϊόντων που χρησιμοποιούνται συνήθως για την παραγωγή άλλων καροτενοειδών τα οποία χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα. Το συνθετικό λυκοπένιο αποτελείται κατά κύριο λόγο από όλο-trans-λυκοπένιο και 5-cis-λυκοπένιο καθώς και από άλλα ισομερή σε ήσσονες ποσότητες. Τα παρασκευάσματα λυκοπενίου του εμπορίου που προορίζονται για χρήση στα τρόφιμα μορφοποιούνται ως εναιωρήματα σε βρώσιμα έλαια ή ως σκόνη κολλοειδώς διαλυτή ή διαλυτή στο νερό.
Αριθ. CI	75125
Αριθ. EINECS	207-949-1
Χημική ονομασία	ψ,ψ-καροτένιο, όλο-trans-λυκοπένιο, (όλο-E)-λυκοπένιο, (όλο-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-οκταμεθυλο-τριανταδωδεκατριένιο-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30
Χημικός τύπος	C <sub>40</sub> H <sub>56</sub>
Μοριακό βάρος	536,85
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικά λυκοπένια τουλάχιστον 96 % (70 % τουλάχιστον σε όλο-trans-λυκοπένιο) Η E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> στα 465 - 475 nm σε εξάνιο (για 100 % καθαρό όλο-trans-λυκοπένιο) είναι 3 450.
<b>Περιγραφή</b>	Κόκκινη κρυσταλλική σκόνη

**▼ B**

<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματοφωτομετρία	Διάλυμα σε εξάνιο παρουσιάζει μέγιστο απορρόφησης στα 470 nm περίπου
Δοκιμή καρτενοειδών	Το διάλυμα του δείγματος σε ακετόνη αποχρωματίζεται ύστερα από διαδοχικές προσθήκες διαλύματος νιτρώδους νατρίου 5 % και θειικού οξέος 1N.
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο στο νερό, εύκολα διαλυτό σε χλωροφόρμιο.
Ιδιότητες του διαλύματος 1 % σε χλωροφόρμιο	Διαυγές με έντονο πορτοκαλοκόκκινο χρώμα
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (40 °C, 4 ώρες σε 20 mm Hg)
Απο-12'-λυκοπενάλη	0,15 % κατ' ανώτατο όριο
Οξείδιο της τριφαινυλοφωσφίνης	0,01 % κατ' ανώτατο όριο
Κατάλοιπα διαλυτών	Μεθανόλη: 200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Εξάνιο, προπανόλη-2: 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο έκαστο. Διχλωρομεθάνιο: 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (μόνο στα παρασκευάσματα του εμπορίου)
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**(ii) ΛΥΚΟΠΕΝΙΟ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΤΟΜΑΤΕΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	Φυσικό κίτρινο 27
<b>Ορισμός</b>	Το λυκοπένιο παράγεται με εκχύλιση κόκκινης τομάτας ( <i>Lycopersicon esculentum</i> L.) με διαλύτη, ακολουθούμενη από απομάκρυνση του διαλύτη. Μόνο οι κατωτέρω διαλύτες δύνανται να χρησιμοποιούνται: διοξείδιο του άνθρακα, οξικός αιθυλεστέρας, ακετόνη, προπανόλη-2, μεθανόλη, αιθανόλη και εξάνιο. Η μείζων χρωμοφόρος ομάδα της τομάτας είναι το λυκοπένιο, ενώ μπορεί να συνυπάρχουν ήσσονες ποσότητες άλλων καρτενοειδών χρωστικών. Εκτός από τις χρωστικές, το προϊόν μπορεί να περιέχει έλαιο, λίπη, κηρούς και αρτυματικές ουσίες που αποτελούν φυσικά συστατικά της τομάτας.
Αριθ. CI	75125
Αριθ. EINECS	207-949-1
Χημική ονομασία	Ψ,Ψ-καροτένιο, όλο-trans-λυκοπένιο, (όλο-E)-λυκοπένιο, (όλο-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-οκταμεθυλοτριανταδυοδεκατριένιο-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30
Χημικός τύπος	C <sub>40</sub> H <sub>56</sub>
Μοριακό βάρος	536,85
Δοκιμασία	E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 3 450 στα 465 - 475 nm σε εξάνιο (για 100 % καθαρό όλο-trans-λυκοπένιο) Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες 5 % τουλάχιστον
<b>Περιγραφή</b>	Βαθυκόκκινο παχύρρευστο υγρό
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματοφωτομετρία	Μέγιστο σε εξάνιο στα 472 nm περίπου



## ▼ B

<b>Καθαρότητα</b>	
Κατάλοιπα διαλυτών	Προπανόλη-2 Εξάνιο Ακετόνη Αιθανόλη Μεθανόλη Οξικός αιθυλεστέρας
	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνοι ή σε συνδυασμό
Θευκή τέφρα	1 % κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## (iii) ΛΥΚΟΠΕΝΙΟ ΑΠΟ BLAKESLEA TRISPORA

<b>Συνώνυμα</b>	Φυσικό κίτρινο 27
<b>Ορισμός</b>	Το λυκοπένιο από <i>Blakeslea trispora</i> λαμβάνεται με εκχύλιση από τη βιομάζα των μυκήτων, την οποία ακολουθεί καθαρισμός με κρυστάλλωση και διήθηση. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από όλο-trans-λυκοπένιο. Μπορεί να περιέχει και ήσσονες ποσότητες άλλων καροτενοειδών. Η προπανόλη-2 και ο οξικός ισοβουτυλεστέρας είναι οι μοναδικοί διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του. Τα παρασκευάσματα λυκοπενίου του εμπορίου που προορίζονται για χρήση στα τρόφιμα μορφοποιούνται ως εναιωρήματα σε βρώσιμα έλαια ή ως σκόνη κολλοειδώς διαλυτή ή διαλυτή στο νερό.
Αριθ. CI	75125
Αριθ. EINECS	207-949-1
Χημική ονομασία	Ψ,Ψ-καροτένιο, όλο-trans-λυκοπένιο, (όλο-E)-λυκοπένιο, (όλο-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-οκταμεθυλοτριανταδουδεκατριένιο-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30
Χημικός τύπος	C <sub>40</sub> H <sub>56</sub>
Μοριακό βάρος	536,85
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 % σε ολικά λυκοπένια και τουλάχιστον 90 % σε όλο-trans-λυκοπένιο επί των ολικών χρωστικών υλών E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 3 450 στα 465 - 475 nm σε εξάνιο (για 100 % καθαρό όλο-trans-λυκοπένιο)
<b>Περιγραφή</b>	Κόκκινη κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματοφωτομετρία	Διάλυμα σε εξάνιο παρουσιάζει μέγιστο απορρόφησης στα 470 nm περίπου
Δοκιμή καροτενοειδών	Το διάλυμα του δείγματος σε ακετόνη αποχρωματίζεται ύστερα από διαδοχικές προσθήκες διαλύματος νιτρώδους νατρίου 5 % και θειικού οξέος 1N.
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο στο νερό, εύκολα διαλυτό σε χλωροφόρμιο.
Ιδιότητες του διαλύματος 1 % σε χλωροφόρμιο	Διαυγές με έντονο πορτοκαλοκόκκινο χρώμα

**▼ B****Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (40 °C, 4 ώρες σε 20 mm Hg)
Άλλα καροτενοειδή	5 % κατ' ανώτατο όριο
Κατάλοιπα διαλυτών	Προπανόλη-2: 0,1 % κατ' ανώτατο όριο Οξικός ισοβουτυλεστέρας: 1,0 % κατ' ανώτατο όριο Διχλωρομεθάνιο: 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (μόνο στα παρασκευάσματα του εμπορίου)
Θευική τέφρα	0,3 % κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 160e Β-ΑΠΟ-8'-ΚΑΡΟΤΕΝΑΛΗ (C30)****Συνώνυμα**

Πορτοκαλί CI food 6

**Ορισμός**

Οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν για το όλο-trans ισομερές της β-απο-8'-καροτενάλης, που αποτελεί την επικρατέστερη μορφή της, συνοδευόμενο από μικρές ποσότητες άλλων καροτενοειδών. Από β-απο-8'-καροτενάλη που ανταποκρίνεται σ' αυτές τις προδιαγραφές παρασκευάζονται αραιωμένες και σταθεροποιημένες μορφές, που περιλαμβάνουν διαλύματα ή εναιωρήματα β-απο-8'-καροτενάλης σε βρώσιμα λίπη ή έλαια, γαλακτώματα και σκόνες που σχηματίζουν κολλοειδή υδατικά διαλύματα. Τα εν λόγω παρασκευάσματα μπορεί να περιέχουν τα cis και trans ισομερή σε διαφορετικές αναλογίες.

Αριθ. CI	40820
Αριθ. EINECS	214-171-6
Χημική ονομασία	β-Απο-8'-καροτενάλη, trans-β-Απο-8'-καροτεναλδεΐδη
Χημικός τύπος	C <sub>30</sub> H <sub>40</sub> O
Μοριακό βάρος	416,65
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 96 % E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 2 640 σε μήκος κύματος 460-462 nm σε κυκλοεξάνιο
<b>Περιγραφή</b>	Κρύσταλλοι με μεταλλική λάμψη ή κρυσταλλική σκόνη χρώματος σκοτεινού ιώδους

**Ταυτοποίηση**

Φασματομετρία Μέγιστο απορρόφησης σε κυκλοεξάνιο στα 460-462 nm

**Καθαρότητα**

Θευική τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	Καροτενοειδή εκτός από β-απο-8'-καροτενάλη: 3,0 % των ολικών χρωστικών υλών κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 161b ΛΟΥΤΕΪΝΗ****Συνώνυμα**

Μείγματα καροτενοειδών, ξανθοφύλλες

**Ορισμός**

Η λουτεΐνη λαμβάνεται με εκχύλιση με διαλύτες ποικιλιών βρώσιμων καρπών και φυτών, αγρωστωδών, τριφυλλιού (μηδικής) και *Tagetes erecta*. Η κύρια χρωμοφόρος ομάδα είναι τα καροτενοειδή, μεταξύ των οποίων η λουτεΐνη και οι εστέρες της με λιπαρά οξέα περιέχονται στη μεγαλύτερη αναλογία, ενώ σε διάφορες ποσότητες

**▼ B**

	<p>απαντούν καροτένια. Η λουτεΐνη ενδέχεται να περιέχει έλαια, λίπη και κηρούς που αποτελούν φυσικά συστατικά της φυτικής πρώτης ύλης.</p> <p>Μόνο οι κατωτέρω διαλύτες δύνανται να χρησιμοποιούνται για την εκχύλιση: μεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη-2, εξάνιο, ακετόνη, μεθυλαιθυλοκετόνη και διοξείδιο του άνθρακα.</p>							
Αριθ. CI								
Αριθ. EINECS	204-840-0							
Χημική ονομασία	3,3'-διυδροξυ-δ-καροτένιο							
Χημικός τύπος	C <sub>40</sub> H <sub>56</sub> O <sub>2</sub>							
Μοριακό βάρος	568,88							
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 4,0 %, υπολογιζόμενη ως λουτεΐνη							
<b>Περιγραφή</b>	Σκοτεινόχρωμο κιτρινοκάστανο υγρό							
<b>Τυποποίηση</b>								
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε μείγμα χλωροφορμίου/αιθανόλης (1:9) στα 445 nm περίπου							
<b>Καθαρότητα</b>								
Κατάλοιπα διαλυτών	<table border="0"> <tr> <td>Ακετόνη</td> <td rowspan="6">} 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνοι ή σε συνδυασμό</td> </tr> <tr> <td>Μεθυλαιθυλοκετόνη</td> </tr> <tr> <td>Μεθανόλη</td> </tr> <tr> <td>Αιθανόλη</td> </tr> <tr> <td>Προπανόλη-2</td> </tr> <tr> <td>Εξάνιο</td> </tr> </table>	Ακετόνη	} 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνοι ή σε συνδυασμό	Μεθυλαιθυλοκετόνη	Μεθανόλη	Αιθανόλη	Προπανόλη-2	Εξάνιο
Ακετόνη	} 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνοι ή σε συνδυασμό							
Μεθυλαιθυλοκετόνη								
Μεθανόλη								
Αιθανόλη								
Προπανόλη-2								
Εξάνιο								
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο							
Μόλυβδος	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο							
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο							
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο							

**E 161g ΚΑΝΘΑΞΑΝΘΙΝΗ****Συνώνυμα**

Πορτοκαλί CI food 8

**Ορισμός**

Οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν για τα όλο-trans ισομερή της κανθαξανθίνης, που αποτελούν την επικρατέστερη μορφή της, συνοδευόμενα από μικρές ποσότητες άλλων καροτενοειδών. Από κανθαξανθίνη που ανταποκρίνεται σ' αυτές τις προδιαγραφές παρασκευάζονται αραιωμένες και σταθεροποιημένες μορφές, που περιλαμβάνουν διαλύματα ή εναιωρήματα κανθαξανθίνης σε βρώσιμα λίπη ή έλαια, γαλακτώματα και σκόνες που σχηματίζουν κολλοειδή υδατικά διαλύματα. Τα εν λόγω παρασκευάσματα μπορεί να περιέχουν τα cis και trans ισομερή σε διαφορετικές αναλογίες.

Αριθ. CI

40850

## ▼ B

Αριθ. EINECS	208-187-2
Χημική ονομασία	β-καροτενοδιόνη-4,4', κανθαξανθίνη, 4,4'-διοξυ-β-καροτένιο
Χημικός τύπος	C <sub>40</sub> H <sub>52</sub> O <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	564,86
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 96 % (εκφραζόμενη ως κανθαξανθίνη)
	$E_{1\text{cm}}^{1\%} \ 2 \ 200 \left\{ \begin{array}{l} \text{σε μήκος κύματος περίπου} \\ \text{485 nm σε χλωροφόρμιο} \\ \\ \text{468-472 nm σε κυκλοεξάνιο} \\ \\ \text{464-467 nm σε πετρελαϊκό} \\ \text{αιθέρα} \end{array} \right.$
<b>Περιγραφή</b>	Κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη χρώματος βαθυιδώδους
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε χλωροφόρμιο στα 485 nm περίπου Μέγιστο απορρόφησης σε κυκλοεξάνιο στα 468-472 nm Μέγιστο απορρόφησης σε πετρελαϊκό αιθέρα στα 464-467 nm
<b>Καθαρότητα</b>	
Θεική τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	Καροτενοειδή εκτός από κανθαξανθίνη 5,0 % των ολικών χρωστικών υλών κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## E 162 ΕΡΥΘΡΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΤΩΝ ΤΕΥΤΛΩΝ, ΒΕΤΑΝΙΝΗ

<b>Συνώνυμα</b>	Ερυθρά χρωστική τεύτλων
<b>Ορισμός</b>	<p>Η ερυθρά χρωστική τεύτλων λαμβάνεται από τη ρίζα ποικιλιών των ερυθρών τεύτλων (<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>rubra</i>) ως καθαρός χυμός με έκθλιψη των τεύτλων ή με υδατική εκχύλιση τεμαχισμένων ριζών τεύτλων, ακολουθούμενη από εμπλουτισμό στη δραστική ουσία. Ο χρωματισμός συντίθεται από πολλές χρωστικές, που ανήκουν όλες στην ομάδα των βεταλαϊνών. Η κύρια χρωμοφόρος ομάδα είναι οι βετακυανίνες (κόκκινες), από τις οποίες η βετανίνη περιέχεται σε αναλογία 75-95 %, ενώ σε μικρές ποσότητες είναι δυνατόν να απαντούν η βεταξανθίνη (κίτρινη) και προϊόντα διάσπασης των βεταλαϊνών (ανοικτοκάστανα).</p> <p>Εκτός από τις χρωστικές, ο χυμός ή το εκχύλισμα περιέχει σάκχαρα, άλατα ή/και πρωτεΐνες που αποτελούν φυσικά συστατικά των ερυθρών τεύτλων. Το διάλυμα ενδέχεται να έχει συμπυκνωθεί και ορισμένα προϊόντα υποβάλλονται σε καθαρισμό για την απομάκρυνση του μεγαλύτερου μέρους των σακχάρων, αλάτων και πρωτεϊνών.</p>
Αριθ. CI	
Αριθ. EINECS	231-628-5
Χημική ονομασία	S-(R',R')-4-[2-[2-καρβοξυ-5(β-D-γλυκοκυρανοζυλοξυ)-2,3-διυδρο-6-υδροξυ-1H-ινδολ-1-υλ]αιθενυλο]-2,3-διυδρο-2,6-πυριδινό-δικαρβοξυλικό οξύ· 2-καρβοξυλικό 1-[2-(2,6-δικαρβοξυ-1,2,3,4-τετραϋδρο-4-πυριδουλιδεν)αιθυλιδεν]-5(β-D-γλυκοκυρανοζυλοξυ)-6-υδροξυ-ινδόλιο

**▼ B**

Χημικός τύπος	Βετανίνη: C <sub>24</sub> H <sub>26</sub> N <sub>2</sub> O <sub>13</sub>
Μοριακό βάρος	550,48
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ερυθρά χρωστική (εκφραζόμενη ως βετανίνη) τουλάχιστον 0,4 % E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 1 120 σε μήκος κύματος περίπου 535 nm σε υδατικό διάλυμα με pH 5
<b>Περιγραφή</b>	Υγρό, πάστα, σκόνη ή στερεό κόκκινου ή βαθυκόκκινου χρώματος
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε νερό με pH 5 στα 535 nm περίπου
<b>Καθαρότητα</b>	
Νιτρικά ιόντα	Κατ' ανώτατο όριο 2 g νιτρικών ανιόντων ανά g ερυθράς χρωστικής (όπως αυτή υπολογίζεται στη δοκιμασία)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 163 ANΘΟΚΥΑΝΙΝΕΣ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Οι ανθοκυανίνες λαμβάνονται με διαβροχή ή εκχύλιση με νερό εμπλουτισμένο με θειώδη ιόντα, οξινισμένο νερό, διοξειδίο του άνθρακα, μεθανόλη ή αιθανόλη, από ποικιλίες βρώσιμων οπωροκηπευτικών και στη συνέχεια συμπύκνωση και/ή καθαρισμό, εάν χρειάζεται. Το προϊόν που προκύπτει μπορεί να μετατραπεί σε σκόνη με βιομηχανική διεργασία ξήρανσης. Οι ανθοκυανίνες περιέχουν τα ίδια συστατικά με την πρώτη ύλη, συγκεκριμένα ανθοκυανίνη, οργανικά οξέα, ταννίνες, σάκχαρα, ανόργανα άλατα κ.λπ., αλλά όχι κατ' ανάγκη στις ίδιες αναλογίες. Η φυσική παρουσία αιθανόλης είναι πιθανή λόγω της διεργασίας διαβροχής. Η χρωμοφόρος ομάδα είναι η ανθοκυανίνη. Τα προϊόντα διατίθενται στην αγορά με βάση τη χρωστική ισχύ τους, όπως προσδιορίζεται με τη δοκιμασία. Η περιεκτικότητα σε χρωστική ύλη δεν εκφράζεται σε ποσοτικές μονάδες.

Αριθ. CI

Αριθ. EINECS

208-438-6 (κυανιδίνη), 205-125-6 (παιωνιδίνη), 208-437-0 (δελφινιδίνη), 211-403-8 (μαλβιδίνη), 205-127-7 (πελαργονιδίνη), 215-849-4 (πετουνιδίνη)

Χημική ονομασία

3,3',4',5',7-Πενταϋδροξυ-φλαβυλοχλωρίδιο (κυανιδίνη)  
 3,4',5',7-Τετραϋδροξυ-3'-μεθοξυ-φλαβυλοχλωρίδιο (παιωνιδίνη)  
 3,4',5',7-Τετραϋδροξυ-3',5'-διμεθοξυ-φλαβυλοχλωρίδιο (μαλβιδίνη)  
 3,5,7-Τριυδροξυ-2-(3,4,5-τριυδροξυ-φαινυλο)-1-βενζοπυρρολογλωρίδιο (δελφινιδίνη)  
 3,3',4',5',7-Πενταϋδροξυ-5'-μεθοξυ-φλαβυλοχλωρίδιο (πετουνιδίνη)  
 3,5,7-Τριυδροξυ-2-(4-υδροξυ-φαινυλο)-1-βενζοπυρρολογλωρίδιο (πελαργονιδίνη)

**▼ B**

Χημικός τύπος	Κυανιδίνη: C <sub>15</sub> H <sub>11</sub> O <sub>6</sub> Cl Παιωνιδίνη: C <sub>16</sub> H <sub>13</sub> O <sub>6</sub> Cl Μαλβιδίνη: C <sub>17</sub> H <sub>15</sub> O <sub>7</sub> Cl Δελφινιδίνη: C <sub>15</sub> H <sub>11</sub> O <sub>7</sub> Cl Πετουνιδίνη: C <sub>16</sub> H <sub>13</sub> O <sub>7</sub> Cl Πελαργονιδίνη: C <sub>15</sub> H <sub>11</sub> O <sub>5</sub> Cl
Μοριακό βάρος	Κυανιδίνη: 322,6 Παιωνιδίνη: 336,7 Μαλβιδίνη: 366,7 Δελφινιδίνη: 340,6 Πετουνιδίνη: 352,7 Πελαργονιδίνη: 306,7
Δοκιμασία	E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> 300 για την καθαρή χρωστική σε μήκος κύματος 515-535 nm σε pH 3,0
<b>Περιγραφή</b>	Υγρό, σκόνη ή πάστα πορφυροκόκκινου χρώματος με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε μεθανόλη με πυκνό HCl σε αναλογία 0,01 % στα Κυανιδίνη: 535 nm Παιωνιδίνη: 532 nm Μαλβιδίνη: 542 nm Δελφινιδίνη: 546 nm Πετουνιδίνη: 543 nm Πελαργονιδίνη: 530 nm
<b>Καθαρότητα</b>	
Κατάλοιπα διαλυτών	Μεθανόλη 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Αιθανόλη 200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Διοξειδίο του θείου	Κατ' ανώτατο όριο 1 000 mg/kg ανά εκατοστιαία μονάδα χρωστικής
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργίλιου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**E 170 ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Λευκό CI Pigment 18· κιμωλία
<b>Ορισμός</b>	Το ανθρακικό ασβέστιο είναι το προϊόν που λαμβάνεται από κονιοποιημένο ασβεστόλιθο ή με καταβύθιση ιόντων ασβεστίου με ανθρακικά ιόντα.
Αριθ. CI	77220
Αριθ. EINECS	Ανθρακικό ασβέστιο: 207-439-9 Ασβεστόλιθος: 215-279-6
Χημική ονομασία	Ανθρακικό ασβέστιο
Χημικός τύπος	CaCO <sub>3</sub>

**▼ B**

Μοριακό βάρος	100,1
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή κρυσταλλική ή άμορφη σκόνη, άοσμη και άγευστη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Πρακτικά αδιάλυτο στο νερό και στην αλκοόλη. Διαλύεται με αναβρασμό σε αραιό οξικό οξύ, αραιό υδροχλωρικό οξύ και αραιό νιτρικό οξύ, τα δε προκύπτοντα διαλύματα παρέχουν, μετά από βρασμό, θετικά αποτελέσματα στις αναλύσεις ασβεστίου.
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	2,0 % κατ' ανώτατο όριο (200 °C, 4 ώρες)
Αδιάλυτες σε οξέα ουσίες	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Άλατα μαγνησίου και αλκαλίων	1 % κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αντιμόνιο (στοιχειακό)	} 100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μόνοι ή σε συνδυασμό
Χαλκός (στοιχειακός)	
Χρόμιο (στοιχειακό)	
Ψευδάργυρος (στοιχειακός)	
Βάριο (στοιχειακό)	
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 171 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	Λευκό CI Pigment 6
<b>Ορισμός</b>	<p>Το διοξείδιο του τιτανίου συνίσταται κυρίως από καθαρό διοξείδιο του τιτανίου με την κρυσταλλική μορφή του ανατασίου και/ή του ρουτιλίου, το οποίο μπορεί να έχει επιστρωθεί με μικρές ποσότητες αλουμίνας και/ή διοξειδίου του πυριτίου για τη βελτίωση των τεχνικών ιδιοτήτων του προϊόντος.</p> <p>Οι ποιότητες ανατασίου του χρωστικού διοξειδίου του τιτανίου είναι δυνατόν να επιτευχθούν μόνο με τη διεργασία θειικού άλατος, η οποία δημιουργεί ως παραπροϊόν μεγάλη ποσότητα θειικού οξέος. Οι ποιότητες ρουτιλίου του διοξειδίου του τιτανίου επιτυγχάνονται συνήθως με τη μέθοδο χλωριούχου άλατος.</p> <p>Ορισμένες ποιότητες ρουτιλίου του διοξειδίου του τιτανίου παράγονται με τη χρήση μαρμαρυγία (γνωστού και ως μεικτό πυριτικό άλας καλίου-αργιλίου) ως προτύπου για τον σχηματισμό της βασικής φολιδωτής δομής. Η επιφάνεια του μαρμαρυγία υποβάλλεται σε ειδική, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, διεργασία με την οποία επικαλύπτεται με διοξείδιο του τιτανίου.</p> <p>Η φολιδωτή μορφή ρουτιλίου του διοξειδίου του τιτανίου παρασκευάζεται με την υποβολή του μαργαριτώδους πιγμέντου από μαρμαρυγία που έχει επικαλυφθεί με διοξείδιο του τιτανίου (ρουτίλιο) σε εκχυλιστική διάλυση σε οξύ και στη συνέχεια σε εκχυλιστική διάλυση σε άλκαλι. Κατά τη διάρκεια της διεργασίας αυτής απομακρύνεται το σύνολο του μαρμαρυγία και το προϊόν της είναι η φολιδωτή μορφή ρουτιλίου του διοξειδίου του τιτανίου.</p>
Αριθ. CI	77891
Αριθ. EINECS	236-675-5

**▼ B**

Χημική ονομασία	Διοξείδιο του τιτανίου
Χημικός τύπος	TiO <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	79,88
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ουσίας απαλλαγμένης από αλουμίνα και διοξείδιο του πυριτίου
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή έως ελαφρά χρωματισμένη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο στο νερό και στους οργανικούς διαλύτες. Διαλύεται αργά σε υδροφθορικό οξύ και σε θερμό πυκνό θειικό οξύ.
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 3 ώρες)
Απώλεια κατά την καύση	1,0 % κατ' ανώτατο όριο επί ουσίας απαλλαγμένης από πτητικές ύλες (800 °C)
Οξείδιο του αργιλίου και/ή διοξείδιο του πυριτίου	Συνολικά 2,0 % κατ' ανώτατο όριο
Ύλες διαλυτές σε HCl 0,5 N	0,5 % κατ' ανώτατο όριο επί ουσίας απαλλαγμένης από αλουμίνα και διοξείδιο του πυριτίου και, επιπλέον, για προϊόντα που περιέχουν αλουμίνα και/ή διοξείδιο του πυριτίου 1,5 % κατ' ανώτατο όριο επί του προϊόντος όπως διατίθεται στην αγορά.
Υδατοδιαλυτές ύλες	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο μετά από εκχύλιση με HCl 0,5 N.
Αντιμόνιο	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο μετά από εκχύλιση με HCl 0,5 N.
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο μετά από εκχύλιση με HCl 0,5 N.
Μόλυβδος	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο μετά από εκχύλιση με HCl 0,5 N.
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο μετά από εκχύλιση με HCl 0,5 N.

**E 172 ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	Κίτρινο του οξειδίου του σιδήρου: Κίτρινο CI Pigment 42 και 43  Κόκκινο του οξειδίου του σιδήρου: Κόκκινο CI Pigment 101 και 102  Μαύρο του οξειδίου του σιδήρου: Μαύρο CI Pigment 11
<b>Ορισμός</b>	Τα οξείδια του σιδήρου και τα υδροξείδια του σιδήρου παρασκευάζονται συνθετικά και συνίστανται κυρίως από άνυδρα και/ή ένυδρα οξείδια του σιδήρου. Η κλίμακα των αποχρώσεων περιλαμβάνει αποχρώσεις του κίτρινου, του κόκκινου, του καστανού και του μαύρου. Τα οξείδια του σιδήρου καθαρότητας κατάλληλης για τρόφιμα διακρίνονται από τις αντίστοιχες ενώσεις τεχνικής καθαρότητας κατά πρώτο λόγο των συγκριτικά χαμηλών επιπέδων των προσμίξεων άλλων μετάλλων. Αυτό επιτυγχάνεται με επιλογή και έλεγχο της πηγής σιδήρου και/ή με το βαθμό χημικού καθαρισμού κατά την παραγωγική διεργασία.
Αριθ. CI	Κίτρινο του οξειδίου του σιδήρου: 77492  Κόκκινο του οξειδίου του σιδήρου: 77491  Μαύρο του οξειδίου του σιδήρου: 77499



**▼ B**

Αριθ. EINECS	Κίτρινο του οξειδίου του σιδήρου: 257-098-5 Κόκκινο του οξειδίου του σιδήρου: 215-168-2 Μαύρο του οξειδίου του σιδήρου: 235-442-5
Χημική ονομασία	Κίτρινο του οξειδίου του σιδήρου: Ένυδρο τριοξείδιο του σιδήρου, ένυδρο οξείδιο του σιδήρου (III) Κόκκινο του οξειδίου του σιδήρου: Άνυδρο τριοξείδιο του σιδήρου, άνυδρο οξείδιο του σιδήρου (III) Μαύρο του οξειδίου του σιδήρου: Μείγμα οξειδίου και τριοξειδίου του σιδήρου, οξείδιο του σιδήρου (II, III)
Χημικός τύπος	Κίτρινο του οξειδίου του σιδήρου: $\text{FeO(OH)} \cdot \text{H}_2\text{O}$ Κόκκινο του οξειδίου του σιδήρου: $\text{Fe}_2\text{O}_3$ Μαύρο του οξειδίου του σιδήρου: $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$
Μοριακό βάρος	88,85: $\text{FeO(OH)}$ 159,70: $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 231,55: $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα του κίτρινου του οξειδίου του σιδήρου σε ολικό σίδηρο τουλάχιστον 60 %, του κόκκινου και του μαύρου τουλάχιστον 68 %, εκφραζόμενη ως σίδηρος
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη χρώματος κίτρινου, κόκκινου, καστανού ή μαύρου σε διάφορες αποχρώσεις
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτα στο νερό και στους οργανικούς διαλύτες. Διαλυτά σε πυκνά ανόργανα οξέα
<b>Καθαρότητα</b>	
Υδατοδιαλυτές ύλες	1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Χρώμιο	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Χαλκός	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Νικέλιο	200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Ψευδάργυρος	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

μετά από πλήρη διάλυση

**E 173 ΑΡΓΙΛΙΟ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)****Συνώνυμα**

Μεταλλικό χρώμα CI Pigment Metal

**Ορισμός**

Η σκόνη αργιλίου συνίσταται από λεπτομερισμένα σωματίδια αργιλίου. Η λειοτριβήση μπορεί να γίνει παρουσία ή όχι βρώσιμων φυτικών ελαίων και/ή λιπαρών οξέων ποιότητας προσθέτων των τροφίμων. Το προϊόν είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άλλη πρόσμιξη πλην των βρώσιμων φυτικών ελαίων και/ή των λιπαρών οξέων ποιότητας προσθέτων των τροφίμων.

**▼ B**

Αριθ. CI	77000
Αριθ. EINECS	231-072-3
Χημική ονομασία	Αργίλιο
Χημικός τύπος	Al
Ατομικό βάρος	26,98
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 %, υπολογιζόμενη ως Al επί ουσίας απαλλαγμένης από έλαια
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή φυλλίδια χρώματος στιλπνού γκρι
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο στο νερό και στους οργανικούς διαλύτες. Διαλυτό σε αραιό υδροχλωρικό οξύ.
Δοκιμή αργιλίου	Θετική δοκιμή με διάλυμα δείγματος σε αραιό υδροχλωρικό οξύ
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C μέχρι σταθερού βάρους)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 174 ΑΡΓΥΡΟΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	Argentum
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. CI	77820
Αριθ. EINECS	231-131-3
Χημική ονομασία	Άργυρος
Χημικός τύπος	Ag
Ατομικό βάρος	107,87
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε Ag τουλάχιστον 99,5 %
<b>Περιγραφή</b>	Αργυρόχρωμη σκόνη ή αργυρόχρωμα φυλλίδια
<b>Ταυτοποίηση</b>	
<b>Καθαρότητα</b>	

**E 175 ΧΡΥΣΟΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	Μεταλλικό χρώμα 3· Aurum
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. CI	77480
Αριθ. EINECS	231-165-9
Χημική ονομασία	Χρυσός

**▼ B**

Χημικός τύπος	Au
Ατομικό βάρος	197,0
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε Au τουλάχιστον 90 %
<b>Περιγραφή</b>	Χρυσόχρωμη σκόνη ή χρυσόχρωμα φυλλίδια
<b>Ταυτοποίηση</b>	
<b>Καθαρότητα</b>	
Άργυρος	7 % κατ' ανώτατο όριο
Χαλκός	4 % κατ' ανώτατο όριο

} μετά από πλήρη διάλυση

**E 180 ΛΙΘΟΡΟΥΜΠΙΝΗ ΒΚ**

<b>Συνώνυμα</b>	Κόκκινο CI Pigment 57· rubinpigment· καρμίνη 6B
<b>Ορισμός</b>	Η λιθορουμπίνη ΒΚ συνίσταται κυρίως από 3-υδροξυ-4-(4-μεθυλο-2-σουλφοφαινυλαζω)-2-ναφθαλινο-καρβοξυλικό ασβέστιο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, μαζί με νερό και χλωριούχο και/ή θειικό ασβέστιο ως τα κύρια άχρωμα συστατικά.
Αριθ. CI	15850:1
Αριθ. EINECS	226-109-5
Χημική ονομασία	3-υδροξυ-4-(4-μεθυλο-2-σουλφοφαινυλαζω)-2-ναφθαλινο-καρβοξυλικό ασβέστιο
Χημικός τύπος	$C_{18}H_{12}CaN_2O_6S$
Μοριακό βάρος	424,45
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες 90 % τουλάχιστον $E_{1cm}^{1\%}$ 200 σε μήκος κύματος περίπου 442 nm σε διμεθυλοφορμαμίδιο
<b>Περιγραφή</b>	Κόκκινη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε διμεθυλοφορμαμίδιο στα 442 nm περίπου
<b>Καθαρότητα</b>	
Βοηθητικές χρωστικές ύλες	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών:	
2-αμινο-5-μεθυλο-βενζολοσουλφονικό ασβέστιο	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
3-υδροξυ-2-ναφθαλινο-καρβοξυλικό ασβέστιο	0,4 % κατ' ανώτατο όριο
Μη σουλφονωμένες πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες	0,01 % κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενες σε ανιλίνη)

**▼ B**

Ύλες εκχυλίσμας με αιθέρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο από διάλυμα με pH 7
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκκες αργιλίου αυτής της χρωστικής ύλης.*

**E 200 ΣΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	203-768-7
Χημική ονομασία	Σορβικό οξύ, trans, trans-2,4-Εξαδιενικό οξύ
Χημικός τύπος	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	112,12
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί άνυδρης ουσίας

**Περιγραφή**

Άχρωμες βελόνες ή λευκή ρέουσα σκόνη, με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή, της οποίας το χρώμα δεν μεταβάλλεται μετά από θέρμανση στους 105 °C επί 90 λεπτά

**Ταυτοποίηση**

Πεδίο τιμών σημείου τήξης	133 °C έως 135 °C μετά από ξήρανση υπό κενό επί 4 ώρες σε ξηραντήρα θειικού οξέος
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης διαλύματος σορβικού οξέος σε προπανόλη-2 (1:4 000 000) σε μήκος κύματος 254 ± 2 nm
Δοκιμή ανίχνευσης διπλών δεσμών	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Λίγο διαλυτό στο νερό, αδιάλυτο στην αιθανόλη.

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Θειική τέφρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Αλδεΐδες	0,1 % κατ' ανώτατο όριο, εκφραζόμενο σε φορμαλδεΐδη
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ B**E 202 ΣΟΡΒΙΚΟ ΚΑΛΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	246-376-1
Χημική ονομασία	Σορβικό κάλιο· (E, E)-2,4,-εξαδιενικό κάλιο· άλας με κάλιο του trans, trans-2,4-εξαδιενικού οξέος
Χημικός τύπος	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> O <sub>2</sub> K
Μοριακό βάρος	150,22
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ξηράς ουσίας

**Περιγραφή**

Λευκή κρυσταλλική σκόνη, της οποίας το χρώμα δεν μεταβάλλεται μετά από θέρμανση στους 105 °C επί 90 λεπτά

**Ταυτοποίηση**

Πεδίο τιμών σημείου τήξης του σορβικού οξέος	Πεδίο τιμών σημείου τήξης του σορβικού οξέος, το οποίο απομονώνεται με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 133 °C έως 135 °C μετά από ξήρανση υπό κενό σε ξηραντήρα θειικού οξέος
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ανίχνευσης διπλών δεσμών	Δοκιμή θετική

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	1,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 3 ώρες)
Οξύτητα ή αλκαλικότητα	1,0 % περίπου κατ' ανώτατο όριο (ως σορβικό οξύ ή K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )
Αλδεύδες	0,1 % κατ' ανώτατο όριο, εκφραζόμενο σε φορμαλδεύδη
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ M25▼ B**E 210 ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΟΞΥ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	200-618-2
Χημική ονομασία	Βενζοϊκό οξύ· βενζολοκαρβοξυλικό οξύ· φαινυλοκαρβοξυλικό οξύ
Χημικός τύπος	C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	122,12
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5 % επί άνυδρης ουσίας

## ▼ B

<b>Περιγραφή</b>	Λευκή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	121,5 °C -123,5 °C
Δοκιμή εξάχνωσης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή βενζοϊκών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	Περίπου 4 (υδατικό διάλυμα)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (3 ώρες, υπεράνω θειικού οξέος)
Θεική τέφρα	0,05 % κατ' ανώτατο όριο
Χλωριούχες οργανικές ενώσεις	0,07 %, κατ' ανώτατο όριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,3 % ως χλωροβενζοϊκό οξύ
Εύκολα οξειδούμενες ουσίες	Προστίθενται 1,5 ml θειικού οξέος σε 100 ml νερού, το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού και προστίθενται σταγόνες διαλύματος $\text{KMnO}_4$ 0,1 N, μέχρις ότου το ροζ χρώμα διατηρείται επί 30 δευτερόλεπτα. Στο θερμό διάλυμα διαλύεται 1 g δείγματος, ζυγισμένο με ακρίβεια mg, και ακολουθεί ογκομέτρηση με διάλυμα $\text{KMnO}_4$ 0,1 N μέχρι να εμφανιστεί ροζ χρώμα που να διατηρείται επί 15 δευτερόλεπτα. Δεν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσότερα από 0,5 ml
Ουσίες που απανθρακώνονται εύκολα	Το ψυχρό διάλυμα 0,5 g βενζοϊκού οξέος σε 5 ml θειικού οξέος πυκνότητας 94,5 έως 95,5 % δεν πρέπει να χρωματίζεται εντονότερα από ένα υγρό αναφοράς που περιέχει 0,2 ml χλωριούχου κοβαλτίου TSC <sup>(1)</sup> , 0,3 ml τριχλωριούχου σιδήρου TSC <sup>(2)</sup> , 0,1 ml θειικού χαλκού TSC <sup>(3)</sup> και 4,4 ml νερού
Πολυκυκλικά οξέα	Το πρώτο ίζημα που σχηματίζεται με κλασματική οξίνιση εξουδετερωμένου διαλύματος βενζοϊκού οξέος, δεν πρέπει να έχει διαφορετικό σημείο τήξης από του βενζοϊκού οξέος
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

<sup>(1)</sup> Χλωριούχο κοβάλτιο TSC: Διαλύονται 65 gr περίπου χλωριούχου κοβαλτίου  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  σε κατάλληλη ποσότητα μείγματος 25 ml υδροχλωρικού οξέος και 975 ml νερού, ώστε να ληφθεί συνολικός όγκος 1 000 ml. Φέρονται 5 ml ακριβώς από αυτό το διάλυμα σε σφαιρική φιάλη που περιέχει 250 ml διαλύματος ιωδίου, προστίθενται 5 ml υπεροξειδίου του υδρογόνου 3 % και κατόπιν 15 ml διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 20 %. Το σύνολο ζέεται επί 10 λεπτά, αφήνεται να ψυχθεί και προστίθενται 2 g ιωδιούχου καλίου και 20 ml θειικού οξέος 25 %. Έπειτα από πλήρη διάλυση του ιζήματος, το ιώδιο που ελευθερώνεται τιτλοδοτείται με θειοθειικό νάτριο (0,1 N) παρουσία αμύλου TS. Ένα ml θειοθειικού νατρίου (0,1 N) αντιστοιχεί σε 23,80 mg  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ . Ο τελικός όγκος του διαλύματος διορθώνεται με την προσθήκη κατάλληλης ποσότητας από το μείγμα υδροχλωρικού οξέος και νερού, για να ληφθεί διάλυμα με συγκέντρωση 59,5 mg  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  ανά ml.

<sup>(2)</sup> Τριχλωριούχος σίδηρος TSC: Διαλύονται 55 gr περίπου τριχλωριούχου σιδήρου σε κατάλληλη ποσότητα μείγματος 25 ml υδροχλωρικού οξέος και 975 ml νερού, ώστε να ληφθεί συνολικός όγκος 1 000 ml. Φέρονται 10,0 ml από αυτό το διάλυμα σε σφαιρική φιάλη που περιέχει 250 ml διαλύματος ιωδίου, προστίθενται 15 ml νερού και 3 g ιωδιούχου καλίου και το μείγμα αφήνεται σε ηρεμία επί 15 λεπτά. Αραιώνεται σε 100 ml νερού και κατόπιν το ιώδιο που ελευθερώνεται τιτλοδοτείται με θειοθειικό νάτριο (0,1 N) παρουσία αμύλου TS. Ένα ml θειοθειικού νατρίου (0,1 N) αντιστοιχεί σε 27,03 mg  $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ . Ο τελικός όγκος του διαλύματος διορθώνεται με την προσθήκη κατάλληλης ποσότητας από το μείγμα υδροχλωρικού οξέος και νερού, για να ληφθεί διάλυμα με συγκέντρωση 45,0 mg  $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  ανά ml.

<sup>(3)</sup> Θεϊκός χαλκός TSC: Διαλύονται 65 gr περίπου θειικού χαλκού  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  σε κατάλληλη ποσότητα μείγματος 25 ml υδροχλωρικού οξέος και 975 ml νερού ώστε να ληφθεί συνολικός όγκος 1 000 ml. Φέρονται 10 ml από αυτό το διάλυμα σε σφαιρική φιάλη που περιέχει 250 ml διαλύματος ιωδίου, προστίθενται 40 ml νερού, 4 ml οξικού οξέος και 3 g ιωδιούχου καλίου. Το ιώδιο που ελευθερώνεται τιτλοδοτείται με θειοθειικό νάτριο (0,1 N) παρουσία αμύλου TS (\*). Ένα ml θειοθειικού νατρίου (0,1 N) αντιστοιχεί σε 24,97 mg  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ . Ο τελικός όγκος του διαλύματος διορθώνεται με την προσθήκη κατάλληλης ποσότητας από το μείγμα υδροχλωρικού οξέος και νερού, για να ληφθεί διάλυμα με συγκέντρωση 62,4 mg  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  ανά ml.

(\*) Άμυλο TS: Λειοτριβούνται 0,5 g αμύλου (άμυλο πατάτας, αραβοσίτου ή διαλυτό άμυλο) και αναμειγνύονται με 5 ml νερού. Στον λαμβανόμενο πολτό προστίθεται με συνεχή ανάδευση η κατάλληλη ποσότητα νερού, για να ληφθεί συνολικός όγκος 100 ml. Το σύνολο ζέεται επί μερικά λεπτά, αφήνεται να ψυχθεί και διηθείται. Το άμυλο πρέπει να είναι πρόσφατης παρασκευής.

▼ B**E 211 BENZOΪΚΟ ΝΑΤΡΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	208-534-8
Χημική ονομασία	Βενζοϊκό νάτριο· άλας με νάτριο του βενζολοκαρβοξυλικού οξέος· άλας με νάτριο του φαινυλοκαρβοξυλικού οξέος
Χημικός τύπος	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> O <sub>2</sub> Na
Μοριακό βάρος	144,11
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> O <sub>2</sub> Na τουλάχιστον 99 % μετά από ξήρανση στους 105 °C επί 4 ώρες

**Περιγραφή**

Λευκό, σχεδόν άοσμο, κρυσταλλικό στερεό σε σκόνη ή κόκκους

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό, μέτρια διαλυτό σε αιθανόλη
Πεδίο τιμών σημείου τήξης του βενζοϊκού οξέος	Πεδίο τιμών σημείου τήξης του βενζοϊκού οξέος που απομονώνεται με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 121,5 °C έως 123,5 °C μετά από ξήρανση σε ξηραντήρα θεικού οξέος
Δοκιμή βενζοϊκών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική

**Καθαρότητα**

Απόλεια κατά την ξήρανση	1,5 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)
Εύκολα οξειδούμενες ουσίες	Προστίθενται 1,5 ml θεικού οξέος σε 100 ml νερού, το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού και προστίθενται σταγόνες διαλύματος KMnO <sub>4</sub> 0,1 N, μέχρις ότου το ροζ χρώμα διατηρείται επί 30 δευτερόλεπτα. Στο θερμό διάλυμα διαλύεται 1 g δείγματος, ζυγισμένο με ακρίβεια mg, και ακολουθεί ογκομέτρηση με διάλυμα KMnO <sub>4</sub> 0,1 N μέχρι να εμφανιστεί ροζ χρώμα που να διατηρείται επί 15 δευτερόλεπτα. Δεν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσότερα από 0,5 ml
Πολυκυκλικά οξέα	Το πρώτο ίζημα που σχηματίζεται με κλασματική οξίνιση εξουδετερωμένου διαλύματος βενζοϊκού νατρίου, δεν πρέπει να έχει διαφορετικό σημείο τήξης από του βενζοϊκού οξέος
Χλωριούχες οργανικές ενώσεις	0,06 % κατ' ανώτατο όριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,25 % ως χλωροβενζοϊκό οξύ
Οξύτητα ή αλκαλικότητα	Για την εξουδετέρωση 1 g βενζοϊκού νατρίου παρουσία φαινολοφθαλείνης, δεν πρέπει να απαιτούνται περισσότερα από 0,25 ml διαλύματος NaOH 0,1 N ή HCl 0,1 N
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 212 BENZOΪΚΟ ΚΑΛΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	209-481-3
Χημική ονομασία	Βενζοϊκό κάλιο· άλας με κάλιο του βενζολοκαρβοξυλικού οξέος· άλας με κάλιο του φαινυλοκαρβοξυλικού οξέος

▼ B

Χημικός τύπος	$C_7H_5KO_2 \cdot 3H_2O$
Μοριακό βάρος	214,27
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε $C_7H_5KO_2$ τουλάχιστον 99 % μετά από ξήρανση στους 105 °C μέχρι σταθερού βάρους
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Πεδίο τιμών σημείου τήξης του βενζοϊκού οξέος	Πεδίο τιμών σημείου τήξης του βενζοϊκού οξέος που απομονώνεται με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 121,5 °C έως 123,5 °C μετά από ξήρανση υπό κενό σε ξηραντήρα θειικού οξέος
Δοκιμή βενζοϊκών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	26,5 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)
Χλωριούχες οργανικές ενώσεις	0,06 % κατ' ανώτατο όριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,25 % ως χλωροβενζοϊκό οξύ
Εύκολα οξειδούμενες ουσίες	Προστίθενται 1,5 ml θειικού οξέος σε 100 ml νερού, το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού και προστίθενται σταγόνες διαλύματος $KMnO_4$ 0,1 N, μέχρις ότου το ροζ χρώμα διατηρείται επί 30 δευτερόλεπτα. Στο θερμό διάλυμα διαλύεται 1 g δείγματος, ζυγισμένο με ακρίβεια mg, και ακολουθεί ογκομέτρηση με διάλυμα $KMnO_4$ 0,1 N μέχρι να εμφανιστεί ροζ χρώμα που να διατηρείται επί 15 δευτερόλεπτα. Δεν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσότερα από 0,5 ml
Ουσίες που απανθρακώνονται εύκολα	Το ψυχρό διάλυμα 0,5 g βενζοϊκού οξέος σε 5 ml θειικού οξέος πυκνότητας 94,5-95,5 % δεν πρέπει να χρωματίζεται εντονότερα από ένα υγρό αναφοράς που περιέχει 0,2 ml χλωριούχου κοβαλτίου TSC, 0,3 ml τριχλωριούχου σιδήρου TSC, 0,1 ml θειικού χαλκού TSC και 4,4 ml νερού
Πολυκυκλικά οξέα	Το πρώτο ίζημα που σχηματίζεται με κλασματική οξίνιση εξουδετερωμένου διαλύματος βενζοϊκού καλίου, δεν πρέπει να έχει διαφορετικό σημείο τήξης από του βενζοϊκού οξέος
Οξύτητα ή αλκαλικότητα	Για την εξουδετέρωση 1 g βενζοϊκού καλίου παρουσία φαινολοφθαλεΐνης, δεν πρέπει να απαιτούνται περισσότερα από 0,25 ml διαλύματος NaOH 0,1 N ή HCl 0,1 N
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 213 ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Βενζοϊκό άλας ασβεστίου
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	218-235-4
Χημική ονομασία	Βενζοϊκό ασβέστιο· διβενζοϊκό ασβέστιο
Χημικός τύπος	Άνυδρο: $C_{14}H_{10}O_4Ca$ Μονοένυδρο: $C_{14}H_{10}O_4Ca \cdot H_2O$ Τριένυδρο: $C_{14}H_{10}O_4Ca \cdot 3H_2O$



**▼ B**

Μοριακό βάρος	Άνυδρο: 282,31 Μονοένυδρο: 300,32 Τριένυδρο: 336,36
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % μετά από ξήρανση στους 105 °C
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί ή άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Πεδίο τιμών σημείου τήξης του βενζοϊκού οξέος	Πεδίο τιμών σημείου τήξης του βενζοϊκού οξέος που απομονώνεται με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 121,5 °C έως 123,5 °C μετά από ξήρανση υπό κενό σε ξηραντήρα θειικού οξέος
Δοκιμή βενζοϊκών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	17,5 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C μέχρι σταθερού βάρους)
Ύγλες αδιάλυτες στο νερό	0,3 % κατ' ανώτατο όριο
Χλωριούχες οργανικές ενώσεις	0,06 % κατ' ανώτατο όριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,25 % ως χλωροβενζοϊκό οξύ
Εύκολα οξειδούμενες ουσίες	Προστίθενται 1,5 ml θειικού οξέος σε 100 ml νερού, το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού και προστίθενται σταγόνες διαλύματος $\text{KMnO}_4$ 0,1 N, μέχρις ότου το ροζ χρώμα διατηρείται επί 30 δευτερόλεπτα. Στο θερμό διάλυμα διαλύεται 1 g δείγματος, ζυγισμένο με ακρίβεια mg, και ακολουθεί ογκομέτρηση με διάλυμα $\text{KMnO}_4$ 0,1 N μέχρι να εμφανιστεί ροζ χρώμα που να διατηρείται επί 15 δευτερόλεπτα. Δεν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσότερα από 0,5 ml
Ουσίες που απανθρακώνονται εύκολα	Το ψυχρό διάλυμα 0,5 g βενζοϊκού οξέος σε 5 ml θειικού οξέος πυκνότητας 94,5-95,5 %, δεν πρέπει να χρωματίζεται εντονότερα από ένα υγρό αναφοράς που περιέχει 0,2 ml χλωριούχου κοβαλτίου TSC, 0,3 ml τριχλωριούχου σιδήρου TSC, 0,1 ml θειικού χαλκού TSC και 4,4 ml νερού
Πολυκυκλικά οξέα	Το πρώτο ίζημα που σχηματίζεται με κλασματική οξίνιση εξουδετερωμένου διαλύματος βενζοϊκού ασβεστίου, δεν πρέπει να έχει διαφορετικό σημείο τήξης από του βενζοϊκού οξέος
Οξύτητα ή αλκαλικότητα	Για την εξουδετέρωση 1 g βενζοϊκού ασβεστίου παρουσία φαινολοφθαλεΐνης, δεν πρέπει να απαιτούνται περισσότερα από 0,25 ml διαλύματος NaOH 0,1 N ή HCl 0,1 N
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 214 p-ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	Ethylparaben· p-οξυβενζοϊκό αιθύλιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	204-399-4
Χημική ονομασία	p-Υδροξυβενζοϊκό αιθύλιο· p-υδροξυβενζοϊκός αιθυλεστεράς

**▼ B**

Χημικός τύπος	$C_9H_{10}O_3$
Μοριακό βάρος	166,8
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5 % μετά από ξήρανση στους 80 °C επί 2 ώρες
<b>Περιγραφή</b>	Σχεδόν άοσμοι, μικροί άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	115 °C - 118 °C
Δοκιμή p-υδροξυβενζοϊκών ιόντων	Πεδίο τιμών σημείου τήξης του p-υδροξυβενζοϊκού οξέος που απομονώνεται με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 213 °C έως 217 °C μετά από ξήρανση υπό κενό σε ξηραντήρα θειικού οξέος
Δοκιμή αλκοόλης	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (80 °C, 2 ώρες)
Θειική τέφρα	0,05 % κατ' ανώτατο όριο
p-Υδροξυβενζοϊκό οξύ και σαλικυλικό οξύ	0,35 % κατ' ανώτατο όριο, εκφρασμένη σε p-υδροξυβενζοϊκό οξύ
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 215 Ρ-ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, ΑΛΑΣ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	252-487-6
Χημική ονομασία	Άλας του p-υδροξυβενζοϊκού αιθυλίου με νάτριο· νατριούχος ένωση του p-υδροξυβενζοϊκού αιθυλεστέρα
Χημικός τύπος	$C_9H_9O_3Na$
Μοριακό βάρος	188,8
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε p-υδροξυβενζοϊκό αιθυλεστέρα τουλάχιστον 83 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή κρυσταλλική υγροσκοπική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	115 °C έως 118 °C, μετά από ξήρανση υπό κενό σε ξηραντήρα θειικού οξέος
Δοκιμή p-υδροξυβενζοϊκών ιόντων	Πεδίο τιμών σημείου τήξης του p-υδροξυβενζοϊκού οξέος που παρέχει το δείγμα, 213 °C έως 217 °C
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
pH	9,9 – 10,3 (υδατικό διάλυμα 0,1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	5 % κατ' ανώτατο όριο (ξηρανση υπό κενό σε ξηραντήρα θειικού οξέος)
Θειική τέφρα	37 έως 39 %

**▼ B**

p-Υδροξυβενζοϊκό οξύ και σαλικυλικό οξύ	0,35 % κατ' ανώτατο όριο, εκφρασμένη σε p-υδροξυβενζοϊκό οξύ
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 218 p-ΥΑΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	p-Οξυβενζοϊκό μεθύλιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	243-171-5
Χημική ονομασία	p-Υδροξυβενζοϊκό μεθύλιο· p-υδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας
Χημικός τύπος	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub>
Μοριακό βάρος	152,15
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % μετά από ξήρανση στους 80 °C επί 2 ώρες
<b>Περιγραφή</b>	Σχεδόν άοσμοι, μικροί άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	125 °C - 128 °C
Δοκιμή p-υδροξυβενζοϊκών ιόντων	Πεδίο τιμών σημείου τήξης του p-υδροξυβενζοϊκού οξέος που παράγει το δείγμα, 213 °C έως 217 °C μετά από ξήρανση στους 80 °C επί 2 ώρες
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλειμα κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (80 °C, 2 ώρες)
Θεική τέφρα	0,05 % κατ' ανώτατο όριο
p-Υδροξυβενζοϊκό οξύ και σαλικυλικό οξύ	0,35 % κατ' ανώτατο όριο, εκφρασμένο σε p-υδροξυβενζοϊκό οξύ
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 219 p-ΥΑΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, ΑΛΑΣ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Άλας του p-υδροξυβενζοϊκού μεθυλίου με νάτριο· Νατριούχος ένωση του p-υδροξυβενζοϊκού μεθυλεστέρα
Χημικός τύπος	C <sub>8</sub> H <sub>7</sub> O <sub>3</sub> Na
Μοριακό βάρος	174,15
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή υγροσκοπική σκόνη

**▼ B****Ταυτοποίηση**

Πεδίο τιμών σημείου τήξης

Το λευκό ίζημα που σχηματίζεται με οξίνιση, με υδροχλωρικό οξύ, υδατικού διαλύματος 10 % (w/v) του παραγώγου του p-υδροξυβενζοϊκού μεθυλεστέρα με νάτριο (με δείκτη χαρτί ηλιοτροπίου) πρέπει, μετά από έκπλυση με νερό και ξήρανση στους 80 °C επί 2 ώρες, να τήκεται στους 125 °C έως 128 °C

Δοκιμή νατρίου

Δοκιμή θετική

pH

9,7 – 10,3 (διάλυμα 0,1 % σε νερό απαλλαγμένο από διοξείδιο του άνθρακα)

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό

5 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

Θεική τέφρα

40 % έως 44,5 % επί άνυδρης ουσίας

p-Υδροξυβενζοϊκό οξύ και σαλικυλικό οξύ

0,35 % κατ' ανώτατο όριο, εκφρασμένη ως p-υδροξυβενζοϊκό οξύ

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 220 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS

231-195-2

Χημική ονομασία

Διοξείδιο του θείου· ανυδρίτης του θειώδους οξέος

Χημικός τύπος

SO<sub>2</sub>

Μοριακό βάρος

64,07

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 %

**Περιγραφή**

Άχρωμο, άφλεκτο αέριο με δριμεία αποπνικτική οσμή

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή θειωδών ουσιών

Δοκιμή θετική

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό

0,05 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

Μη πτητικό κατάλοιπο

0,01 % κατ' ανώτατο όριο

Τριοξείδιο του θείου

0,1 % κατ' ανώτατο όριο

Σελήνιο

10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Αέρια που, υπό κανονικές συνθήκες, δεν περιέχονται στον ατμοσφαιρικό αέρα

Κανένα ίχνος

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## ▼ B

## E 221 ΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

## Συνώνυμα

## Ορισμός

Αριθ. EINECS	231-821-4
Χημική ονομασία	Θειώδες νάτριο (άνυδρο ή επταένυδρο)
Χημικός τύπος	Άνυδρο: $\text{Na}_2\text{SO}_3$ Επταένυδρο: $\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
Μοριακό βάρος	Άνυδρο: 126,04 Επταένυδρο: 252,16
Δοκιμασία	Άνυδρο: Περιεκτικότητα σε $\text{Na}_2\text{SO}_3$ τουλάχιστον 95 % και σε $\text{SO}_2$ τουλάχιστον 48 % Επταένυδρο: Περιεκτικότητα σε $\text{Na}_2\text{SO}_3$ τουλάχιστον 48 % και σε $\text{SO}_2$ τουλάχιστον 24 %

## Περιγραφή

Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή άχρωμοι κρύσταλλοι

## Ταυτοποίηση

Δοκιμή θειωδών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
pH	8,5-11,5 (άνυδρο: διάλυμα 10 %· επταένυδρο: διάλυμα 20 %)

## Καθαρότητα

Θειοθειικά ιόντα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε $\text{SO}_2$
Σίδηρος	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε $\text{SO}_2$
Σελήνιο	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε $\text{SO}_2$
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## E 222 ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

## Συνώνυμα

## Ορισμός

Αριθ. EINECS	231-921-4
Χημική ονομασία	Όξινο θειώδες νάτριο
Χημικός τύπος	$\text{NaHSO}_3$ σε μορφή υδατικού διαλύματος
Μοριακό βάρος	104,06
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε $\text{NaHSO}_3$ τουλάχιστον 32 % w/w

## Περιγραφή

Διαυγές, άχρωμο έως κίτρινο διάλυμα

## Ταυτοποίηση

Δοκιμή θειωδών ιόντων	Δοκιμή θετική
-----------------------	---------------

**▼ B**

Δοκιμή νατρίου

pH

**Καθαρότητα****▼ M3**

Σίδηρος

**▼ B**

Σελήνιο

Αρσενικό

Μόλυβδος

Υδράργυρος

Δοκιμή θετική

2,5-5,5 (υδατικό διάλυμα 10 %)

10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO<sub>2</sub>5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO<sub>2</sub>

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 223 ΜΕΤΑΔΙΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

**Περιγραφή****Ταυτοποίηση**

Δοκιμήθειωδών ιόντων

Δοκιμή νατρίου

pH

**Καθαρότητα**

Θειοθειικά ιόντα

Σίδηρος

Σελήνιο

Αρσενικό

Μόλυβδος

Υδράργυρος

Πυροθειώδες νάτριο

231-673-0

Διθειώδες νάτριο· πενταοξοδιθειικό νάτριο

Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

190,11

Περιεκτικότητα σε Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub> τουλάχιστον 95 % και σε SO<sub>2</sub> τουλάχιστον 64 %

Λευκοί κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη

Δοκιμή θετική

Δοκιμή θετική

4,0 – 5,5 (υδατικό διάλυμα 10 %)

0,1 % κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO<sub>2</sub>10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO<sub>2</sub>5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO<sub>2</sub>

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 224 ΜΕΤΑΔΙΘΕΙΩΔΕΣ ΚΑΛΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Πυροθειώδες κάλιο

240-795-3

Διθειώδες κάλιο· πενταοξοδιθειικό κάλιο

K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

222,33

**▼ B**

Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε $K_2S_2O_5$ τουλάχιστον 90 % και σε $SO_2$ τουλάχιστον 51,8 %, ενώ το υπόλοιπο είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου θειικό κάλιο
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή θειωδών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Θειοθειικά ιόντα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε $SO_2$
Σίδηρος	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε $SO_2$
Σελήνιο	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε $SO_2$
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 226 ΘΕΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	218-235-4
Χημική ονομασία	Θειώδες ασβέστιο
Χημικός τύπος	$CaSO_3 \cdot 2H_2O$
Μοριακό βάρος	156,17
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε $CaSO_3 \cdot 2H_2O$ τουλάχιστον 95 % και σε $SO_2$ τουλάχιστον 39 %
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή θειωδών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Σίδηρος	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε $SO_2$
Σελήνιο	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε $SO_2$
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M8****E 227 ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ****▼ B**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	237-423-7

**▼ B**

Χημική ονομασία	Όξινο θειώδες ασβέστιο
Χημικός τύπος	Ca(HSO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	202,22
Δοκιμασία	6 έως 8 % (w/v) διοξειδίου του θείου και 2,5 έως 3,5 % (w/v) διοξειδίου του ασβεστίου, που αντιστοιχούν σε 10 έως 14 % (w/v) όξινου θειώδους ασβεστίου [Ca(HSO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> ]
<b>Περιγραφή</b>	Διαυγές πρασινοκίτρινο υδατικό διάλυμα με χαρακτηριστική οσμή διοξειδίου του θείου
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή θειωδών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Σίδηρος	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO <sub>2</sub>
Σελήνιο	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO <sub>2</sub>
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M8****E 228 ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΩΔΕΣ ΚΑΛΙΟ****▼ B**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-870-1
Χημική ονομασία	Όξινο θειώδες κάλιο
Χημικός τύπος	KHSO <sub>3</sub> σε μορφή υδατικού διαλύματος
Μοριακό βάρος	120,17
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 280 g KHSO <sub>3</sub> ανά λίτρο (ή 150 g SO <sub>2</sub> ανά λίτρο)
<b>Περιγραφή</b>	Διαυγές άχρωμο υδατικό διάλυμα
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή θειωδών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Σίδηρος	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO <sub>2</sub>
Σελήνιο	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO <sub>2</sub>
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο



▼ B**E 234 ΝΙΣΙΝΗ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Η νισίνη συνίσταται από πολλά συγγενή πολυπεπίδια, τα οποία παράγονται από στελέχη του είδους *Lactococcus lactis*, υποείδος *lactis*

Αριθ. EINECS

215-807-5

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

 $C_{143}H_{230}N_{42}O_{37}S_7$ 

Μοριακό βάρος

3 354,12

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα του συμπυκνώματος νισίνης τουλάχιστον 900 μονάδες ανά mg σε μείγμα στερεών υπολειμμάτων γάλακτος χωρίς λίπος και ελάχιστη περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο 50 %

**Περιγραφή**

Λευκή σκόνη

**Ταυτοποίηση****Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση

3 % κατ' ανώτατο όριο (102 °C έως 103 °C, μέχρι σταθερού βάρους)

Αρσενικό

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 235 ΝΑΤΑΜΥΚΙΝΗ****Συνώνυμα**

Πιμαρικήνη

**Ορισμός**

Η ναταμυκίνη είναι μυκητοκτόνο της ομάδας των πολυενικών μακρολιδών και παράγεται από στελέχη του είδους *Streptomyces natalensis* και άλλων σχετικών ειδών

Αριθ. EINECS

231-683-5

Χημική ονομασία

Στερεοϊσομερές του 22-(3-αμινο-3,6-διδεσοξυ-β-D-μαννοπυρανοζυλοξυ)-1,3,26-τριυδροξυ-12-μεθυλ-10-οξο-6,11,28-τριοξατρικυκλο[22.3.1.0<sup>5,7</sup>]εικοσιοκτα-8,14,16,18,20-πενταενο-25-καρβοξυλικού οξέος

Χημικός τύπος

 $C_{33}H_{47}O_{13}N$ 

Μοριακό βάρος

665,74

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 % επί ξηράς ουσίας

**Περιγραφή**

Λευκή έως υπόλευκη κρυσταλλική σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Χρωματικές αντιδράσεις

Μερικοί κρύσταλλοι ναταμυκίνης, όταν προστεθούν επάνω σε πλάκα σταγονομετρικής ανάλυσης σε μία σταγόνα:

πυκνού υδροχλωρικού οξέος, παρέχουν μπλε χρώση,

πυκνού φωσφορικού οξέος, παρέχουν πράσινη χρώση, η οποία, μετά από λίγα λεπτά, μετατρέπεται σε ασθενή κόκκινη

Φασματομετρία

Το φάσμα διαλύματος 0,0005 % w/v σε μεθανολικό διάλυμα οξικού οξέος 1 %, παρουσιάζει μέγιστα απορρόφησης σε μήκη κύματος περίπου 290 nm, 303 nm και 318 nm, μια μικρή κορυφή στα 280 nm περίπου και ελάχιστα απορρόφησης στα 250 nm, 295,5 nm και 311 nm περίπου

**▼ B**

pH	5,5 - 7,5 (διάλυμα 1 % w/v σε μείγμα 20 μερών διμεθυλοφορμαμίδιου και 80 μερών νερού που έχει προηγουμένως εξουδετερωθεί)
Ειδική στροφική ικανότητα	$[\alpha]_D^{20} + 250^\circ$ έως $+ 295^\circ$ (διάλυμα 1 % w/v σε παγόμορφο οξικό οξύ στους 20 °C και υπολογισμός επί ξηρού)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	8 % κατ' ανώτατο όριο (υπό κενό στους 60 °C, υπεράνω P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , μέχρι σταθερού βάρους)
Θεική τέφρα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
Συνολικός αριθμός μικροοργανισμών	100 αποικίες ανά γραμμάριο κατ' ανώτατο όριο

**E 239 ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟΤΕΤΡΑΜΙΝΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Εξαμίνη· μεθенаμίνη
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	202-905-8
Χημική ονομασία	1,3,5,7-Τετρααζω-τρικυκλο [3.3.1.1 <sup>3,7</sup> ]-δεκάνιο, εξαμεθυλενοτετραμίνη
Χημικός τύπος	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> N <sub>4</sub>
Μοριακό βάρος	140,19
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμη ή λευκή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή φορμαλδεϋδης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή αμμωνίας	Δοκιμή θετική
Σημείο εξάχνωσης	Περίπου 260 °C
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (στους 105 °C υπό κενό υπεράνω P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> επί 2 ώρες)
Θεική τέφρα	0,05 % κατ' ανώτατο όριο
Θεικά ιόντα	0,005 % κατ' ανώτατο όριο, εκφρασμένη σε SO <sub>4</sub>
Ιόντα χλωρίου	0,005 % κατ' ανώτατο όριο, εκφρασμένη σε Cl
Αμμωνιακά άλατα	Δεν ανιχνεύονται
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **B****E 242 ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΔΙΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	DMDC· πυροκαρβονικό διμεθύλιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	224-859-8
Χημική ονομασία	Δικαρβονικό διμεθύλιο· Διμεθυλεστέρας του πυροκαρβονικού οξέος
Χημικός τύπος	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>5</sub>
Μοριακό βάρος	134,09
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,8 %
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμο υγρό, διασπώμενο όταν διαλυθεί σε νερό. Είναι διαβρωτικό για το δέρμα και τους οφθαλμούς και τοξικό μέσω της εισπνοής και της κατάποσης
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διάσπαση	Θετικές δοκιμές CO <sub>2</sub> και μεθανόλης μετά από αραίωση
Σημείο τήξης	17 °C
Σημείο βρασμού	172 °C με διάσπαση
Πυκνότητα στους 20 °C	1,25 g/cm <sup>3</sup> περίπου
Φάσμα απορρόφησης υπερύθρου	Μέγιστα απορρόφησης σε μήκη κύματος 1 156 και 1 832 cm <sup>-1</sup>
<b>Καθαρότητα</b>	
Καρβονικό διμεθύλιο	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Ολικό χλώριο	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **M12****E 243 ETHYL LAUROYL ARGINATE**

<b>Συνώνυμα</b>	Λαυρικός αργινικός αιθυλεστέρας·υδροχλωρικό άλας του N-α-λαυρούλο-L-αργινικού αιθυλίου· LAE·
-----------------	--

▼ **M19**

<b>Ορισμός</b>	Ο λαυρικός αργινικός αιθυλεστέρας παρασκευάζεται με εστεροποίηση της αργινίνης με αιθανόλη, ακολουθούμενη από αντίδραση του εστέρα με λαυρούλογλωρίδιο, σε υδατικό περιβάλλον με ελεγχόμενη θερμοκρασία μεταξύ 10 και 15 °C και με pH μεταξύ 6,7 και 6,9. Ο λαυρικός αργινικός αιθυλεστέρας που προκύπτει ανακτάται ως υδροχλωρικό άλας, ύστερα από διήθηση και ξήρανση.
----------------	--

▼ **M12**

ELINCS	434-630-6
Χημική ονομασία	Υδροχλωρικό άλας του N-α-δωδεκανοΐλο-L-αργινικού αιθυλίου
Χημικός τύπος	C <sub>20</sub> H <sub>41</sub> N <sub>4</sub> O <sub>3</sub> Cl
Μοριακό βάρος	421,02
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 85 % και έως 95 % κατ' ανώτατο όριο
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή σκόνη

▼ **M12****Στοιχεία αναγνώρισης**

Διαλυτότητα

Ευδιάλυτη σε νερό, αιθανόλη, προπυλενογλυκόλη και γλυκερίνη

**Καθαρότητα**Να-λαυροϋλο-*l*-αργινίνη

3 % κατ' ανώτατο όριο

Λαυρικό οξύ

5 % κατ' ανώτατο όριο

Λαυρικό αιθύλιο

3 % κατ' ανώτατο όριο

L-αργινίνη· HCl

1 % κατ' ανώτατο όριο

Αργινικό αιθύλιο 2HCl

1 % κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **M36****E 246 ΓΛΥΚΟΛΙΠΙΔΙΑ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Τα φυσικά γλυκολιπίδια προκύπτουν από διαδικασία ζύμωσης με χρήση του στελέχους άγριου τύπου MUCL 53181 του μύκητα *Dacryopinax spathularia* (βρώσιμο μανιτάρι). Η γλυκόζη χρησιμοποιείται ως πηγή άνθρακα. Η περαιτέρω διεργασία απαλλαγμένη από διαλύτη περιλαμβάνει διήθηση και μικροδιήθηση για την απομάκρυνση μικροβιακών κυττάρων, καθίζηση και πλύσιμο με ρυθμιστικό νερό για καθαρισμό. Το προϊόν παστεριώνεται και αποξηραίνεται με ψεκασμό. Η διαδικασία παραγωγής δεν προκαλεί χημική μετατροπή των γλυκολιπιδίων ούτε μεταβάλλει την εγγενή τους σύσταση.

Αριθμός CAS

2205009-17-0

Χημική ονομασία

Γλυκολιπίδια από τον μύκητα *Dacryopinax spathularia*

Δοκιμασία

Τουλάχιστον 93 % συνολική περιεκτικότητα σε γλυκολιπίδια επί ξηράς ουσίας.

**Περιγραφή**

Σκόνη απόχρωσης μπεζ έως ανοιχτό καστανό, χαρακτηριστική οσμή αδύναμη

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Συμμορφώνεται (10 g/l σε νερό)

pH

Μεταξύ 5,0 και 7,0 (10 g/l σε νερό)

Θολότητα

28 NTU κατ' ανώτατο όριο (10 g/l σε νερό)

▼ **M36****Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό	5 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Πρωτεΐνες	3 % κατ' ανώτατο όριο (συντελεστής N × 6,25)
Λίπος	2 % κατ' ανώτατο όριο (σταθμική μέθοδος)
Νάτριο	3,3 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	0,7 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Νικέλιο	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**Μικροβιολογικά κριτήρια**

Συνολικοί αερόβιοι μικροοργανισμοί	100 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
Ζυμομόκητες και ευρωτομόκητες	10 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
Κολοβακτηριοειδή	3 MPN/g κατ' ανώτατο όριο
<i>Salmonella</i> spp.	Απουσία σε 25 g

▼ **B****E 249 ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΚΑΛΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	231-832-4
Χημική ονομασία	Νιτρώδες κάλιο
Χημικός τύπος	KNO <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	85,11
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 % επί άνυδρης ουσίας <sup>(1)</sup>

**Περιγραφή**

Λευκοί ή ελαφρώς κίτρινοι ρευστοποιούμενοι κόκκοι

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή νιτρωδών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
pH	6,0 - 9,0 (διάλυμα 5 %)

<sup>(1)</sup> Επιτρέπεται να πωλείται μόνο σε μείγμα με μαγειρικό αλάτι ή υποκατάστατό του.

**▼ B**

<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	3 % κατ' ανώτατο όριο [4 ώρες, υπεράνω πυριτικής πηκτής (silica gel)]
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 250 ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-555-9
Χημική ονομασία	Νιτρώδες νάτριο
Χημικός τύπος	NaNO <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	69,00
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97 % επί άνυδρης ουσίας <sup>(1)</sup>
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή υποκίτρινοι σβώλοι
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νιτρωδών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,25 % κατ' ανώτατο όριο [4 ώρες, υπεράνω πυριτικής πηκτής (silica gel)]
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 251 ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ****(i) ΣΤΕΡΕΟ ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Νίτρο της Χιλής· νιτρική σόδα
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-554-3
Χημική ονομασία	Νιτρικό νάτριο
Χημικός τύπος	NaNO <sub>3</sub>
Μοριακό βάρος	85,00
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή, κρυσταλλική, ελαφρώς υγροσκοπική σκόνη

<sup>(1)</sup> Επιτρέπεται να πωλείται μόνο σε μείγμα με μαγειρικό αλάτι ή υποκατάστατό του.

▼ **B****Ταυτοποίηση**

Δοκιμή νιτρικών ιόντων

Δοκιμή θετική

Δοκιμή νατρίου

Δοκιμή θετική

pH

5,5 - 8,3 (διάλυμα 5 %)

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση

2 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)

Νιτρώδη ιόντα

30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο εκφρασμένα σε NaNO<sub>2</sub>

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**(ii) ΥΓΡΟ ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Το υγρό νιτρικό νάτριο είναι υδατικό διάλυμα νιτρικού νατρίου που προκύπτει ως άμεσο αποτέλεσμα της χημικής αντίδρασης μεταξύ του υδροξειδίου του νατρίου και του νιτρικού οξέος σε στοιχειομετρικά ποσά, χωρίς να έπεται κρυστάλλωση. Οι τυποποιημένες μορφές που παρασκευάζονται από υγρό νιτρικό νάτριο που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές επιτρέπεται να περιέχουν νιτρικό οξύ σε περίσσεια, εάν δηλώνεται ή επισημαίνεται σαφώς.

Αριθ. EINECS

231-554-3

Χημική ονομασία

Νιτρικό νάτριο

Χημικός τύπος

NaNO<sub>3</sub>

Μοριακό βάρος

85,00

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε NaNO<sub>3</sub> μεταξύ 33,5 % και 40,0 %**Περιγραφή**

Διαυγές άχρωμο υγρό

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή νιτρικών ιόντων

Δοκιμή θετική

Δοκιμή νατρίου

Δοκιμή θετική

pH

1,5 - 3,5

**Καθαρότητα**

Ελεύθερο νιτρικό οξύ

0,01 % κατ' ανώτατο όριο

Νιτρώδη ιόντα

10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο εκφρασμένα σε NaNO<sub>2</sub>

Αρσενικό

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

0,3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν υδατικό διάλυμα 35 %***E 252 ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ****Συνώνυμα**

Νίτρο της Χιλής· νιτρική σόδα

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS

231-818-8

**▼ B**

Χημική ονομασία	Νιτρικό κάλιο
Χημικός τύπος	KNO <sub>3</sub>
Μοριακό βάρος	101,11
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή διαφανή πρίσματα με ψυχρή, αλμυρή και δριμεία γεύση
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νιτρικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
pH	4,5 - 8,5 (διάλυμα 5 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	1 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)
Νιτρώδη ιόντα	20 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (ως KNO <sub>2</sub> )
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 260 ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	200-580-7
Χημική ονομασία	Οξικό οξύ· Αιθανικό οξύ
Χημικός τύπος	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	60,05
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,8 %
<b>Περιγραφή</b>	Διαυγές άχρωμο υγρό με χαρακτηριστική δριμεία οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Σημείο βρασμού	118 °C σε πίεση 760 mm (στήλης υδραργύρου)
Ειδικό βάρος	1049 περίπου
Δοκιμή οξικών ιόντων	Διάλυμα σε αναλογία 1:3 παρέχει θετικές δοκιμές οξικών ιόντων
Σημείο πήξης	Τουλάχιστον 14,5 °C
<b>Καθαρότητα</b>	
Μη πτητικό κατάλοιπο	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μυρμηκικό οξύ, μυρμηκικά άλατα και άλλες οξειδούμενες ουσίες	1 000 mg/kg κατ' ανώτατο όριο ως μυρμηκικό οξύ
Εύκολα οξειδούμενες ουσίες	Σε δοχείο με γυάλινο πώμα αραιώνονται 2 ml δείγματος με 10 ml νερού και προστίθενται 0,1 ml διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου 0,1 N. Το ροζ χρώμα δεν μετατρέπεται σε καφέ επί 30 λεπτά.



**▼ B**

Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	0,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M2****E 261 (i) ΟΞΙΚΟ ΚΑΛΙΟ****▼ B****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	204-822-2
Χημική ονομασία	Οξικό κάλιο
Χημικός τύπος	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> O <sub>2</sub> K
Μοριακό βάρος	98,14
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί άνυδρης ουσίας

**Περιγραφή**

Άχρωμοι, ρευστοποιούμενοι κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη, άοσμα ή με ελαφρά οσμή ξιδιού

**Ταυτοποίηση**

pH	7,5 – 9,0 (υδατικό διάλυμα 5 %)
Δοκιμή οξικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	8 % κατ' ανώτατο όριο (150 °C, 2 ώρες)
Μυρμηκικό οξύ, μυρμηκικά άλατα και άλλες οξειδούμενες ουσίες	1 000 mg/kg κατ' ανώτατο όριο ως μυρμηκικό οξύ
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M2****E 261 (ii) ΔΙΟΞΙΚΟ ΚΑΛΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Το διοξικό κάλιο είναι μοριακή ένωση οξικού καλίου και οξικού οξέος

Ευρωπαϊκός κατάλογος των χημικών ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο (EINECS)	224-217-7
Χημική ονομασία	Όξινο διοξικό κάλιο
Χημικός τύπος	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> KO <sub>4</sub>

▼ M2

Μοριακό βάρος	158,2
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα 36-38 % σε ελεύθερο οξικό οξύ και 61-64 % σε οξικό κάλιο
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί κρύσταλλοι
<b>Προσδιορισμός</b>	
pH	4,5 – 5 (υδατικό διάλυμα 10 %)
Δοκιμή οξικών οξέων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	1 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Μυρμηκικό οξύ, μυρμηκικά άλατα και άλλες οξειδούμενες ουσίες	1 000 mg/kg κατ' ανώτατο όριο ως μυρμηκικό οξύ
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ B

## E 262 (i) ΟΞΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	204-823-8
Χημική ονομασία	Οξικό νάτριο
Χημικός τύπος	$C_2H_3NaO_2 \cdot nH_2O$ (n = 0 ή 3)
Μοριακό βάρος	Άνυδρο: 82,03 Τριένυδρο: 136,08
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα (και των δύο μορφών, άνυδρης και τριένυδρης), τουλάχιστον 98,5 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άνυδρο: Λευκή, άοσμη, κοκκώδης υγροσκοπική σκόνη Τριένυδρο: Άχρωμοι διαφανείς κρύσταλλοι ή κοκκώδης κρυσταλλική σκόνη, άοσμα ή με ελαφρά οσμή ξιδιού. Σε επαφή με θερμό ξηρό αέρα, αποσαθρώνεται

**▼ B****Ταυτοποίηση**

pH 8,0-9,5 (υδατικό διάλυμα 1 %)

Δοκιμή οξικών ιόντων Δοκιμή θετική

Δοκιμή νατρίου Δοκιμή θετική

**Καθαρότητα**

Απόλεια κατά την ξήρανση Άνυδρο: 2 % κατ' ανώτατο όριο (120 °C, 4 ώρες)

Τριένυδρο: Μεταξύ 36 % και 42 % (120 °C, 4 ώρες)

Μυρμηκικό οξύ, μυρμηκικά άλατα και άλλες οξειδούμενες ουσίες 1 000 mg/kg κατ' ανώτατο όριο ως μυρμηκικό οξύ

Αρσενικό 3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος 2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος 1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 262 (ii) ΔΙΟΞΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Το διοξικό νάτριο είναι μοριακή ένωση οξικού νατρίου και οξικού οξέος

Αριθ. EINECS 204-814-9

Χημική ονομασία Οξίνο οξικό νάτριο

Χημικός τύπος  $C_4H_7NaO_4 \cdot nH_2O$  (n = 0 ή 3)

Μοριακό βάρος 142,09 (άνυδρο)

**▼ M34**

Δοκιμασία Περιεκτικότητα 39-43 % σε ελεύθερο οξικό οξύ και 57-60 % σε οξικό νάτριο

**▼ B****Περιγραφή**

Λευκό υγροσκοπικό κρυσταλλικό στερεό, με οσμή ξιδιού

**Ταυτοποίηση**

pH 4,5 – 5,0 (υδατικό διάλυμα 10 %)

Δοκιμή οξικών ιόντων Δοκιμή θετική

Δοκιμή νατρίου Δοκιμή θετική

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό 2 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

Μυρμηκικό οξύ, μυρμηκικά άλατα και άλλες οξειδούμενες ουσίες 1 000 mg/kg κατ' ανώτατο όριο ως μυρμηκικό οξύ

Αρσενικό 3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος 2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος 1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 263 ΟΞΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS 200-540-9

**▼ B**

Χημική ονομασία	Οξικό ασβέστιο
Χημικός τύπος	Άνυδρο: $C_4H_6O_4Ca$ Μονοένυδρο: $C_4H_6O_4Ca \cdot H_2O$
Μοριακό βάρος	Άνυδρο: 158,17 Μονοένυδρο: 176,18
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Το άνυδρο οξικό ασβέστιο είναι λευκό, υγροσκοπικό, ογκώδες κρυσταλλικό στερεό με υπόπικρη γεύση. Ενδέχεται να αποπνέει ελαφρά οσμή οξικού οξέος. Το μονοένυδρο άλας μπορεί να έχει τη μορφή βελονών, κόκκων ή σκόνης.
<b>Ταυτοποίηση</b>	
pH	6,0 – 9,0 (υδατικό διάλυμα 10 %)
Δοκιμή οξικών οξέων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	11 % κατ' ανώτατο όριο (155 °C μέχρι σταθερού βάρους, για το μονοένυδρο άλας)
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,3 % κατ' ανώτατο όριο
Μυρμηκικό οξύ, μυρμηκικά άλατα και άλλες οξειδούμενες ουσίες	1 000 mg/kg κατ' ανώτατο όριο ως μυρμηκικό οξύ
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 270 ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Αποτελείται από μείγμα γαλακτικού οξέος ( $C_3H_6O_3$ ) και λακτιδίου του γαλακτικού οξέος ( $C_6H_{10}O_5$ ). Λαμβάνεται ως προϊόν της γαλακτικής ζύμωσης των σακχάρων ή παρασκευάζεται συνθετικά. Το γαλακτικό οξύ είναι υγροσκοπικό και, συμπυκνόμενο με βρασμό, σχηματίζει το λακτίδιο του γαλακτικού οξέος, το οποίο, με αραίωση και θέρμανση, υδρολύεται προς γαλακτικό οξύ.
Αριθ. EINECS	200-018-0
Χημική ονομασία	Γαλακτικό οξύ· 2-Υδροξυ-προπιονικό οξύ· 1-Υδροξυ-αιθανο-1-καρβοξυλικό οξύ
Χημικός τύπος	$C_3H_6O_3$
Μοριακό βάρος	90,08
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 76 %
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμο ή υποκίτρινο, σχεδόν άοσμο σιροπιώδες υγρό έως στερεό
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή γαλακτικών ιόντων	Δοκιμή θετική

**▼ B****Καθαρότητα**

Θεική τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Χλώριο	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Θεικά ιόντα	0,25 % κατ' ανώτατο όριο
Σίδηρος	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Σημείωση:* Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν υδατικό διάλυμα 80 % προκειμένου για αραιότερα υδατικά διαλύματα, υπολογίζονται αντίστοιχες τιμές ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε γαλακτικό οξύ

**E 280 ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΟΞΥ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	201-176-3
Χημική ονομασία	Προπιονικό οξύ· Προπανικό οξύ
Χημικός τύπος	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	74,08
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5 %

**Περιγραφή**

Άχρωμο ή ελαφρώς υποκίτρινο, ελαιώδες υγρό με ελαφρώς δριμεία οσμή

**Ταυτοποίηση**

Σημείο τήξης	- 22 °C
Εύρος θερμοκρασιών απόσταξης	138,5 °C έως 142,5 °C

**Καθαρότητα**

Μη πτητικό κατάλοιπο	0,01 % κατ' ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 140 °C μέχρι σταθερού βάρους
Αλδεΐδες	0,1 % κατ' ανώτατο όριο, εκφρασμένες σε φορμαλδεΐδη
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 281 ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	205-290-4
Χημική ονομασία	Προπιονικό νάτριο· Προπανικό νάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> O <sub>2</sub> Na
Μοριακό βάρος	96,06
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % μετά από ξήρανση στους 105 °C επί 2 ώρες

**▼ B**

<b>Περιγραφή</b>	Λευκή κρυσταλλική υγροσκοπική σκόνη ή λεπτόκοκκη λευκή σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή προπιονικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
pH	7,5 – 10,5 (υδατικό διάλυμα 10 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	4 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)
Ουσίες αδιάλυτες στο νερό	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Σίδηρος	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 282 ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	223-795-8
Χημική ονομασία	Προπιονικό ασβέστιο
Χημικός τύπος	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub> Ca
Μοριακό βάρος	186,22
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % μετά από ξήρανση στους 105 °C επί 2 ώρες
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή προπιονικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
pH	6,0 – 9,0 (υδατικό διάλυμα 10 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	4 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)
Ουσίες αδιάλυτες στο νερό	0,3 % κατ' ανώτατο όριο
Σίδηρος	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>▼ M16</b>	
Φθόριο	20 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>▼ B</b>	
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 283 ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	206-323-5

**▼ B**

Χημική ονομασία	Προπιονικό κάλιο· Προπανικό κάλιο
Χημικός τύπος	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> KO <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	112,17
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % μετά από ξήρανση στους 105 °C επί 2 ώρες
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή προπιονικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	4 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)
Ουσίες αδιάλυτες στο νερό	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Σίδηρος	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 284 ΒΟΡΙΚΟ ΟΞΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	Βορακικό οξύ· ορθοβορικό οξύ· borofax
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	233-139-2
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>
Μοριακό βάρος	61,84
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5 %
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμοι, άοσμοι, διαφανείς κρύσταλλοι ή κόκκοι ή σκόνη λευκού χρώματος, ελαφρώς λιπαρής υφής. Η ουσία απαντά στη φύση με τη μορφή του ορυκτού σασωλίτη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Σημείο τήξης	Στους 171 °C περίπου
Δοκιμή καύσης	Καίεται με ωραία πράσινη φλόγα
pH	3,8 – 4,8 (υδατικό διάλυμα 3,3 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Υπεροξειδία	Με την προσθήκη διαλύματος KI δεν εμφανίζεται χρώση
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## ▼ B

## E 285 ΤΕΤΡΑΒΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (ΒΟΡΑΚΑΣ)

<b>Συνώνυμα</b>	Βορικό νάτριο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	215-540-4
Χημική ονομασία	Τετραβορικό νάτριο· Βορικό νάτριο· Πυροβορικό νάτριο· Ανυδρο άλας του τετραβορικού οξέος
Χημικός τύπος	Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> ·10H <sub>2</sub> O
Μοριακό βάρος	201,27
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή υαλώδεις πλάκες που γίνονται αδιαφανείς όταν εκτεθούν στον ατμοσφαιρικό αέρα· διαλύεται αργά στο νερό
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	Μεταξύ 171 °C και 175 °C με διάσπαση
<b>Καθαρότητα</b>	
Υπεροξειδία	Με την προσθήκη διαλύματος KI δεν εμφανίζεται χρώση
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## E 290 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

<b>Συνώνυμα</b>	Αέριο ανθρακικό οξύ· ξηρός πάγος (στερεά μορφή)· ανυδρίτης του ανθρακικού οξέος
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	204-696-9
Χημική ονομασία	Διοξείδιο του άνθρακα
Χημικός τύπος	CO <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	44,01
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % v/v επί του αερίου
<b>Περιγραφή</b>	Στις συνήθεις περιβαλλοντικές συνθήκες, άχρωμο αέριο με ελαφρώς δριμεία οσμή. Το διοξείδιο του άνθρακα του εμπορίου μεταφέρεται και διακινείται σε υγρή μορφή —σε κυλίνδρους ή συστήματα αποθήκευσης προϊόντων χύμα υπό πίεση— ή σε συμπιεσμένα στερεά τεμάχια «ξηρού πάγου». Οι στερεές μορφές (ξηρός πάγος) περιέχουν συνήθως πρόσθετες ουσίες, όπως προπυλενογλυκόλη ή ορυκτέλαια, ως συνδετικούς παράγοντες
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Σχηματισμός ιζήματος	Εάν ένα ρεύμα δείγματος διοχετευθεί σε διάλυμα υδροξειδίου του βαρίου, σχηματίζεται λευκό ίζημα, το οποίο διαλύεται σε αραιό οξικό οξύ με αναβρασμό
<b>Καθαρότητα</b>	
Οξύτητα	Η διοχέτευση 915 ml του αερίου σε 50 ml πρόσφατα βρασμένου νερού δεν πρέπει να του προσδίδει μεγαλύτερη οξύτητα, έναντι του δείκτη πορτοκαλί του μεθυλίου, από την οξύτητα 50 ml πρόσφατα βρασμένου νερού, στα οποία έχει προστεθεί 1 ml υδροχλωρικού οξέος (0,01 N)



**▼ B**

Αναγωγικές ουσίες, φωσφίνη και υδρόθειο	Η διοχέτευση 915 ml του αερίου σε 25 ml αντιδραστηρίου εναμμιονίου νιτρικού αργύρου, στο οποίο έχουν προστεθεί 3 ml αμμωνιάς δεν πρέπει να θολώνει ή να αμαυρώνει αυτό το διάλυμα
Μονοξειδίο του άνθρακα	10 µl/l κατ' ανώτατο όριο
Ορυκτέλαια	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 296 ΜΗΛΙΚΟ ΟΞΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	Pomalous acid
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	230-022-8, 210-514-9, 202-601-5
Χημική ονομασία	Υδροξυβουτανοδικαρβονικό οξύ· υδροξυηλεκτρικό οξύ
Χημικός τύπος	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>5</sub>
Μοριακό βάρος	134,09
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 %
<b>Περιγραφή</b>	Κρυσταλλική σκόνη ή κόκκοι λευκού ή σχεδόν λευκού χρώματος
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	127 °C - 132 °C
Δοκιμή μηλικών ιόντων	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Θεική τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Φουμαρικό οξύ	1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Μηλεϊνικό οξύ	0,05 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 297 ΦΟΥΜΑΡΙΚΟ ΟΞΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	203-743-0
Χημική ονομασία	trans-Βουτενοδικαρβονικό οξύ· trans-1,2-αιθυλενο-δικαρβοξυλικό οξύ
Χημικός τύπος	C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>4</sub>
Μοριακό βάρος	116,07
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Κρυσταλλική σκόνη ή κόκκοι λευκού χρώματος
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	286 °C - 302 °C (κλειστός τριχοειδής σωλήνας, ταχεία θέρμανση)
Δοκιμή ανίχνευσης διπλών δεσμών	Δοκιμή θετική
Δοκιμή 1,2-δικαρβοξυλικού οξέος	Δοκιμή θετική
pH	3,0 - 3,2 (διάλυμα 0,05 % στους 25 °C)

**▼ B****Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (120 °C, 4 ώρες)
Θειική τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Μηλεϊνικό οξύ	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 300 ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ, L-ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ****Συνώνυμα**

L-xylo-Ascorbic acid· L(+)-ασκορβικό οξύ

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS	200-066-2
Χημική ονομασία	L-ασκορβικό οξύ· Ασκορβικό οξύ· 1,4-Λακτόνη του 2,3-διδευδρο-L-θρεο-εξουρονικού οξέος· 3-Κετο-L-γουλοφουρανολακτόνη
Χημικός τύπος	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>6</sub>
Μοριακό βάρος	176,13
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>6</sub> τουλάχιστον 99 %, μετά από ξήρανση σε ξηραντήρα κενού υπεράνω θειικού οξέος για 24 ώρες

**Περιγραφή**

Λευκή έως ωχροκίτρινη, άοσμη κρυσταλλική σκόνη

Πεδίο τιμών σημείου τήξης

Μεταξύ 189 °C και 193 °C με διάσπαση

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή ασκορβικού οξέος	Δοκιμή θετική
pH	Μεταξύ 2,4 και 2,8 (υδατικό διάλυμα 2 %)
Ειδική στροφική ικανότητα	[α] <sub>D</sub> <sup>20</sup> μεταξύ + 20,5° και + 21,5° (υδατικό διάλυμα 10 % w/v)

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	0,4 % κατ' ανώτατο όριο (υπό κενό υπεράνω θειικού οξέος επί 24 ώρες)
Θειική τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 301 ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ****Συνώνυμα**

L-Ασκορβικό νάτριο· άλας του L-ασκορβικού οξέος με νάτριο

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS	205-126-1
Χημική ονομασία	Ασκορβικό νάτριο· L-Ασκορβικό νάτριο· Άλας με νάτριο της ενολο-1,4-λακτόνης του 2,3-διδευδρο-L-θρεο-εξουρονικού οξέος· Άλας με νάτριο της ενολο-3-κετο-L-γουλοφουρανολακτόνης
Χημικός τύπος	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> O <sub>6</sub> Na

**▼ B**

Μοριακό βάρος	198,11
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα του ασκορβικού νατρίου σε C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> O <sub>6</sub> Na τουλάχιστον 99 %, μετά από ξήρανση σε ξηραντήρα κενού υπεράνω θεικού οξέος για 24 ώρες
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή ή σχεδόν λευκή, άοσμη κρυσταλλική σκόνη που, όταν εκτεθεί στο φως, αμαυρώνεται
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή ασκορβικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
pH	Μεταξύ 6,5 και 8,0 (υδατικό διάλυμα 10 %)
Ειδική στροφική ικανότητα	[α] <sub>D</sub> <sup>20</sup> μεταξύ + 103° και + 106° (υδατικό διάλυμα 10 % w/v)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	0,25 % κατ' ανώτατο όριο (υπό κενό υπεράνω θεικού οξέος επί 24 ώρες)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 302 ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Διένυδρο ασκορβικό ασβέστιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	227-261-5
Χημική ονομασία	Διένυδρο ασκορβικό ασβέστιο· διένυδρο άλας με ασβέστιο της 1,4-λακτόνης του 2,3-διιδεύδρο-L-θρεο-εξουρονικού οξέος
Χημικός τύπος	C <sub>12</sub> H <sub>14</sub> O <sub>12</sub> Ca·2H <sub>2</sub> O
Μοριακό βάρος	426,35
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί ουσίας απαλλαγμένης από πτητικές ύλες
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή έως ελαφρώς φαιοκίτρινη, άοσμη κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή ασκορβικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
pH	Μεταξύ 6,0 και 7,5 (υδατικό διάλυμα 10 %)
Ειδική στροφική ικανότητα	[α] <sub>D</sub> <sup>20</sup> μεταξύ + 95° και + 97° (υδατικό διάλυμα 5 % w/v)
<b>Καθαρότητα</b>	
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Πτητικές ύλες	0,3 % κατ' ανώτατο όριο, προσδιοριζόμενες με ξήρανση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 24 ώρες μέσα σε ξηραντήρα που περιέχει θεικό οξύ ή πεντοξειδίο του φωσφόρου
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ B**E 304 (i) ΠΑΛΜΙΤΙΚΟ ΑΣΚΟΡΒΥΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Παλμιτικό L-ασκορβύλιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	205-305-4
Χημική ονομασία	Παλμιτικό ασκορβύλιο· παλμιτικό L-ασκορβύλιο· 6-παλμιτική 1,4-λακτόνη του 2,3-διδευδρο-L-θρεο-εξουρονικού οξέος· 6-παλμιτοϋλο-3-κετο-L-γουλοφουρανολακτόνη
Χημικός τύπος	C <sub>22</sub> H <sub>38</sub> O <sub>7</sub>
Μοριακό βάρος	414,55
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί ξηράς ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή ή λευκοκίτρινη σκόνη με οσμή εσπεριδοειδών
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	Μεταξύ 107 °C και 117 °C
Ειδική στροφική ικανότητα	[α] <sub>D</sub> <sup>20</sup> μεταξύ + 21° και + 24° (μεθανολικό διάλυμα 5 % w/v)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	2,0 % κατ' ανώτατο όριο (σε κλίβανο κενού, στους 56 °C - 60 °C, επί 1 ώρα)
Θευική τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 304 (ii) ΣΤΕΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟΡΒΥΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	246-944-9
Χημική ονομασία	Στεατικό ασκορβύλιο· στεατικό L-ασκορβύλιο· 6-στεατική 1,4-λακτόνη του 2,3-διδευδρο-L-θρεο-εξουρονικού οξέος· 6-στεατοϋλο-3-κετο-L-γουλοφουρανολακτόνη
Χημικός τύπος	C <sub>24</sub> H <sub>42</sub> O <sub>7</sub>
Μοριακό βάρος	442,6
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 %
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή ή λευκοκίτρινη σκόνη με οσμή εσπεριδοειδών
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Σημείο τήξης	116 °C περίπου
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	2,0 % κατ' ανώτατο όριο (σε κλίβανο κενού, στους 56 °C - 60 °C, επί 1 ώρα)
Θευική τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ B

Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 306 ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΕΣ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Προϊόν λαμβανόμενο με απόσταξη με υδρατμούς υπό κενό προϊόντων βρώσιμων φυτικών ελαίων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα συμπυκνώματα τοκοφερολών και τοκοτριενολών.

Το προϊόν περιέχει τοκοφερόλες, όπως d-α, d-β, d-γ, και d-δ τοκοφερόλη

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

430,71 (d-α-τοκοφερόλη)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε ολικές τοκοφερόλες τουλάχιστον 34 %

**Περιγραφή**

Καφεκόκκινο έως κόκκινο, διαυγές παχύρρευστο έλαιο με ασθενή χαρακτηριστική οσμή και γεύση. Ενδέχεται να εμφανίζει ελαφρό αποχωρισμό κηρωδών συστατικών σε μικροκρυσταλλική μορφή

**Ταυτοποίηση**

Με κατάλληλη μέθοδο χρωματογραφίας υγρού-αερίου

Ειδική στροφική ικανότητα

[α]<sub>D</sub><sup>20</sup> τουλάχιστον + 20°

Διαλυτότητα

Αδιάλυτο στο νερό. Διαλυτό σε αιθανόλη. Αναμειξιμο με αιθέρα

**Καθαρότητα**

Θευική τέφρα

0,1 % κατ' ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 307 α-ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ****Συνώνυμα**

dl-α-Τοκοφερόλη· ρακεμικό μείγμα α-τοκοφερόλης

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS

233-466-0

Χημική ονομασία

DL-5,7,8-Τριμεθυλο-τοκόλη· DL-2,5,7,8-τετραμεθυλο-2-(4',8',12'-τριμεθυλο-δεκατριυλο)-χρωμανόλη-6

Χημικός τύπος

C<sub>29</sub>H<sub>50</sub>O<sub>2</sub>

Μοριακό βάρος

430,71

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 96 %

**Περιγραφή**

Υποκίτρινο έως κεχριμπαρόχρωμο, σχεδόν άοσμο, διαυγές παχύρρευστο έλαιο που, όταν εκτεθεί στον αέρα ή στο φως, οξειδώνεται και αμαυρώνεται

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Αδιάλυτο στο νερό, εύκολα διαλυτό σε αιθανόλη, αναμειξιμο με αιθέρα

▼ **B**

Φασματοφωτομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε απόλυτη αιθανόλη σε μήκος κύματος 292 nm περίπου
Ειδική στροφική ικανότητα	$[\alpha]_D^{25}$ μεταξύ $0^\circ \pm 0,05^\circ$ (διάλυμα σε χλωροφόρμιο σε αναλογία 1:10)
<b>Καθαρότητα</b>	
Δείκτης διάθλασης	$[n]_D^{20}$ 1,503 — 1,507
Απορροφητικότητα σε αιθανόλη	$E_{1\text{cm}}^{1\%}$ (292 nm) 71—76 (0,01 g σε 200 ml απόλυτης αιθανόλης)
Θευκή τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 308 γ-ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	dl-γ-Τοκοφερόλη
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-523-4
Χημική ονομασία	2,7,8-Τριμεθυλο 2-(4',8',12'-τριμεθυλο-δεκατριυλο)-χρωμανόλη-6
Χημικός τύπος	$C_{28}H_{48}O_2$
Μοριακό βάρος	416,69
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97 %
<b>Περιγραφή</b>	Διαυγές παχύρρευστο ωχροκίτρινο έλαιο που, όταν εκτεθεί στον αέρα ή στο φως, οξειδώνεται και αμαυρώνεται
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε απόλυτη αιθανόλη σε μήκη κύματος 298 nm και 257 nm περίπου
<b>Καθαρότητα</b>	
Απορροφητικότητα σε αιθανόλη	$E_{1\text{cm}}^{1\%}$ (298 nm) μεταξύ 91 και 97 $E_{1\text{cm}}^{1\%}$ (257 nm) μεταξύ 5,0 και 8,0
Δείκτης διάθλασης	$[n]_D^{20}$ 1,503—1,507
Θευκή τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 309 δ-ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	204-299-0
Χημική ονομασία	2,8-Διμεθυλο-2-(4',8',12'-τριμεθυλο-δεκατριυλο)-χρωμανόλη-6
Χημικός τύπος	$C_{27}H_{46}O_2$
Μοριακό βάρος	402,7
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97 %
<b>Περιγραφή</b>	Διαυγές παχύρρευστο ωχροκίτρινο ή πορτοκαλί έλαιο που, όταν εκτεθεί στον αέρα ή στο φως, οξειδώνεται και αμαυρώνεται

**▼ B**

<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης σε απόλυτη αιθανόλη σε μήκη κύματος 298 nm και 257 nm περίπου
<b>Καθαρότητα</b>	
Απορροφητικότητα $E_{1\text{cm}}^{1\%}$ σε αιθανόλη	$E_{1\text{cm}}^{1\%}$ (298 nm) μεταξύ 89 και 95 $E_{1\text{cm}}^{1\%}$ (257 nm) μεταξύ 3,0 και 6,0
Δείκτης διάθλασης	$[n]_D^{20}$ 1,500—1,504
Θεική τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 310 ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	204-498-2
Χημική ονομασία	Γαλλικό προπύλιο· Γαλλικός προπυλεστέρας· 3,4,5-Τριυδροξυ-βενζοϊκός n-προπυλεστέρας
Χημικός τύπος	$C_{10}H_{12}O_5$
Μοριακό βάρος	212,20
Δοκιμασία	Περικεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκό έως υπόλευκο, κρυσταλλικό, άοσμο στερεό
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Λίγο διαλυτό στο νερό, εύκολα διάλυτο σε αιθανόλη, αιθέρα και προπανοδιόλη-1,2
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	Μεταξύ 146 °C και 150 °C μετά από ξήρανση στους 110 °C επί τέσσερις ώρες
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (110 °C, 4 ώρες)
Θεική τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερα οξέα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (ως γαλλικό οξύ)
Χλωριούχες οργανικές ενώσεις	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (ως Cl)
Απορροφητικότητα σε αιθανόλη	$E_{1\text{cm}}^{1\%}$ (275 nm) τουλάχιστον 485 και 520 κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M30**

## ▼ B

## E 315 ΕΡΥΘΡΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ

<b>Συνώνυμα</b>	Ισοασκορβικό οξύ· D-αραβοασκορβικό οξύ
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	201-928-0
Χημική ονομασία	γ-λακτόνη του D-ερυθρο-εξεν-2-ικού οξέος· Ισοασκορβικό οξύ· D-ισοασκορβικό οξύ
Χημικός τύπος	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>6</sub>
Μοριακό βάρος	176,13
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκό έως υποκίτρινο κρυσταλλικό στερεό που, όταν εκτεθεί στο φως, αμαυρώνεται σταδιακά
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	Από 164 °C έως 172 °C περίπου με διάσπαση
Δοκιμή ασκορβικού οξέος /χρωματική αντίδραση	Δοκιμή θετική
Ειδική στροφική ικανότητα	[α] <sub>D</sub> <sup>25</sup> υδατικού διαλύματος 10 % (w/v) μεταξύ - 16,5° και - 18,0°
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,4 % κατ' ανώτατο όριο μετά από ξήρανση υπό ελαττωμένη πίεση με πυριτική πηκτή (silica gel) επί 3 ώρες
Θεική τέφρα	0,3 % κατ' ανώτατο όριο
Οξαλικά ιόντα	Σε διάλυμα 1 g της ουσίας σε 10 ml νερού προστίθενται 2 σταγόνες παγόμορφου οξικού οξέος και 5 ml διαλύματος οξικού ασβεστίου 10 %. Το διάλυμα πρέπει να παραμένει διαυγές
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## E 316 ΕΡΥΘΡΟΡΒΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

<b>Συνώνυμα</b>	Ισοασκορβικό νάτριο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	228-973-9
Χημική ονομασία	Ισοασκορβικό νάτριο· D-ισοασκορβικό νάτριο· άλας με νάτριο της 1,4-λακτόνης του 2,3-διιδεύδρο-D-ερυθρο-εξουρονικού οξέος· άλας με νάτριο της ενολο-3-κετο-D-γυλοφουρανολακτόνης
Χημικός τύπος	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> O <sub>6</sub> Na·H <sub>2</sub> O
Μοριακό βάρος	216,13
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 %, μετά από ξήρανση σε ξηραντήρα κενού υπεράνω θειικού οξέος επί 24 ώρες, εκφρασμένη σε ένυδρο άλας με 1 μόριο H <sub>2</sub> O



**▼ B**

<b>Περιγραφή</b>	Λευκό κρυσταλλικό στερεό
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό, πολύ λίγο διαλυτό σε αιθανόλη
Δοκιμή ασκορβικού οξέος /χρωματική αντίδραση	Δοκιμή θετική
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
pH	5,5 έως 8,0 (υδατικό διάλυμα 10 %)
Ειδική στροφοική ικανότητα	$[\alpha]_D^{25}$ υδατικού διαλύματος 10 % (w/v) από + 95° έως + 98°
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,25 % κατ' ανώτατο όριο (υπό κενό υπεράνω θεικού οξέος επί 24 ώρες)
Οξαλικά ιόντα	Σε διάλυμα 1 g της ουσίας σε 10 ml νερού προστίθενται 2 σταγόνες παγόμορφου οξικού οξέος και 5 ml διαλύματος οξικού ασβεστίου 10 %. Το διάλυμα πρέπει να παραμένει διαυγές.
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 319 ΤΡΙΤΟΤΑΓΗΣ ΒΟΥΤΥΛ-ΥΔΡΟΚΙΝΟΝΗ (TBHQ)**

<b>Συνώνυμα</b>	TBHQ
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	217-752-2
Χημική ονομασία	τριτ. βουτυλο-βενζολοδιόλη-1,4· 2-(1,1-διμεθυλαιθυλο)-βενζολοδιόλη-1,4
Χημικός τύπος	$C_{10}H_{14}O_2$
Μοριακό βάρος	166,22
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % σε $C_{10}H_{14}O_2$
<b>Περιγραφή</b>	Λευκό κρυσταλλικό στερεό με χαρακτηριστική οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Πρακτικά αδιάλυτο στο νερό, διαλυτό σε αιθανόλη
Σημείο τήξης	126,5 °C ή περισσότερο
Φαινολικές προσμίξεις	Διαλύονται περίπου 5 mg του δείγματος σε 10 ml μεθανόλης και προστίθενται 10,5 ml διαλύματος διμεθυλαμίνης (αναλογία 1: 4). Εμφανίζεται χρώμα κόκκινο έως ρόδινο
<b>Καθαρότητα</b>	
τριτ. βουτυλο-p-βενζοκινόνη	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
2,5-δι-τριτ. βουτυλδροκινόνη	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Υδροξυκινόνη	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Τολουόλιο	25 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **B****E 320 ΒΟΥΤΥΛ-ΥΔΡΟΞΥΑΝΙΣΟΛΗ (ΒΗΑ)**

<b>Συνώνυμα</b>	ΒΗΑ
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	246-563-8
Χημική ονομασία	3-τριτ. βουτυλ-4-υδροξυανισόλη· μείγμα 2-τριτ. βουτυλ-4-υδροξυανισόλης και 3-τριτ. βουτυλ-4-υδροξυανισόλης
Χημικός τύπος	C <sub>11</sub> H <sub>16</sub> O <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	180,25
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα 98,5 % τουλάχιστον σε C <sub>11</sub> H <sub>16</sub> O <sub>2</sub> και 85 % τουλάχιστον σε ισομερές 3-τριτ. βουτυλ-4-υδροξυανισόλης
<b>Περιγραφή</b>	Φολιδωτό ή κηρώδες στερεό, λευκού ή υποκίτρινου χρώματος, με ελαφρώς αρωματική οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο στο νερό, εύκολα διαλυτό σε αιθανόλη
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	Από 48 °C έως 63 °C
Χρωματική αντίδραση	Θετική δοκιμή φαινολικών ομάδων
<b>Καθαρότητα</b>	
Θεική τέφρα	0,05 % κατ' ανώτατο όριο μετά από πύρωση στους 800 ± 25 °C
Φαινολικές προσμίξεις	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Απορροφητικότητα	E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> (290 nm) τουλάχιστον 190 και 210 κατ' ανώτατο όριο E <sub>1cm</sub> <sup>1%</sup> (228 nm) τουλάχιστον 326 και 345 κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 321 ΒΟΥΤΥΛ-ΥΔΡΟΞΥΤΟΛΟΥΟΛΙΟ (ΒΗΤ)**

<b>Συνώνυμα</b>	ΒΗΤ
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	204-881-4
Χημική ονομασία	2,6-Δι-τριτ. βουτυλο-p-κρεσόλη· 4-μεθυλο-2,6-δι-τριτ.βουτυλο-φαινόλη
Χημικός τύπος	C <sub>15</sub> H <sub>24</sub> O
Μοριακό βάρος	220,36
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 %
<b>Περιγραφή</b>	Λευκό κρυσταλλικό ή φολιδωτό στερεό, άοσμο ή με χαρακτηριστική ασθενή αρωματική οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο σε νερό και προπανοδιόλη-1,2 Εύκολα διαλυτό σε αιθανόλη
Σημείο τήξης	70 °C

**▼ B**

Φασματομετρία	Το φάσμα απορρόφησης στοιβάδας πάχους 2 cm διαλύματος της ουσίας σε απόλυτη αιθανόλη σε αναλογία 1:100 000, σε μήκος κύματος 230 έως 320 nm, εμφανίζει μία μόνο κορυφή στα 278 nm
<b>Καθαρότητα</b>	
Θεική τέφρα	0,005 % κατ' ανώτατο όριο
Φαινολικές προσμίξεις	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Απορροφητικότητα σε αιθανόλη	$E_{1\text{cm}}^{1\%}$ (278 nm) τουλάχιστον 81 και 88 κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>E 322 ΛΕΚΙΘΙΝΕΣ</b>	
<b>Συνώνυμα</b>	Φωσφατίδια· φωσφολιπίδια
<b>Ορισμός</b>	Οι λεκιθίνες είναι μείγματα ή κλάσματα φωσφατιδίων, που λαμβάνονται με φυσικές μεθόδους από ζωικές ή φυτικές τροφές, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων υδρόλυσης που λαμβάνονται με χρήση κατάλληλων αβλαβών ενζύμων. Το τελικό προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει υπολειμματική ενζυμική δραστηριότητα. Οι λεκιθίνες ενδέχεται να έχουν ελαφρώς λευκανθεί με υπεροξειδίο του υδρογόνου σε υδατικό περιβάλλον. Η οξειδωση αυτή δεν πρέπει να προκαλεί χημική μετατροπή των λεκιθινικών φωσφατιδίων
Αριθ. EINECS	232-307-2
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Λεκιθίνες: περιεκτικότητα τουλάχιστον 60,0 % σε ουσίες αδιάλυτες σε ακετόνη Προϊόντα υδρόλυσης λεκιθινών: περιεκτικότητα τουλάχιστον 56,0 % σε ουσίες αδιάλυτες σε ακετόνη
<b>Περιγραφή</b>	Λεκιθίνες: καστανόχρωμο υγρό ή κολλώδες ρευστό ή σκόνη Προϊόντα υδρόλυσης λεκιθινών: παχύρρευστο υγρό ή πολτός, χρώματος ανοικτού καστανού έως καστανού
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή χολίνης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφόρου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή λιπαρών οξέων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή προϊόντων υδρόλυσης λεκιθινών	Σε ποτήρι βρασμού των 800 ml, προστίθενται 500 ml νερού (30 °C—35 °C). Προστίθενται κατόπιν αργά 50 ml δείγματος με συνεχή ανάδευση. Το προϊόν υδρόλυσης λεκιθινών σχηματίζει ομοιογενές γαλάκτωμα. Η μη υδρολυμένη λεκιθίνη σχηματίζει διακριτή μάζα 50 g περίπου
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	2,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 1 ώρα)
Ύλες αδιάλυτες σε τολουόλιο	0,3 % κατ' ανώτατο όριο

**▼ B**

Βαθμός οξύτητας	Λεκιθίνες: 35 mg υδροξειδίου του καλίου ανά gr κατ' ανώτατο όριο Προϊόντα υδρόλυσης λεκιθινών: 45 mg υδροξειδίου του καλίου ανά gr κατ' ανώτατο όριο
Αριθμός υπεροξειδίων	Ίσος ή μικρότερος του 10
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M35****E 322a ΛΕΚΙΘΙΝΗ ΒΡΩΜΗΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	Κλασματοποιημένο έλαιο βρώμης
<b>Ορισμός</b>	Η λεκιθίνη βρώμης είναι ένα κλασματοποιημένο έλαιο βρώμης πλούσιο σε πολικά λιπίδια, κυρίως γαλακτολιπίδια. Η λεκιθίνη βρώμης παράγεται από πυρήνες βρώμης ποιότητας κατάλληλης για τρόφιμα, οι οποίοι κοσκινίζονται και εκχυλίζονται με χρήση αιθανόλης σε υψηλή θερμοκρασία για την παραγωγή ακατέργαστου εκχυλίσματος λιπιδίων. Το εν λόγω ακατέργαστο εκχύλισμα υποβάλλεται σε εξάτμιση και διήθηση πολλαπλών σταδίων, αποδίδοντας ακατέργαστο έλαιο βρώμης, το οποίο διαχωρίζεται, εξατμίζεται και διηθείται για την παραγωγή λεκιθίνης βρώμης. Μόνο αιθανόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκχύλιση ως διαλύτης εκχύλισης.
Αριθμός Eines	281-672-4
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε πολικά λιπίδια, αδιάλυτα στην ακετόνη, τουλάχιστον 30 %
<b>Περιγραφή</b>	Παχύρρευστο καστανό έως υποκίτρινο υγρό
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Χολίνη	2 g/100 g κατ' ανώτατο όριο
Φωσφόρος	Τουλάχιστον 0,5 %
Πολικά λιπίδια	35 % κ.β. κατ' ελάχιστο όριο
Ουδέτερα λιπίδια	55-65 % κ.β.
Κορεσμένα	17-20 % κ.β.
Μονοακόρεστα	38-42 % κ.β.
Πολυακόρεστα	38-42 % κ.β.
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	2 % κατ' ανώτατο όριο
Ύλες αδιάλυτες σε τολουόλιο	1 % κ.β. κατ' ανώτατο όριο
Βαθμός οξύτητας	30 mg KOH/g κατ' ανώτατο όριο
Αριθμός υπεροξειδίων	κατ' ανώτατο όριο 10 meq O <sub>2</sub> /kg λίπους
Κατάλοιπα διαλυτών	Αιθανόλη: 300 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	0,05 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	0,02 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	0,05 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M35****Μικροβιολογικά κριτήρια**

Αριθμός αερόβιων μικροοργανισμών:	1 000 CFU/g κατ' ανώτατο όριο
Ζυμομύκητες	100 CFU/g κατ' ανώτατο όριο
Υφομύκητες	100 CFU/g κατ' ανώτατο όριο
Εντεροβακτηριοειδή	10 CFU/g κατ' ανώτατο όριο
Αερόβια σπόρια	1 CFU/g κατ' ανώτατο όριο
<b>Άλλα</b>	
Γλουτένη	20 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ B****E 325 ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	200-772-0
Χημική ονομασία	Γαλακτικό νάτριο· 2-υδροξυ-προπιονικό νάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> NaO <sub>3</sub>
Μοριακό βάρος	112,06 (άνυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 57 % και 66 % κατ' ανώτατο όριο

**Περιγραφή****Ταυτοποίηση**

Δοκιμή γαλακτικών ιόντων	Δοκιμή θετική
--------------------------	---------------

**▼ M3**

Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
----------------	---------------

**▼ B**

pH	6,5 έως 7,5 (υδατικό διάλυμα 20 %)
----	------------------------------------

**Καθαρότητα**

Οξύτητα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο, μετά από ξήρανση, εκφρασμένη σε γαλακτικό οξύ
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αναγωγικές ουσίες	Απουσία αναγωγής του φελλιγγείου υγρού

Σημείωση: Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν υδατικό διάλυμα 60 %

**E 326 ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΛΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	213-631-3
Χημική ονομασία	Γαλακτικό κάλιο· 2-υδροξυ-προπιονικό κάλιο
Χημικός τύπος	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> O <sub>3</sub> K
Μοριακό βάρος	128,17 (άνυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 57 % και 66 % κατ' ανώτατο όριο

**▼ B**

<b>Περιγραφή</b>	Ελαφρός παχύρρευστο, σχεδόν άχρωμο διαυγές υγρό, άοσμο ή με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Καύση	Καίεται διάλυμα γαλακτικού καλίου μέχρι να αποταφρωθεί. Η τέφρα είναι αλκαλική και, με προσθήκη οξέος, αναβράζει
Χρωματική αντίδραση	5 ml διαλύματος κατεχόλης σε θεικό οξύ, σε αναλογία 1:100, επικαλύπτονται με 2 ml διαλύματος γαλακτικού καλίου. Η επιφάνεια επαφής των δύο στοιβάδων χρωματίζεται βαθυκόκκινη
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή γαλακτικών ιόντων	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Οξύτητα	Σε 20 ml νερού διαλύεται 1 g διαλύματος γαλακτικού καλίου, προστίθενται 3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης TS και το διάλυμα ογκομετρείται με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 0,1 N. Δεν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσότερα από 0,2 ml
Αναγωγικές ουσίες	Απουσία αναγωγής του φελιγγείου υγρού

*Σημείωση:* Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν υδατικό διάλυμα 60 %

**E 327 ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	212-406-7
Χημική ονομασία	Γαλακτικό ασβέστιο· Ένυδρο γαλακτικό ασβέστιο· Άλας με ασβέστιο του 2-υδροξυ-προπιονικού οξέος
Χημικός τύπος	$(C_3H_5O_2)_2 Ca \cdot nH_2O$ (n = 0 - 5)
Μοριακό βάρος	218,22 (άνυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Σχεδόν άοσμο, λευκό κρυσταλλικό στερεό, σε μορφή σκόνης ή κόκκων
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή γαλακτικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Διαλυτό στο νερό και πρακτικά αδιάλυτο σε αιθανόλη
pH	Από 6,0 έως 8,0 (υδατικό διάλυμα 5 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	άνυδρη ουσία: 3,0 % κατ' ανώτατο όριο (120 °C, 4 ώρες) ένυδρο άλας με 1 μόριο H <sub>2</sub> O: 8,0 % κατ' ανώτατο όριο (120 °C, 4 ώρες) ένυδρο άλας με 3 μόρια H <sub>2</sub> O: 20,0 % κατ' ανώτατο όριο (120 °C, 4 ώρες) ένυδρο άλας με 4,5 μόρια H <sub>2</sub> O: 27,0 % κατ' ανώτατο όριο (120 °C, 4 ώρες)
Οξύτητα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηρού, εκφρασμένη σε γαλακτικό οξύ

**▼ B**

Φθόριο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αναγωγικές ουσίες	Απουσία αναγωγής του φελλιγγείου υγρού

**E 330 ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Το κιτρικό οξύ παράγεται από χυμό λεμονιού ή ανανά, με ζύμωση διαλυμάτων υδατανθράκων ή άλλων κατάλληλων μέσων με χρήση μυκήτων *Candida* spp. ή μη τοξινογόνων στελεχών *Aspergillus niger*

Αριθ. EINECS

201-069-1

Χημική ονομασία

Κιτρικό οξύ· 2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβοξυλικό οξύ· β-υδροξυ-τρικαρβαλλυλικό οξύ

Χημικός τύπος

α)  $C_6H_8O_7$  (άνυδρο)  
β)  $C_6H_8O_7 \cdot H_2O$  (μονοένυδρο)

Μοριακό βάρος

α) 192,13 (άνυδρο)  
β) 210,15 (μονοένυδρο)

Δοκιμασία

Το κιτρικό οξύ μπορεί να είναι άνυδρο ή να περιέχει ένα μόριο νερού. Περιεκτικότητα σε  $C_6H_8O_7$  τουλάχιστον 99,5 % επί άνυδρης ουσίας**Περιγραφή**

Το κιτρικό οξύ είναι λευκό ή άχρωμο, άοσμο, κρυσταλλικό στερεό με έντονα όξινη γεύση. Η μονοένυδρη ουσία αφυδατώνεται σε ξηρή ατμόσφαιρα

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Πολύ διαλυτό στο νερό· εύκολα διαλυτό σε αιθανόλη· διαλυτό σε αιθέρα

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό

Το άνυδρο κιτρικό οξύ περιέχει νερό σε αναλογία 0,5 % κατ' ανώτατο όριο, το μονοένυδρο κιτρικό οξύ περιέχει νερό σε αναλογία 8,8 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

Θεική τέφρα

0,05 % κατ' ανώτατο όριο έπειτα από πύρωση στους  $800 \pm 25$  °C

Αρσενικό

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

0,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, εκφραζόμενα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση

Ουσίες που απανθρακώνονται εύκολα

Σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 90 °C, θερμαίνονται 1 g κονιοποιημένου δείγματος και 10 ml θειικού οξέος πυκνότητας τουλάχιστον 98 % επί 1 ώρα στο σκοτάδι. Το διάλυμα πρέπει απλώς να χρωματιστεί ωχροκάστανο (υγρό σύγκρισης Matching Fluid K)

▼ **B****E 331 (i) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Μονοβασικό κιτρικό νάτριο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	242-734-6
Χημική ονομασία	Δισόξινο κιτρικό νάτριο· Δισόξινο άλας με νάτριο του 2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβοξυλικού οξέος
Χημικός τύπος	α) C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> O <sub>7</sub> Na (άνυδρο) β) C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> O <sub>7</sub> Na·H <sub>2</sub> O (μονοένυδρο)
Μοριακό βάρος	α) 214,11 (άνυδρο) β) 232,23 (μονοένυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή άχρωμοι κρύσταλλοι
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή κιτρικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
pH	Από 3,5 έως 3,8 (υδατικό διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	άνυδρο: 1,0 % κατ' ανώτατο όριο (140 °C, 0,5 ώρες) μονοένυδρο: 8,8 % κατ' ανώτατο όριο (180 °C, 4 ώρες)
Οξαλικά ιόντα	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 331 (ii) ΟΞΙΝΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Διβασικό κιτρικό νάτριο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	205-623-3
Χημική ονομασία	Όξινο κιτρικό νάτριο· Όξινο άλας με νάτριο του 2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβοξυλικού οξέος· Ένυδρο όξινο κιτρικό άλας νατρίου με 1,5 μόρια H <sub>2</sub> O
Χημικός τύπος	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O <sub>7</sub> Na <sub>2</sub> ·1,5H <sub>2</sub> O
Μοριακό βάρος	263,11
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή άχρωμοι κρύσταλλοι
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή κιτρικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
pH	Από 4,9 έως 5,2 (υδατικό διάλυμα 1 %)



**▼ B****Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	13,0 % κατ' ανώτατο όριο (180 °C, 4 ώρες)
Οξαλικά ιόντα	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 331 (iii) ΚΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ****Συνώνυμα**

Ουδέτερο κιτρικό νάτριο

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS	200-675-3
Χημική ονομασία	Κιτρικό νάτριο· Άλας με νάτριο του 2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβοξυλικού οξέος· Κιτρικό άλας νατρίου, άνυδρο, διένυδρο ή πενταένυδρο
Χημικός τύπος	Άνυδρο: $C_6H_5O_7Na_3$ Ένυδρο: $C_6H_5O_7Na_3 \cdot nH_2O$ (n = 2 ή 5)
Μοριακό βάρος	258,07 (άνυδρο) 294,10 (ένυδρο n = 2) 348,16 (ένυδρο n = 5)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί άνυδρης ουσίας

**Περιγραφή**

Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή άχρωμοι κρύσταλλοι

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή κιτρικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
pH	Από 7,5 έως 9,0 (υδατικό διάλυμα 5 %)

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	Άνυδρο: 1,0 % κατ' ανώτατο όριο (180 °C, 18 ώρες) Διένυδρο: 10,0 έως 13,0 % (180 °C, 18 ώρες) Πενταένυδρο: 30,3 % κατ' ανώτατο όριο (180 °C, 4 ώρες)
Οξαλικά ιόντα	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 332 (i) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ****Συνώνυμα**

Μονοβασικό κιτρικό κάλιο

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS	212-753-4
Χημική ονομασία	Δισόξινο κιτρικό κάλιο· Δισόξινο άλας με κάλιο του 2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβοξυλικού οξέος· Άνυδρο δισόξινο κιτρικό άλας καλίου

**▼ B**

Χημικός τύπος	$C_6H_7O_7K$
Μοριακό βάρος	230,21
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή, υγροσκοπική, κοκκώδης σκόνη ή διαφανείς κρύσταλλοι
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή κιτρικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
pH	Από 3,5 έως 3,8 (υδατικό διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	1,0 % κατ' ανώτατο όριο (180 °C, 4 ώρες)
Οξαλικά ιόντα	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 332 (ii) ΚΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Ουδέτερο κιτρικό κάλιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	212-755-5
Χημική ονομασία	Κιτρικό κάλιο· Άλας με κάλιο του 2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβοξυλικού οξέος· Μονοένυδρο κιτρικό άλας καλίου
Χημικός τύπος	$C_6H_5O_7K_3 \cdot H_2O$
Μοριακό βάρος	324,42
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή, υγροσκοπική, κοκκώδης σκόνη ή διαφανείς κρύσταλλοι
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή κιτρικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
pH	Από 7,5 έως 9,0 (υδατικό διάλυμα 5 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	6,0 % κατ' ανώτατο όριο (180 °C, 4 ώρες)
Οξαλικά ιόντα	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ B

## E 333 (i) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

<b>Συνώνυμα</b>	Μονοβασικό κιτρικό ασβέστιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Δισόξινο κιτρικό ασβέστιο· Δισόξινο άλας με ασβέστιο του 2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβοξυλικού οξέος· Μονοένυδρο δισόξινο κιτρικό άλας ασβεστίου
Χημικός τύπος	$(C_6H_7O_7)_2Ca \cdot H_2O$
Μοριακό βάρος	440,32
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,5 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή λεπτόκκοκη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή κιτρικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
pH	Από 3,2 έως 3,5 (υδατικό διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	7,0 % κατ' ανώτατο όριο (180 °C, 4 ώρες)
Οξαλικά ιόντα	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση)
Φθόριο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αργίλιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (μόνο εάν προστίθεται σε τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά) 200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (για όλες τις χρήσεις, εκτός από τις τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά)
Ανθρακικά ιόντα	Κατά τη διάλυση 1 g κιτρικού ασβεστίου σε 10 ml υδροχλωρικού οξέος 2 N, θα πρέπει να εκλύονται μόνον λίγες μεμονωμένες φυσαλλίδες

## E 333 (ii) ΟΞΙΝΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

<b>Συνώνυμα</b>	Διβασικό κιτρικό ασβέστιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Όξινο κιτρικό ασβέστιο· Όξινο άλας με ασβέστιο του 2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβοξυλικού οξέος· Τριένυδρο όξινο κιτρικό άλας ασβεστίου
Χημικός τύπος	$(C_6H_7O_7)_2Ca_2 \cdot 3H_2O$
Μοριακό βάρος	530,42
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,5 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή λεπτόκκοκη σκόνη

**▼ B****Ταυτοποίηση**

Δοκιμή κιτρικών ιόντων

Δοκιμή θετική

Δοκιμή ασβεστίου

Δοκιμή θετική

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση

20,0 % κατ' ανώτατο όριο (180 °C, 4 ώρες)

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση)

Φθόριο

30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)

Αρσενικό

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Αργίλιο

30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (μόνο εάν προστίθεται σε τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά)

200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (για όλες τις χρήσεις, εκτός από τις τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά)

Ανθρακικά ιόντα

Κατά τη διάλυση 1 g κιτρικού ασβεστίου σε 10 ml υδροχλωρικού οξέος 2 N, θα πρέπει να εκλύονται μόνον λίγες μεμονωμένες φυσαλλίδες

**E 333 (iii) ΚΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ****Συνώνυμα**

Ουδέτερο κιτρικό ασβέστιο

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS

212-391-7

Χημική ονομασία

Κιτρικό ασβέστιο· Άλας με ασβέστιο του 2-υδροξυ-1,2,3-προπανο-τρικαρβοξυλικού οξέος· Τετραένυδρο κιτρικό άλας ασβεστίου

Χημικός τύπος

 $(C_6H_6O_7)_2Ca_3 \cdot 4H_2O$ 

Μοριακό βάρος

570,51

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,5 % επί άνυδρης ουσίας

**Περιγραφή**

Λευκή λεπτόκοκκη σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή κιτρικών ιόντων

Δοκιμή θετική

Δοκιμή ασβεστίου

Δοκιμή θετική

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση

14,0 % κατ' ανώτατο όριο (180 °C, 4 ώρες)

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση)

Φθόριο

30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)

Αρσενικό

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ B**

Αργίλιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (μόνο εάν προστίθεται σε τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά) 200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (για όλες τις χρήσεις, εκτός από τις τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά)
Ανθρακικά ιόντα	Κατά τη διάλυση 1 g κιτρικού ασβεστίου σε 10 ml υδροχλωρικού οξέος 2 N, θα πρέπει να εκλύονται μόνον λίγες μεμονωμένες φυσαλλίδες

**E 334 L(+)-ΤΡΥΓΙΚΟ ΟΞΥ, ΤΡΥΓΙΚΟ ΟΞΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	201-766-0
Χημική ονομασία	L-Τρυγικό οξύ· L-2,3-διυδροξυ-βουτανοδικαρβονικό οξύ· d-α, β-Διδυδροξυ-ηλεκτρικό οξύ
Χημικός τύπος	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>6</sub>
Μοριακό βάρος	150,09
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμο ή ημιδιαφανές κρυσταλλικό στερεό ή λευκή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	Από 168 °C έως 170 °C
Δοκιμή τρυγικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Ειδική στροφική ικανότητα	[α] <sub>D</sub> <sup>20</sup> μεταξύ + 11,5° και + 13,5° (υδατικό διάλυμα 20 % w/v)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (υπεράνω P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 3 ώρες)
Θεϊκή τέφρα	1 000 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (έπειτα από πύρωση στους 800 ± 25 °C)
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Οξαλικά ιόντα	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση

**E 335 (i) ΟΞΙΝΟ ΤΡΥΓΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Όξινο άλας με νάτριο του L-(+)-τρυγικού οξέος
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Όξινο άλας με νάτριο του L-2,3-διυδροξυ-βουτανοδικαρβονικού οξέος· ΈΜονοένυδρο όξινο L-(+)-τρυγικό νάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> O <sub>6</sub> Na·H <sub>2</sub> O
Μοριακό βάρος	194,05
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Διαφανείς άχρωμοι κρύσταλλοι

**▼ B****Ταυτοποίηση**

Δοκιμή τρυγικών ιόντων

Δοκιμή θετική

Δοκιμή νατρίου

Δοκιμή θετική

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση

10,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 335 (ii) ΤΡΥΓΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS

212-773-3

Χημική ονομασία

L-Τρυγικό νάτριο· (+)-Τρυγικό νάτριο· Άλας με νάτριο του (+)-2,3-διυδροξυ-βουτανοδικαρβονικού οξέος· Έλιένυδρο L-(+)-τρυγικό νάτριο με 2 μόρια H<sub>2</sub>O

Χημικός τύπος

C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>6</sub>Na<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O

Μοριακό βάρος

230,8

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί άνυδρης ουσίας

**Περιγραφή**

Διαφανείς άχρωμοι κρύσταλλοι

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή τρυγικών ιόντων

Δοκιμή θετική

Δοκιμή νατρίου

Δοκιμή θετική

Διαλυτότητα

1 gr είναι αδιάλυτο σε 3 ml νερού. Αδιάλυτο σε αιθανόλη

pH

Από 7,0 έως 7,5 (υδατικό διάλυμα 1 %)

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση

17,0 % κατ' ανώτατο όριο (150 °C, 4 ώρες)

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 336 (i) ΟΞΙΝΟ ΤΡΥΓΙΚΟ ΚΑΛΙΟ****Συνώνυμα**

Μονοβασικό τρυγικό κάλιο

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Ανυδρο όξινο L-(+)-τρυγικό κάλιο· όξινο άλας με κάλιο του L-2,3-διυδροξυ-βουτανοδικαρβονικού οξέος

**▼ B**

Χημικός τύπος	C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> O <sub>6</sub> K
Μοριακό βάρος	188,16
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή κρυσταλλική ή κοκκώδης σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή τρυγικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Σημείο τήξης	230 °C
pH	3,4 (1 % υδατικό διάλυμα)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	1,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)
Οξαλικά ιόντα	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 336 (ii) ΤΡΥΓΙΚΟ ΚΑΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Ουδέτερο τρυγικό κάλιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	213-067-8
Χημική ονομασία	Άλας με κάλιο του L-2,3-διυδροξυ-βουτανοδικαρβονικού οξέος· Ένυδρο L-(+)-τρυγικό κάλιο με 1/2 μόριο H <sub>2</sub> O
Χημικός τύπος	C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>6</sub> K <sub>2</sub> ·½H <sub>2</sub> O
Μοριακό βάρος	235,2
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή κρυσταλλική ή κοκκώδης σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή τρυγικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
pH	Από 7,0 έως 9,0 (υδατικό διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	4,0 % κατ' ανώτατο όριο (150 °C, 4 ώρες)
Οξαλικά ιόντα	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ B**E 337 ΤΡΥΓΙΚΟ ΚΑΛΙΟΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	L-(+)-Τρυγικό καλιονάτριο· άλας του Rochelle· άλας του Seignette
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	206-156-8
Χημική ονομασία	Διπλό άλας με κάλιο και νάτριο του L-2,3-διυδροξυ-βουτανοδικαρβονικού οξέος· L-(+)-τρυγικό καλιονάτριο
Χημικός τύπος	$C_4H_4O_6KNa \cdot 4H_2O$
Μοριακό βάρος	282,23
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή τρυγικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	1 g είναι διαλυτό σε 1 ml νερού. Αδιάλυτο σε αιθανόλη
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	70 - 80 °C
pH	Από 6,5 έως 8,5 (υδατικό διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	26,0 % κατ' ανώτατο όριο και τουλάχιστον 21,0 % (150 °C, 3 ώρες)
Οξαλικά ιόντα	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 338 ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	Ορθοφωσφορικό οξύ
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-633-2
Χημική ονομασία	Φωσφορικό οξύ
Χημικός τύπος	$H_3PO_4$
Μοριακό βάρος	98,00
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 67,0 % και 85,7 % κατ' ανώτατο όριο Το φωσφορικό οξύ διατίθεται στο εμπόριο ως υδατικό διάλυμα σε διάφορες συγκεντρώσεις.
<b>Περιγραφή</b>	Διαυγές, άχρωμο, παχύρρευστο υγρό
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή οξέος	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική



**▼ B**

<b>Καθαρότητα</b>	
Πτητικά οξέα	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (ως οξικό οξύ)
Ιόντα χλωρίου	200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε χλώριο)
Νιτρικά ιόντα	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (ως NaNO <sub>3</sub> )
Θειικά ιόντα	1 500 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (ως CaSO <sub>4</sub> )
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Σημείωση: Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν υδατικό διάλυμα 75 %

**E 339 (i) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Δισόξινο ορθοφωσφορικό νάτριο· μονοβασικό φωσφορικό νάτριο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-449-2
Χημική ονομασία	Δισόξινο φωσφορικό νάτριο
Χημικός τύπος	Άνυδρο: NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> Μονοένυδρο: NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> · H <sub>2</sub> O Διένυδρο: NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> · 2H <sub>2</sub> O
Μοριακό βάρος	Άνυδρο: 119,98 Μονοένυδρο: 138,00 Διένυδρο: 156,01
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> τουλάχιστον 97 %, ύστερα από ξήρανση στους 60 °C επί μία ώρα και, στη συνέχεια, στους 105 °C επί τέσσερις ώρες Περιεκτικότητα σε P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> από 58,0 % έως 60,0 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκό, άοσμο, ελαφρώς ρευστοποιούμενο στερεό σε μορφή σκόνης, κρυστάλλων ή κόκκων
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό. Αδιάλυτο στην αιθανόλη ή τον αιθέρα
pH	Από 4,1 έως 5,0 (υδατικό διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	Το άνυδρο άλας παρουσιάζει απώλεια βάρους 2,0 %, κατ' ανώτατο όριο, το μονοένυδρο 15,0 % κατ' ανώτατο όριο και το διένυδρο 25 % κατ' ανώτατο όριο (60 °C, 1 ώρα και, στη συνέχεια, 105 °C, 4 ώρες)
Ουσίες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)

**▼ B**

Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 339 (ii) ΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Όξινο ορθοφωσφορικό νάτριο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-448-7
Χημική ονομασία	Όξινο φωσφορικό νάτριο· όξινο ορθοφωσφορικό νάτριο
Χημικός τύπος	Άνυδρο: $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ Ένυδρο: $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (n = 2,7 ή 12)
Μοριακό βάρος	141,98 (άνυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ τουλάχιστον 98 %, ύστερα από ξήρανση στους 40 °C επί τρεις ώρες και, στη συνέχεια, στους 105 °C επί πέντε ώρες Περιεκτικότητα σε $\text{P}_2\text{O}_5$ από 49 % έως 51 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Το άνυδρο όξινο φωσφορικό νάτριο είναι λευκή, υγροσκοπική άοσμη σκόνη. Από τις διαθέσιμες εφυδατωμένες μορφές, το διένυδρο άλας είναι λευκό, κρυσταλλικό, άοσμο στερεό, το επταένυδρο άλας είναι λευκό, άοσμο στερεό σε μορφή αφυδατούμενων στην ατμόσφαιρα κρυστάλλων ή κοκκώδους σκόνης και το δωδεκαένυδρο είναι λευκό αφυδατούμενο στην ατμόσφαιρα, άοσμο στερεό σε μορφή σκόνης ή κρυστάλλων
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό. Αδιάλυτο σε αιθανόλη
pH	Από 8,4 έως 9,6 (υδατικό διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	Το άνυδρο άλας παρουσιάζει απώλεια βάρους 5,0 % κατ' ανώτατο όριο, το διένυδρο 22,0 % κατ' ανώτατο όριο, το επταένυδρο 50 % κατ' ανώτατο όριο, το δωδεκαένυδρο 61,0 % κατ' ανώτατο όριο (40 °C, 3 ώρες και, στη συνέχεια, 105 °C, 5 ώρες)
Ουσίες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 339 (iii) ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Ουδέτερο φωσφορικό νάτριο· ορθοφωσφορικό νάτριο
-----------------	---

## ▼ B

<b>Ορισμός</b>	Το φωσφορικό νάτριο λαμβάνεται από υδατικά διαλύματα και κρυσταλλώνεται ως άνυδρο άλας και με 1/2, 1, 6, 8 ή 12 μόρια H <sub>2</sub> O. Το δωδεκαένυδρο άλας κρυσταλλώνεται πάντα από υδατικά διαλύματα με περίσσεια υδροξειδίου του νατρίου. Περιέχει ¼ μορίου NaOH
Αριθ. EINECS	231-509-8
Χημική ονομασία	Φωσφορικό νάτριο· ορθοφωσφορικό νάτριο
Χημικός τύπος	Άνυδρο: Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> Ένυδρο: Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> nH <sub>2</sub> O (n = 1/2, 1, 6, 8, ή 12)
Μοριακό βάρος	163,94 (άνυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα του άνυδρου φωσφορικού νατρίου και των εφυδατωμένων μορφών του, με εξαίρεση το δωδεκαένυδρο, σε Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> τουλάχιστον 97,0 %, υπολογιζόμενη επί ξηράς ουσίας. Περιεκτικότητα του δωδεκαένυδρου άλατος σε Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> τουλάχιστον 92,0 %, επί πυρωμένης ουσίας Περιεκτικότητα σε P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> από 40,5 % έως 43,5 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμοι κρύσταλλοι, κόκκοι ή κρυσταλλική σκόνη λευκού χρώματος
<b>Τυποποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό. Αδιάλυτο σε αιθανόλη
pH	Από 11,5 έως 12,5 (υδατικό διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την καύση	Οι απώλειες βάρους ύστερα από ξήρανση στους 120 °C επί δύο ώρες και, στη συνέχεια, πύρωση στους 800 °C περίπου επί 30 λεπτά, είναι για το άνυδρο άλας 2,0 % κατ' ανώτατο όριο, για το μονοένυδρο 11,0 % κατ' ανώτατο όριο, για το δωδεκαένυδρο από 45,0 % έως 58,0 %
Ουσίες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 340 (i) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Δισόξινο ορθοφωσφορικό κάλιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-913-4
Χημική ονομασία	Δισόξινο φωσφορικό κάλιο· δισόξινο ορθοφωσφορικό κάλιο
Χημικός τύπος	KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>
Μοριακό βάρος	136,09

**▼ B**

Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98,0 % μετά από ξήρανση στους 105 °C επί τέσσερις ώρες
	Περιεκτικότητα σε P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> από 51,0 % έως 53,0 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμοι, άχρωμοι κρύσταλλοι ή άοσμη, λευκή, κοκκώδης ή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό. Αδιάλυτο σε αιθανόλη
pH	Από 4,2 έως 4,8 (υδατικό διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	2,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)
Ουσίες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 340 (ii) ΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Όξινο ορθοφωσφορικό κάλιο· διβασικό φωσφορικό κάλιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-834-5
Χημική ονομασία	Όξινο φωσφορικό κάλιο· όξινο ορθοφωσφορικό κάλιο
Χημικός τύπος	K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>
Μοριακό βάρος	174,18
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % μετά από ξήρανση στους 105 °C επί τέσσερις ώρες Περιεκτικότητα σε P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> από 40,3 % έως 41,5 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Κοκκώδης σκόνη, κρύσταλλοι ή μάζες, άχρωμα ή λευκά· ρευστοποιούμενη ουσία, υγροσκοπική
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό. Αδιάλυτο σε αιθανόλη
pH	Από 8,7 έως 9,4 (υδατικό διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	2,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)

**▼ B**

Ουσίες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 340 (iii) ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Ουδέτερο φωσφορικό κάλιο· ορθοφωσφορικό κάλιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-907-1
Χημική ονομασία	Φωσφορικό κάλιο· Ορθοφωσφορικό κάλιο
Χημικός τύπος	Άνυδρο: $K_3PO_4$ Ένυδρο: $K_3PO_4 \cdot nH_2O$ (n = 1 ή 3)
Μοριακό βάρος	212,27 (άνυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97 % επί πυρωμένης ουσίας Περιεκτικότητα σε $P_2O_5$ από 30,5 % έως 34,0 % επί πυρωμένης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμοι ή λευκοί, άοσμοι, υγροσκοπικοί κρύσταλλοι ή κόκκοι. Στις διαθέσιμες εφυδατωμένες μορφές περιλαμβάνονται το μονοένυδρο και το τριένυδρο άλας
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό. Αδιάλυτο σε αιθανόλη
pH	Από 11,5 έως 12,3 (διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την καύση	Άνυδρο: 3,0 % κατ' ανώτατο όριο· Ένυδρο: 23,0 % κατ' ανώτατο όριο (προσδιοριζόμενη με ξήρανση στους 105 °C επί μία ώρα και, στη συνέχεια, με πύρωση στους 800 °C ± 25 °C περίπου επί 30 λεπτά)
Ουσίες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 341 (i) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Μονοβασικό φωσφορικό ασβέστιο· δισόξινο ορθοφωσφορικό ασβέστιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-837-1

**▼ B**

Χημική ονομασία	Δισόξινο φωσφορικό ασβέστιο
Χημικός τύπος	Άνυδρο: $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ Μονοένυδρο: $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
Μοριακό βάρος	234,05 (άνυδρο) 252,08 (μονοένυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 % επί ξηράς ουσίας Περιεκτικότητα σε $\text{P}_2\text{O}_5$ από 55,5 % έως 61,1 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Κοκκώδης σκόνη ή λευκοί ρευστοποιούμενοι κρύσταλλοι ή κόκκοι
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Περιεκτικότητα σε CaO	Από 23,0 % έως 27,5 % (άνυδρο) Από 19,0 % έως 24,8 % (μονοένυδρο)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	Άνυδρο: 14 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες) Μονοένυδρο: 17,5 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)
Απώλεια κατά την καύση	Άνυδρο: 17,5 % κατ' ανώτατο όριο (ύστερα από πύρωση στους 800 °C ± 25 °C επί 30 λεπτά) Μονοένυδρο: 25,0 % κατ' ανώτατο όριο (προσδιοριζόμενη με ξήρανση στους 105 °C επί μία ώρα και, στη συνέχεια, με πύρωση στους 800 °C ± 25 °C περίπου επί 30 λεπτά)
Φθόριο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αργίλιο	70 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (μόνο εάν προστίθεται σε τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά) 200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (για όλες τις χρήσεις, εκτός από τις τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά)

**E 341 (ii) ΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Διβασικό φωσφορικό ασβέστιο· όξινο ορθοφωσφορικό ασβέστιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-826-1
Χημική ονομασία	Όξινο φωσφορικό ασβέστιο· όξινο ορθοφωσφορικό ασβέστιο·
Χημικός τύπος	Άνυδρο: $\text{CaHPO}_4$ Διένυδρο: $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Μοριακό βάρος	136,06 (άνυδρο) 172,09 (διένυδρο)

**▼ B**

Δοκιμασία	Το όξινο φωσφορικό ασβέστιο περιέχει $\text{CaHPO}_4$ σε αναλογία τουλάχιστον 98 % και κατ' ανώτατο όριο ίση με το ισοδύναμο του 102 % ύστερα από ξήρανση στους 200 °C επί τρεις ώρες
<b>Περιγραφή</b>	Περιεκτικότητα σε $\text{P}_2\text{O}_5$ από 50,0 % έως 52,5 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Ταυτοποίηση</b>	Κρύσταλλοι ή κόκκοι, κοκκώδης σκόνη ή σκόνη, χρώματος λευκού
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Μέτρια διαλυτό στο νερό. Αδιάλυτο σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την καύση	8,5 % κατ' ανώτατο όριο (άνυδρο) ή 26,5 % (ένυδρο) ύστερα από πύρωση στους 800 °C ± 25 °C επί 30 λεπτά
Φθόριο	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αργίλιο	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για την άνυδρη μορφή και 80 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για την διένυδρη μορφή (μόνο εάν προστίθεται σε τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά)
	600 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για την άνυδρη μορφή και 500 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για την διένυδρη μορφή (για όλες τις χρήσεις εκτός από τις τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά). Εφαρμόζεται έως την 31η Μαρτίου 2015.
	200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για την άνυδρη μορφή και 500 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για την διένυδρη μορφή (για όλες τις χρήσεις εκτός από τις τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά). Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2015.

**E 341 (iii) ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Ουδέτερο φωσφορικό ασβέστιο· ορθοφωσφορικό ασβέστιο· υδροξυφωσφορικό ασβέστιο· υδροξυαπατίτης
<b>▼ M31</b>	
<b>Ορισμός</b>	Το φωσφορικό ασβέστιο είναι μεταβλητό μείγμα φωσφορικών αλάτων του ασβεστίου, το οποίο λαμβάνεται με εξουδετέρωση φωσφορικού οξέος με υδροξείδιο του ασβεστίου ή ανθρακικό ασβέστιο και του οποίου η κατά προσέγγιση σύνθεση είναι: $10\text{CaO} \cdot 3\text{P}_2\text{O}_5 \cdot \text{H}_2\text{O}$
<b>▼ B</b>	
Αριθ. EINECS	235-330-6 (υδροξυφωσφορικό ασβέστιο) 231-840-8 (ορθοφωσφορικό ασβέστιο)
Χημική ονομασία	Υδροξυφωσφορικό ασβέστιο· Φωσφορικό ασβέστιο
Χημικός τύπος	$\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3 \cdot \text{OH}$ ή $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
Μοριακό βάρος	502 ή 310
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 90 % επί πυρωμένης ουσίας Περιεκτικότητα σε $\text{P}_2\text{O}_5$ από 38,5 % έως 48,0 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή, άοσμη σκόνη, σταθερή στον ατμοσφαιρικό αέρα

**▼ B**

<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Πρακτικά αδιάλυτο στο νερό. Αδιάλυτο στην αιθανόλη, διαλυτό σε αραιό υδροχλωρικό και νιτρικό οξύ
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την καύση	8 % κατ' ανώτατο όριο ύστερα από πύρωση στους 800 °C ± 25 °C επί 0,5 ώρες
Φθόριο	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αργίλιο	150 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (μόνο εάν προστίθεται σε τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά) 500 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (για όλες τις χρήσεις, εκτός από τις τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά). Εφαρμόζεται έως την 31η Μαρτίου 2015 200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (για όλες τις χρήσεις, εκτός από τις τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά). Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2015.

**E 343 (i) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Φωσφορικό μαγνήσιο, μονοβασικό· δισόξινο ορθοφωσφορικό μαγνήσιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	236-004-6
Χημική ονομασία	Δισόξινο φωσφορικό μαγνήσιο
Χημικός τύπος	$Mg(H_2PO_4)_2 \cdot nH_2O$ (όπου $n = 0$ έως 4)
Μοριακό βάρος	218,30 (άνυδρο)
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 51,0 % ύστερα από πύρωση, υπολογιζόμενο ως $P_2O_5$ επί πυρωμένης ουσίας (800 °C ± 25 °C επί 30 λεπτά)
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή, άοσμη, κρυσταλλική σκόνη, λίγο διαλυτή στο νερό
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή μαγνησίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Περιεκτικότητα σε MgO	21,5 % κατ' ανώτατο όριο ύστερα από πύρωση ή επί άνυδρης ουσίας (105 °C, 4 ώρες)
<b>Καθαρότητα</b>	
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (ως φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο



▼ **B****E 343 (ii) ΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Φωσφορικό μαγνήσιο, διβασικό· όξινο ορθοφωσφορικό μαγνήσιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-823-5
Χημική ονομασία	Όξινο φωσφορικό μαγνήσιο
Χημικός τύπος	$MgHPO_4 \cdot nH_2O$ (όπου $n = 0 - 3$ )
Μοριακό βάρος	120,30 (άνυδρο)
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 96 % ύστερα από πύρωση ( $800\text{ }^\circ\text{C} \pm 25\text{ }^\circ\text{C}$ επί 30 λεπτά)
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή, άοσμη, κρυσταλλική σκόνη, λίγο διαλυτή στο νερό
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή μαγνησίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Περιεκτικότητα σε MgO	Τουλάχιστον 33,0 % επί άνυδρης ουσίας ( $105\text{ }^\circ\text{C}$ , 4 ώρες)
<b>Καθαρότητα</b>	
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (ως φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 350 (i) ΜΗΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Άλας νατρίου του μηλικού οξέος
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	DL-μηλικό νάτριο· άλας νατρίου του υδροξυβουτανοδικαρβονικού οξέος
Χημικός τύπος	Ημιένυδρο: $C_4H_4Na_2O_5 \cdot \frac{1}{2} H_2O$ Τριένυδρο: $C_4H_4Na_2O_5 \cdot 3H_2O$
Μοριακό βάρος	Ημιένυδρο: 187,05 Τριένυδρο: 232,10
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98,0 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Κρυσταλλική σκόνη ή σβώλοι χρώματος λευκού
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή 1,2-δικαρβοξυλικού οξέος	Δοκιμή θετική
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Σχηματισμός αζωχρώματος	Ναι
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό

**▼ B****Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	Ημιένυδρο: 7,0 % κατ' ανώτατο όριο (130 °C, 4 ώρες) Τριένυδρο: 20,5 % - 23,5 % (130 °C, 4 ώρες)
Αλκαλικότητα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο ως Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>
Φουμαρικό οξύ	1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Μηλεϊνικό οξύ	0,05 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 350 (ii) ΟΞΙΝΟ ΜΗΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ****Συνώνυμα**

Όξινο άλας νατρίου του DL-μηλικού οξέος

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Όξινο DL-μηλικό νάτριο· όξινο 2-DL-υδροξυ-ηλεκτρικό νάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> NaO <sub>5</sub>
Μοριακό βάρος	156,07
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 % επί άνυδρης ουσίας

**Περιγραφή**

Λευκή σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή 1,2-δικαρβοξυλικού οξέος	Δοκιμή θετική
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Σχηματισμός αζωχρώματος	Ναι

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	2,0 % κατ' ανώτατο όριο (110 °C, 3 ώρες)
Μηλεϊνικό οξύ	0,05 % κατ' ανώτατο όριο
Φουμαρικό οξύ	1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 351 ΜΗΛΙΚΟ ΚΑΛΙΟ****Συνώνυμα**

Άλας καλίου του μηλικού οξέος

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	DL-μηλικό κάλιο· άλας καλίου του υδροξυβουτανοδικαρβονικού οξέος
Χημικός τύπος	C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> K <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
Μοριακό βάρος	210,27

**▼ B**

Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 59,5 %
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμο ή σχεδόν άχρωμο υδατικό διάλυμα
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή 1,2-δικαρβοξυλικού οξέος	Δοκιμή θετική
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Σχηματισμός αζωχρώματος	Ναι
<b>Καθαρότητα</b>	
Αλκαλικότητα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο ως $K_2CO_3$
Φουμαρικό οξύ	1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Μηλεϊνικό οξύ	0,05 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>E 352 (i) ΜΗΛΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ</b>	
<b>Συνώνυμα</b>	Άλας ασβεστίου του μηλικού οξέος
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	DL-μηλικό ασβέστιο· α-υδροξυηλεκτρικό ασβέστιο· άλας ασβεστίου του υδροξυβουτανοδικαρβονικού οξέος
Χημικός τύπος	$C_4H_5CaO_5$
Μοριακό βάρος	172,14
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,5 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμές μηλικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή 1,2-δικαρβοξυλικού οξέος	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Σχηματισμός αζωχρώματος	Ναι
Διαλυτότητα	Λίγο διαλυτό στο νερό
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	2 % κατ' ανώτατο όριο (100 °C, 3 ώρες)
Αλκαλικότητα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο ως $CaCO_3$
Μηλεϊνικό οξύ	0,05 % κατ' ανώτατο όριο
Φουμαρικό οξύ	1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **B****E 352 (ii) ΟΞΙΝΟ ΜΗΛΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Όξινο άλας ασβεστίου του DL-μηλικού οξέος
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Όξινο DL-μηλικό ασβέστιο· όξινο 2-DL-υδροξυ-ηλεκτρικό ασβέστιο
Χημικός τύπος	(C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> Ca
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,5 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή 1,2-δικαρβοξυλικού οξέος	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Σχηματισμός αζωχρώματος	Ναι
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	2,0 % κατ' ανώτατο όριο (110 °C, 3 ώρες)
Μηλεϊνικό οξύ	0,05 % κατ' ανώτατο όριο
Φουμαρικό οξύ	1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 353 ΜΕΤΑΤΡΥΓΙΚΟ ΟΞΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	Διτρυγικό οξύ
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Μετατρυγικό οξύ
Χημικός τύπος	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>6</sub>
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 99,5 %
<b>Περιγραφή</b>	Μορφή κρυστάλλων ή σκόνης με λευκό ή υποκίτρινο χρώμα. Πολύ υγροσκοπικό με ασθενή οσμή καραμέλας
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Πολύ διαλυτό στο νερό και στην αιθανόλη
Δοκιμή ταυτοποίησης	Σε δοκιμαστικό σωλήνα φέρεται δείγμα 1 έως 10 mg της ουσίας αυτής και προστίθενται 2 ml πυκνού θειικού οξέος και 2 σταγόνες του αντιδραστηρίου θειορεζορκίνη. Όταν το σύνολο θερμανθεί στους 150 °C, εμφανίζεται έντονο ιώδες χρώμα
<b>Καθαρότητα</b>	
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ B**

Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 354 ΤΡΥΓΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	L-Τρυγικό ασβέστιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Διένυδρο L(+)-2,3-διυδροξυβουτανοδικαρβονικό ασβέστιο
Χημικός τύπος	$C_4H_4CaO_6 \cdot 2H_2O$
Μοριακό βάρος	224,18
Δοκιμασία	98,0 % ή περισσότερο
<b>Περιγραφή</b>	Λεπτόκοκκη κρυσταλλική σκόνη με λευκό ή υπόλευκο χρώμα
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Λίγο διαλυτό στο νερό. Διαλυτότητα περίπου 0,01 g/100 ml νερού (20 °C). Μέτρια διαλυτό στην αιθανόλη. Λίγο διαλυτό στον διαιθυλαιθέρα. Διαλυτό στα οξέα
Ειδική στροφική ικανότητα	$[\alpha]_D^{20} + 7,0^\circ$ έως $+ 7,4^\circ$ (0,1 % σε διάλυμα HCl 1N )
pH	Από 6,0 έως 9,0 (πηκτό εναιώρημα 5 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Θεικά ιόντα	1 g/kg κατ' ανώτατο όριο (ως H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 355 ΑΛΙΠΙΚΟ ΟΞΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	204-673-3
Χημική ονομασία	Εξανοδικαρβονικό οξύ· 1,4-βουτανοδικαρβοξυλικό οξύ
Χημικός τύπος	$C_6H_{10}O_4$
Μοριακό βάρος	146,14
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,6 %
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμοι κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη λευκού χρώματος
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	151,5 - 154,0 °C
Διαλυτότητα	Λίγο διαλυτό στο νερό. Εύκολα διαλυτό σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Θεική τέφρα	20 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ B**

Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 356 ΑΔΙΠΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	231-293-5
Χημική ονομασία	Αδιπικό νάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>4</sub>
Μοριακό βάρος	190,11
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 % (επί άνυδρης ουσίας)

**Περιγραφή**

Άοσμοι κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη λευκού χρώματος

**Ταυτοποίηση**

Πεδίο τιμών σημείου τήξης	151 °C - 152 °C (για το αδιπικό οξύ)
Διαλυτότητα	Περίπου 50 g/100 ml νερού (20 °C)
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό	3 % κατ' ανώτατο όριο (Karl Fischer)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 357 ΑΔΙΠΙΚΟ ΚΑΛΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	242-838-1
Χημική ονομασία	Αδιπικό κάλιο
Χημικός τύπος	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> K <sub>2</sub> O <sub>4</sub>
Μοριακό βάρος	222,32
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 % (επί άνυδρης ουσίας)

**Περιγραφή**

Άοσμοι κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη λευκού χρώματος

**Ταυτοποίηση**

Πεδίο τιμών σημείου τήξης	151 °C - 152 °C (για το αδιπικό οξύ)
Διαλυτότητα	Περίπου 60 g/100 ml νερού (20 °C)
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική

**Καθαρότητα**

Νερό	3 % κατ' ανώτατο όριο (Karl Fischer)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ B****E 363 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΞΥ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	203-740-4
Χημική ονομασία	Βουτανοδικαρβονικό οξύ
Χημικός τύπος	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub>
Μοριακό βάρος	118,09
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 %

**Περιγραφή**

Άχρωμοι ή λευκοί, άοσμοι κρύσταλλοι

**Ταυτοποίηση**

Πεδίο τιμών σημείου τήξης	185,0 °C - 190,0 °C
---------------------------	---------------------

**Καθαρότητα**

Υπόλειμμα κατά την πύρωση	0,025 % κατ' ανώτατο όριο (800 °C, 15 min)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 380 ΚΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ****Συνώνυμα**

Ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS	222-394-5
Χημική ονομασία	Τριαμμώνιο άλας του 2-υδροξυπροπανο-1,2,3-τρικαρβοξυλικού οξέος
Χημικός τύπος	C <sub>6</sub> H <sub>17</sub> N <sub>3</sub> O <sub>7</sub>
Μοριακό βάρος	243,22
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,0 %

**Περιγραφή**

Λευκοί έως υπόλευκοι κρύσταλλοι ή σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή αμμωνίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή κιτρικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό

**Καθαρότητα**

Οξαλικά ιόντα	0,04 % κατ' ανώτατο όριο (ως οξαλικό οξύ)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο



### E 385 ΑΙΘΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΟΤΕΤΡΑΟΞΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΝΑΤΡΙΟ

<b>Συνώνυμα</b>	Άλας με ασβέστιο και νάτριο του EDTA· βερσενικό ασβεστιονάτριο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	200-529-9
Χημική ονομασία	N,N'-1,2-Αιθανοδιυλο-δις[N-(καρβοξυμεθυλο)-γλυκινικό] [(4-)-O, O',ON <sup>N</sup> , O <sup>N</sup> ]ασβεστιο-(2)-δινάτριο· αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό ασβεστιονάτριο· (αιθυλενοδινιτριλο)τετραοξικό ασβεστιονάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> O <sub>8</sub> CaN <sub>2</sub> Na <sub>2</sub> ·2H <sub>2</sub> O
Μοριακό βάρος	410,31
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί άοσμοι κρυσταλλικοί κόκκοι ή λευκή έως υπόλευκη σκόνη, ελαφρώς υγροσκοπικά
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Χηλική συμπλοκοποίηση μεταλλικών ιόντων	Ναι
pH	Από 6,5 έως 7,5 (διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	5-13 % (μέθοδος Karl Fischer)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

### E 392 ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟΥ

<b>Συνώνυμα</b>	Εκχύλισμα φύλλου δενδρολίβανου (αντιοξειδωτικό)
<b>Ορισμός</b>	Τα εκχύλισμα δενδρολίβανου περιέχουν διάφορα συστατικά που αποδεδειγμένα επιτελούν αντιοξειδωτικές λειτουργίες. Τα εν λόγω συστατικά υπάρχουν ιδίως στα φαινολικά οξέα, τα φλαβονοειδή και τα διτερπενοειδή. Εκτός από τις αντιοξειδωτικές ενώσεις, τα εκχύλισμα μπορούν επίσης να περιέχουν τριτερπένια και ύλες εκχυλίσματος με οργανικό διαλύτη που εξειδικεύονται στην ακόλουθη προδιαγραφή.
Αριθ. EINECS	283-291-9
Χημική ονομασία	Εκχύλισμα δενδρολίβανου ( <i>Rosmarinus officinalis</i> )
<b>Περιγραφή</b>	Το αντιοξειδωτικό εκχύλισμα φύλλων δενδρολίβανου παρασκευάζεται με εκχύλιση των φύλλων του φυτού <i>Rosmarinus officinalis</i> , με σύστημα διαλύτη εγκεκριμένο για τρόφιμα. Είναι δυνατόν να ακολουθήσουν απόσπηση και αποχρωματισμός. Τα εκχύλισμα μπορούν να τυποποιηθούν.
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Αντιοξειδωτικές ενώσεις αναφοράς: φαινολικά διτερπένια	Καρνοσικό οξύ (C <sub>20</sub> H <sub>28</sub> O <sub>4</sub> ) και καρνοσόλη (C <sub>20</sub> H <sub>26</sub> O <sub>4</sub> ) (που συνιστούν τουλάχιστον το 90 % των συνολικών φαινολικών διτερπενίων)



**▼ B**

Βασικές πτητικές ουσίες αναφοράς	Βορνεόλη, οξικό βορνύλιο, καμφορά, 1,8-κινεόλη, βερβενόνη
Πυκνότητα	> 0,25 g/ml
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο στο νερό
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	< 5 %
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**1 – Εκχυλίσματα δενδρολίβανου που παράγονται από αποξηραμένα φύλλα δενδρολίβανου με εκχύλιση με ακετόνη.**

<b>Περιγραφή</b>	Τα εκχυλίσματα δενδρολίβανου παρασκευάζονται από αποξηραμένα φύλλα δενδρολίβανου με εκχύλιση με ακετόνη, διήθηση, καθαρισμό και εξάτμιση του διαλύτη. Ακολουθεί ξήρανση και κοσκίνιση ώστε να ληφθεί λεπτόκοκκη σκόνη ή υγρό.
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ενώσεις αναφοράς	≥ 10 % w/w, ως σύνολο καρνοσικού οξέος και καρνοσόλης
Λόγος αντιοξειδωτικών/πτητικών ουσιών	(Συνολικό ποσοστό % w/w καρνοσικού οξέος και καρνοσόλης) ≥ 15 (% w/w βασικών πτητικών ουσιών αναφοράς)* (* ως ποσοστό των ολικών πτητικών ουσιών στο εκχύλισμα, μετρούμενο με αεριοχρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MSD))
<b>Καθαρότητα</b>	
Υπολειμματικοί διαλύτες	Ακετόνη: 500 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**2 – Εκχυλίσματα δενδρολίβανου που παρασκευάζονται με εκχύλιση αποξηραμένων φύλλων με υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα.**

<b>Περιγραφή</b>	Τα εκχυλίσματα δενδρολίβανου παράγονται από αποξηραμένα φύλλα δενδρολίβανου με εκχύλιση με υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα με μικρή ποσότητα αιθανόλης ως μέσο παράσυρσης.
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ενώσεις αναφοράς	≥ 13 % w/w, ως σύνολο καρνοσικού οξέος και καρνοσόλης
Λόγος αντιοξειδωτικών/πτητικών ουσιών	(Συνολικό ποσοστό % w/w καρνοσικού οξέος και καρνοσόλης) ≥ 15 (% w/w βασικών πτητικών ουσιών αναφοράς)* (* ως ποσοστό των ολικών πτητικών ουσιών στο εκχύλισμα, μετρούμενο με αεριοχρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MSD))
<b>Καθαρότητα</b>	
Υπολειμματικοί διαλύτες	Αιθανόλη: 2 % κατ' ανώτατο όριο

**3 – Εκχυλίσματα δενδρολίβανου που παρασκευάζονται από αποσημασμένο αιθανολικό εκχύλισμα δενδρολίβανου.**

<b>Περιγραφή</b>	Τα εκχυλίσματα δενδρολίβανου παρασκευάζονται από αποσημασμένο αιθανολικό εκχύλισμα δενδρολίβανου. Τα εκχυλίσματα μπορούν να υποβληθούν σε περαιτέρω καθαρισμό, π.χ. με κατεργασία με ενεργό άνθρακα και/ή μοριακή απόσταξη. Τα εκχυλίσματα μπορούν να μετατραπούν σε εναιώρημα με τη χρήση κατάλληλων και εγκεκριμένων φορέων ή να ξηραθούν με ψεκασμό.
------------------	---

**▼ B**

<b>Ταυτοποίηση</b>	
Περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ενώσεις αναφοράς	≥ 5 % w/w, ως σύνολο καρνοσικού οξέος και καρνοσόλης
Λόγος αντιοξειδωτικών/πηθτικών ουσιών	(Συνολικό ποσοστό % w/w καρνοσικού οξέος και καρνοσόλης) ≥ 15 (% w/w βασικών πηθτικών ουσιών αναφοράς)* (* ως ποσοστό των ολικών πηθτικών ουσιών στο εκχύλισμα, μετρούμενο με αεριοχρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MSD))
<b>Καθαρότητα</b>	
Υπολειμματικοί διαλύτες	Αιθανόλη: 500 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

#### 4 – Εκχυλίσματα δενδρολίβανου, αποσημημένα και αποχρωματισμένα με εκχύλιση δύο σταδίων με εξάνιο και αιθανόλη.

<b>Περιγραφή</b>	Τα εκχυλίσματα δενδρολίβανου παρασκευάζονται από αποσημημένο αιθανολικό εκχύλισμα δενδρολίβανου με εκχύλιση με εξάνιο. Τα εκχυλίσματα μπορούν να υποβληθούν σε περαιτέρω καθαρισμό, π.χ. με κατεργασία με ενεργό άνθρακα και/ή μοριακή απόσταξη. Τα εκχυλίσματα μπορούν να μετατραπούν σε εναιώρημα με τη χρήση κατάλληλων και εγκεκριμένων φορέων ή να ξηραθούν με ψεκασμό.
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Περιεκτικότητα αναφοράς σε αντιοξειδωτικές ενώσεις	≥ 5 % w/w, ως σύνολο καρνοσικού οξέος και καρνοσόλης
Λόγος αντιοξειδωτικών/πηθτικών ουσιών	(Συνολικό ποσοστό % w/w καρνοσικού οξέος και καρνοσόλης) ≥ 15 (% w/w βασικών πηθτικών ουσιών αναφοράς)* (* ως ποσοστό των ολικών πηθτικών ουσιών στο εκχύλισμα, μετρούμενο με αεριοχρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MSD))
<b>Καθαρότητα</b>	
Υπολειμματικοί διαλύτες	Εξάνιο: 25 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Αιθανόλη: 500 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

#### E 400 ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΟΞΥ

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Γραμμική γλυκουρονογλυκάνη, αποτελούμενη κυρίως από ομάδες D-μανουρονικού οξέος ενωμένες με δεσμούς β-(1-4) και ομάδες L-γουλουρονικού οξέος ενωμένες με δεσμούς α-(1-4), σε μορφή δακτυλίου πυρανόζης. Κολλοειδώς διαλυτός στο νερό υδατάνθρακας, λαμβανόμενος από διάφορα είδη φαιοφυκών (Phaeophyceae) με εκχύλιση με αραιά διαλύματα αλκαλίων
Αριθ. EINECS	232-680-1
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	(C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>6</sub> ) <sub>n</sub>
Μοριακό βάρος	10 000 - 600 000 (συνήθης μέσος όρος)
Δοκιμασία	Το αλγινικό οξύ παρέχει, επί άνυδρης ουσίας, τουλάχιστον 20 % και όχι άνω του 23 % διοξειδίου του άνθρακα (CO <sub>2</sub> ), που αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα σε αλγινικό οξύ (C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>6</sub> ) <sub>n</sub> τουλάχιστον 91 % και όχι άνω του 104,5 % (υπολογιζόμενη με βάση ισοδύναμο βάρος 200)
<b>Περιγραφή</b>	Το αλγινικό οξύ απαντά σε νηματοειδή, κοκκοειδή, κοκκώδη και κονιοποιημένη μορφή. Έχει χρώμα λευκό έως κιτρινοκαστανο και είναι σχεδόν άοσμο.

▼ B**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Αδιάλυτο σε νερό και οργανικούς διαλύτες, δυσδιάλυτο σε διαλύματα ανθρακικού νατρίου, υδροξειδίου του νατρίου και φωσφορικού νατρίου

Σταθμική ανάλυση με χλωριούχο ασβέστιο

Σε διάλυμα του δείγματος με συγκέντρωση 0,5 % σε διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 1 M, προστίθεται ποσότητα διαλύματος χλωριούχου ασβεστίου 2,5 % ίση με το ένα πέμπτο του όγκου του. Σχηματίζεται ογκώδες ζελατινώδες ίζημα. Με τη δοκιμή αυτή διακρίνεται το αλγινικό οξύ από το κόμμι ακακίας, την καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, το καρβοξυμεθυλ-άμυλο, την καραγενάνη, τη ζελατίνη, το κόμμι γκάτι, το κόμμι καράγια, το κόμμι χαρουπιών, τη μεθυλοκυτταρίνη και το τραγακάνθινο κόμμι

Σταθμική ανάλυση με θειικό αμμώνιο

Σε διάλυμα του δείγματος με συγκέντρωση 0,5 % σε διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 1 M, προστίθεται ποσότητα κορεσμένου διαλύματος θειικού αμμωνίου ίση με το μισό του όγκου του. Δεν σχηματίζεται ίζημα. Με τη δοκιμή αυτή διακρίνεται το αλγινικό οξύ από το άγαρ-άγαρ, την καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, την καραγενάνη, τις αποεστεροποιημένες πηκτινικές ύλες, τη ζελατίνη, το κόμμι χαρουπιών, τη μεθυλοκυτταρίνη και το άμυλο.

Χρωματική αντίδραση

Ποσότητα 0,01 g δείγματος ανακινείται με 0,15 ml διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 0,1 N, μέχρι να διαλυθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα, και κατόπιν προστίθεται 1 ml διαλύματος οξίνου θειικού σιδήρου (III). Μετά από 5 λεπτά το διάλυμα χρωματίζεται κόκκινο του κερασιού και τελικά βαθύ πορφυρό.

pH

Από 2,0 έως 3,5 (εναιώρημα 3 %)

**Καθαρότητα**

Απόλεια κατά την ξήρανση

15 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)

Θειική τέφρα

8 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας

Ύλες αδιάλυτες σε υδροξείδιο του νατρίου (διάλυμα 1 M)

2 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας

Φορμαλδεΐδη

50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**Μικροβιολογικά κριτήρια**

Συνολικός αριθμός μικροοργανισμών

5 000 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο

Ζυμογόμητες και ευρωτομύκητες

500 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο

*Escherichia coli*

Απουσία σε 5 g

*Salmonella* spp.

Απουσία σε 10 g

**E 401 ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Άλας του αλγινικού οξέος με νάτριο

Χημικός τύπος

(C<sub>6</sub>H<sub>7</sub>NaO<sub>6</sub>)<sub>n</sub>

Μοριακό βάρος

10 000 - 600 000 (συνήθης μέσος όρος)

**▼ B**

Δοκιμασία	Το αλγινικό νάτριο παρέχει, επί άνυδρης ουσίας, τουλάχιστον 18 % και όχι άνω του 21 % διοξειδίου του άνθρακα, που αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα σε αλγινικό νάτριο τουλάχιστον 90,8 % και όχι άνω του 106,0 % (υπολογιζόμενη με βάση ισοδύναμο βάρος 222)
<b>Περιγραφή</b>	Σχεδόν άοσμη, ινώδης ή κοκκώδης σκόνη, χρώματος λευκού έως υποκίτρινου
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή αλγινικού οξέος	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	15 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	2 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας
Φορμαλδεΐδη	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
Συνολικός αριθμός μικροοργανισμών	5 000 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
Ζυμομόκητες και ευρωτομόκητες	500 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 5 g
<i>Salmonella</i> spp.	Απουσία σε 10 g

**E 402 ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

Άλας του αλγινικού οξέος με κάλιο

 $(C_6H_7KO_6)_n$ 

10 000 - 600 000 (συνήθης μέσος όρος)

Το αλγινικό κάλιο παρέχει, επί άνυδρης ουσίας, τουλάχιστον 16,5 % και όχι άνω του 19,5 % διοξειδίου του άνθρακα, που αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα σε αλγινικό κάλιο τουλάχιστον 89,2 % και όχι άνω του 105,5 % (υπολογιζόμενη με βάση ισοδύναμο βάρος 238)

**Περιγραφή**

Σχεδόν άοσμη, ινώδης ή κοκκώδης σκόνη, χρώματος λευκού έως υποκίτρινου

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή καλίου

Δοκιμή θετική

Δοκιμή αλγινικού οξέος

Δοκιμή θετική

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση

15 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)

Ύλες αδιάλυτες στο νερό

2 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας

Φορμαλδεΐδη

50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ B**

Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
Συνολικός αριθμός μικροοργανισμών	5 000 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
Ζυμομύκητες και ευρωτομύκητες	500 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 5 g
<i>Salmonella</i> spp.	Απουσία σε 10 g
<b>E 403 ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ</b>	
<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Αμμωνιακό άλας του αλγινικού οξέος
Χημικός τύπος	(C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>6</sub> ) <sub>n</sub>
Μοριακό βάρος	10 000 - 600 000 (συνήθης μέσος όρος)
Δοκιμασία	Το αλγινικό αμμώνιο παρέχει, επί άνυδρης ουσίας, τουλάχιστον 18 % και όχι άνω του 21 % διοξειδίου του άνθρακα, που αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα σε αλγινικό αμμώνιο τουλάχιστον 88,7 % και όχι άνω του 103,6 % (υπολογιζόμενη με βάση ισοδύναμο βάρος 217)
<b>Περιγραφή</b>	Σχεδόν άοσμη, ινώδης ή κοκκώδης σκόνη, χρώματος λευκού έως υποκίτρινου
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή αμμωνίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή αλγινικού οξέος	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	15 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)
Θειική τέφρα	7 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηράς ουσίας
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	2 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας
Φορμαλδεϋδη	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
Συνολικός αριθμός μικροοργανισμών	5 000 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
Ζυμομύκητες και ευρωτομύκητες	500 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 5 g
<i>Salmonella</i> spp.	Απουσία σε 10 g



## E 404 ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

<b>Συνώνυμα</b>	Αλας ασβεστίου του αλγινικού οξέος
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Αλας του αλγινικού οξέος με ασβέστιο
Χημικός τύπος	$(C_6H_7Ca_{1/2}O_6)_n$
Μοριακό βάρος	10 000 - 600 000 (συνήθης μέσος όρος)
Δοκιμασία	Το αλγινικό ασβέστιο παρέχει, επί άνυδρης ουσίας, τουλάχιστον 18 % και όχι άνω του 21 % διοξειδίου του άνθρακα, που αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα σε αλγινικό ασβέστιο τουλάχιστον 89,6 % και όχι άνω του 104,5 % (υπολογιζόμενη με βάση ισοδύναμο βάρος 219)
<b>Περιγραφή</b>	Σχεδόν άοσμη, ινώδης ή κοκκώδης σκόνη, χρώματος λευκού έως υποκίτρινου
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή αλγινικού οξέος	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	15,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)
Φορμαλδεύδη	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
Συνολικός αριθμός μικροοργανισμών	5 000 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
Ζυμομύκητες και ευρωτομύκητες	500 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 5 g
<i>Salmonella</i> spp.	Απουσία σε 10 g

## E 405 ΑΛΓΙΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ-1,2

<b>Συνώνυμα</b>	Αλγινικό υδροξυπροπύλιο· εστέρας του αλγινικού οξέος με προπανοδιόλη-1,2· αλγινική προπυλενογλυκόλη
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Εστέρας του αλγινικού οξέος με προπανοδιόλη-1,2· η σύνθεσή του ποικίλλει ανάλογα με το βαθμό εστεροποίησης και με την εκατοστιαία αναλογία των ελεύθερων και των εξουδετερωμένων καρβοξυλίων στο μόριο
Χημικός τύπος	$(C_9H_{14}O_7)_n$ (εστεροποιημένο)
Μοριακό βάρος	10 000 – 600 000 (συνήθης μέσος όρος)
Δοκιμασία	Το προϊόν παρέχει, επί άνυδρης ουσίας, τουλάχιστον 16 % και κατ' ανώτατο όριο 20 % διοξειδίου του άνθρακα (CO <sub>2</sub> )
<b>Περιγραφή</b>	Σχεδόν άοσμη, ινώδης ή κοκκώδης σκόνη, χρώματος λευκού έως υποκίτρινου

**▼ B****Ταυτοποίηση**

Δοκιμή προπανοδιόλης-1,2

Δοκιμή θετική (μετά από υδρόλυση)

Δοκιμή αλγινικού οξέος

Δοκιμή θετική (μετά από υδρόλυση)

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση

20 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)

Συνολική περιεκτικότητα σε προπανοδιόλη-1,2

Τουλάχιστον 15 % και κατ' ανώτατο όριο 45 %

Περιεκτικότητα σε ελεύθερη προπανοδιόλη-1,2

15 % κατ' ανώτατο όριο

Υγες αδιάλυτες στο νερό

2 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας

Φορμαλδεΐδη

50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**Μικροβιολογικά κριτήρια**

Συνολικός αριθμός μικροοργανισμών

5 000 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο

Ζυμομύκητες και ευρωτομύκητες

500 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο

*Escherichia coli*

Απουσία σε 5 g

*Salmonella* spp.

Απουσία σε 10 g

**E 406 ΑΓΑΡ****Συνώνυμα**

Γελόζη· Ιαπωνικό άγαρ· Ιχθυόκολλα Βεγγάλης, Κεϊλάνης, Κίνας ή Ιαπωνίας· Layor Carang

**Ορισμός**

Το άγαρ είναι ένας κολλοειδής διαλυτός στο νερό πολυσακχαρίτης, αποτελούμενος κυρίως από ομάδες γαλακτόζης με τακτική εναλλαγή των ισομερών μορφών L και D. Οι εξόζες αυτές συνδέονται στο συμπολυμερές με εναλλασσόμενους γλυκοζιτικούς δεσμούς α-1,3 και β-1,4. Στο 10 % περίπου των ομάδων D-γαλακτοπυρανόζης, ένα από τα υδροξύλια είναι εστεροποιημέν με θειικό οξύ εξουδετερωμένο με ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο ή νάτριο. Λαμβάνεται από ορισμένα στελέχη θαλασσίων φυκών των οικογενειών Gelidiaceae (γελιδίτες) και Gracilariaceae της Rhodophyceae (ροδοφύκη)

Αριθ. EINECS

232-658-1

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

Η συγκέντρωση κατωφλίου της πηκτής θα πρέπει να μην υπερβαίνει το 0,25 %

**Περιγραφή**

Το άγαρ είναι άοσμο ή έχει ελαφρά χαρακτηριστική οσμή. Το μη κονιοποιημένο άγαρ έχει συνήθως μορφή δεσμών από λεπτές, μεμβρανώδεις και συγκολλημένες ταινίες ή τεμαχίων, νιφάδων ή κόκκων. Το χρώμα του ποικίλλει από ανοικτό πορτοκαλοκίτρινο έως φαιοκίτρινο ή ωχροκίτρινο ή είναι άχρωμο. Όταν είναι υγρό, είναι σκληρό ενώ ξηρό είναι εύθρυπτο. Το κονιοποιημένο άγαρ έχει χρώμα λευκό έως λευκοκίτρινο ή ωχροκίτρινο. Εξεταζόμενο μικροσκοπικός μέσα σε νερό το κονιοποιημένο άγαρ εμφανίζεται πιο διαφανές. Εξεταζόμενο μέσα σε διάλυμα υδρίτη της χλωράλης, το κονιοποιημένο άγαρ εμφανίζεται πιο διαφανές απ' ό,τι μέσα σε νερό, κάτω από κοκκώδες, γραμμωτό, γωνιώδες, ενδέχεται δε να περιέχει κελύφη διατόμων. Η ενεργός συγκέντρωση της πηκτής επιτρέπεται να τυποποιείται με την προσθήκη δεξτρόζης και μαλτοδεξτρινών ή σακχαρόζης

▼ B**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Αδιάλυτο σε κρύο νερό· διαλυτό σε βραστό νερό

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση

22 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 5 ώρες)

Τέφρα

6,5 % κατ' ανώτατο όριο, επί άνυδρης ουσίας, προσδιοριζόμενη με πύρωση στους 550 °C

Τέφρα αδιάλυτη σε οξέα (αδιάλυτη σε υδροχλωρικό οξύ περίπου 3 N)

0,5 % κατ' ανώτατο όριο, επί άνυδρης ουσίας, προσδιοριζόμενη με πύρωση στους 550 °C

Αδιάλυτες ύλες (ύστερα από ανάδευση επί 10 λεπτά σε θερμό νερό)

1,0 % κατ' ανώτατο όριο

Άμυλο

Δεν ανιχνεύεται με την ακόλουθη μέθοδο: σε διάλυμα του δείγματος σε αναλογία 1:10 προστίθενται μερικές σταγόνες διαλύματος ιωδίου. Δεν πρέπει να εμφανιστεί μπλε χρώμα

Ζελατίνη και άλλες πρωτεΐνες

Διαλύεται περίπου 1 g άγαρ σε 100 ml βραστού νερού και το διάλυμα αφήνεται να ψυχθεί μέχρι τους 50 °C περίπου. Σε 5 ml αυτού του διαλύματος, προστίθενται 5 ml διαλύματος τρινιτροφαινόλης (1 g άνυδρης τρινιτροφαινόλης σε 100 ml θερμού νερού). Δεν πρέπει να εμφανιστεί θόλωμα εντός 10 λεπτών

Απορρόφηση νερού

Σε ογκομετρικό κύλινδρο των 100 ml, φέρονται 5 g άγαρ και ο όγκος συμπληρώνεται μέχρι τη χαραγή με νερό. Το σύνολο αναμειγνύεται και αφήνεται σε ηρεμία 24 ώρες σε θερμοκρασία 25 °C περίπου. Το περιεχόμενο του κυλίνδρου χύνεται επάνω σε υγρό υαλοβάμβακα, κατά τρόπον ώστε το νερό να εκρεύσει σε ένα δεύτερο ογκομετρικό κύλινδρο των 100 ml. Δεν πρέπει να συλλεγούν άνω των 75 ml νερού

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**Μικροβιολογικά κριτήρια**

Συνολικός αριθμός μικροοργανισμών

5 000 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο

Ζυμομόκητες και ευρωτομόκητες

300 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο

*Escherichia coli*

Απουσία σε 5 g

*Salmonella* spp.

Απουσία σε 5 g

**E 407 ΚΑΡΑΓΕΝΑΝΗ****Συνώνυμα**

Το προϊόν κυκλοφορεί στο εμπόριο με διάφορα ονόματα όπως:

Γελόζη ιρλανδικού βρύου· ευχευμάνη (από είδη του γένους *Eucheuma*)· ιριδοφυκάνη (από είδη του γένους *Iridaea*)· υπνεάνη (από είδη του γένους *Hypnea*)· φουρκελλαράνη ή δανικό άγαρ-άγαρ (από το είδος *Furcellaria fastigiata*)· καραγενάνη (από είδη των γενών *Chondrus* και *Gigartina*)

**Ορισμός**

Η καραγενάνη λαμβάνεται με εκχύλιση με νερό ή αραιά υδατικά διαλύματα αλκαλίων από στελέχη θαλασσίων φυκών των οικογενειών *Gigartinaceae*, *Solieriaceae*, *Hypneaecae* και *Furcellariaceae* της ομοταξίας *Rhodophyceae* (ροδοφύκη).

Η καραγενάνη αποτελείται κυρίως από τα άλατα καλίου, νατρίου, μαγνησίου και ασβεστίου των θεικών εστέρων των πολυσακχαριτών της γαλακτόζης και του 3,6-ανυδρικού παραγώγου της. Οι εξόξες αυτές συνδέονται στο συμπολυμερές με εναλλασόμενους γλυκοζιτικούς δεσμούς α-1,3 και β-1,4.



▼ B

	<p>Οι κυρίαρχοι πολυσακχαρίτες στην καραγενάνη χαρακτηρίζονται ως κ-, ι-, λ-, ανάλογα με τον αριθμόθεικών ομάδων ανά επαναλαμβανόμενη δομική μονάδα (δηλ. 1,2,3 θειικά ιόντα). Μεταξύ κ- και ι- υπάρχει μια συνεχής σειρά ενδιάμεσων συνθέσεων που διαφέρουν όσον αφορά τον αριθμό των θειικών ιόντων ανά επαναλαμβανόμενη δομική μονάδα μεταξύ του 1 και του 2.</p> <p>Κατά τη διάρκεια της διεργασίας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλα οργανικά αντιδραστήρια καθίζησης εκτός από μεθανόλη, αιθανόλη και προπανόλη-2.</p> <p>Ο όρος «καραγενάνη» χρησιμοποιείται μόνο για το πολυμερές το οποίο δεν έχει υποστεί υδρόλυση ή άλλη χημική διάσπαση.</p> <p>Το προϊόν είναι δυνατό να περιέχει κατ' ανώτατο όριο 5 mg/kg φορμαλδεΐδης ως τυχαίας πρόσμειξης.</p>
Αριθ. EINECS	232-524-2
Χημική ονομασία	Θειικοί εστέρες πολυγαλακτόζης
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Υποκίτρινη έως άχρωμη, πρακτικά άοσμη, χονδρόκοκκη έως λεπτόκοκκη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή γαλακτόζης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ανυδρικού παράγωγου γαλακτόζης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή θειικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Διαλυτό σε θερμό νερό· αδιάλυτο στην αλκοόλη (διάλυμα 1,5 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Υπολείμματα διαλυτών	0,1 % μεθανόλης, αιθανόλης, προπανόλης-2 κατ' ανώτατο όριο, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό
Ιξώδες	Τουλάχιστον 5 mPa.s (διάλυμα 1,5 % στους 75 °C)
Απώλεια κατά την ξήρανση	12 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)
Θειικά ιόντα	Τουλάχιστον 15 % και κατ' ανώτατο όριο 40 % επί ξηράς ουσίας (ως SO <sub>4</sub> )
Τέφρα	Τουλάχιστον 15 % και κατ' ανώτατο όριο 40 %, επί ξηράς ουσίας, προσδιοριζόμενη με πύρωση στους 550 °C
Τέφρα αδιάλυτη σε οξέα	1 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηράς ουσίας (αδιάλυτη σε υδροχλωρικό οξύ 10 %)
Υγες αδιάλυτες σε οξέα	2 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηράς ουσίας (αδιάλυτες σε θειικό οξύ 1 % v/v)
Καραγενάνη χαμηλού μοριακού βάρους (κλάσμα με μοριακό βάρος κάτω των 50 kDa)	5 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
Συνολικός αριθμός μικροοργανισμών	5 000 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο

## ▼ B

Ζυμομύκητες και ευρωτομύκητες	300 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 5 g
<i>Salmonella</i> spp.	Απουσία σε 10 g

## E 407a ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΚΗ EUCHEMA

<b>Συνώνυμα</b>	PES (από τα αρχικά των λέξεων Processed Euchema seaweed/τροποποιημένα φύκη του γένους Euchema). Τα PES που λαμβάνονται από το είδος <i>Euchema cottonii</i> είναι γενικά γνωστά ως κ-PES και εκείνα που λαμβάνονται από το είδος <i>Euchema spinosum</i> ως ι-PES.
<b>Ορισμός</b>	Τα τροποποιητημένα φύκη του γένους <i>Euchema</i> λαμβάνονται με κατεργασία στελεχών θαλασσίων φυκών των ειδών <i>Euchema cottonii</i> και <i>Euchema spinosum</i> της τάξης Rhodophyceae (ροδοφύκη) με υδατικά διαλύματα αλκαλίων (KOH), ακολουθούμενη από έκπλυση με καθαρό νερό για την απομάκρυνση των ξένων προσμείξεων και ξήρανση, οπότε προκύπτει το τελικό προϊόν. Περαιτέρω καθαρισμός επιτυγχάνεται με έκπλυση με αλκοόλη. Οι αλκοόλες που επιτρέπονται είναι μόνο η μεθανόλη, η αιθανόλη και η προπανόλη-2. Το προϊόν αποτελείται κυρίως από τα άλατα καλίου, νατρίου και ασβεστίου των θεικών εστέρων των πολυσακχαριτών της γαλακτόζης και του 3,6-ανυδρικού παραγώγου της. Περιέχει επίσης κυτταρίνη φυκών σε αναλογία έως 15 %. Η έκφραση «τροποποιημένα φύκη <i>Euchema</i> » χρησιμοποιείται μόνο γι' αυτά που δεν έχουν υποστεί υδρόλυση ή άλλη χημική διάσπαση. Είναι δυνατόν να περιέχει το προϊόν κατ' ανώτατο όριο 5 mg/kg φορμαλδεΐδης.
<b>Περιγραφή</b>	Χρυσοκάστανη έως υποκίτρινη, πρακτικά άοσμη χονδρόκοκκη έως λεπτόκοκκη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή γαλακτόζης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ανυδρικού παράγωγου γαλακτόζης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή θεικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Με νερό σχηματίζει θολά παχύρρευστα εναιωρήματα. Αδιάλυτο στην αιθανόλη (διάλυμα 1,5 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Υπολείμματα διαλυτών	0,1 % μεθανόλης, αιθανόλης, προπανόλης-2 κατ' ανώτατο όριο, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό
Ιξώδες	Τουλάχιστον 5 mPa.s (διάλυμα 1,5 % στους 75 °C)
Απώλεια κατά την ξήρανση	12 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)
Θειικά ιόντα	Τουλάχιστον 15 % και κατ' ανώτατο όριο 40 % επί ξηράς ουσίας (ως SO <sub>4</sub> )
Τέφρα	Τουλάχιστον 15 % και όχι άνω του 40 %, επί ξηράς ουσίας, προσδιοριζόμενη με πύρωση στους 550 °C
Τέφρα αδιάλυτη σε οξέα	1 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηράς ουσίας (αδιάλυτη σε υδροχλωρικό οξύ 10 %)
Ύλες αδιάλυτες σε οξέα	Τουλάχιστον 8 % και όχι άνω του 15 % επί ξηράς ουσίας (αδιάλυτες σε θειικό οξύ 1 % v/v)
Καραγενάνη χαμηλού μοριακού βάρους (κλάσμα με μοριακό βάρος κάτω των 50 kDa)	5 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ B

Κάδμιο	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
Συνολικός αριθμός μικροοργανισμών	5 000 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
Ζυμομόκητες και ευρωτομούκητες	300 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 5 g
<i>Salmonella</i> spp.	Απουσία σε 10 g
<b>E 410 ΚΟΜΜΙ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ</b>	
<b>Συνώνυμα</b>	Κόμμι algaroba
<b>Ορισμός</b>	Το κόμμι χαρουπιών είναι το αλεσμένο ενδοσπέρμιο των σπερμάτων στελεχών της χαρουπιάς, κοινή ονομασία του δέντρου <i>Ceratonia siliqua</i> (L.) Taub. (οικογένεια Leguminosae). Συνίσταται κυρίως από ένα μακρομοριακό, κολλοειδές διαλυτό στο νερό πολυσακχαρίτη, αποτελούμενο από ομάδες γαλακτοπυρανόζης και μαννοπυρανόζης συνδεδεμένες με γλυκοζιτικούς δεσμούς, που περιγράφεται χημικώς ως γαλακτομαννάνη
Αριθ. EINECS	232-541-5
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	50 000 - 3 000 000
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε γαλακτομαννάνη τουλάχιστον 75 %
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή έως λευκοκίτρινη, σχεδόν άοσμη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή γαλακτόζης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή μαννόζης	Δοκιμή θετική
Μικροσκοπική εξέταση	Σε γυάλινη αντικειμενοφόρο πλάκα, τοποθετείται λίγο κονιοποιημένο δείγμα σε υδατικό διάλυμα που περιέχει 0,5 % ιωδίου και 1 % ιωδιούχου καλίου και εξετάζεται στο μικροσκόπιο. Το κόμμι χαρουπιών εμφανίζεται με τη μορφή επιμήκων σωληνοειδών κυττάρων, χωρισμένων ή με μικρά διάκενα μεταξύ τους. Το καστανόχρωμο περιεχόμενό τους είναι πολύ λιγότερο ομοιόμορφο απ' ότι στο κόμμι γκουάρ. Το κόμμι γκουάρ εμφανίζεται με τη μορφή σχεδόν όμοιων ομάδων σφαιρικών έως απιοειδών κυττάρων με κίτρινο έως καστανόχρωμο περιεχόμενο
Διαλυτότητα	Διαλυτό σε θερμό νερό, αδιάλυτο σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	15 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 5 ώρες)
Τέφρα	1,2 % κατ' ανώτατο όριο, προσδιοριζόμενη με πύρωση στους 800 °C
Πρωτεΐνες (N × 6,25)	7 % κατ' ανώτατο όριο
Ύλες αδιάλυτες σε οξέα	4 % κατ' ανώτατο όριο
Άμυλο	Δεν ανιχνεύεται με την ακόλουθη μέθοδο: σε διάλυμα του δείγματος σε αναλογία 1:10 προστίθενται μερικές σταγόνες διαλύματος ιωδίου. Δεν πρέπει να εμφανιστεί μπλε χρώμα
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ B

Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αιθανόλη και προπανόλη-2	1 % κατ' ανώτατο όριο, χωριστά ή σε συνδυασμό
<b>E 412 KOMMI ΓΚΟΥΑΡ</b>	
<b>Συνώνυμα</b>	Κόμμι κυάμοψης· άλευρο γκουάρ
<b>Ορισμός</b>	Το κόμμι γκουάρ είναι το αλεσμένο ενδοσπέρμιο των σπερμάτων φυσικών στελεχών του γκουάρ, κοινή ονομασία του φυτού <i>Cyamopsis tetragonolobus</i> (L.) Taub. (οικογένεια Leguminosae). Συνίσταται κυρίως από ένα μακρομοριακό, κολλοειδώς διαλυτό στο νερό πολυσακχαρίτη, αποτελούμενο από ομάδες γαλακτοπυρανόζης και μαννοπυρανόζης συνδεδεμένες με γλυκοζιτικούς δεσμούς, που περιγράφεται χημικώς ως γαλακτομαννάνη. Το κόμμι μπορεί να είναι μερικώς υδρολυμένο με θερμική κατεργασία, κατεργασία με ήπιο οξύ ή αλκαλική οξειδωση για ρύθμιση του ιξώδους.
Αριθ. EINECS	232-536-0
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	50 000 - 8 000 000
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε γαλακτομαννάνη τουλάχιστον 75 %
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή έως λευκοκίτρινη, σχεδόν άοσμη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή γαλακτόζης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή μαννόζης	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Διαλυτό σε κρύο νερό
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	15 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 5 ώρες)
Τέφρα	5,5 % κατ' ανώτατο όριο, προσδιοριζόμενη με πύρωση στους 800 °C
Ύλες αδιάλυτες σε οξέα	7 % κατ' ανώτατο όριο
Πρωτεΐνη	10 % κατ' ανώτατο όριο (συντελεστής N × 6,25)
Άμυλο	Δεν ανιχνεύεται με την ακόλουθη μέθοδο: σε διάλυμα του δείγματος σε αναλογία 1:10 προστίθενται μερικές σταγόνες διαλύματος ιωδίου. (Δεν πρέπει να εμφανιστεί μπλε χρώμα)
Οργανικά υπεροξειδία	0,7 meq ενεργού οξυγόνου/kg δείγματος κατ' ανώτατο όριο
Φουρφουράλη	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Πενταχλωροφαινόλη	0,01 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 413 ΤΡΑΓΑΚΑΝΘΙΝΟ KOMMI**

<b>Συνώνυμα</b>	Τραγακάνθη·
<b>Ορισμός</b>	Το τραγακάνθινο κόμμι είναι το αποξηραμένο έκκριμα των βλαστών και των κλάδων στελεχών του φυτού <i>Astragalus gummifer</i> Labillardiere και άλλων ασιατικών ειδών του γένους <i>Astragalus</i> (οικογένεια Leguminosae). Συνίσταται κυρίως από μακρομοριακούς πολυσακχαρίτες (γαλακτοαραβάνες και όξινους πολυσακχαρίτες), οι οποίοι κατά την υδρόλυση παρέχουν γαλακτουρονικό οξύ, γαλακτόζη, αραβινόζη, ξυλόζη και φυκόζη. Ενδέχεται επίσης να περιέχει μικρές ποσότητες ραμνόζης και γλυκόζης (προερχόμενες από την παρουσία ιχνών αμύλου ή/και κυτταρίνης)

**▼ B**

Αριθ. EINECS	232-252-5
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	Κατά προσέγγιση 800 000
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Το μη κονιοποιημένο τραγακάνθινο κόμμι εμφανίζεται με τη μορφή πεπλατυσμένων, φολιδωτών θραυσμάτων, επίπεδων ή καμπύλων, ή με τη μορφή σπειροειδώς περιελιγμένων τεμαχίων πάχους 0,5-2,5 mm και μήκους έως 3 cm. Το χρώμα του είναι λευκό έως ωχροκίτρινο αλλά ορισμένα τεμάχια μπορεί να έχουν ελαφρά κόκκινη χροιά. Τα τεμάχια παρουσιάζουν κερατοειδή υφή και είναι εύθραπτα. Είναι άοσμο ενώ τα διαλύματά του έχουν ανούσια κολλώδη γεύση. Το κονιοποιημένο τραγακάνθινο κόμμι έχει χρώμα λευκό έως ωχροκίτρινο ή καστανό με ρόδινη απόχρωση (πολύ ανοικτό χρυσοκάστανο)
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	1 g δείγματος, αναμειγνύομενο με 50 ml νερού, διογκώνεται σχηματίζοντας ένα λείο, σκληρό, οπαλίζον πήκτωμα· δεν διαλύεται σε αιθανόλη και δεν διογκώνεται σε υδατικό διάλυμα αιθανόλης 60 % (w/v).
<b>Καθαρότητα</b>	
Δοκιμή κόμμεος καράγια	Αρνητική. Ζέεται 1 g με 20 ml νερού μέχρι να σχηματιστεί πήκτωμα. Προστίθενται 5 ml υδροχλωρικού οξέος και το μείγμα ζέεται εκ νέου για πέντε λεπτά. Δεν πρέπει να εμφανιστεί σταθερό ρόδινο ή κόκκινο χρώμα.
Απώλεια κατά την ξήρανση	16 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 5 ώρες)
Ολική τέφρα	4 % κατ' ανώτατο όριο
Τέφρα αδιάλυτη σε οξέα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Υλες αδιάλυτες σε οξέα	2 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
<i>Salmonella</i> spp.	Απουσία σε 10 g
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 5 g

**E 414 ΚΟΜΜΙ ΑΚΑΚΙΑΣ****Συνώνυμα**

Αραβικό κόμμι

**Ορισμός**

Το κόμμι ακακίας είναι το αποξηραμένο έκκριμα των βλαστών και των κλάδων στελεχών του φυτού *Acacia Senegal* (L.) Willdenow ή συγγενών ειδών του γένους Ακακία (οικογένεια Leguminosae). Συνίσταται κυρίως από μακρομοριακούς πολυσακχαρίτες και τα άλατά τους με ασβέστιο, μαγνήσιο και κάλιο, που κατά την υδρόλυση παρέχουν αραβινόζη, γαλακτόζη, ραμνόζη και γλυκουρονικό οξύ

Αριθ. EINECS

232-519-5

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Κατά προσέγγιση 350 000

Δοκιμασία

**▼ B**

<b>Περιγραφή</b>	Το μη κονιοποιημένο κόμμι ακακίας εμφανίζεται με τη μορφή λευκών ή λευκοκίτρινων σφαιροειδών δακρύων διαφόρων μεγεθών ή γωνιωδών θραυσμάτων, πολλές φορές αναμειγμένο με σκοτεινό-χρώμα θραύσματα. Διατίθεται επίσης σε μορφή νιφάδων, κόκκων, σκόνης ή αποξηραμένου με ψεκασμό υλικού, χρώματος λευκού έως λευκοκίτρινου
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Ένα γραμμάριο διαλύεται σε 2 ml κρύου νερού, σχηματίζοντας διάλυμα που ρέει εύκολα και παρέχει όξινη αντίδραση με δείκτη χαρτί ηλιοτροπίου· αδιάλυτο σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	17 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 5 ώρες), προκειμένου για το κοκκώδες προϊόν, και 10 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες), προκειμένου για το αποξηραμένο με ψεκασμό προϊόν
Ολική τέφρα	4 % κατ' ανώτατο όριο
Τέφρα αδιάλυτη σε οξέα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Υγες αδιάλυτες σε οξέα	1 % κατ' ανώτατο όριο
Άμυλο ή δεξτρίνη	Διάλυμα του κόμμεος σε αναλογία 1:50 υποβάλλεται σε βρασμό και στη συνέχεια ψύχεται. Σε 5 ml αυτού του διαλύματος προστίθεται 1 σταγόνα διαλύματος ιωδίου. Δεν πρέπει να εμφανιστεί υποκίτρινο ή υπέρυθρο χρώμα
Ταννίνες	Σε 10 ml διαλύματος 1:50 προστίθεται περίπου 0,1 ml διαλύματος χλωριούχου σιδήρου (9 g FeCl <sub>3</sub> ·6H <sub>2</sub> O σε νερό μέχρι συνολικού όγκου 100 ml). Δεν πρέπει να εμφανιστεί υπόμαυρο χρώμα ούτε να σχηματιστεί υπόμαυρο ίζημα
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Προϊόντα υδρόλυσης	Απουσία μαννόζης, ξυλόζης και γαλακτουρονικού οξέος (χρωματογραφικός προσδιορισμός)
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
<i>Salmonella</i> spp.	Απουσία σε 10 g
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 5 g

**E 415 ΞΑΝΘΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΙ****Συνώνυμα****Ορισμός**

	Το ξανθανικό κόμμι είναι ένας μακρομοριακός πολυσακχαρίτης, που λαμβάνεται με ζύμωση καθαρής καλλιέργειας υδατανθράκων με στελέχη του βακτηριδίου <i>Xanthomonas campestris</i> , ακολουθούμενη από καθαρισμό με εκχύλιση με αιθανόλη ή προπανόλη-2, ξήρανση και άλεση. Περιέχει ως κύριες δομικές μονάδες εξόζης D-γλυκόζη και D-μαννόζη μαζί με D-γλυκουρονικό οξύ και πυροσταφυλικό οξύ και παρασκευάζεται σε μορφή αλάτων με νάτριο, κάλιο ή ασβέστιο. Το διαλύματά του είναι ουδέτερα
Αριθ. EINECS	234-394-2
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	Κατά προσέγγιση 1 000 000
Δοκιμασία	Το προϊόν παρέχει, επί άνυδρης ουσίας, τουλάχιστον 4,2 % και κατ' ανώτατο όριο 5 % CO <sub>2</sub> , που αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα σε ξανθανικό κόμμι 91 % έως 108 %

**▼ B**

<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη χρώματος υπόλευκου
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτό στο νερό. Αδιάλυτο σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	15 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2,5 ώρες)
Ολική τέφρα	16 % κατ' ανώτατο όριο, επί άνυδρης ουσίας, προσδιοριζόμενη με πύρωση στους 650 °C μετά από ξήρανση στους 105 °C για τέσσερις ώρες
Πυροσταφυλικό οξύ	Τουλάχιστον 1,5 %
Άζωτο	1,5 % κατ' ανώτατο όριο
Αιθανόλη και προπανόλη-2	500 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
Συνολικός αριθμός μικροοργανισμών	5 000 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
Ζυμομόκητες και ευρωτομόκητες	300 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 5 g
<i>Salmonella</i> spp.	Απουσία σε 10 g
<i>Xanthomonas campestris</i>	Απουσία ζωντανών κυττάρων σε 1 g

**E 416 ΚΟΜΜΙ ΚΑΡΑΓΙΑ**

<b>Συνώνυμα</b>	Katilo· kadaya· κόμμι στερκουλίας· sterculia· karaya· kullo· kuterra
<b>Ορισμός</b>	Το κόμμι καράγια είναι το αποξηραμένο έκκριμα των βλαστών και των κλάδων των στελεχών δέντρων: <i>Sterculia urens</i> Roxburgh και άλλων ειδών του γένους Στερκουλία (οικογένεια Sterculiaceae) ή <i>Cochlospermum gossypium</i> A.P. de Candolle και άλλων ειδών του γένους Κοχλιόσπερμο (οικογένεια Bixaceae). Συνίσταται κυρίως από μακρομοριακούς ακετυλιωμένους πολυσακχαρίτες, που με υδρόλυση παρέχουν γαλακτόζη, ραμνόζη και γαλακτουρονικό οξύ, καθώς και μικρές ποσότητες γλυκουρονικού οξέος
Αριθ. EINECS	232-539-4
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Το κόμμι καράγια εμφανίζεται με τη μορφή δακρύων διαφόρων μεγεθών και ασύμμετρων θραυσμάτων με χαρακτηριστική ημικρυσταλλική όψη. Το χρώμα του είναι ωχροκίτρινο έως καστανό με ρόδινη απόχρωση και η υφή του ημιδιαφανής και κερατοειδής. Το κονιοποιημένο κόμμι καράγια έχει χρώμα υπόφαιο έως καστανό με ρόδινη απόχρωση. Το κόμμι αναδίδει τη χαρακτηριστική οσμή του οξικού οξέος
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο σε αιθανόλη
Διόγκωση σε διάλυμα αιθανόλης	Το κόμμι καράγια διογκώνεται σε διάλυμα αιθανόλης 60 %, ιδιότητα που το διακρίνει από άλλα κόμμια
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	20 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 5 ώρες)

**▼ B**

Ολική τέφρα	8 % κατ' ανώτατο όριο
Τέφρα αδιάλυτη σε οξέα	1 % κατ' ανώτατο όριο
Ύλες αδιάλυτες σε οξέα	3 % κατ' ανώτατο όριο
Πτητικά οξέα	Τουλάχιστον 10 % (ως οξικό οξύ)
Άμυλο	Δεν ανιχνεύεται
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
<i>Salmonella</i> spp.	Απουσία σε 10 g
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 5 g

**E 417 KOMMI TAPA****Ορισμός**

Το κόμμι τάρα είναι το αλεσμένο ενδοσπέρμιο των σπερμάτων στελεχών του φυτού *Caesalpinia spinosa* (οικογένεια Leguminosae). Συνίσταται από μακρομοριακούς πολυσακχαρίτες αποτελούμενους κυρίως από γαλακτομαννάνες. Το βασικό συστατικό είναι μία ευθεία αλυσίδα δομικών μονάδων (1-4)-β-D-μαννοπυρανόζης, συνδεδεμένων με δεσμούς (1-6) με D-γαλακτοπυρανόζη. Η αναλογία μαννόζης προς γαλακτόζη στο κόμμι τάρα είναι περίπου 3:1. (Η αντίστοιχη αναλογία στο κόμμι χαρουπιών είναι 4:1, ενώ στο κόμμι γκουά 2:1)

Αριθ. EINECS	254-409-6
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή έως λευκοκίτρινη, σχεδόν άοσμη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτό στο νερό, αδιάλυτο σε αιθανόλη
Σχηματισμός πηκτής	Εάν σε υδατικό διάλυμα του δείγματος προστεθεί μικρή ποσότητα βορικού νατρίου, σχηματίζεται πηκτή
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	15 % κατ' ανώτατο όριο
Τέφρα	1,5 % κατ' ανώτατο όριο
Ύλες αδιάλυτες σε οξέα	2 % κατ' ανώτατο όριο
Πρωτεΐνη	3,5 % κατ' ανώτατο όριο (συντελεστής N × 5,7)
Άμυλο	Δεν ανιχνεύεται
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο





## E 418 ΚΟΜΜΙ ΤΖΕΛΑΝ

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Το κόμμι τζελάν είναι ένας μακρομοριακός πολυσακχαρίτης που παρασκευάζεται με ζύμωση καθαρής καλλιέργειας υδατανθράκων με στελέχη του βακτηριδίου <i>Pseudomonas elodea</i> , ακολουθούμενη από καθαρισμό με ισοπροπυλική αλκοόλη ή αιθανόλη, ξήρανση και άλεση. Ο μακρομοριακός πολυσακχαρίτης συνίσταται κυρίως σε έναν τετρασακχαρίτη, αποτελούμενο από μια ομάδα ραμνόζης, μια ομάδα γλυκουρονικού οξέος και δύο ομάδες γλυκόζης και εστεροποιημένο με ακύλια (γλυκερύλια και ακετύλια), ως επαναλαμβανόμενη εστερική δομική μονάδα που συνδέεται με Ο-γλυκοζιτικούς δεσμούς. Το γλυκουρονικό οξύ έχει εξουδετερωθεί προς σχηματισμό μείγματος των αλάτων του με κάλιο, νάτριο, ασβέστιο και μαγνήσιο
Αριθ. EINECS	275-117-5
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	Κατά προσέγγιση 500 000
Δοκιμασία	Η ξηρά ουσία παρέχει τουλάχιστον 3,3 % και κατ' ανώτατο όριο 6,8 % CO <sub>2</sub>
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη χρώματος κρεμ
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλύεται στο νερό, σχηματίζοντας παχύρρευστο διάλυμα Αδιάλυτο σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	15 % κατ' ανώτατο όριο μετά από ξήρανση (105 °C, 2,5 ώρες)
Αζωτο	3 % κατ' ανώτατο όριο
Προπανάλη-2	750 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
Συνολικός αριθμός μικροοργανισμών	10 000 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
Ζυμομόκητες και ευρωτομόκητες	400 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 5 g
<i>Salmonella</i> spp.	Απουσία σε 10 g

## E 420 (i) ΣΟΡΒΙΤΟΛΗ

<b>Συνώνυμα</b>	D-γλυκιτόλη· D-σορβιτόλη
<b>Ορισμός</b>	Η σορβιτόλη παρασκευάζεται με υδρογόνωση D-γλυκόζης. Αποτελείται κυρίως από D-σορβιτόλη. Ανάλογα με τα επίπεδα της D-γλυκόζης, το μέρος των προϊόντων που δεν είναι D-σορβιτόλη αποτελείται από συγγενείς ουσίες, όπως η μαννιτόλη, η ιδιτόλη και η μαλτιτόλη.
Αριθ. EINECS	200-061-5
Χημική ονομασία	D-γλυκιτόλη
Χημικός τύπος	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> O <sub>6</sub>

**▼ B**

Μοριακό βάρος	182,2
Δοκιμασία	Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ολικές γλυκίτολες 97 % και σε D-σορβιτόλη 91 % επί ξηρού (οι γλυκίτολες είναι ενώσεις με συντακτικό τύπο $\text{CH}_2\text{OH}-(\text{CHOH})_n-\text{CH}_2\text{OH}$ , όπου «n» ακέραιος αριθμός).
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή υγροσκοπική σκόνη, κρυσταλλική σκόνη, νιφάδες ή κόκκοι.
Όψη υδατικού διαλύματος:	Το διάλυμα είναι διαυγές.
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Πολύ διαλυτό στο νερό, λίγο διαλυτό στην αιθανόλη
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	88 έως 102 °C
Μονοβενζυλιδενοπαράγωγο της σορβιτόλης	Σε 5 g του δείγματος προστίθενται 7 ml μεθανόλης, 1 ml βενζαλδεΐδης και 1 ml υδροχλωρικού οξέος. Αναμειγνύονται και ανακινούνται σε μηχανικό τάρρακτρο μέχρι να εμφανιστούν κρύσταλλοι. Ακολουθεί διήθηση με τη βοήθεια αναρρόφησης και οι κρύσταλλοι διαλύονται σε 20 ml βραστό νερό που περιέχει 1 g όξινου ανθρακικού νατρίου. Το διάλυμα διηθείται ενώ ακόμη είναι θερμό και το διήθημα νύχεται, διηθείται με αναρρόφηση, εκπλύνεται με 5 ml μείγματος μεθανόλης και νερού (1:2) και ξηραίνεται στον αέρα. Οι λαμβανόμενοι κρύσταλλοι τήκονται σε θερμοκρασία μεταξύ 173 °C και 179 °C.
<b>▼ M4</b>	
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	1,5 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Αγωγιμότητα	Όχι περισσότερο από 20 μS/cm (σε διάλυμα 20 % ξηρής ύλης) σε θερμοκρασία 20 °C
Αναγωγικά σάκχαρα	0,3 % κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε γλυκόζη επί ξηρού)
Ολικά σάκχαρα	1 % κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε γλυκόζη επί ξηρού)
Νικέλιο	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενο επί ξηρού)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενο επί ξηρού)
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενο επί ξηρού)

**▼ B****E 420 (ii) ΣΙΡΟΠΙ ΣΟΡΒΙΤΟΛΗΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	Σιρόπι D-γλυκίτολης
<b>Ορισμός</b>	Σιρόπι σορβιτόλης που παρασκευάζεται με υδρογόνωση σιροπίου γλυκόζης και αποτελείται από D-σορβιτόλη, D-μαννιτόλη και υδρογονωμένους σακχαρίτες. Το μέρος του προϊόντος που δεν είναι D-σορβιτόλη αποτελείται κυρίως από υδρογονωμένους ολιγοσακχαρίτες που σχηματίζονται με την υδρογόνωση του σιροπίου γλυκόζης που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη (περίπτωση στην οποία το σιρόπι δεν κρυσταλλώνεται) ή μαννιτόλη. Είναι δυνατόν να περιέχονται και μικρές ποσότητες από γλυκίτολες με $n \leq 4$ (οι γλυκίτολες είναι ενώσεις με συντακτικό τύπο $\text{CH}_2\text{OH}-(\text{CHOH})_n-\text{CH}_2\text{OH}$ , όπου «n» ακέραιος αριθμός)
Αριθ. EINECS	270-337-8
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ολικά στερεά 69 % και σε D-σορβιτόλη 50 % επί άνυδρης ουσίας

**▼ B****Περιγραφή**

Διαυγές άχρωμο υδατικό διάλυμα

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Αναμείξιμο με νερό, με γλυκερίνη και με προπανοδιόλη-1,2

Μονοβενζυλιδενοπαράγωγο της σορβιτόλης

Σε 5 g του δείγματος προστίθενται 7 ml μεθανόλης, 1 ml βενζαλδεΐδης και 1 ml υδροχλωρικού οξέος. Αναμειγνύονται και ανακινούνται σε μηχανικό τάρρακτρο μέχρι να εμφανιστούν κρύσταλλοι. Ακολουθεί διήθηση με τη βοήθεια αναρρόφησης και στη συνέχεια οι κρύσταλλοι διαλύονται σε 20 ml βραστού νερού που περιέχει 1 g όξινου ανθρακικού νατρίου. Το διάλυμα διηθείται ενώ είναι ακόμη θερμό. Το διήθημα ψύχεται, διηθείται με αναρρόφηση, εκπλύνεται με 5 ml μείγματος μεθανόλης και νερού (1:2) και ξηραίνεται στον αέρα. Οι λαμβανόμενοι κρύσταλλοι τήκονται σε θερμοκρασία μεταξύ 173 °C και 179 °C.

**▼ M4****Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό

Το ανώτερο 31 % (μέθοδος Karl Fischer)

Αγωγιμότητα

Όχι περισσότερο από 10 μS/cm (στο προϊόν αυτό καθεαυτό) σε θερμοκρασία 20 °C

Αναγωγικά σάκχαρα

0,3 % κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε γλυκόζη επί ξηρού)

Νικέλιο

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενο επί ξηρού)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενο επί ξηρού)

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενο επί ξηρού)

**E 421 (i) ΜΑΝΝΙΤΟΛΗ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ****▼ B**

(i) ΜΑΝΝΙΤΟΛΗ

**Συνώνυμα**

D-μαννιτόλη

**▼ M4****Ορισμός**

Παρασκευάζεται με καταλυτική υδρογόνωση διαλυμάτων υδατανθράκων που περιέχουν γλυκόζη και/ή φρουκτόζη.

Το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 96 % μαννιτόλης. Το μέρος του προϊόντος που δεν είναι μαννιτόλη αποτελείται κυρίως από σορβιτόλη (2 % κατ' ανώτατο όριο), μαλιτιτόλη (2 % κατ' ανώτατο όριο) και ισομαλιτιτόλη (1,1 GPM (διένυδρη 1-O-α-D-γλυκοπυρανοζυλο-D-μαννιτόλη): 2 % κατ' ανώτατο όριο και 1,6 GPS (6-O-α-D-γλυκοπυρανοζυλο-D-σορβιτόλη): 2 % κατ' ανώτατο όριο). Οι ξένες προσμείξεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 0,1 % μεμονωμένα.

**▼ B**

Αριθ. EINECS

200-711-8

Χημική ονομασία

D-μαννιτόλη

Χημικός τύπος

C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>O<sub>6</sub>

Μοριακό βάρος

182,2

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε D-μαννιτόλη τουλάχιστον 96,0 % και κατ' ανώτατο όριο 102 % επί ξηράς ουσίας

**Περιγραφή**

Λευκή, άοσμη, κρυσταλλική σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Διαλυτή στο νερό, πολύ λίγο διαλυτή στην αιθανόλη, πρακτικά αδιάλυτη στον αιθέρα

Πεδίο τιμών σημείου τήξης

Από 164 °C έως 169 °C

Φασματομετρία απορρόφησης υπέρυθρης ακτινοβολίας

Σύγκριση με πρότυπο αναφοράς, π.χ. EP ή USP

Ειδική στροφική ικανότητα

[α]<sub>D</sub><sup>20</sup>: + 23° έως + 25° (διάλυμα βορικού άλατος)

**▼ B**

pH

Από 5 έως 8. Προστίθεται 0,5 ml κορεσμένου διαλύματος χλωριούχου καλίου σε 10 ml διαλύματος του δείγματος με συγκέντρωση 10 % (w/v) και στη συνέχεια μετράται το pH

**▼ M4****Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό

Το ανώτερο 0,5 % (μέθοδος Karl Fischer)

Αγωγιμότητα

Όχι περισσότερο από 20  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (σε διάλυμα 20 % ξηρής ύλης) σε θερμοκρασία 20 °C

Αναγωγικά σάκχαρα

0,3 % κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε γλυκόζη)

Ολικά σάκχαρα

1 % κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε γλυκόζη)

Νικέλιο

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ B**

## (ii) MANNITOLH ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΖΥΜΩΣΗ

**Συνώνυμα**

D-μαννιτόλη

**Ορισμός**Παρασκευάζεται με ασυνεχή ζύμωση σε αερόβιες συνθήκες με τη χρήση συμβατικού στελέχους του ζυμομύκητα *Zygosaccharomyces rouxii*. Το μέρος του προϊόντος που δεν είναι μαννιτόλη αποτελείται κυρίως από σορβιτόλη, μαλιτιτόλη και ισομαλιτιτόλη.

Αριθ. EINECS

200-711-8

Χημική ονομασία

D-μαννιτόλη

Χημικός τύπος

 $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6$ 

Μοριακό βάρος

182,2

Δοκιμασία

Τουλάχιστον 99 % επί ξηράς ουσίας

**Περιγραφή**

Λευκή, άοσμη, κρυσταλλική σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Διαλυτή στο νερό, πολύ λίγο διαλυτή στην αιθανόλη, πρακτικά αδιάλυτη στον αιθέρα

Πεδίο τιμών σημείου τήξης

Από 164 °C έως 169 °C

Φασματομετρία απορρόφησης υπέρυθρης ακτινοβολίας

Σύγκριση με πρότυπο αναφοράς, π.χ. EP ή USP

Ειδική στροφοική ικανότητα

 $[\alpha]_{\text{D}}^{20}$ : + 23° έως + 25° (διάλυμα βορικού άλατος)

pH

Μεταξύ 5 και 8

Προστίθεται 0,5 ml κορεσμένου διαλύματος χλωριούχου καλίου σε 10 ml διαλύματος του δείγματος με συγκέντρωση 10 % (w/v) και στη συνέχεια μετράται το pH

**▼ M4****Καθαρότητα**

Αραβιτόλη

0,3 % κατ' ανώτατο όριο

Περιεκτικότητα σε νερό

Το ανώτερο 0,5 % (μέθοδος Karl Fischer)

Αγωγιμότητα

Όχι περισσότερο από 20  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (σε διάλυμα 20 % ξηρής ύλης) σε θερμοκρασία 20 °C

Αναγωγικά σάκχαρα

0,3 % κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε γλυκόζη)

Ολικά σάκχαρα

1 % κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε γλυκόζη)

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **B****Μικροβιολογικά κριτήρια**

Αερόβια μεσόφιλα βακτήρια	1 000 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
Κολοβακτηρίδια	Απουσία σε 10 g
<i>Salmonella</i> spp.	Απουσία σε 25 g
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 10 g
<i>Staphylococcus aureus</i>	Απουσία σε 10 g
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Απουσία σε 10 g
Ευρωτομύκητες	100 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
Ζυμομύκητες	100 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο

▼ **M41****E 422 ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ****Συνώνυμα**

Γλυκερίνη· Γλυκερόλη

**Ορισμός**

Η γλυκερόλη λαμβάνεται μόνο από φυτικά έλαια και λίπη, είτε απευθείας είτε από την ακατέργαστη γλυκερόλη που λαμβάνεται ως υποπροϊόν της παραγωγής βιοντίζελ και υποβάλλεται σε διαδικασίες καθαρισμού που περιλαμβάνουν απόσταξη και άλλα στάδια καθαρισμού για τη λήψη εξευγενισμένης γλυκερόλης.

Αριθ. Eines

200-289-5

Χημική ονομασία

Προπανοτριόλη-1,2,3· Γλυκερόλη (γλυκερίνη)· Τριυδροξυ-προπάνιο

Χημικός τύπος

C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub>

Μοριακό βάρος

92,10

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε γλυκερόλη τουλάχιστον 98 % επί ξηράς ουσίας

**Περιγραφή**

Διαυγές, άχρωμο υγροσκοπικό σιροπιώδες υγρό με αμυδρή χαρακτηριστική οσμή, που δεν είναι ούτε δριμεία ούτε δυσάρεστη

**Ταυτοποίηση**

Ειδικό βάρος (25 °C/25 °C)

Τουλάχιστον 1,257

Δείκτης διαθλάσεως

[n]<sub>D</sub><sup>20</sup> από 1,471 έως 1,474**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό

5 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

Θεική τέφρα

0,01 % κατ' ανώτατο όριο, προσδιοριζόμενη με πύρωση στους 800 ± 25 °C

Βουτανοτριόλες

0,2 % κατ' ανώτατο όριο

Ακρολεΐνη

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Λιπαρά οξέα και εστέρες λιπαρών οξέων

0,1 % κατ' ανώτατο όριο εκφρασμένα σε βουτυρικό οξύ

Χλωριούχες ενώσεις

30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (ως χλώριο)

3-γλωρο-προπανοδιόλη-1,2 (3-MCPD)

0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Αρσενικό

0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Κάδμιο

0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **M7****E 423 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΟΚΤΕΝΥΛΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΞΥ ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΟΜΜΙ**

<b>Συνώνυμα</b>	Υγρογονοκτενυλοβουτανοδικό αραβικό κόμμι, υδρογονοκτενυληλεκτρικό αραβικό κόμμι
<b>Ορισμός</b>	Το τροποποιημένο με οκτενυληλεκτρικό οξύ αραβικό κόμμι παράγεται με εστεροποίηση αραβικού κόμμιος ( <i>Acacia seyal</i> ) ή από αραβικό κόμμι ( <i>Acacia senegal</i> ) σε υδατικό διάλυμα με έως και 3 % οκτενυληλεκτρικού ανυδρίτη. Στη συνέχεια ξηραίνεται με ψεκασμό.
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μέσο μοριακό βάρος κατά βάρος	Κλάσμα i): 3,105 g/mol Κλάσμα ii) 1,106 g/mol
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ελεύθερης ροής, με υπόλευκο έως ανοιχτό καστανό χρώμα
<b>Ταυτότητα</b>	
Ιξώδες διάλυμα συγκεντρώσεως 5 % στους 25 °C	30 mPa.s κατ' ανώτατο όριο
Αντίδραση καθίζησης	Σχηματίζει κροκιδώδη ιζήματα σε διάλυμα βασικού οξικού μολύβδου (TS).
Διαλυτότητα	Ουσία εύκολα διαλυτή στο νερό· αδιάλυτο σε αιθανόλη
pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 5 %	3,5 έως 6,5
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	15 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 5 ώρες)
Βαθμός εστεροποίησης	0,6 % κατ' ανώτατο όριο
Ολική τέφρα	10 % κατ' ανώτατο όριο (530 °C)
Τέφρα αδιάλυτη σε οξέα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Δοκιμή για άμυλο ή δεξτρίνη	Φέρεται σε βρασμό υδατικό διάλυμα του δείγματος σε αναλογία 1:50 και προστίθεται περίπου 0,1 ml ιωδιούχου TS. Δεν πρέπει να εμφανιστεί γαλαζωπό ή κοκκινωπό χρώμα.
Δοκιμή για κόμμι ταννίνης	Σε 10 ml υδατικού διαλύματος του δείγματος 1:50, προστίθεται περίπου 0,1 ml διαλύματος τριχλωριούχου σιδήρου. Δεν πρέπει να εμφανιστεί υπόμαυρο χρώμα ούτε να σχηματιστεί υπόμαυρο ίζημα.
Κατάλοιπο οκτενυληλεκτρικού οξέος	0,3 % κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
<i>Salmonella</i> spp.	Απουσία σε 25 g
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 1 g

## ▼ B

## E 425 (i) KOMMI KONJAC

## Συνώνυμα

## Ορισμός

Το κόμμα Κοηίας είναι υδατοδιαλυτό υδροκολλοειδές το οποίο λαμβάνεται από το άλευρο Κοηίας με εκχύλιση με νερό. Το άλευρο κοηίας είναι το μη καθαρισμένο ακατέργαστο προϊόν από τη ρίζα του πολυετούς φυτού *Amorphophallus konjac*. Το βασικό συστατικό του κόμματος Κοηίας είναι ο υδατοδιαλυτός μακρομοριακός πολυσακχαρίτης γλυκομαννάνη, ο οποίος αποτελείται από δομικές μονάδες D-μαννόζης και D-γλυκόζης με γραμμομοριακή αναλογία 1,6: 1,0, συνδεδεμένες με γλυκοζιτικούς δεσμούς β(1-4). Μικρότερες πλευρικές αλυσίδες συνδέονται με γλυκοζιτικούς δεσμούς β(1-3), ενώ εμφανίζονται τυχαία ακετυλομάδες σε αναλογία 1 ομάδα ανά 9 έως 19 δομικές μονάδες σακχάρου

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Το κύριο συστατικό, η γλυκομαννάνη, έχει μέσο μοριακό βάρος 200 000 έως 2 000 000

Δοκιμασία

Ελάχιστη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες 75 %

## Περιγραφή

Σκόνη λευκού ή υπόλευκου έως ανοικτού χρυσοκάστανου χρώματος

## Ταυτοποίηση

Διαλυτότητα

Κολλοειδώς διαλυτό σε θερμό ή κρύο νερό, σχηματίζει πολύ παχύρρευστο διάλυμα με pH μεταξύ 4,0 και 7,0

Σχηματισμός πηκτής

Προστίθενται 5 ml διαλύματος βορικού νατρίου 4 % σε διάλυμα του δείγματος με συγκέντρωση 1 % σε δοκιμαστικό σωλήνα και το σύνολο ανακινείται ζωηρά. Σχηματίζεται πηκτή

Σχηματισμός θερμοσταθερής πηκτής

Παρασκευάζεται διάλυμα του δείγματος με συγκέντρωση 2 %, με θέρμανση σε υδατόλουτρο επί 30 λεπτά, υπό συνεχή ανατάραξη, και στη συνέχεια το διάλυμα ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου. Για κάθε g δείγματος που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή 30 g του διαλύματος 2 %, προστίθεται 1 ml διαλύματος ανθρακικού καλίου 10 % στο πλήρως ενυδατωμένο δείγμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το μείγμα θερμαίνεται σε υδατόλουτρο στους 85 °C και διατηρείται στη θερμοκρασία αυτή επί 2 ώρες χωρίς ανατάραξη. Στις συνθήκες αυτές σχηματίζεται θερμοσταθερή πηκτή

## Καθαρότητα

Απώλεια κατά την ξήρανση

12 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 5 ώρες)

Άμυλο

3 % κατ' ανώτατο όριο

Πρωτεΐνη

3 % κατ' ανώτατο όριο (συντελεστής N × 5,7)

Ιξώδες (διάλυμα 1 %)

Τουλάχιστον 3 kgm<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup> στους 25 °C

Υγες διαλυτές στον αέρα

0,1 % κατ' ανώτατο όριο

Ολική τέφρα

5,0 % κατ' ανώτατο όριο (800 °C, 3 έως 4 ώρες)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## Μικροβιολογικά κριτήρια

*Salmonella* spp.

Απουσία σε 12,5 g

*Escherichia coli*

Απουσία σε 5 g

## E 425 (ii) ΓΛΥΚΟΜΑΝΝΑΝΗ ΚΟΝJΑC

## Συνώνυμα

## Ορισμός

Η γλυκομαννάνη Κοηίας είναι υδατοδιαλυτό υδροκολλοειδές που λαμβάνεται από το άλευρο Κοηίας με έκπλυση με αθανόλη που περιέχει νερό. Το άλευρο Κοηίας είναι το μη καθαρισμένο ακατέργαστο προϊόν από τον κόνδυλο του πολυετούς φυτού *Amorphophallus konjac*. Το βασικό συστατικό είναι ο υδατοδιαλυτός μακρομοριακός πολυσακχαρίτης γλυκομαννάνη, ο οποίος αποτελείται από δομικές μονάδες D-μαννόζης και D-γλυκόζης με γραμμομοριακή αναλογία 1,6: 1,0, συνδεδεμένες με γλυκοζιτικούς δεσμούς β(1-4), και με διακλάδωση σε κάθε 50ή ή 60ή μονάδα περίπου. Κάθε 19ος σακχαρίτης περίπου είναι ακετυλωμένος

**▼ B**

Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	500 000 έως 2 000 000
Δοκιμασία	Σύνολο διαιτητικών ινών: τουλάχιστον 95 % επί ξηρού
<b>Περιγραφή</b>	Ρέουσα και άοσμη σκόνη, χρώματος λευκού έως ελαφρώς υποκάστανου, λεπτού κοκκομετρικού βαθμού
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Κολλοειδώς διαλυτό σε θερμό ή κρύο νερό, σχηματίζει πολύ παχύρρευστο διάλυμα με pH μεταξύ 5,0 και 7,0. Η διαλυτότητα αυξάνεται με θέρμανση και μηχανική ανατάραξη
Σχηματισμός θερμοσταθερής πηκτής	Παρασκευάζεται διάλυμα του δείγματος με συγκέντρωση 2 %, με θέρμανση σε υδατόλουτρο επί 30 λεπτά, υπό συνεχή ανατάραξη, και στη συνέχεια το διάλυμα ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου. Για κάθε g δείγματος που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή 30 g του διαλύματος 2 %, προστίθεται 1 ml διαλύματος ανθρακικού καλίου 10 % στο πλήρως ενυδατωμένο δείγμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το μείγμα θερμαίνεται σε υδατόλουτρο στους 85 °C και διατηρείται στη θερμοκρασία αυτή επί 2 ώρες χωρίς ανατάραξη. Στις συνθήκες αυτές σχηματίζεται θερμοσταθερή πηκτή
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	8 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 3 ώρες)
Άμυλο	1 % κατ' ανώτατο όριο
Ιξώδες (διάλυμα 1 %)	Τουλάχιστον 20 kgm <sup>-1</sup> s <sup>-1</sup> στους 25 °C
Πρωτεΐνη	1,5 % κατ' ανώτατο όριο (N x 5,7 ώρες)
Υλες διαλυτές στον αέρα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Θειώδη ιόντα (ως SO <sub>2</sub> )	4 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υλες διαλυτές σε αλκοόλη 50 %.	0,02 % κατ' ανώτατο όριο
Ολική τέφρα	2,0 % κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2,0 % κατ' ανώτατο όριο (800 °C, 3 έως 4 ώρες)
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
<i>Salmonella</i> spp.	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 12,5 g
	Απουσία σε 5 g

**E 426 ΗΜΙΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΣΟΓΙΑΣ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Η ημικυτταρίνη σόγιας είναι εξευγενισμένος υδατοδιαλυτός πολυσακχαρίτης που λαμβάνεται από ίνες σόγιας με εκχύλιση με θερμό νερό. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλα οργανικά αντιδραστήρια καθίζησης εκτός από αιθανόλη

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

Υδατοδιαλυτοί πολυσακχαρίτες σόγιας. Υδατοδιαλυτές ίνες σόγιας

Ελάχιστη περιεκτικότητα σε υδαάνθρακες 74 %



## ▼ B

<b>Περιγραφή</b>	Ρέουσα λευκή ή λευκοκίτρινη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτή σε θερμό και κρύο νερό χωρίς σχηματισμό πηκτής
pH	5,5 ± 1,5 (διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	7 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)
Πρωτεΐνη	14 % κατ' ανώτατο όριο
Ιξώδες	200 mPa.s κατ' ανώτατο όριο (διάλυμα 10 %)
Ολική τέφρα	9,5 % κατ' ανώτατο όριο (600 °C, 4 ώρες)
Αρσενικό	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αιθανόλη	2 % κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
Συνολικός αριθμός μικροοργανισμών	3 000 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
Ζυμομόκητες και ευρωτομόκητες	100 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 10 g

## E 427 ΚΟΜΜΙ ΚΑΣΣΙΑΣ

## Συνώνυμα

## Ορισμός

	<p>Το κόμμι κασσίας είναι το κονιοποιημένο καθαρό ενδοσπέρμιο των σπερμάτων των φυτών <i>Cassia tora</i> και <i>Cassia obtusifoli</i> (οικογένεια Leguminosae) που περιέχει λιγότερο από 0,05 % <i>Cassia occidentalis</i>. Αποτελείται κυρίως από μακρομοριακούς πολυσακχαρίτες που συνίστανται κυρίως σε ευθεία αλυσίδα δομικών μονάδων 1,4-β-D-μαννοπυρανόζης, συνδεδεμένων στις θέσεις 1,6 με μονάδες α-D-γαλακτοπυρανόζης. Η αναλογία μαννόζης προς γαλακτόζη είναι περίπου 5:1.</p> <p>Κατά την παρασκευή, αφαιρούνται ο εξωτερικός φλοιός και το φυτό από τα σπέρματα με θερμομηχανική κατεργασία και ακολουθεί άλεση και κοσκίνιση του ενδοσπερμίου. Το κονιοποιημένο ενδοσπέρμιο υποβάλλεται σε περαιτέρω καθαρισμό με εκχύλιση με προπανόλη-2.</p>
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε γαλακτομαννάνη τουλάχιστον 75 %
<b>Περιγραφή</b>	Ωχροκίτρινη έως υπόλευκη άοσμη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο σε αιθανόλη. Διασπείρεται καλά σε κρύο νερό, σχηματίζοντας κολλοειδές διάλυμα.
Σχηματισμός πηκτής με βορικό άλας	Σε υδατικό κολλοειδές διάλυμα του δείγματος προστίθεται επαρκής ποσότητα διαλύματος βορικού νατρίου (TS) ώστε να αυξηθεί το pH άνω του 9, οπότε σχηματίζεται πηκτή.
Σχηματισμός πηκτής με ξανθανικό κόμμι	Ζυγίζονται 1,5 g του δείγματος και 1,5 g ξανθανικού κόμμεος και αναμειγνύονται. Το εν λόγω μείγμα μεταφέρεται (υπό ταχεία ανάδευση) σε ποτήρι βρασμού των 400 ml που περιέχει 300 ml νερού σε θερμοκρασία 80 °C. Ακολουθεί ανάδευση μέχρι την πλήρη διάλυση του μείγματος και για επιπλέον 30 λεπτά (κατά τη διάρκεια της ανάδευσης η θερμοκρασία διατηρείται σε επίπεδο άνω των 60 °C). Διακόπτεται η ανάδευση και το μείγμα αφήνεται να ψυχθεί σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 2 ώρες.

▼ **B**

Ιξώδες	Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω απ' τους 40 °C σχηματίζεται μια σταθερή, παχύρρευστη και ελαστική πηκτή, η οποία δεν σχηματίζεται με διάλυμα-μάρτυρα κόμμεος κασσίας ή ζανθανικού κόμμεος 1 %, το οποίο παρασκευάζεται με τον ίδιο τρόπο.
<b>Καθαρότητα</b>	
Ύλες αδιάλυτες σε οξέα	Λιγότερο από 500 mPa.s (25 °C, 2 ώρες, διάλυμα 1 %) που αντιστοιχεί σε μέσο μοριακό βάρος 200 000-300 000 Da
pH	2,0 % κατ' ανώτατο όριο
Ακατέργαστες λιπαρές ουσίες	5,5-8 (υδατικό διάλυμα 1 %)
Πρωτεΐνη	1 % κατ' ανώτατο όριο
Ολική τέφρα	7 % κατ' ανώτατο όριο
Απόλεια κατά την ξήρανση	12 % κατ' ανώτατο όριο (5 ώρες, 105 °C)
Ολικές ανθρακίνες	0,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (όριο ανίχνευσης)
Υπολείμματα διαλυτών	750 mg/kg προπανόλης-2 κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
Συνολικός αριθμός μικροοργανισμών	5 000 αποικίες ανά γραμμάριο κατ' ανώτατο όριο
Ζυμομόκητες και ευρωτομόκητες	100 αποικίες ανά γραμμάριο κατ' ανώτατο όριο
<i>Salmonella</i> spp	Απουσία σε 25 g
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 1 g

**E 431 ΣΤΕΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΞΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (40)**

<b>Συνώνυμα</b>	Μονοστεατικό πολυοξυαιθυλένιο (40)
<b>Ορισμός</b>	Μείγμα μονο- και δι-εστέρων του βρώσιμου στεατικού οξέος του εμπορίου με μεικτές πολυοξυαιθυλενοδιόλες (με μέσο μήκος πολυμερούς περίπου 40 μονάδων οξυαιθυλενίου) μαζί με ελεύθερη πολυόλη
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,5 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Νιφάδες υπόλευκου χρώματος ή κηρώδες στερεό στους 25 °C, με ελαφρά οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτό σε νερό, αιθανόλη, μεθανόλη και οξικό αιθυλεστέρα. Αδιάλυτο σε ορυκτέλαιο
Πεδίο τιμών σημείου πήξης	39 °C - 44 °C
Φάσμα απορρόφησης υπερύθρου	Το χαρακτηριστικό φάσμα ενός μερικού εστέρα λιπαρού οξέος με πολυοξυαιθυλιωμένη πολυόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	3 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Βαθμός οξύτητας	1 κατ' ανώτατο όριο
Αριθμός σαπωνοποίησης	Τουλάχιστον 25 και κατ' ανώτατο όριο 35
Αριθμός υδροξυλίου	Τουλάχιστον 27 και κατ' ανώτατο όριο 40
1,4-διοξάνιο	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **M37**▼ **B**

Αιθυλενογλυκόλες (μονο- και δι-)	0,25 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 432 ΜΟΝΟΛΑΥΡΙΚΗ ΠΟΛΥΟΞΥ-ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΣΟΡΒΙΤΑΝΗ (POLY-SORBATE 20)****Συνώνυμα**

Polysorbate 20· μονολαυρική πολυοξυαιθυλενο (20) σορβιτάνη

**Ορισμός**

Μείγμα μερικών εστέρων της σορβιτόλης και των μονο- και δι-ανυδριτών της με βρώσιμο λαυρικό οξύ του εμπορίου και συμπεκνωμένο με περίπου 20 γραμμομόρια αιθυλενοξειδίου ανά γραμμομόριο σορβιτόλης και ανυδριτών της

Αριθ. EINECS  
Χημική ονομασία  
Χημικός τύπος  
Μοριακό βάρος  
Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 70 % σε οξυαιθυλενικές ομάδες, ισοδύναμη με τουλάχιστον 97,3 % μονολαυρικής πολυοξυαιθυλενο (20) σορβιτάνης επί άνυδρης ουσίας

**Περιγραφή**

Ελαιώδες υγρό στους 25 °C, χρώματος κίτρινου του λεμονιού έως κίτρινου του κεχριμπαριού, με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Διαλυτή στο νερό, στην αιθανόλη, στη μεθανόλη, στον οξικό αιθυλεστέρα και στο διοξάνιο. Αδιάλυτη σε ορυκτέλαιο και στον πετρελαϊκό αιθέρα

Φάσμα απορρόφησης υπερύθρου

Το χαρακτηριστικό φάσμα ενός μερικού εστέρα λιπαρού οξέος με πολυοξυαιθυλιωμένη πολυόλη

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό  
Βαθμός οξύτητας  
Αριθμός σαπωνοποίησης  
Αριθμός υδροξυλίου  
1,4-διοξάνιο

3 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

2 κατ' ανώτατο όριο

Τουλάχιστον 40 και έως 50 κατ' ανώτατο όριο

Τουλάχιστον 96 και έως 108 κατ' ανώτατο όριο

5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **M37**▼ **B**

Αιθυλενογλυκόλες (μονο- και δι-)	0,25 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 433 ΜΟΝΟΕΛΑΪΚΗ ΠΟΛΥΟΞΥ-ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΣΟΡΒΙΤΑΝΗ (POLY-SORBATE 80)****Συνώνυμα**

Polysorbate 80· Μονοελαϊκή πολυοξυαιθυλενο (20) σορβιτάνη

**Ορισμός**

Μείγμα μερικών εστέρων της σορβιτόλης και των μονο- και δι-ανυδριτών της με βρώσιμο ελαϊκό οξύ του εμπορίου και συμπεκνωμένο με περίπου 20 γραμμομόρια αιθυλενοξειδίου ανά γραμμομόριο σορβιτόλης και ανυδριτών της

**▼ B**

Αριθ. EINECS  
Χημική ονομασία  
Χημικός τύπος  
Μοριακό βάρος  
Δοκιμασία

**Περιγραφή****Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Φάσμα απορρόφησης υπερύθρου

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό  
Βαθμός οξύτητας  
Αριθμός σαπωνοποίησης  
Αριθμός υδροξυλίου  
1,4-διοξάνιο

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 65 % σε οξυαιθυλενικές ομάδες, ισοδύναμη τουλάχιστον με 96,5 % μονοελαϊκής πολυοξυαιθυλενο (20) σορβιτάνης επί άνυδρης ουσίας

Ελαιώδες υγρό στους 25 °C, κίτρινου του λεμονιού έως κίτρινου του κεχριμπαριού, με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή

Διαλυτή στο νερό, την αιθανόλη, τη μεθανόλη, τον οξικό αιθυλεστέρα και το τολουόλιο. Αδιάλυτη σε ορυκτέλαιο και στον πετρελαϊκό αιθέρα

Το χαρακτηριστικό φάσμα ενός μερικού εστέρα λιπαρού οξέος με πολυοξυαιθυλιωμένη πολυόλη

3 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

2 κατ' ανώτατο όριο

Τουλάχιστον 45 και κατ' ανώτατο όριο 55

Τουλάχιστον 65 και κατ' ανώτατο όριο 80

5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M37****▼ B**

Αιθυλενογλυκόλες (μονο- και δι-)  
Αρσενικό  
Μόλυβδος  
Υδράργυρος  
Κάδμιο

0,25 % κατ' ανώτατο όριο

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 434 ΜΟΝΟΠΑΛΜΙΤΙΚΗ ΠΟΛΥΟΞΥ-ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΣΟΡΒΙΤΑΝΗ (POLYSORBATE 40)****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS  
Χημική ονομασία  
Χημικός τύπος  
Μοριακό βάρος  
Δοκιμασία

**Περιγραφή****Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Polysorbate 40· Μονοπαλμιτική πολυοξυαιθυλενο (20) σορβιτάνη

Μείγμα μερικών εστέρων της σορβιτόλης και των μονο- και δι-ανυδριτών της με βρώσιμο παλμιτικό οξύ του εμπορίου και συμπεκνωμένο με περίπου 20 γραμμομόρια αιθυλενοξειδίου ανά γραμμομόριο σορβιτόλης και ανυδριτών της

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 66 % σε οξυαιθυλενικές ομάδες, ισοδύναμη τουλάχιστον με 97 % μονοπαλμιτικής πολυοξυαιθυλενο (20) σορβιτάνης επί άνυδρης ουσίας

Κίτρινο του λεμονιού έως πορτοκαλόχρωμο ελαιώδες υγρό ή ημιπύκτωμα στους 25 °C, με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή

Διαλυτή στο νερό, την αιθανόλη, τη μεθανόλη, τον οξικό αιθυλεστέρα και την ακετόνη. Αδιάλυτη σε ορυκτέλαιο

▼ B

Φάσμα απορρόφησης υπερύθρου

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό

Βαθμός οξύτητας

Αριθμός σαπωνοποίησης

Αριθμός υδροξυλίου

1,4-διοξάνιο

Το χαρακτηριστικό φάσμα ενός μερικού εστέρα λιπαρού οξέος με πολυοξαιθυλιωμένη πολυόλη

3 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

2 κατ' ανώτατο όριο

Τουλάχιστον 41 και 52 κατ' ανώτατο όριο

Τουλάχιστον 90 και 107 κατ' ανώτατο όριο

5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ M37▼ B

Αιθυλενογλυκόλες (μονο- και δι-)

Αρσενικό

Μόλυβδος

Υδράργυρος

Κάδμιο

0,25 % κατ' ανώτατο όριο

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 435 ΜΟΝΟΣΤΕΑΤΙΚΗ ΠΟΛΥΟΞΥ-ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΣΟΡΒΙΤΑΝΗ (POLY-SORBATE 60)****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

Polysorbate 60· Μονοστεατική πολυοξυ-αιθυλενο (20) σορβιτάνη

Μείγμα μερικών εστέρων της σορβιτόλης και των μονο- και δι-ανυδριτών της με βρώσιμο στεατικό οξύ του εμπορίου και συμπυκνωμένο με περίπου 20 γραμμομόρια αιθυλενοξειδίου ανά γραμμομόριο σορβιτόλης και ανυδριτών της

**Περιγραφή****Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Φάσμα απορρόφησης υπερύθρου

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 65 % σε οξυαιθυλενικές ομάδες, ισοδύναμη τουλάχιστον με 97 % μονοστεατικής πολυοξυαιθυλενο (20) σορβιτάνης επί άνυδρης ουσίας

Κίτρινο του λεμονιού έως πορτοκαλόχρωμο ελαιώδες υγρό ή ημιπύκτωμα στους 25 °C, με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό

Βαθμός οξύτητας

Αριθμός σαπωνοποίησης

Αριθμός υδροξυλίου

1,4-διοξάνιο

Διαλυτή στο νερό, τον οξικό αιθυλεστέρα και το τολουόλιο. Αδιάλυτη σε ορυκτέλαιο και φυτικά έλαια

Το χαρακτηριστικό φάσμα ενός μερικού εστέρα λιπαρού οξέος με πολυοξαιθυλιωμένη πολυόλη

3 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

2 κατ' ανώτατο όριο

Τουλάχιστον 45 και κατ' ανώτατο όριο 55

Τουλάχιστον 81 και κατ' ανώτατο όριο 96

5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ M37

**▼ B**

Αιθυλενογλυκόλες (μονο- και δι-)	0,25 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 436 ΤΡΙΣΤΕΑΤΙΚΗ ΠΟΛΥΟΞΥ-ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΣΟΡΒΙΤΑΝΗ (POLYSORBATE 65)**

<b>Συνώνυμα</b>	Polysorbate 65· Τριστεατική πολυοξυαιθυλενο (20) σορβιτάνη
<b>Ορισμός</b>	Μείγμα μερικών εστέρων της σορβιτόλης και των μονο- και δι-ανυδριτών της με βρώσιμο στεατικό οξύ του εμπορίου και συμπυκνωμένο με περίπου 20 γραμμομόρια αιθυλενοξειδίου ανά γραμμομόριο σορβιτόλης και ανυδριτών της
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 46 % σε οξυαιθυλενικές ομάδες, ισοδύναμη τουλάχιστον με 96 % τριστεατικής πολυοξυαιθυλενο (20) σορβιτάνης σε άνυδρη βάση
<b>Περιγραφή</b>	Χρυσοκάστανο, κηρώδες στερεό στους 25 °C, με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Κολλοειδώς διαλυτή στο νερό. Διαλυτή σε ορυκτέλαιο, φυτικά έλαια, πετρελαϊκό αιθέρα, ακετόνη, αιθέρα, διοξάνιο, αιθανόλη και μεθανόλη
Πεδίο τιμών σημείου πήξης	29-33 °C
Φάσμα απορρόφησης υπερύθρου	Το χαρακτηριστικό φάσμα ενός μερικού εστέρα λιπαρού οξέος με πολυοξυαιθυλιωμένη πολυόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	3 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Βαθμός οξύτητας	2 κατ' ανώτατο όριο
Αριθμός σαπωνοποίησης	Τουλάχιστον 88 και κατ' ανώτατο όριο 98
Αριθμός υδροξυλίου	Τουλάχιστον 40 και κατ' ανώτατο όριο 60
1,4-διοξάνιο	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M37****▼ B**

Αιθυλενογλυκόλες (μονο- και δι-)	0,25 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## ▼ B

## E 440 (i) ΠΗΚΤΙΝΗ

## Συνώνυμα

## Ορισμός

Η πηκτίνη συνίσταται κυρίως από τους μερικούς εστεροποιημένους μεθυλεστέρες του πολυγαλακτουρονικού οξέος και τα άλατά τους με αμμώνιο, νάτριο, κάλιο και ασβέστιο. Λαμβάνεται με εκχύλιση σε υδατικό περιβάλλον κατάλληλων βρώσιμων φυτικών υλών, συνήθως εσπεριδοειδών ή μήλων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλα οργανικά αντιδραστήρια καθίζησης εκτός από μεθανόλη, αιθανόλη και προπανόλη-2

Αριθ. EINECS

232-553-0

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε γαλακτουρονικό οξύ τουλάχιστον 65 % επί άνυδρης και απαλλαγμένης από τέφρα ουσίας, μετά από έκλυση με οξύ και αλκοόλη

## Περιγραφή

Σκόνη χρώματος λευκού ανοικτοκίτρινου, ανοικτού φαιού ή ανοικτού καστανού

## Ταυτοποίηση

Διαλυτότητα

Διαλύεται στο νερό σχηματίζοντας κολλοειδές οπαλίζον διάλυμα. Αδιάλυτη σε αιθανόλη

## Καθαρότητα

Απώλεια κατά την ξήρανση

12 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)

Τέφρα αδιάλυτη σε οξέα

1 % κατ' ανώτατο όριο (αδιάλυτη σε υδροχλωρικό οξύ περίπου 3N)

Διοξειδίο του θείου

50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας

Περιεκτικότητα σε άζωτο

1,0 % κατ' ανώτατο όριο μετά από έκλυση με οξύ και αιθανόλη

Ολικές αδιάλυτες ύλες

3 % κατ' ανώτατο όριο

Υπολείμματα διαλυτών

1 % ελεύθερης μεθανόλης, αιθανόλης, προπανόλης-2 κατ' ανώτατο όριο, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, επί ουσίας απαλλαγμένης από πτητικές ύλες

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## E 440 (ii) ΑΜΙΔΙΩΜΕΝΕΣ ΠΗΚΤΙΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

## Συνώνυμα

## Ορισμός

Οι αμιδιωμένες πηκτινικές ύλες συνίστανται κυρίως από τους μερικούς εστεροποιημένους μεθυλεστέρες και τα αμύδια του πολυγαλακτουρονικού οξέος καθώς και από τα άλατά τους με αμμώνιο, νάτριο, κάλιο και ασβέστιο. Λαμβάνονται με εκχύλιση σε υδατικό περιβάλλον κατάλληλων βρώσιμων φυτικών υλών, συνήθως εσπεριδοειδών ή μήλων, ακολουθούμενη από κατεργασία με αμμωνία σε αλκαλικό περιβάλλον. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλα οργανικά αντιδραστήρια καθίζησης εκτός από μεθανόλη, αιθανόλη και προπανόλη-2

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

**▼ B**

Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Περιεκτικότητα σε γαλακτουρονικό οξύ τουλάχιστον 65 % επί άνυδρης και απαλλαγμένης από τέφρα ουσίας, μετά από έκπλυση με οξύ και αλκοόλη
<b>Ταυτοποίηση</b>	Σκόνη χρώματος λευκού, ανοικτοκίτρινου, ανοικτού φαιού ή ανοικτού καστανού
<b>Διαλυτότητα</b>	Διαλύονται στο νερό σχηματίζοντας κολλοειδές οπαλίζον διάλυμα. Αδιάλυτες σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	12 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)
Τέφρα αδιάλυτη σε οξέα	1 % κατ' ανώτατο όριο (αδιάλυτη σε υδροχλωρικό οξύ περίπου 3N)
Βαθμός αμιδίωσης	25 % ολικών καρβοξυλίων κατ' ανώτατο όριο
Υπόλειμμα διοξειδίου του θείου	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας
Περιεκτικότητα σε άζωτο	2,5 % κατ' ανώτατο όριο μετά από έκπλυση με οξύ και αιθανόλη
Ολικές αδιάλυτες ύλες:	3 % κατ' ανώτατο όριο
Υπολείμματα διαλυτών	1 % μεθανόλης, αιθανόλης, προπανόλης-2 κατ' ανώτατο όριο, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, επί ουσίας απαλλαγμένης από πτητικές ύλες
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 442 ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	Άλατα φωσφατιδικών οξέων με αμμώνιο· μείγμα αλάτων φωσφορυλιωμένων γλυκεριδίων με αμμώνιο
<b>Ορισμός</b>	Μείγμα ενώσεων του αμμωνίου με φωσφατιδικά οξέα που λαμβάνονται από βρώσιμα λίπη και έλαια. Ο φωσφόρος μπορεί να είναι ενωμένος με ένα, δύο ή τρία γλυκερίδια. Επιπλέον, δύο φωσφορικοί εστέρες μπορεί να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους ως φωσφατιδυλοφωσφατίδια
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε φωσφόρο τουλάχιστον 3 % και έως 3,4 % κατ' ανώτατο όριο κατά βάρος· περιεκτικότητα σε αμμώνιο τουλάχιστον 1,2 % και έως 1,5 % κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενο ως N)

**▼ M3**

**Περιγραφή** Ημιστερεό λιπαρής υφής έως ελαιώδες υγρό

**▼ B**

<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτά σε λίπη. Αδιάλυτα στο νερό. Μερικώς διαλυτά σε αιθανόλη και ακετόνη
Δοκιμή γλυκερόλης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή λιπαρών οξέων	Δοκιμή θετική



## ▼ B

Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Ύλες αδιάλυτες σε πετρελαϊκό αιθέρα	2,5 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## E 444 ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΙΚΗ ΟΞΙΚΗ ΣΑΚΧΑΡΟΖΗ

<b>Συνώνυμα</b>	SAIB
<b>Ορισμός</b>	Η ισοβουτυρική οξική σακχαρόζη είναι μείγμα των προϊόντων αντίδρασης που σχηματίζονται με εστεροποίηση σακχαρόζης ποιότητας για τρόφιμα με ανυδρίτη οξικού οξέος και ισοβουτυρικό ανυδρίτη, ακολουθούμενη από απόσταξη. Το μείγμα περιέχει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς εστέρων, στους οποίους η γραμμομοριακή αναλογία της οξικής προς τη βουτυρική ρίζα είναι περίπου 2:6
Αριθ. EINECS	204-771-6
Χημική ονομασία	Ισοβουτυρική οξική σακχαρόζη
Χημικός τύπος	C <sub>40</sub> H <sub>62</sub> O <sub>19</sub>
Μοριακό βάρος	832-856 (περίπου), C <sub>40</sub> H <sub>62</sub> O <sub>19</sub> : 846,9
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε C <sub>40</sub> H <sub>62</sub> O <sub>19</sub> τουλάχιστον 98,8 % και έως 101,9 % κατ' ανώτατο όριο
<b>Περιγραφή</b>	Αχρόχρωμο υγρό, διαυγές και χωρίς ίζημα, με ευχάριστη οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτη στο νερό. Διαλυτή στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες
Δείκτης διάθλασης	[n] <sub>D</sub> <sup>40</sup> : 1,4492 - 1,4504
Ειδικό βάρος	[d] <sub>D</sub> <sup>25</sup> : 1,141 - 1,151
<b>Καθαρότητα</b>	
Τριακετίνη	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Βαθμός οξύτητας	0,2 κατ' ανώτατο όριο
Αριθμός σαπωνοποίησης	Τουλάχιστον 524 και έως 540 κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## E 445 ΕΣΤΕΡΕΣ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΜΕ ΚΟΛΟΦΩΝΙΟ ΞΥΛΟΥ

<b>Συνώνυμα</b>	Εστερικό κόμμι
<b>Ορισμός</b>	Πολύπλοκο μείγμα εστέρων δι- και τριγλυκερίνης με ρητινικά οξέα προερχόμενα από κολοφώνιο ξύλου. Το κολοφώνιο λαμβάνεται από πρέμνα γηρασμένων πεύκων με εκχύλιση με διαλύτη, ακολουθούμενη από κατεργασία καθαρισμού υγρού-υγρού με διαλύτη. Οι προδιαγραφές αυτές δεν ισχύουν για τα παράγωγα των κομμεορητινών και του εκκρίμματος ζωντανών κωνοφόρων δέντρων ούτε για τις ουσίες που λαμβάνονται από ρητίνες ταλελαίου, υποπροϊόντος της επεξεργασίας χαρτοπολτού για χαρτί κραφτ. Η σύσταση του τελικού προϊόντος είναι 90 % περίπου ρητινικά οξέα και 10 % ουδέτερα συστατικά (ουσίες που δεν είναι οξέα). Το ποσοστό των ρητινικών

▼ B

Αριθ. EINECS	οξέων είναι πολύπλοκο μείγμα ισομερών διτερπενικών μονοκαρβοξυλικών οξέων με τον εμπειρικό μοριακό τύπο C <sub>20</sub> H <sub>30</sub> O <sub>2</sub> , κυρίως αβιετικό οξύ. Η ουσία υποβάλλεται σε καθαρισμό με απογύμνωση (stripping) με υδρατμούς ή απόσταξη με υδρατμούς με αντιρροή
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Σκληρό, κίτρινο έως ελαφρώς κεχριμαπόχρωμο στερεό
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτοι στο νερό, διαλυτοί σε ακετόνη
Φάσμα απορρόφησης υπερύθρου	Το χαρακτηριστικό φάσμα της ένωσης
<b>Καθαρότητα</b>	
Ειδικό βάρος διαλύματος	[d] <sup>20</sup> <sub>25</sub> τουλάχιστον 0,935, προσδιοριζόμενο σε διάλυμα σε d-λεμονένιο περιεκτικότητας 50 % (καθαρότητα 97 %, σημείο βρασμού 175,5-176 °C, d <sup>20</sup> <sub>4</sub> : 0,84)
Πεδίο τιμών σημείου μαλάκυνσης κατά Ring and Ball	Από 82 °C έως 90 °C
Βαθμός οξύτητας	Τουλάχιστον 3 και έως 9 κατ' ανώτατο όριο
Αριθμός υδροξυλίου	Τουλάχιστον 15 και έως 45 κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Δοκιμή απουσίας ρητίνης ταλελαίου (δοκιμασία θείου)	Όταν θειούχες οργανικές ενώσεις θερμαίνονται παρουσία μυρμηκικού νατρίου, το θείο μετατρέπεται σε υδρόθειο, ευκόλως ανιχνεύσιμο με χρήση χάρτη οξικού μολύβδου. Θετικό αποτέλεσμα της δοκιμής υποδηλώνει ότι έχει χρησιμοποιηθεί ρητίνη ταλελαίου αντί για κολοφόνιο ξύλου

**E 450 (i) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Δισόξινο διφωσφορικό νάτριο· όξινο πυροφωσφορικό άλας νατρίου· δισόξινο πυροφωσφορικό άλας νατρίου
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-835-0
Χημική ονομασία	Δισόξινο διφωσφορικό νάτριο
Χημικός τύπος	Na <sub>2</sub> H <sub>2</sub> P <sub>2</sub> O <sub>7</sub>
Μοριακό βάρος	221,94
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο τουλάχιστον 95 % Περιεκτικότητα σε P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> τουλάχιστον 63,0 % και έως 64,5 % κατ' ανώτατο όριο

**▼ B**

<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή κόκκοι χρώματος λευκού
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Διαλυτό στο νερό
pH	Από 3,7 έως 5,0 (διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	1 % κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αργίλιο	200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 450 (ii) ΟΞΙΝΟ ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Όξινο πυροφωσφορικό άλας νατρίου όξινο διφωσφορικό άλας νατρίου
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	238-735-6
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	Μονοένυδρο: $\text{Na}_3\text{HP}_2\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$ Άνυδρο: $\text{Na}_3\text{HP}_2\text{O}_7$
Μοριακό βάρος	Μονοένυδρο: 261,95 Άνυδρο: 243,93
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 % επί ξηράς ουσίας Περιεκτικότητα σε $\text{P}_2\text{O}_5$ τουλάχιστον 57 % και έως 59 % κατ' ανώτατο όριο
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή κόκκοι χρώματος λευκού, σε άνυδρη ή μονοένυδρη μορφή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Διαλυτό στο νερό
pH	Από 6,7 έως 7,5 (διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την καύση	4,5 % κατ' ανώτατο όριο στην άνυδρη μορφή (450 – 550 °C). 11,5 % κατ' ανώτατο όριο στη μονοένυδρη μορφή
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες) στην άνυδρη μορφή 1,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες) στη μονοένυδρη μορφή

**▼ B**

Υγες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 450 (iii) ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Πυροφωσφορικό άλας νατρίου· διφωσφορικό νάτριο· πυροφωσφορικό νάτριο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-767-1
Χημική ονομασία	Διφωσφορικό νάτριο
Χημικός τύπος	Άνυδρο: $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ Δεκαένυδρο: $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
Μοριακό βάρος	Άνυδρο: 265,94 Δεκαένυδρο: 446,09
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ τουλάχιστον 95 % επί πυρωμένης ουσίας Περιεκτικότητα σε $\text{P}_2\text{O}_5$ τουλάχιστον 52,5 % και έως 54,0 % κατ' ανώτατο όριο
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμοι ή λευκοί κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική ή κοκκώδης σκόνη. Το δεκαένυδρο άλας, ερχόμενο σε επαφή με ξηρό αέρα, αφυδατώνεται ελαφρώς
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Διαλυτό στο νερό. Αδιάλυτο σε αιθανόλη
pH	Από 9,8 έως 10,8 (διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την καύση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο για το άνυδρο άλας, τουλάχιστον 38 % και έως 42 % κατ' ανώτατο όριο για το δεκαένυδρο (105 °C επί 4 ώρες και, στη συνέχεια, 550 °C επί 30 λεπτά)
Υγες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 450 (v) ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Πυροφωσφορικό κάλιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	230-785-7
Χημική ονομασία	Διφωσφορικό κάλιο

**▼ B**

Χημικός τύπος	$K_4P_2O_7$
Μοριακό βάρος	330,34 (άνυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 % (800 °C επί 0,5 ώρες) Περιεκτικότητα σε $P_2O_5$ τουλάχιστον 42,0 % και έως 43,7 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή, πολύ υγροσκοπική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Διαλυτό στο νερό, αδιάλυτο σε αιθανόλη
pH	Από 10,0 έως 10,8 (διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την καύση	2 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C επί 4 ώρες και, στη συνέχεια, 550 °C επί 30 λεπτά)
Ουσίες αδιάλυτες στο νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 450 (vi) ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Πυροφωσφορικό ασβέστιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	232-221-5
Χημική ονομασία	Διφωσφορικό ασβέστιο Πυροφωσφορικό ασβέστιο
Χημικός τύπος	$Ca_2P_2O_7$
Μοριακό βάρος	254,12
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 96 % Περιεκτικότητα σε $P_2O_5$ τουλάχιστον 55 % και έως 56 % κατ' ανώτατο όριο
<b>Περιγραφή</b>	Λεπτόκοκκη, άοσμη σκόνη χρώματος λευκού
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο στο νερό. Διαλυτό σε αραιό υδροχλωρικό και νιτρικό οξύ
pH	Από 5,5 έως 7,0 (εναιώρημα σε νερό 10 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την καύση	1,5 % κατ' ανώτατο όριο (800 °C ± 25 °C, 30 λεπτά)
Φθόριο	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)

**▼ B**

Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 450 (vii) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Όξινο πυροφωσφορικό άλας ασβεστίου· δισόξινο πυροφωσφορικό άλας ασβεστίου
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	238-933-2
Χημική ονομασία	Δισόξινο διφωσφορικό ασβέστιο
Χημικός τύπος	CaH <sub>2</sub> P <sub>2</sub> O <sub>7</sub>
Μοριακό βάρος	215,97
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 90 % επί άνυδρης ουσίας Περιεκτικότητα σε P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> τουλάχιστον 61 % και έως 66 % κατ' ανώτατο όριο
<b>Περιγραφή</b>	Κρύσταλλοι ή σκόνη χρώματος λευκού
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Ύλες αδιάλυτες σε οξέα	0,4 % κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αργίλιο	800 mg/kg κατ' ανώτατο όριο. Εφαρμόζεται έως την 31η Μαρτίου 2015. 200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο. Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2015.

**▼ M10****E 450 (ix) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΔΙΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Όξινο πυροφωσφορικό μαγνήσιο, δισόξινο πυροφωσφορικό μονομαγνήσιο, διφωσφορικό μαγνήσιο, πυροφωσφορικό μαγνήσιο
<b>Ορισμός</b>	Το δισόξινο διφωσφορικό μαγνήσιο είναι το όξινο άλας του διφωσφορικού οξέος με μαγνήσιο. Παρασκευάζεται με τη βραδεία προσθήκη υδροξειδίου του μαγνησίου που βρίσκεται σε διασπορά σε νερό σε φωσφορικό οξύ, έως ότου επιτευχθεί γραμμομοριακή αναλογία 1:2 μεταξύ Mg και P. Καθόλη τη διάρκεια της αντίδρασης, η θερμοκρασία διατηρείται κάτω από τους 60 °C. Στο μείγμα που προκύπτει από την αντίδραση προστίθεται περίπου 0,1 % υπεροξείδιο του υδρογόνου. Ακολουθεί θέρμανση και λειοτρίβηση του ιζήματος.

**▼ M10**

Αριθ. EINECS	244-016-8
Χημική ονομασία	Δισόξινο πυροφωσφορικό μονομαγνήσιο
Χημικός τύπος	MgH <sub>2</sub> P <sub>2</sub> O <sub>7</sub>
Μοριακό βάρος	200,25
Δοκιμή	Περιεκτικότητα σε P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> όχι μικρότερη από 68,0 % και όχι μεγαλύτερη από 70,5 % εκφρασμένη ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Περιεκτικότητα σε Mg τουλάχιστον 18,0 % και έως 20,5 % κατ' ανώτατο όριο, υπολογιζόμενη σε MgO
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί κρύσταλλοι ή λευκή σκόνη
<b>Description</b>	Cristaux ou poudre de couleur blanche
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Ελαφρώς διαλυτή στο νερό, πρακτικά αδιάλυτη στην αιθανόλη
Μέγεθος σωματιδίων:	Το μέσο μέγεθος των σωματιδίων θα κυμαίνεται μεταξύ 10 και 50 μm
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την πυράκτωση	Όχι περισσότερο από 12 % (800 °C, 0,5 της ώρας)
Φθοριούχα	Όχι περισσότερο από 20 mg/kg (εκφρασμένα ως φθόριο)
Αργίλιο	Όχι περισσότερο από 50 mg/kg
Αρσενικό	Όχι περισσότερο από 1 mg/kg
Κάδμιο	Όχι περισσότερο από 1 mg/kg
Μόλυβδος	Όχι περισσότερο από 1 mg/kg

**▼ B****E 451 (i) ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Τριπολυφωσφορικό νάτριο· τριπολυφωσφορικό άλας νατρίου
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-838-7
Χημική ονομασία	Τριφωσφορικό νάτριο
Χημικός τύπος	Na <sub>5</sub> O <sub>10</sub> P <sub>3</sub> · nH <sub>2</sub> O (n = 0 ή 6)
Μοριακό βάρος	367,86
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 85,0 % (άνυδρο) ή 65,0 % (εξαένυδρο) Περιεκτικότητα σε P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> τουλάχιστον 56 % και έως 59 % κατ' ανώτατο όριο (άνυδρο) ή τουλάχιστον 43 % και έως 45 % κατ' ανώτατο όριο (εξαένυδρο)

**▼ B**

<b>Περιγραφή</b>	Κόκκοι ή σκόνη χρώματος λευκού, ελαφρώς υγροσκοπικά
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό. Αδιάλυτο σε αιθανόλη
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	Από 9,1 έως 10,2 (διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	Άνυδρο: 0,7 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 1 ώρα) Εξαένυδρο: 23,5 % κατ' ανώτατο όριο (60 °C επί 1 ώρα και, στη συνέχεια, 105 °C επί 4 ώρες)
Ουσίες αδιάλυτες στο νερό	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Ανώτερα προϊόντα πολυμερισμού των φωσφορικών ιόντων	1 % κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 451 (ii) ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Τριπολυφωσφορικό κάλιο· τριφωσφορικό κάλιο· τριπολυφωσφορικό άλας καλίου
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	237-574-9
Χημική ονομασία	Τριφωσφορικό κάλιο· τριπολυφωσφορικό κάλιο
Χημικός τύπος	$K_5O_{10}P_3$
Μοριακό βάρος	448,42
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 85 % επί άνυδρης ουσίας Περιεκτικότητα σε $P_2O_5$ τουλάχιστον 46,5 % και έως 48 % κατ' ανώτατο όριο
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή κόκκοι χρώματος λευκού, πολύ υγροσκοπικά
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Πολύ διαλυτό στο νερό
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	Από 9,2 έως 10,5 (διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την καύση	0,4 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C επί 4 ώρες και, στη συνέχεια, 550 °C επί 30 λεπτά)
Ύγλες αδιάλυτες στο νερό	2 % κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο



## ▼ B

Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>E 452 (i) ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ</b>	
(i) ΔΙΑΛΥΤΟ ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ	
<b>Συνώνυμα</b>	Εξαμεταφωσφορικό νάτριο· τετραπολυφωσφορικό νάτριο· άλας του Graham· πολυφωσφορικό νάτριο, υαλώδες· πολυμεταφωσφορικό νάτριο· μεταφωσφορικό νάτριο
<b>Ορισμός</b>	Τα διαλυτά πολυφωσφορικά άλατα του νατρίου λαμβάνονται με τήξη του ορθοφωσφορικού νατρίου, ακολουθούμενη από ψύξη. Οι ενώσεις αυτές αποτελούν χημική τάξη, στην οποία ανήκουν πολλές άμορφες υδατοδιαλυτές πολυφωσφορικές ενώσεις που αποτελούνται από ευθείες αλυσίδες μεταφωσφορικών δομικών μονάδων $(\text{NaPO}_3)_x$ όπου $x \geq 2$ , τερματιζόμενες με ομάδες $\text{Na}_2\text{PO}_4$ . Οι ουσίες αυτές ταυτοποιούνται συνήθως μέσω της αναλογίας $\text{Na}_2\text{O}/\text{P}_2\text{O}_5$ ή της περιεκτικότητας τους σε $\text{P}_2\text{O}_5$ . Η αναλογία $\text{Na}_2\text{O}/\text{P}_2\text{O}_5$ κυμαίνεται από περίπου 1,3 στο τετραπολυφωσφορικό νάτριο, όπου $x =$ περίπου 4, έως περίπου 1,1 στο άλας του Graham, το κοινώς ονομαζόμενο εξαμεταφωσφορικό νάτριο, όπου $x = 13$ έως 18, και περίπου 1,0 στα πολυφωσφορικά άλατα νατρίου μεγαλύτερου μοριακού βάρους, όπου $x = 20$ έως 100 ή και περισσότερο. Το pH των διαλυμάτων τους κυμαίνεται από 3,0 έως 9,0
Αριθ. EINECS	272-808-3
Χημική ονομασία	Πολυφωσφορικό νάτριο
Χημικός τύπος	Ετερογενή μείγματα αλάτων νατρίου γραμμικών πολυμερών συμπύκνωσης του φωσφορικού οξέος με τον γενικό τύπο $\text{H}_{(n+2)}\text{P}_n\text{O}_{(3n+1)}$ , όπου «n» είναι τουλάχιστον 2
Μοριακό βάρος	$(102)_n$
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε $\text{P}_2\text{O}_5$ τουλάχιστον 60 % και έως 71 % κατ' ανώτατο όριο επί πυρωμένης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμα ή λευκά, διαφανή φυλλίδια, κόκκοι ή σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Πολύ διαλυτό στο νερό
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	Από 3,0 έως 9,0 (διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την καύση	1 % κατ' ανώτατο όριο
Ύγλες αδιάλυτες στο νερό	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>(ii) ΑΔΙΑΛΥΤΟ ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ</b>	
<b>Συνώνυμα</b>	Αδιάλυτο μεταφωσφορικό νάτριο· άλας του Maddrell· αδιάλυτο πολυφωσφορικό νάτριο· IMP
<b>Ορισμός</b>	Το αδιάλυτο μεταφωσφορικό νάτριο είναι μακρομοριακό πολυφωσφορικό νάτριο που αποτελείται από δύο μακρές αλυσίδες μεταφωσφορικών δομικών μονάδων $(\text{NaPO}_3)_x$ περιελιγμένες προς αντίθετες κατευθύνσεις γύρω από ένα κοινό άξονα. Η αναλογία $\text{Na}_2\text{O}/\text{P}_2\text{O}_5$ είναι περίπου 1,0. Το pH εναιωρήματος σε νερό σε αναλογία 1:3 είναι περίπου 6,5
Αριθ. EINECS	272-808-3

**▼ B**

Χημική ονομασία	Πολυφωσφορικό νάτριο
Χημικός τύπος	Ετερογενή μείγματα αλάτων νατρίου γραμμικών πολυμερών συμπίκνωσης του φωσφορικού οξέος με τον γενικό τύπο $H_{(n+2)}P_nO_{(3n+1)}$ , όπου «n» είναι τουλάχιστον 2
Μοριακό βάρος	$(102)_n$
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε $P_2O_5$ τουλάχιστον 68,7 % και έως 70,0 % κατ' ανώτατο όριο
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο στο νερό, διαλυτό σε ανόργανα οξέα και σε διαλύματα χλωριούχου καλίου και χλωριούχου αμμωνίου (όχι όμως χλωριούχου νατρίου)
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	6,5 περίπου (εναιώρημα σε νερό σε αναλογία 1:3)
<b>Καθαρότητα</b>	
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 452 (ii) ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Μεταφωσφορικό κάλιο· πολυμεταφωσφορικό κάλιο· άλας Kurrol
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	232-212-6
Χημική ονομασία	Πολυφωσφορικό κάλιο
Χημικός τύπος	$(KPO_3)_n$ Ετερογενή μείγματα αλάτων με κάλιο γραμμικών πολυμερών συμπίκνωσης του φωσφορικού οξέος με τον γενικό τύπο $H_{(n+2)}P_nO_{(3n+1)}$ , όπου «n» είναι τουλάχιστον 2
Μοριακό βάρος	$(118)_n$
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε $P_2O_5$ τουλάχιστον 53,5 % και έως 61,5 % κατ' ανώτατο όριο επί πυρωμένης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λεπτόκοκκη λευκή σκόνη ή κρύσταλλοι ή άχρωμα υαλώδη φυλλίδια
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	1 g διαλύεται σε 100 ml διαλύματος οξικού νατρίου σε αναλογία 1:25
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	7,8 κατ' ανώτατο όριο (εναιώρημα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την καύση	2 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C επί 4 ώρες και, στη συνέχεια, 550 °C επί 30 λεπτά)
Κυκλοφωσφορικά ιόντα	8 % κατ' ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε $P_2O_5$

**▼ B**

Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 452 (iii) ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Πολυφωσφορικό νατριοασβέστιο, υαλώδεις
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	233-782-9
Χημική ονομασία	Πολυφωσφορικό νατριοασβέστιο
Χημικός τύπος	(NaPO <sub>3</sub> ) <sub>n</sub> CaO, όπου n είναι συνήθως 5
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> τουλάχιστον 61 % και έως 69 % κατ' ανώτατο όριο επί πυρωμένης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί υαλώδεις κρύσταλλοι, σφαιρίδια
<b>Ταυτοποίηση</b>	
pH	Περίπου 5 έως 7 (εναιώρημα 1 % m/m)
Περιεκτικότητα σε CaO	7 % - 15 % m/m
<b>Καθαρότητα</b>	
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 452 (iv) ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Μεταφωσφορικό ασβέστιο· πολυμεταφωσφορικό ασβέστιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	236-769-6
Χημική ονομασία	Πολυφωσφορικό ασβέστιο
Χημικός τύπος	(CaP <sub>2</sub> O <sub>6</sub> ) <sub>n</sub> Ετερογενή μείγματα αλάτων με ασβέστιο γραμμικών πολυμερών συμπύκνωσης του φωσφορικού οξέος με τον γενικό τύπο H <sub>(n+2)</sub> P <sub>n</sub> O <sub>(n+1)</sub> , όπου «n» είναι τουλάχιστον 2
Μοριακό βάρος	(198) <sub>n</sub>
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> τουλάχιστον 71 % και έως 73 % κατ' ανώτατο όριο επί πυρωμένης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμοι, άχρωμοι κρύσταλλοι ή άοσμη, λευκή σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Συνήθως μέτρια διαλυτό στο νερό. Διαλυτό σε όξινους διαλύτες
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική

**▼ B**

Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Περιεκτικότητα σε CaO	27 έως 29,5 %
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την καύση	2 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C επί 4 ώρες και, στη συνέχεια, 550 °C επί 30 λεπτά)
Κυκλοφωσφορικά ιόντα	8 % κατ' ανώτατο όριο (επί της περιεκτικότητας σε P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )
Φθόριο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένη σε φθόριο)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M23****E 456 ΠΛΥΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΚΑΛΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Το πολυασπαρτικό κάλιο είναι το άλας καλίου του πολυασπαρτικού οξέος, που παράγεται από L-ασπαρτικό οξύ και υδροξείδιο του καλίου. Η θερμική διαδικασία μετατρέπει το ασπαρτικό οξύ σε πολυηλεκτριμίδιο, το οποίο είναι αδιάλυτο. Το πολυηλεκτριμίδιο υποβάλλεται σε κατεργασία με υδροξείδιο του καλίου, που επιτρέπει το άνοιγμα του δακτυλίου και τον πολυμερισμό των μονάδων. Το τελευταίο στάδιο είναι η φάση της ξήρανσης με ψεκασμό, από την οποία λαμβάνεται σκόνη ανοικτού καστανού χρώματος

Αριθμός CAS	64723-18-8
Χημική ονομασία	L-ασπαρτικό οξύ, ομοπολυμερές, άλας καλίου
Χημικός τύπος	[C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> NO <sub>3</sub> K] <sub>n</sub>
Μέσο μοριακό βάρος κατά βάρος	5 300 g/mol περίπου
Ποσοτικός προσδιορισμός	Τουλάχιστον 98 % επί ξηρού βάρους
Κοκκομετρική διάσταση	Τουλάχιστον 45 μm (το ανώτερο 1 % κατά βάρος σωματιδίων κάτω των 45 μm)
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμη σκόνη ανοικτού καστανού χρώματος
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Πολύ διαλυτό στο νερό και ελαφρώς διαλυτό σε οργανικούς διαλύτες
pH	7,5-8,5 (υδατικό διάλυμα 40 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Βαθμός υποκατάστασης	Τουλάχιστον 91,5 % επί ξηρού βάρους
Απώλειες κατά την ξήρανση	Το ανώτερο 11 % (105 °C, 12 ώρες)
Υδροξείδιο του καλίου	Το ανώτερο 2 %
Ασπαρτικό οξύ	Το ανώτερο 1 %
Άλλες προσμείξεις	Το ανώτερο 0,1 %
Αρσενικό	Το ανώτερο 2,5 mg/kg

▼ **M23**

Μόλυβδος	Το ανώτερο 1,5 mg/kg
Υδράργυρος	Το ανώτερο 0,5 mg/kg
Κάδμιο	Το ανώτερο 0,1 mg/kg

▼ **B****E 459 Β-ΚΥΚΛΟΔΕΞΤΡΙΝΗ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Η β-κυκλοδεξτρίνη είναι ένας μη ανάγων κυκλικός σακχαρίτης που αποτελείται από επτά α-1,4-D-γλυκοπυρανοζυλικές μονάδες. Το προϊόν προκύπτει από τη δράση του ενζύμου κυκλογλυκοζυλοτρανσφεράσης (CGTase), που λαμβάνεται από τους βακτήλους *Bacillus circulans*, *Raenibacillus macerans* ή ανασυνδυασμένος *Bacillus licheniformis*, στέλεχος SJ1608, σε μερικός υδρολυμένο άμυλο

Αριθ. EINECS

231-493-2

Χημική ονομασία

Κυκλοεπτααμυλόζη

Χημικός τύπος

(C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub>)<sub>7</sub>

Μοριακό βάρος

1 135

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε (C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub>)<sub>7</sub> τουλάχιστον 98,0 % επί άνυδρης ουσίας**Περιγραφή**

Ουσιαστικά άοσμο, λευκό ή σχεδόν λευκό κρυσταλλικό στερεό

Όψη υδατικού διαλύματος

Διαυγές και άχρωμο

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Μέτρια διαλυτή στο νερό· εύκολα διαλυτή σε θερμό νερό· λίγο διαλυτή στην αιθανόλη

Ειδική στροφική ικανότητα

[α]<sub>D</sub><sup>25</sup>: + 160° έως + 164° (διάλυμα 1 %)

τιμή pH:

5,0-8,0 (διάλυμα 1 %)

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό

14 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

Άλλες κυκλοδεξτρίνες

2 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας

Υπολείμματα διαλυτών

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο τολουολίου και 1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο τριχλωροαιθυλενίου

Θειική τέφρα

0,1 % κατ' ανώτατο όριο

Αρσενικό

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **M8****E 460 (i) ΜΙΚΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΠΗΚΤΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ****Συνώνυμα**▼ **B****Ορισμός**

Η μικροκρυσταλλική κυτταρίνη είναι καθαρισμένη μερικός αποπολυμερισμένη κυτταρίνη, η οποία παρασκευάζεται με κατεργασία με ανόργανα οξέα α-κυτταρίνης που λαμβάνεται ως πολτός από ινώδεις φυτικές ύλες. Ο βαθμός πολυμερισμού δεν υπερβαίνει κατά κανόνα το 400

Αριθ. EINECS

232-674-9

**▼ B**

Χημική ονομασία	Κυτταρίνη
Χημικός τύπος	(C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub>
Μοριακό βάρος	Περίπου 36 000
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε κυτταρίνη τουλάχιστον 97 % επί άνυδρης ουσίας
Κοκκομετρικός βαθμός	Τουλάχιστον 5 μm (μέγιστη αναλογία σωματιδίων μεγέθους κάτω των 5 μm: 10 %)
<b>Περιγραφή</b>	Λεπτόκοκκη, άοσμη σκόνη, χρώματος λευκού ή σχεδόν λευκού
<b>Ταυτοποίηση</b>	
<b>▼ M24</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτη σε νερό, αιθανόλη, αιθέρα και αραιά ανόργανα οξέα. Πρακτικά αδιάλυτη ή αδιάλυτη σε διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (συγκέντρωση: 50 g NaOH/L)
<b>▼ B</b>	
Χρωματική αντίδραση	Σε 1 mg δείγματος προστίθεται 1 ml φωσφορικού οξέος και το μείγμα θερμαίνεται σε υδατόλουτρο επί 30 λεπτά. Προστίθενται 4 ml διαλύματος πυροκατεχόλης σε φωσφορικό οξύ σε αναλογία 1:4 και το σύνολο θερμαίνεται επί 30 λεπτά, οπότε χρωματίζεται κόκκινο
Φασματοσκοπία απορρόφησης υπερύθρου	Να προσδιοριστεί
Δοκιμή σχηματισμού εναιωρήματος	Σε ηλεκτρικό αναμεικτήρα υψηλής ταχύτητας (12 000 rpm) αναμειγνύονται 30 g δείγματος με 270 ml νερού επί 5 λεπτά. Το μείγμα που προκύπτει είναι είτε ένα λεπτόρρευστο εναιώρημα είτε ένα λασπώδες, άμορφο εναιώρημα που ρέει ελάχιστα ή καθόλου, καθιζάνει ελαφρώς και περιέχει πολλές έγκλειστες φυσαλίδες αέρα. Εφόσον ληφθεί λεπτόρρευστο εναιώρημα, μεταγγίζονται 100 ml σε ογκομετρικό κύλινδρο των 100 ml και αφήνονται σε ηρεμία επί 1 ώρα. Τα στερεά συστατικά καθιζάνουν και εμφανίζεται διαυγές υπερκείμενο υγρό
pH	Το pH του υπερκείμενου υγρού κυμαίνεται μεταξύ 5,0 και 7,5 (εναιώρημα σε νερό 10 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	7 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 3 ώρες)
Υδατοδιαλυτές ύλες	0,24 % κατ' ανώτατο όριο
Θευική τέφρα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (800 ± 25 °C)
Άμυλο	Δεν ανιχνεύεται
Καρβοξύλια	Σε 20 ml του κolloειδούς που έχει ληφθεί κατά τη δοκιμή σχηματισμού εναιωρήματος (Ταυτοποίηση), προστίθενται μερικές σταγόνες διαλύματος ιωδίου και αναμινύονται. Δεν πρέπει να εμφανιστεί ιωδοκυανό ή κυανό χρώμα
Αρσενικό	1 % κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 460 (ii) ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	Καθαρισμένη, μηχανικός διασπασμένη κυτταρίνη, η οποία παρασκευάζεται με επεξεργασία α-κυτταρίνης που λαμβάνεται ως πολτός από ινώδεις φυτικές ύλες
Χημική ονομασία	232-674-9
Χημικός τύπος	Κυτταρίνη· γραμμικό πολυμερές σακχαριτών γλυκόζης με δεσμούς 1:4
Μοριακό βάρος	(C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub>
Δοκιμασία	(162) <sub>n</sub> (όπου n έχει κατά κανόνα την τιμή 1 000 και άνω)
	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 92 %

▼ B

Κοκκομετρικός βαθμός	Τουλάχιστον 5 μm (μέγιστη αναλογία σωματιδίων μεγέθους κάτω των 5 μm: 10 %)
<b>Περιγραφή</b>	Αοσμη σκόνη λευκού χρώματος
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτη σε νερό, αιθανόλη, αιθέρα και αραιά ανόργανα οξέα. Λίγο διαλυτή σε διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου
Δοκιμή σχηματισμού εναιωρήματος	Σε ηλεκτρικό αναμεικτήρα υψηλής ταχύτητας (12 000 rpm) αναμειγνύονται 30 g δείγματος με 270 ml νερού επί 5 λεπτά. Το μείγμα που προκύπτει είναι είτε ένα λεπτόρρευστο εναιώρημα είτε ένα λασπώδες, άμορφο εναιώρημα που ρέει ελάχιστα ή καθόλου, καθιζάνει ελαφρώς και περιέχει πολλές έγκλειστες φυσαλλίδες αέρα. Εφόσον ληφθεί λεπτόρρευστο εναιώρημα, μεταγγίζονται 100 ml σε ογκομετρικό κύλινδρο των 100 ml και αφήνονται σε ηρεμία επί 1 ώρα. Τα στερεά συστατικά καθιζάνουν και εμφανίζεται διαυγές υπερκείμενο υγρό
pH	Το pH του υπερκείμενου υγρού κυμαίνεται μεταξύ 5,0 και 7,5 (εναιώρημα σε νερό 10 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	7 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 3 ώρες)
Υδατοδιαλυτές ύλες	1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Θειική τέφρα	0,3 % κατ' ανώτατο όριο (800 ± 25 °C)
Άμυλο	Δεν ανιχνεύεται Σε 20 ml του κολλοειδούς που έχει ληφθεί κατά τη δοκιμή σχηματισμού εναιωρήματος (Ταυτοποίηση), προστίθενται μερικές σταγόνες διαλύματος ιωδίου και αναμειγνύονται. Δεν πρέπει να εμφανιστεί ιωδοκυανό ή κυανό χρώμα
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 461 ΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Μεθυλαιθέρας της κυτταρίνης
<b>Ορισμός</b>	Η μεθυλοκυτταρίνη είναι κυτταρίνη που λαμβάνεται απευθείας από ινώδεις φυτικές ύλες και αιθεροποιείται εν μέρει με μεθύλια
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Μεθυλαιθέρας της κυτταρίνης
Χημικός τύπος	Τα πολυμερή περιέχουν δομικές μονάδες υποκαταστημένου ανυδρικού παραγώγου της γλυκόζης με τον ακόλουθο γενικό τύπο: $C_6H_7O_2(OR_1)(OR_2)(OR_3)$ , όπου $R_1, R_2, R_3$ μπορεί να είναι: — H — $CH_3$ ή — $CH_2CH_3$
Μοριακό βάρος	Από 20 000 περίπου έως 380 000
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε μεθοξύλια ( $-OCH_3$ ) τουλάχιστον 25 % και έως 33 % κατ' ανώτατο όριο και σε υδροξυαιθοξύλια ( $-OCH_2CH_2OH$ ) 5 % κατ' ανώτατο όριο

▼ B

<b>Περιγραφή</b>	Άοσμη και άγευστη, κοκκώδης ή ινώδης σκόνη, ελαφρώς υγροσκοπική, χρώματος λευκού ή ελαφρώς υποκίτρινου ή υπόψιου
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διογκώνεται μέσα στο νερό, σχηματίζοντας ένα διαυγές έως οπαλίζον, παχύρρευστο κολλοειδές διάλυμα. Αδιάλυτη σε αιθανόλη, αιθέρα και χλωροφόρμιο. Διαλυτή σε παγόμορφο οξικό οξύ
pH	Τουλάχιστον 5,0 και έως 8,0 κατ' ανώτατο όριο (κολλοειδές διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	10 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 3 ώρες)
Θειική τέφρα	1,5 % κατ' ανώτατο όριο (800 ± 25 °C)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 462 ΑΙΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Αιθυλαιθέρας της κυτταρίνης
<b>Ορισμός</b>	Η αιθυλοκυτταρίνη είναι κυτταρίνη που λαμβάνεται απευθείας από ινώδεις φυτικές ύλες και αιθεροποιείται εν μέρει με αιθύλια
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Αιθυλαιθέρας της κυτταρίνης
Χημικός τύπος	Τα πολυμερή περιέχουν δομικές μονάδες υποκαταστημένου ανυδρικού παραγώγου της γλυκόζης με τον ακόλουθο γενικό τύπο: $C_6H_7O_2(OR_1)(OR_2)$ όπου $R_1$ και $R_2$ μπορεί να είναι: — H — $CH_2CH_3$
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε αιθοξύλια ( $-OC_2H_5$ ) τουλάχιστον 44 % και έως 50 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηράς ουσίας (που ισοδυναμεί με 2,6 αιθοξύλια κατ' ανώτατο όριο ανά μονάδα ανυδρικού παραγώγου της γλυκόζης)
<b>Περιγραφή</b>	Ελαφρώς υγροσκοπική, λευκή έως υπόλευκη, άοσμη και άγευστη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Πρακτικά αδιάλυτη στο νερό, σε γλυκερόλη και σε προπανοδιόλη-1,2, αλλά διαλυτή σε διάφορες αναλογίες σε ορισμένους οργανικούς διαλύτες ανάλογα με την περιεκτικότητα σε αιθοξύλια. Η αιθυλοκυτταρίνη που περιέχει αιθοξύλια σε ποσοστό μικρότερο από 46-48 % είναι εύκολα διαλυτή σε τετραϋδροφουράνιο, οξικό μεθυλεστέρα, χλωροφόρμιο και σε μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων-αιθανόλης. Η αιθυλοκυτταρίνη που περιέχει αιθοξύλια σε ποσοστό 46-48 % και άνω είναι εύκολα διαλυτή σε αιθανόλη, μεθανόλη, τολουόλιο, χλωροφόρμιο και οξικό αιθυλεστέρα
Δοκιμή σχηματισμού μεμβράνης	Διαλύονται 5 g του δείγματος σε 95 g μείγματος τολουολίου και αιθανόλης, αναλογίας 80:20 (w/w). Σχηματίζεται διαυγές, σταθερό, ελαφρώς κίτρινο διάλυμα. Φέρονται λίγα ml του διαλύματος σε γυάλινη πλάκα και αφήνεται ο διαλύτης να εξατμιστεί. Σχηματίζεται μια πυκνή, σκληρή, συνεχής, διαφανής μεμβράνη. Η μεμβράνη είναι εύφλεκτη



## ▼ B

pH	Ουδέτερο, προσδιοριζόμενο με χαρτί ηλιοτροπίου (κολλοειδές διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	3 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)
Θεική τέφρα	0,4 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>E 463 ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ</b>	
<b>Συνώνυμα</b>	Υδροξυπροπυλαιθέρας της κυτταρίνης
<b>Ορισμός</b>	Η υδροξυπροπυλοκυτταρίνη είναι κυτταρίνη που λαμβάνεται απευθείας από ινώδεις φυτικές ύλες και αιθεροποιείται εν μέρει με υδροξυπροπύλια
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Υδροξυπροπυλαιθέρας της κυτταρίνης
Χημικός τύπος	Τα πολυμερή περιέχουν δομικές μονάδες υποκαταστημένου ανυδριτικού παραγώγου της γλυκόζης με τον ακόλουθο γενικό τύπο: $C_6H_7O_2(OR_1)(OR_2)(OR_3)$ όπου $R_1, R_2, R_3$ μπορεί να είναι: — H — $CH_2CHOHCH_3$ — $CH_2CHO(CH_2CHOHCH_3)CH_3$ — $CH_2CHO[CH_2CHO(CH_2CHOHCH_3)CH_3]CH_3$
Μοριακό βάρος	Από 30 000 περίπου έως 1 000 000
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε υδροξυπροποξύλια ( $-OCH_2CHOHCH_3$ ) 80,5 % κατ' ανώτατο όριο, που ισοδυναμεί με 4,6 υδροξυπροπύλια κατ' ανώτατο όριο ανά μονάδα ανυδριτικού παραγώγου της γλυκόζης, επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμη και άγευστη, κοκκώδης ή ινώδης σκόνη, ελαφρώς υγροσκοπική, χρώματος λευκού ή ελαφρώς υποκίτρινου ή υπόφαιου
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διογκώνεται μέσα στο νερό, σχηματίζοντας ένα διαυγές έως οπαλίζον, παχύρρεστο κολλοειδές διάλυμα. Διαλυτή σε αιθανόλη. Αδιάλυτη σε αιθέρα
Αεριοχρωματογραφία	Προσδιορισμός των υποκαταστατών με αέριο χρωματογραφία
pH	Τουλάχιστον 5,0 και έως 8,0 κατ' ανώτατο όριο (κολλοειδές διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	10 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 3 ώρες)
Θεική τέφρα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο, προσδιοριζόμενη με πύρωση στους 800 ± 25 °C
Προπυλενοχλωρυδρίνες	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## ▼ M27

**E 463a ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (L-HPC)****Συνώνυμα****Ορισμός**

Όνομασία IUPAC

Αριθμός CAS

Αριθμός Eines

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

Μέγεθος σωματιδίων

**Περιγραφή****Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Δοκιμασία

pH

**Καθαρότητα**

Απώλειες κατά την ξήρανση

Υπόλειμμα κατά την πύρωση

Προπυλενογλωρυδρίνες

Αρσενικό

Μόλυβδος

Υδράργυρος

Κάδμιο

Υδροξυπροπυλαιθέρας της κυτταρίνης, χαμηλής υποκατάστασης

Η L-HPC είναι χαμηλής υποκατάστασης πολυ(-υδροξυπροπυλ-)αιθέρας της κυτταρίνης.

Η L-HPC παράγεται με μερική αιθεροποίηση των μονάδων ανυδρικού παραγώγου της γλυκόζης καθαρής κυτταρίνης (ξυλοπολτός) με οξείδιο του προπυλίου/υδροξυπροπυλικές ομάδες. Το προϊόν που προκύπτει υποβάλλεται στη συνέχεια σε καθαρισμό, ξήρανση και άλεση για την παρασκευή υδροξυπροπυλοκυτταρίνης χαμηλής υποκατάστασης.


Η L-HPC περιέχει τουλάχιστον 5,0 % και όχι περισσότερο από 16,0 % υδροξυπροποξυλίων, υπολογιζόμενα επί ξηράς ουσίας.

Η L-HPC διαφέρει από την υδροξυπροπυλοκυτταρίνη (E 463) όσον αφορά το βαθμό μοριακής υποκατάστασης με υδροξυπροποξύλια της μονάδας δακτυλίου της γλυκόζης (0,2 για την L-HPC έναντι 3,5 για την E 463) του κυτταρικού σκελετού.

2-Υδροξυπροπυλαιθέρας της κυτταρίνης (χαμηλής υποκατάστασης)  
9004-64-2

Υδροξυπροπυλαιθέρας της κυτταρίνης, χαμηλής υποκατάστασης

Τα πολυμερή περιέχουν δομικές μονάδες υποκαταστημένου ανυδρικού παραγώγου της γλυκόζης με τον ακόλουθο γενικό τύπο:

όπου R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub> μπορεί να είναι:

— H

— CH<sub>2</sub>CHOHCH<sub>3</sub>— CH<sub>2</sub>CHO(CH<sub>2</sub>CHOHCH<sub>3</sub>)CH<sub>3</sub>— CH<sub>2</sub>CHO[CH<sub>2</sub>CHO(CH<sub>2</sub>CHOHCH<sub>3</sub>)CH<sub>3</sub>]CH<sub>3</sub>

Περίπου από 30 000 έως 150 000 g/mol

Ο μέσος αριθμός υδροξυπροποξυλίων

(—OCH<sub>2</sub>CHOHCH<sub>3</sub>) ισοδυναμεί με 0,2 υδροξυπροποξύλια ανά μονάδα ανυδρικού παραγώγου της γλυκόζης σε άνυδρη βάση

με μέθοδο περίθλασης με λέιζερ — Όχι λιγότερο από 45 μm (όχι περισσότερο από 1 % του βάρους των σωματιδίων κάτω των 45 μm) και όχι περισσότερο από 65 μm

με χρωματογραφία αποκλεισμού μεγέθους (SEC) — Μέσο (D50) μέγεθος σωματιδίων μεταξύ 47,3 μm και 50,3 μm· τιμή D90 (90 % κάτω από ορισμένη τιμή) μεταξύ 126,2 μm και 138 μm

Άοσμη και άγευστη, κοκκώδης ή ινώδης σκόνη, ελαφρώς υγροσκοπική, χρώματος λευκού ή ελαφρώς υποκίτρινου ή υπόφαιου

Δοκιμή θετική

Αδιάλυτο στο νερό· διογκώνεται μέσα στο νερό. Διαλύεται σε διάλυμα με 10 % υδροξείδιο του νατρίου σχηματίζοντας παχύρρευστο διάλυμα.

Προσδιορισμός του βαθμού μοριακής υποκατάστασης με αεριοχρωματογραφία

Τουλάχιστον 5,0 και έως 7,5 κατ' ανώτατο όριο (κολοειδές αιώρημα 1 %)

5,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 1 ώρα)

0,8 % κατ' ανώτατο όριο, προσδιοριζόμενο με πύρωση στους 800 ± 25 °C

0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας) [αεριοχρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MS)]

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

0,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

0,15 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## ▼ B

## E 464 ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΟΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Η υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη είναι κυτταρίνη που λαμβάνεται απευθείας από ινώδεις φυτικές ύλες και αιθεροποιείται εν μέρει με μεθύλια, με ένα μικρό ποσοστό υποκατάστασης από υδροξυπροπύλια
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	2-Υδροξυπροπυλαιθέρας της μεθυλοκυτταρίνης
Χημικός τύπος	Τα πολυμερή περιέχουν δομικές μονάδες υποκαταστημένου ανυδρικού παραγώγου της γλυκόζης με τον ακόλουθο γενικό τύπο: $C_6H_7O_2(OR_1)(OR_2)(OR_3)$ , όπου $R_1$ , $R_2$ , $R_3$ μπορεί να είναι: — H — $CH_3$ — $CH_2CHOHCH_3$ — $CH_2CHO (CH_2CHOHCH_3) CH_3$ — $CH_2CHO[CH_2CHO (CH_2CHOHCH_3) CH_3]CH_3$
Μοριακό βάρος	Από 13 000 περίπου έως 200 000
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε μεθοξύλια ( $-OCH_3$ ) τουλάχιστον 19 % και έως 30 % κατ' ανώτατο όριο και σε υδροξυπροποξύλια ( $-OCH_2CHOHCH_3$ ) 12 % κατ' ανώτατο όριο, επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμη και άγευστη, κοκκώδης ή ινώδης σκόνη, ελαφρώς υγροσκοπική, χρώματος λευκού ή ελαφρώς υποκίτρινου ή υπόψιου
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διογκώνεται μέσα στο νερό, σχηματίζοντας ένα διαυγές έως οπαλίζον, παχύρρευστο κολλοειδές διάλυμα. Αδιάλυτη σε αιθανόλη
Αεριοχρωματογραφία	Προσδιορισμός των υποκαταστατών με αεριοχρωματογραφία
pH	Τουλάχιστον 5,0 και έως 8,0 κατ' ανώτατο όριο (κολλοειδές διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	10 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 3 ώρες)
Θεϊκή τέφρα	1,5 % κατ' ανώτατο όριο για τα προϊόντα με ιξώδες 50 mPa.s και άνω 3 % κατ' ανώτατο όριο για τα προϊόντα με ιξώδες κάτω των 50 mPa.s
Προπυλενοχλωρυδρίνες	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## E 465 ΑΙΘΥΛΟΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ

<b>Συνώνυμα</b>	Μεθυλαιθυλοκυτταρίνη
<b>Ορισμός</b>	Η αιθυλομεθυλοκυτταρίνη είναι κυτταρίνη που λαμβάνεται απευθείας από ινώδεις φυτικές ύλες και αιθεροποιείται εν μέρει με μεθύλια και αιθύλια
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Αιθυλ-μεθυλαιθέρας της κυτταρίνης

▼ **B**

Χημικός τύπος	Τα πολυμερή περιέχουν δομικές μονάδες υποκαταστημένου ανυδρικού παραγώγου της γλυκόζης με τον ακόλουθο γενικό τύπο: $C_6H_7O_2(OR_1)(OR_2)(OR_3)$ , όπου $R_1, R_2, R_3$ μπορεί να είναι: — H — $CH_3$ — $CH_2CH_3$
Μοριακό βάρος	Από 30 000 περίπου έως 40 000
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα, επί άνυδρης ουσίας, σε μεθοξύλια ( $-OCH_3$ ) τουλάχιστον 3,5 % και έως 6,5 % κατ' ανώτατο όριο και σε αιθοξύλια ( $-OCH_2CH_3$ ) τουλάχιστον 14,5 % και έως 19 % κατ' ανώτατο όριο και συνολική περιεκτικότητα σε αλκοξύλια τουλάχιστον 13,2 % και έως 19,5 % κατ' ανώτατο όριο, εκφρασμένη σε μεθοξύλια
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμη και άγευστη, κοκκώδης ή ινώδης σκόνη, ελαφρώς υγροσκοπική, χρώματος λευκού ή ελαφρώς υποκίτρινου ή υπόφαιου
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διογκώνεται μέσα στο νερό, σχηματίζοντας ένα διαυγές έως οπαλίζον, παχύρρεστο κολλοειδές διάλυμα. Διαλυτή σε αιθανόλη. Αδιάλυτη σε αιθέρα
pH	Τουλάχιστον 5,0 και έως 8,0 κατ' ανώτατο όριο (κολλοειδές διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	15 % κατ' ανώτατο όριο για την ινώδη μορφή και 10 % κατ' ανώτατο όριο για την κονιοποιημένη μορφή (105 °C, μέχρι σταθερού βάρους)
Θεική τέφρα	0,6 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **M8****E 466 ΑΛΑΣ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΚΟΜΜΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	NaCMC· άλας CMC με νάτριο
<b>Ορισμός</b>	Το άλας με νάτριο της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης είναι μερικό άλας με νάτριο ενός καρβοξυμεθυλαιθέρα της κυτταρίνης, η οποία λαμβάνεται απευθείας από ινώδεις φυτικές ύλες

▼ **B**

Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Άλας με νάτριο του καρβοξυμεθυλαιθέρα της κυτταρίνης
Χημικός τύπος	Τα πολυμερή περιέχουν δομικές μονάδες υποκαταστημένου ανυδρικού παραγώγου της γλυκόζης με τον ακόλουθο γενικό τύπο: $C_6H_7O_2(OR_1)(OR_2)(OR_3)$ , όπου $R_1, R_2, R_3$ μπορεί να είναι: — H — $CH_2COONa$ — $CH_2COOH$
Μοριακό βάρος	Άνω του 17 000 περίπου (βαθμός πολυμερισμού κατά προσέγγιση 100)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμη και άγευστη, κοκκώδης ή ινώδης σκόνη, ελαφρώς υγροσκοπική, χρώματος λευκού ή ελαφρώς υποκίτρινου ή υπόφαιου

**▼ B****Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα	Σχηματίζει με νερό παχύρρευστο κολλοειδές διάλυμα. Αδιάλυτη σε αιθανόλη
Δοκιμή σχηματισμού αφρού	Διάλυμα του δείγματος με συγκέντρωση 0,1 % ανακινείται ζωηρά. Δεν εμφανίζεται καθόλου στιβάδα αφρού. (Με τη δοκιμή αυτή διακρίνεται το άλας με νάτριο της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης από άλλους αιθέρες της κυτταρίνης)
Σχηματισμός ιζήματος	Σε 5 ml διαλύματος του δείγματος με συγκέντρωση 0,5 %, προστίθενται 5 ml διαλύματος θειικού χαλκού ή θειικού αργιλίου 5 %, οπότε σχηματίζεται ίζημα. (Με τη δοκιμή αυτή διακρίνεται το άλας με νάτριο της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης από άλλους αιθέρες της κυτταρίνης, καθώς και από τη ζελατίνη, το κόμμι χαρουπιών και το τραγακάνθινο κόμμι)
Χρωματική αντίδραση	Σε 50 ml νερού προστίθενται υπό ανάδευση 0,5 g κονιοποιημένου άλατος με νάτριο της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη διασπορά. Η ανάδευση συνεχίζεται μέχρι να ληφθεί διαυγές διάλυμα, το οποίο χρησιμοποιείται για την ακόλουθη δοκιμή:  Σε 1 mg δείγματος, που έχει προηγουμένως αραιωθεί με ίσο όγκο νερού σε μικρό δοκιμαστικό σωλήνα, προστίθενται 5 σταγόνες διαλύματος ναφθόλης-1. Ο δοκιμαστικός σωλήνας κρατείται υπό κλίση και εισάγονται με προσοχή κατά μήκος των τοιχωμάτων του 2 ml θειικού οξέος ώστε να σχηματίσει κάτω στιβάδα. Στη μεσεπιφάνεια αναπτύσσεται μια κοκκινοπορφυρή χρώση
pH	Τουλάχιστον 5,0 και έως 8,5 κατ' ανώτατο όριο (κολλοειδές διάλυμα 1 %)

**Καθαρότητα**

Βαθμός υποκατάστασης	Τουλάχιστον 0,2 και όχι περισσότερα από 1,5 καρβοξυμεθύλια (-CH <sub>2</sub> COOH) ανά μονάδα ανυδρτικού παραγώγου της γλυκόζης
Απώλεια κατά την ξήρανση	12 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C μέχρι σταθερού βάρους)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Ολικές γλυκολικές ενώσεις	0,4 % κατ' ανώτατο όριο υπολογιζόμενες ως γλυκολικό νάτριο επί άνυδρης ουσίας
Νάτριο	12,4 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας

**E 468 ΑΛΑΣ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΤΑΥΡΟΔΕΣΜΟΥΣ, ΚΟΜΜΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΤΑΥΡΟΔΕΣΜΟΥΣ****Συνώνυμα**

Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη με σταυροδεσμούς· CMC με σταυροδεσμούς· άλας με νάτριο της CMC με σταυροδεσμούς

**Ορισμός**

Η καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη με σταυροδεσμούς είναι το άλας με νάτριο εν μέρει Ο-καρβοξυμεθυλιωμένης κυτταρίνης στην οποία έχουν δημιουργηθεί σταυροδεσμοί μέσω θερμικής κατεργασίας

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Άλας με νάτριο του φέροντος σταυροδεσμούς καρβοξυμεθυλαιθέρα της κυτταρίνης

Χημικός τύπος

Τα πολυμερή που περιέχουν δομικές μονάδες υποκατεστημένου ανυδρτικού παραγώγου της γλυκόζης με τον γενικό τύπο:

C<sub>6</sub>H<sub>7</sub>O<sub>2</sub>(OR<sub>1</sub>)(OR<sub>2</sub>)(OR<sub>3</sub>) όπου R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> και R<sub>3</sub> μπορεί να είναι κάποιο από τα ακόλουθα:

- H
- CH<sub>2</sub>COONa
- CH<sub>2</sub>COOH

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

**▼ B**

<b>Περιγραφή</b>	Ελαφρώς υγροσκοπική, λευκή έως υπόλευκη, άοσμη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Σχηματισμός ιζήματος	Ποσότητα 1 g ανακινείται με 100 ml διαλύματος που περιέχει 4 mg/kg κυανού του μεθυλενίου και το σύνολο αφήνεται να καθιζήσει. Η προς εξέταση ουσία απορροφά το κυανό του μεθυλενίου και καθιζάνει με τη μορφή κυανής, ινώδους μάζας
Χρωματική αντίδραση	Ποσότητα 1 g ανακινείται με 50 ml νερού. 1 ml του μείγματος μεταφέρεται σε δοκιμαστικό σωλήνα, προστίθενται 1 ml νερού και 0,05 ml προσφάτως παρασκευασμένου διαλύματος 40 g/l α-ναφθόλης σε μεθανόλη. Ο δοκιμαστικός σωλήνας κρατείται υπό κλίση και προστίθενται προσεκτικά 2 ml θειικού οξέος κατά μήκος των τοιχωμάτων του ώστε να σχηματίσει κάτω στιβάδα. Στη μεσεπιφάνεια αναπτύσσεται μια κοκκινιοίωδης χρώση
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
pH	Τουλάχιστον 5,0 και έως 7,0 κατ' ανώτατο όριο (διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	6 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 3 ώρες)
Υδατοδιαλυτές ύλες	10 % κατ' ανώτατο όριο
Βαθμός υποκατάστασης	Τουλάχιστον 0,2 και έως 1,5 κατ' ανώτατο όριο καρβοξυμεθύλια ανά μονάδα ανυδρικού παραγώγου της γλυκόζης
Περιεκτικότητα σε νάτριο	12,4 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 469 ΕΝΖΥΜΙΚΑ ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΗ ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΕΝΖΥΜΙΚΑ ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΟ ΚΟΜΜΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	Άλας με νάτριο καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης, ενζυμικά υδρολυμένης
<b>Ορισμός</b>	Ενζυμικά υδρολυμένη καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη λαμβάνεται από καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη με ενζυμική πέψη με κυτταρίναση παραγόμενη από <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (πρώην <i>T. reesei</i> )
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Άλας με νάτριο καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης, εν μέρει ενζυμικά υδρολυμένης
Χημικός τύπος	Άλατα νατρίου πολυμερών που περιέχουν δομικές μονάδες υποκατεστημένου ανυδρικού παραγώγου της γλυκόζης με τον γενικό τύπο: $[C_6H_7O_2(OH)_x(OCH_2COONa)_y]_n$ όπου n είναι ο βαθμός πολυμερισμού x = 1,50 έως 2,80 y = 0,2 έως 1,50 x + y = 3,0 (y = βαθμός υποκατάστασης)
Μοριακό βάρος	178,14 όπου y = 0,20 282,18 όπου y = 1,50 Μακρομόρια: Τουλάχιστον 800 (n περίπου 4)
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 99,5 %, συμπεριλαμβανομένων των μονο- και δισαχαριτών, επί ξηράς ουσίας

## ▼ B

<b>Περιγραφή</b>	Λευκή ή ελαφρώς υποκίτρινη ή υπόφαιη, άοσμη, ελαφρώς υγροσκοπική κοκκώδης ή ινώδης σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτή στο νερό, αδιάλυτη σε αιθανόλη
Δοκιμή σχηματισμού αφρού	Διάλυμα 0,1 % του δείγματος ανακινείται ζοηρά. Δεν εμφανίζεται καθόλου στιβάδα αφρού. Η δοκιμή αυτή διακρίνει το άλας με νάτριο της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης, υδρολυμένης ή μη, από άλλους κυτταρινικούς αιθέρες και από αλγινικά και φυσικά κόμματα
Σχηματισμός ιζήματος	Σε 5 ml διαλύματος του δείγματος με συγκέντρωση 0,5 % προστίθενται 5 ml διαλύματος θειικού χαλκού ή αργιλίου 5 %. Εμφανίζεται ίζημα. Η δοκιμή αυτή διακρίνει το άλας με νάτριο της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης, υδρολυμένης ή μη, από άλλους κυτταρινικούς αιθέρες και από τη ζελατίνη, το κόμμι χαρουπιών και το τραγακάνθινο κόμμι
Χρωματική αντίδραση	Σε 50 ml νερού προστίθενται υπό ανάδευση 0,5 g του κονιοποιημένου δείγματος για να επιτευχθεί ομοιόμορφη διασπορά. Η ανάδευση συνεχίζεται μέχρι να ληφθεί διαυγές διάλυμα. 1 ml του διαλύματος αραιώνεται με 1 ml νερού σε μικρό δοκιμαστικό σωλήνα. Προστίθενται 5 σταγόνες ναφθόλης-1 TS. Ο σωλήνας κρατείται υπό κλίση και εισάγονται προσεκτικά κατά μήκος των τοιχωμάτων του 2 ml θειικού οξέος ώστε να σχηματίσει κάτω στιβάδα. Στη μεσεπιφάνεια αναπτύσσεται μια κοκκινοπορφυρή χρώση
Ιξώδες (στερεά 60 %)	Τουλάχιστον $2\,500\text{ kgm}^{-1}\text{s}^{-1}$ (25 °C) που αντιστοιχεί σε μέσο μοριακό βάρος 5 000 Da
pH	Τουλάχιστον 6,0 και έως 8,5 κατ' ανώτατο όριο (κολλοειδές διάλυμα 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	12 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C μέχρι σταθερού βάρους)
Βαθμός υποκατάστασης	Τουλάχιστον 0,2 και έως 1,5 κατ' ανώτατο όριο καρβοξυμεθύλια ανά μονάδα ανυδρικού παραγώγου της γλυκόζης επί ξηράς ουσίας
Χλωριούχο νάτριο και γλυκολικό νάτριο	0,5 % κατ' ανώτατο όριο, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό
Υπολειμματική ενζυμική δραστηριότητα	Δοκιμή θετική. Δεν επέρχεται καμία αλλαγή στο ιξώδες του διαλύματος δοκιμής, πράγμα που δείχνει υδρόλυση του άλατος με νάτριο της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης
Μόλυβδος	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 470a ΑΛΑΤΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ, ΚΑΛΙΟ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Άλατα με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο λιπαρών οξέων που απαντούν στα βρώσιμα λίπη και έλαια. Τα άλατα αυτά λαμβάνονται είτε από βρώσιμα λίπη και έλαια είτε από αποσταγμένα λιπαρά οξέα βρώσιμων λιπών και ελαίων.
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 % επί άνυδρης ουσίας (105 °C μέχρι σταθερού βάρους)
<b>Περιγραφή</b>	Ελαφρά στερεά σε μορφή σκόνης ή νιφάδων ή ημιστερεά προϊόντα, χρώματος λευκού ή υπόλευκου

**▼ B**

<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Άλατα με νάτριο και κάλιο: διαλυτά στο νερό και στην αιθανόλη. Άλατα με ασβέστιο: αδιάλυτα σε νερό, αιθανόλη και αιθέρα
Δοκιμή κατιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή λιπαρών οξέων	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Νάτριο	Τουλάχιστον 9 % και έως 14 % κατ' ανώτατο όριο, εκφρασμένο σε Na <sub>2</sub> O
Κάλιο	Τουλάχιστον 13 % και έως 21,5 % κατ' ανώτατο όριο εκφρασμένο σε K <sub>2</sub> O
Ασβέστιο	Τουλάχιστον 8,5 % και έως 13 % κατ' ανώτατο όριο εκφρασμένο σε CaO
Ασαπυνοποιητές ύλες	2 % κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερα λιπαρά οξέα	3 % κατ' ανώτατο όριο, υπολογιζόμενα ως ελαϊκό οξύ
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερα αλκάλια	0,1 % κατ' ανώτατο όριο εκφρασμένα σε NaOH
Ύλες αδιάλυτες σε αλκοόλη	0,2 % κατ' ανώτατο όριο (μόνον προκειμένου για τα άλατα με νάτριο και κάλιο)

**E 470b ΑΛΑΤΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΗΣΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
	Άλατα με μαγνήσιο λιπαρών οξέων που απαντούν στα βρώσιμα λίπη και έλαια. Τα άλατα αυτά λαμβάνονται είτε από βρώσιμα λίπη και έλαια είτε από αποσταγμένα λιπαρά οξέα βρώσιμων λιπών και ελαίων
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 % επί άνυδρης ουσίας (105 °C μέχρι σταθερού βάρους)
<b>Περιγραφή</b>	
	Ελαφρά στερεά σε μορφή σκόνης ή νιφάδων ή ημιστερεά προϊόντα, χρώματος λευκού ή υπόλευκου
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτα στο νερό, μερικώς διαλυτά σε αιθανόλη και αιθέρα
Δοκιμή μαγνησίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή λιπαρών οξέων	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Μαγνήσιο	Τουλάχιστον 6,5 % και έως 11 % κατ' ανώτατο όριο, εκφρασμένο σε MgO
Ελεύθερα αλκάλια	0,1 % κατ' ανώτατο όριο εκφρασμένα σε MgO
Ασαπυνοποιητές ύλες	2 % κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερα λιπαρά οξέα	3 % κατ' ανώτατο όριο, υπολογιζόμενα ως ελαϊκό οξύ
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο



▼ **B**

Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **M42****E 471 MONO- ΚΑΙ ΔΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ****Συνώνυμα  
Ορισμός**

Τα μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων συνίστανται από μείγματα μονο-, δι- και τριεστέρων της γλυκερόλης (γλυκερίνης) με λιπαρά οξέα που απαντούν στα βρώσιμα λίπη και έλαια. Ενδέχεται να περιέχουν μικρές ποσότητες ελεύθερων λιπαρών οξέων και γλυκερόλης.

Η γλυκερόλη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μονο- και διγλυκεριδίων λιπαρών οξέων θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές για το πρόσθετο τροφίμων E 422.

Το πρόσθετο τροφίμων E 471 παράγεται από λίπη και έλαια που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίμων όσον αφορά τα βρώσιμα λίπη και έλαια.

Αριθ. Eines  
Χημική ονομασία  
Χημικός τύπος  
Μοριακό βάρος  
Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε μονο- και διεστέρες: τουλάχιστον 70 %

Περιεκτικότητα σε ερουκικό οξύ, συμπεριλαμβανομένου του ερουκικού οξέος που είναι δεσμευμένο στο μονο-/διγλυκερίδιο:

0,2 % κατ' ανώτατο όριο (μόνο εάν προστίθεται σε τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά)

0,5 % κατ' ανώτατο όριο (για όλες τις χρήσεις εκτός από τροφές που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά)

Τα προϊόντα ποικίλλουν από ελαιώδη υγρά χρώματος ωχροκίτρινου έως ωχροκάστανου έως σκληρά κηρώδη στερεά χρώματος λευκού ή ελαφρώς υπόλευκου. Τα στερεά είναι δυνατόν να έχουν τη μορφή νιφάδων, σκόνης ή μικρών σφαιριδίων.

**Περιγραφή****Ταυτοποίηση**

Φάσμα απορρόφησης υπερύθρου

Το χαρακτηριστικό φάσμα των προϊόντων μερικής εστεροποίησης λιπαρών οξέων με πολυόλες

Δοκιμή θετική

Δοκιμή θετική

Αδιάλυτα στο νερό, διαλυτά σε αιθανόλη και τολουόλιο στους 50 °C

Δοκιμή γλυκερόλης  
Δοκιμή λιπαρών οξέων  
Διαλυτότητα

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό  
Βαθμός οξύτητας  
Ελεύθερη γλυκερόλη  
Πολυγλυκερόλες

2 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

6 κατ' ανώτατο όριο

7 % κατ' ανώτατο όριο

Μέγιστη περιεκτικότητα 4 % σε διγλυκερόλη και 1 % σε ανώτερες πολυγλυκερόλες, υπολογιζόμενη και στις δύο περιπτώσεις επί της περιεκτικότητας σε ολική γλυκερόλη

0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

0,75 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (μόνο εάν προστίθεται σε τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά)

Αρσενικό  
Μόλυβδος  
Υδράργυρος  
Κάδμιο  
Άθροισμα 3-μονοχλωροπροπανοδιόλης (3-MCPD) και εστέρων λιπαρών οξέων με 3-MCPD, εκφραζόμενο ως 3-MCPD

2,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (για όλες τις χρήσεις εκτός από τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά)

Από τις 30 Ιουλίου 2023 έως τις 30 Ιανουαρίου 2024, 5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο εάν προστίθεται σε τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά και 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για όλες τις άλλες χρήσεις.

Από τις 30 Ιανουαρίου 2024, 5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για όλες τις χρήσεις.

Γλυκιδυλικό εστέρες λιπαρών οξέων, εκφραζόμενοι ως γλυκιδόλη

Τουλάχιστον 16 % και έως 33 % κατ' ανώτατο όριο

Ολική γλυκερόλη  
Θεϊκή τέφρα

0,5 % κατ' ανώτατο όριο, προσδιοριζόμενη με πύρωση στους 800 ± 25 °C

Σάπωνες

—

*Τα κριτήρια καθαρότητας ισχύουν για το πρόσθετο απαλλαγμένο από άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο, αν και επιτρέπεται η παρουσία αυτών των ουσιών σε μέγιστη αναλογία 6 % (εκφρασμένη σε ελαϊκό νάτριο)*


**E 472 α ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙΓΛΥΚΕ-  
ΡΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ**

<b>Συνώνυμα</b>	Εστέρες του οξικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια· ακετογλυκε- ρίδια· ακετυλιωμένα μονο- και διγλυκερίδια· μεικτοί εστέρες γλυκε- ρόλης με οξικό οξύ και λιπαρά οξέα
<b>Ορισμός</b>	Μεικτοί εστέρες γλυκερόλης με οξικό οξύ και λιπαρά οξέα που απαντούν στα βρώσιμα λίπη και έλαια. Τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να περιέχουν μικρές ποσότητες ελεύθερης γλυκερόλης, ελεύθερων λιπαρών οξέων, ελεύθερου οξικού οξέος και ελεύθερων γλυκεριδίων
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Διαυγή ευκίνητα υγρά έως στερεά, των οποίων το χρώμα ποικίλλει από λευκό έως ωχροκίτρινο
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή γλυκερόλης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή λιπαρών οξέων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή οξικού οξέος	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Αδιάλυτοι στο νερό. Διαλυτοί σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Άλλα οξέα πλην του οξικού και των λιπαρών	Λιγότερο από 1 %
Ελεύθερη γλυκερόλη	2 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Ολικό οξικό οξύ	Τουλάχιστον 9 % και έως 32 % κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερα λιπαρά οξέα (και οξικό οξύ)	3 % κατ' ανώτατο όριο, υπολογιζόμενα ως ελαϊκό οξύ
Ολική γλυκερόλη	Τουλάχιστον 14 % και έως 31 % κατ' ανώτατο όριο
Θεϊκή τέφρα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο, προσδιοριζόμενη με πύρωση στους 800 ± 25 °C

*Τα παραπάνω κριτήρια καθαρότητας ισχύουν για το πρόσθετο απαλλαγμένο από άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο, αν και επιτρέπεται η παρουσία αυτών των ουσιών σε μέγιστη αναλογία 6 % (εκφρασμένη σε ελαϊκό νάτριο).*

**E 472 β ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ  
ΔΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ**

<b>Συνώνυμα</b>	Εστέρες του γαλακτικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια· γαλακτο- γλυκερίδια· μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων εστεροποιημένα με γαλακτικό οξύ
<b>Ορισμός</b>	Μεικτοί εστέρες γλυκερόλης με γαλακτικό οξύ και λιπαρά οξέα που απαντούν στα βρώσιμα λίπη και έλαια. Τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να περιέχουν μικρές ποσότητες ελεύθερης γλυκερόλης, ελεύθερων λιπαρών οξέων, ελεύθερου γαλακτικού οξέος και ελεύθερων γλυκε- ριδίων

▼ B

<b>Περιγραφή</b>	Διαυγή ευκίνητα υγρά έως κηρώδη στερεά, μεταβλητής σύστασης, των οποίων το χρώμα ποικίλλει από λευκό έως ωχροκίτρινο
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή γλυκερόλης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή λιπαρών οξέων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή γαλακτικού οξέος	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Αδιάλυτοι σε κρύο νερό αλλά κολλοειδώς διαλυτοί σε θερμό νερό
<b>Καθαρότητα</b>	
Άλλα οξέα πλην του γαλακτικού και των λιπαρών	Λιγότερο από 1 %
Ελεύθερη γλυκερόλη	2 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Ολικό γαλακτικό οξύ	Τουλάχιστον 13 % και έως 45 % κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερα λιπαρά οξέα (και γαλακτικό οξύ)	3 % κατ' ανώτατο όριο, υπολογιζόμενα ως ελαϊκό οξύ
Ολική γλυκερόλη	Τουλάχιστον 13 % και έως 30 % κατ' ανώτατο όριο
Θειική τέφρα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (800 ± 25 °C)

*Τα παραπάνω κριτήρια καθαρότητας ισχύουν για το πρόσθετο απαλλαγμένο από άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο, αν και επιτρέπεται η παρουσία αυτών των ουσιών σε μέγιστη αναλογία 6 % (εκφρασμένη σε ελαϊκό νάτριο).*

#### **E 472 c ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ**

<b>Συνώνυμα</b>	Citrem· εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια· κιτρογλυκερίδια· μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων εστεροποιημένα με κιτρικό οξύ
<b>Ορισμός</b>	Μεικτοί εστέρες γλυκερόλης με κιτρικό οξύ και λιπαρά οξέα που απαντούν στα βρώσιμα λίπη και έλαια. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατόν να περιέχουν μικρές ποσότητες ελεύθερης γλυκερόλης, ελεύθερων λιπαρών οξέων, ελεύθερου κιτρικού οξέος και ελεύθερων γλυκεριδίων και να έχουν εξουδετερωθεί, πλήρως ή εν μέρει, με άλατα νατρίου, καλίου ή ασβεστίου που είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό και έχουν εγκριθεί ως πρόσθετα τροφίμων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Υγρά έως κηρώδη στερεά ή ημιστερεά, των οποίων το χρώμα ποικίλλει από υποκίτρινο έως ανοικτό καστανό
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή γλυκερόλης	Δοκιμή θετική

**▼ B**

Δοκιμή λιπαρών οξέων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή κιτρικού οξέος	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Αδιάλυτοι σε κρύο νερό, κολλοειδώς διαλυτοί σε θερμό νερό, διαλυτοί σε λίπη και έλαια, αδιάλυτοι σε κρύα αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Άλλα οξέα πλην του κιτρικού και των λιπαρών	Λιγότερο από 1 %
Ελεύθερη γλυκερόλη	2 % κατ' ανώτατο όριο
Ολική γλυκερόλη	Τουλάχιστον 8 % και έως 33 % κατ' ανώτατο όριο
Ολικό κιτρικό οξύ	Τουλάχιστον 13 % και έως 50 % κατ' ανώτατο όριο
Θεική τέφρα	Μη εξουδετερωμένα προϊόντα: 0,5 % κατ' ανώτατο όριο (800 ± 25 °C) Μερικώς ή πλήρως εξουδετερωμένα προϊόντα: 10 % κατ' ανώτατο όριο (800 ± 25 °C)
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Βαθμός οξύτητας	130 κατ' ανώτατο όριο

*Τα κριτήρια καθαρότητας ισχύουν για το πρόσθετο απαλλαγμένο από άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο, αν και επιτρέπεται η παρουσία αυτών των ουσιών σε μέγιστη αναλογία 6 % (εκφρασμένη σε ελαϊκό νάτριο).*

**E 472 d ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ**

<b>Συνώνυμα</b>	Εστέρες του τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων εστεροποιημένα με τρυγικό οξύ
<b>Ορισμός</b>	Μεικτοί εστέρες της γλυκερόλης με τρυγικό οξύ και λιπαρά οξέα που απαντούν στα βρώσιμα λίπη και έλαια. Τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να περιέχουν μικρές ποσότητες ελεύθερης γλυκερόλης, ελεύθερων λιπαρών οξέων, ελεύθερου τρυγικού οξέος και ελεύθερων γλυκεριδίων
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Κολλώδη παχύρρευστα υποκίτρινα υγρά έως σκληροί κίτρινοι κηροί
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή γλυκερόλης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή λιπαρών οξέων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή τρυγικού οξέος	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Άλλα οξέα πλην του τρυγικού και των λιπαρών	Λιγότερο από 1,0 %
Ελεύθερη γλυκερόλη	2 % κατ' ανώτατο όριο
Ολική γλυκερόλη	Τουλάχιστον 12 % και έως 29 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **B**

Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Ολικό τρυγικό οξύ	Τουλάχιστον 15 % και έως 50 % κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερα λιπαρά οξέα	3 % κατ' ανώτατο όριο, υπολογιζόμενα ως ελαϊκό οξύ
Θεϊκή τέφρα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (800 ± 25 °C)

*Τα παραπάνω κριτήρια καθαρότητας ισχύουν για το πρόσθετο απαλλαγμένο από άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο, αν και επιτρέπεται η παρουσία αυτών των ουσιών σε μέγιστη αναλογία 6 % (εκφρασμένη σε ελαϊκό νάτριο).*

**E 472 e ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΤΥΛΟΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ**

<b>Συνώνυμα</b>	Εστέρες του διακετυλοτρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια· μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων εστεροποιημένα με μονο- και διακετυλοτρυγικό οξύ· μεικτοί εστέρες γλυκερόλης με διακετυλοτρυγικό οξύ και λιπαρά οξέα
<b>Ορισμός</b>	Μεικτοί εστέρες γλυκερόλης με μονο- και διακετυλοτρυγικό οξύ (παράγωγα του τρυγικού οξέος) και με λιπαρά οξέα που απαντούν στα βρώσιμα λίπη και έλαια. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατόν να περιέχουν σε μικρές ποσότητες ελεύθερη γλυκερόλη, ελεύθερα λιπαρά οξέα, ελεύθερο τρυγικό και οξικό οξύ και τους συνδυασμούς στους καθώς και ελεύθερα γλυκερίδια. Περιέχουν επίσης τρυγικούς και οξικούς εστέρες των λιπαρών οξέων
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Ποικίλλουν από κολλώδη παχύρρευστα υγρά και λιποειδή ημιστερεά έως κηρούς κιτρίνου χρώματος, όταν δε έλθουν σε επαφή με υγρό αέρα, υδρολύονται ελευθερώνοντας οξικό οξύ
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή γλυκερόλης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή λιπαρών οξέων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή τρυγικού οξέος	Δοκιμή θετική
Δοκιμή οξικού οξέος	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Άλλα οξέα πλην του οξικού, του τρυγικού και των λιπαρών	Λιγότερο από 1 %
Ελεύθερη γλυκερόλη	2 % κατ' ανώτατο όριο
Ολική γλυκερόλη	Τουλάχιστον 11 % και έως 28 % κατ' ανώτατο όριο
Θεϊκή τέφρα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο, προσδιοριζόμενη με πύρωση στους 800 ± 25 °C
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## ▼ B

Ολικό τρυγικό οξύ	Τουλάχιστον 10 % και έως 40 % κατ' ανώτατο όριο
Ολικό οξικό οξύ	Τουλάχιστον 8 % και έως 32 % κατ' ανώτατο όριο
Βαθμός οξύτητας	Τουλάχιστον 40 και έως 130 κατ' ανώτατο όριο

*Τα παραπάνω κριτήρια καθαρότητας ισχύουν για το πρόσθετο απαλλαγμένο από άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο, αν και επιτρέπεται η παρουσία αυτών των ουσιών σε μέγιστη αναλογία 6 % (εκφρασμένη σε ελαϊκό νάτριο).*

**E 472 f ΜΕΙΚΤΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ  
ΜΕ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ**

<b>Συνώνυμα</b>	Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων εστεροποιημένα με οξικό και τρυγικό οξύ
<b>Ορισμός</b>	Μεικτοί εστέρες γλυκερόλης με οξικό και τρυγικό οξύ και με λιπαρά οξέα που απαντούν στα βρώσιμα λίπη και έλαια. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατόν να περιέχουν σε μικρές ποσότητες ελεύθερη γλυκερόλη, ελεύθερα λιπαρά οξέα, ελεύθερο τρυγικό και οξικό οξύ καθώς και ελεύθερα γλυκερίδια. Περιέχουν ενδεχομένως μονο- και διακετυλοτρυγικούς εστέρες μονο- και διγλυκερίδιων λιπαρών οξέων
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Κολλώδη υγρά έως στερεά, των οποίων το χρώμα ποικίλλει από λευκό έως ωχροκίτρινο
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή γλυκερόλης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή λιπαρών οξέων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή τρυγικού οξέος	Δοκιμή θετική
Δοκιμή οξικού οξέος	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Άλλα οξέα πλην του οξικού, του τρυγικού και των λιπαρών	Λιγότερο από 1,0 %
Ελεύθερη γλυκερόλη	2 % κατ' ανώτατο όριο
Ολική γλυκερόλη	Τουλάχιστον 12 % και έως 27 % κατ' ανώτατο όριο
Θεική τέφρα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (800 ± 25 °C)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Ολικό οξικό οξύ	Τουλάχιστον 10 % και έως 20 % κατ' ανώτατο όριο
Ολικό τρυγικό οξύ	Τουλάχιστον 20 % και έως 40 % κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερα λιπαρά οξέα	3 % κατ' ανώτατο όριο, υπολογιζόμενα ως ελαϊκό οξύ

## ▼ B

*Τα παραπάνω κριτήρια καθαρότητας ισχύουν για το πρόσθετο απαλλαγμένο από άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο, αν και επιτρέπεται η παρουσία αυτών των ουσιών σε μέγιστη αναλογία 6 % (εκφρασμένη σε ελαϊκό νάτριο).*

## E 473 ΕΣΤΕΡΕΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΟΖΗ

<b>Συνώνυμα</b>	Εστεροσάκχαρα· εστέρες ζάχαρης
<b>Ορισμός</b>	Πρόκειται κυρίως για μονο-, δι- και τριεστέρες της σακχαρόζης με λιπαρά οξέα που απαντούν στα βρώσιμα λίπη και έλαια. Παρασκευάζονται από σακχαρόζη και μεθυλ-, αιθυλ- και βινυλεστέρες βρώσιμων λιπαρών οξέων (συμπεριλαμβανομένου του λαυρικού) ή από σακχαρογλυκερίδια με εκχύλιση. Για την παρασκευή τους δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλοι οργανικοί διαλύτες εκτός από διμεθυλοσουλφοξείδιο, διμεθυλοφορμαμίδια, οξικό αιθυλεστέρα, προπανόλη-2, 2-μεθυλοπροπανόλη-1, προπυλενογλυκόλη, μεθυλαιθυλοκετόνη και υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα. Κατά τη διαδικασία παρασκευής επιτρέπεται να χρησιμοποιείται p-μεθοξυφαινόλη ως σταθεροποιητής.
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 80 %
<b>Περιγραφή</b>	Στερεά σε μορφή σκληρής πηκτής, μαλακών μαζών ή λευκής έως ελαφρώς λευκόφαιης σκόνης
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή σακχαρόζης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή λιπαρών οξέων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Μέτρια διαλυτοί στο νερό, διαλυτοί στην αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Θεική τέφρα	2 % κατ' ανώτατο όριο (800 ± 25 °C)
Ελεύθερη σακχαρόζη	5 % κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερα λιπαρά οξέα	3 % κατ' ανώτατο όριο, υπολογιζόμενα ως ελαϊκό οξύ
p-Μεθοξυφαινόλη	100 µg/kg κατ' ανώτατο όριο
Ακεταλδεΐδη	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μεθανόλη	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Διμεθυλοσουλφοξείδιο	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Διμεθυλοφορμαμίδιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
2-Μεθυλοπροπανόλη-1	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Οξικός αιθυλεστέρας	} 350 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό
Προπανόλη-2	
Προπυλενογλυκόλη	
Μεθυλαιθυλοκετόνη	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## ▼ B

*Τα παραπάνω κριτήρια καθαρότητας ισχύουν για το πρόσθετο απαλλαγμένο από άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο, αν και επιτρέπεται η παρουσία αυτών των ουσιών σε μέγιστη αναλογία 6 % (εκφρασμένη σε ελαϊκό νάτριο).*

## E 474 ΣΑΚΧΑΡΟΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

<b>Συνώνυμα</b>	Γλυκερίδια ζάχαρης
<b>Ορισμός</b>	Τα σακχαρογλυκερίδια παράγονται με αντίδραση σακχαρόζης με βρώσιμα λίπη ή έλαια, οπότε προκύπτουν κυρίως μείγματα μονο-, δι- και τριεστέρων της σακχαρόζης με λιπαρά οξέα (συμπεριλαμβανομένου του λαυρικού οξέος) μαζί με υπολείμματα μονο-, δι- και τριγλυκεριδίων από τα χρησιμοποιούμενα λίπη ή έλαια. Για την παρασκευή τους δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλοι οργανικοί διαλύτες εκτός από κυκλοεξάνιο, διμεθυλοφορμαμίδια, οξικό αιθυλεστέρα, 2-μεθυλοπροπανόλη-1 και προπανόλη-2
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε εστέρες λιπαρών οξέων με σακχαρόζη τουλάχιστον 40 % και έως 60 % κατ' ανώτατο όριο
<b>Περιγραφή</b>	Στερεά σε μορφή μαλακών μαζών σκληρής πηκτής ή λευκής έως υπόλευκης σκόνης
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή σακχαρόζης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή λιπαρών οξέων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Αδιάλυτα στο νερό, διαλυτά σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Θεική τέφρα	2 % κατ' ανώτατο όριο (800 ± 25 °C)
Ελεύθερη σακχαρόζη	5 % κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερα λιπαρά οξέα	3 % κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενα ως ελαϊκό οξύ)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μεθανόλη	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Διμεθυλοφορμαμίδιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
2-Μεθυλοπροπανόλη-1	} 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό
Κυκλοεξάνιο	
Οξικός αιθυλεστέρας	} 350 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό
Προπανόλη-2	

*Τα παραπάνω κριτήρια καθαρότητας ισχύουν για το πρόσθετο απαλλαγμένο από άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο, αν και επιτρέπεται η παρουσία αυτών των ουσιών σε μέγιστη αναλογία 6 % (εκφρασμένη σε ελαϊκό νάτριο).*



▼ **M41****E 475 ΠΟΛΥΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ**

<b>Συνώνυμα</b>	Εστέρες πολυγλυκερολών με λιπαρά οξέα· Εστέρες πολυγλυκερολών με εστέρες λιπαρών οξέων
<b>Ορισμός</b>	Τα πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων παράγονται με εστεροποίηση πολυγλυκερολών με βρώσιμα λίπη και έλαια ή με λιπαρά οξέα που απαντούν στα βρώσιμα λίπη και έλαια. Η πολυγλυκερολική ρίζα είναι κατά κύριο λόγο δι-, τρι- και τετραγλυκερόλη, ενώ η περιεκτικότητα σε επταγλυκερόλη ή ανώτερες πολυγλυκερόλες δεν υπερβαίνει το 10 %  Η πολυγλυκερόλη παράγεται από γλυκερόλη που πληροί τις προδιαγραφές του πρόσθετου E 422.
Αριθ. Eines	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Συνολική περιεκτικότητα σε εστέρες λιπαρών οξέων τουλάχιστον 90 %
<b>Περιγραφή</b>	Ανοιχτά κίτρινα έως κεχριμπαρένια, ελαιώδη έως πολύ παχύρρευστα υγρά· ανοιχτά καστανά έως μεσαία καστανά, εύπλαστα ή μαλακά στερεά· και ανοιχτά καστανά έως καστανά, σκληρά, κηρώδη στερεά
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή γλυκερόλης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή πολυγλυκερολών	Δοκιμή θετική
Δοκιμή λιπαρών οξέων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Οι εστέρες αυτοί ποικίλλουν από πολύ υδρόφιλες έως πολύ λιπόφιλες ουσίες αλλά ως τάξη συμπεριφέρονται ως κολλοειδώς διαλυτοί στο νερό και διαλυτοί σε οργανικούς διαλύτες και έλαια
<b>Καθαρότητα</b>	
Θεική τέφρα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (800 ± 25 °C)
Άλλα οξέα πλην των λιπαρών	Λιγότερο από 1 %
Ελεύθερα λιπαρά οξέα	6 % κατ' ανώτατο όριο, υπολογιζόμενα ως ελαϊκό οξύ
Γλυκερόλη και πολυγλυκερόλες ολικές	Τουλάχιστον 18 % και έως 60 % κατ' ανώτατο όριο
Γλυκερόλη και πολυγλυκερόλες ελεύθερες	7 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	0,3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Άθροισμα 3-μονογλωροπροπανοδιόλης (3-MCPD) και εστέρων λιπαρών οξέων με 3-MCPD, εκφραζόμενο ως 3-MCPD	2,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Γλυκιδυλικοί εστέρες λιπαρών οξέων εκφραζόμενοι ως γλυκιδόλη	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Εφαρμόζεται από τις 20 Ιουλίου 2023 έως τις 20 Ιανουαρίου 2024. 5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Εφαρμόζεται από τις 20 Ιανουαρίου 2024.
Ερουκικό οξύ	2 % κατ' ανώτατο όριο

*Τα παραπάνω κριτήρια καθαρότητας ισχύουν για το πρόσθετο απαλλαγμένο από άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο, αν και επιτρέπεται η παρουσία αυτών των ουσιών σε μέγιστη αναλογία 6 % (εκφρασμένη σε ελαϊκό νάτριο).*

**E 476 ΠΟΛΥΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΡΙΚΙΝΕΛΑΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	Γλυκερίδια συμπυκνωμένων λιπαρών οξέων καστορέλαιου (ρικινέ-λαιο, κικινέλαιο)· πολυγλυκερίδια πολυσυμπυκνωμένων λιπαρών οξέων καστορέλαιου· πολυγλυκερίδια διεστεροποιημένου ρικινελαϊκού (κικινελαϊκού) οξέος· PGPR
-----------------	--

▼ **M41****Ορισμός**

Αριθ. Eines  
Χημική ονομασία  
Χημικός τύπος  
Μοριακό βάρος  
Δοκιμασία

**Περιγραφή****Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα  
  
Δοκιμή γλυκερόλης  
Δοκιμή πολυγλυκερολών  
Δοκιμή ρικινελαϊκού οξέος  
Δείκτης διαθλάσεως

**Καθαρότητα**

Πολυγλυκερόλες  
  
Αριθμός υδροξυλίου  
Βαθμός οξύτητας  
Αρσενικό  
Μόλυβδος  
Υδράργυρος  
Κάδμιο  
Άθροισμα 3-μονοχλωροπροπανοδιόλης (3-MCPD) και εστέρων λιπαρών οξέων με 3-MCPD (εκφραζόμενο ως 3-MCPD)  
Γλυκιδυλικοί εστέρες λιπαρών οξέων (εκφραζόμενοι ως γλυκιδόλη)

Τα πολυγλυκερίδια του πολυρικινελαϊκού οξέος παρασκευάζονται με εστεροποίηση πολυγλυκερολών με συμπυκνωμένα λιπαρά οξέα καστορέλαιου. Το καστορέλαιο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πολυγλυκεριδίων του πολυρικινελαϊκού οξέος είναι απαλλαγμένο από ρικίνη.

Η πολυγλυκερόλη παράγεται από γλυκερόλη που πληροί τις προδιαγραφές του πρόσθετου E 422.

Διαυγές, πολύ παχύρρευστο υγρό

Διαλυτή στο νερό και στην αιθανόλη· διαλυτή σε αιθέρα, υδρογονάνθρακες και αλογονωμένους υδρογονάνθρακες

Δοκιμή θετική

Δοκιμή θετική

Δοκιμή θετική

$[\eta]_D^{65}$  από 1,4630 έως 1,4665

Η πολυγλυκερολική ρίζα αποτελείται τουλάχιστον κατά 75 % από δι-, τρι- και τετραγλυκερόλες και δεν περιέχει επταγλυκερόλη ή ανώτερες πολυγλυκερόλες σε αναλογία μεγαλύτερη από 10 %

Τουλάχιστον 80 και έως 100 κατ' ανώτατο όριο

6 κατ' ανώτατο όριο

0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

2,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **B****E 477 ΕΣΤΕΡΕΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ-1,2****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS  
Χημική ονομασία  
Χημικός τύπος  
Μοριακό βάρος  
Δοκιμασία

**Περιγραφή****Ταυτοποίηση**

Δοκιμή προπυλενογλυκόλης

Εστέρες λιπαρών οξέων με προπυλενογλυκόλη

Συνίστανται από μείγματα μονο- και διεστέρων της προπανοδιόλης-1,2 με λιπαρά οξέα που απαντούν στα βρώσιμα λίπη και έλαια. Η αλκοολική ρίζα είναι αποκλειστικά προπανοδιόλη-1,2 με το διμερές της και με ίχνη του τριμερούς. Δεν περιέχουν άλλα οργανικά οξέα εκτός από βρώσιμα λιπαρά οξέα

Συνολική περιεκτικότητα σε εστέρες λιπαρών οξέων τουλάχιστον 85 %

Διαυγή υγρά ή κηρώδη λευκά στερεά, άμορφα ή σε μορφή νιφάδων ή σφαιριδίων, με ευχάριστη οσμή

Δοκιμή θετική

▼ **B**

Δοκιμή λιπαρών οξέων	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Θειική τέφρα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (800 ± 25 °C)
Άλλα οξέα πλην των λιπαρών	Λιγότερο από 1 %
Ελεύθερα λιπαρά οξέα	6 % κατ' ανώτατο όριο, υπολογιζόμενα ως ελαϊκό οξύ
Ολική προπανοδιόλη-1,2	Τουλάχιστον 11 % και έως 31 % κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερη προπανοδιόλη-1,2	5 % κατ' ανώτατο όριο
Διμερές και τριμερές της προπυλενογλυκόλης	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

*Τα παραπάνω κριτήρια καθαρότητας ισχύουν για το πρόσθετο απαλλαγμένο από άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο, αν και επιτρέπεται η παρουσία αυτών των ουσιών σε μέγιστη αναλογία 6 % (εκφρασμένη σε ελαϊκό νάτριο).*

**E 479 b ΘΕΡΜΙΚΩΣ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ΜΕ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ**

<b>Συνώνυμα</b>	TOSOM
<b>Ορισμός</b>	Το θερμικώς οξειδωμένο σογιέλαιο που έχει αντιδράσει με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων είναι ένα πολύπλοκο μείγμα εστέρων της γλυκερόλης με λιπαρά οξέα βρώσιμων λιπών και λιπαρά οξέα θερμικώς οξειδωμένου σογιελαίου. Παρασκευάζεται με αλληλεπίδραση και απόσπηση υπό κενό στους 130 °C μείγματος αποτελούμενου από θερμικώς οξειδωμένο σογιέλαιο σε αναλογία 10 % και μονο- και διγλυκερίδια βρώσιμων λιπαρών οξέων σε αναλογία 90 %. Το χρησιμοποιούμενο σογιέλαιο πρέπει να έχει ληφθεί αποκλειστικά από σπέρματα φυτών σόγιας
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Ωχροκίτρινη έως ανοικτοκαστανή ουσία με κηρώδη ή στερεά σύσταση
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο στο νερό. Διαλυτό σε θερμά έλαια ή λίπη
<b>Καθαρότητα</b>	
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	55 — 65 °C
Ελεύθερα λιπαρά οξέα	1,5 % κατ' ανώτατο όριο, υπολογιζόμενα ως ελαϊκό οξύ
Ελεύθερη γλυκερόλη	2 % κατ' ανώτατο όριο
Ολικά λιπαρά οξέα	83 — 90 %
Ολική γλυκερόλη	16 — 22 %
Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων που δεν σχηματίζουν προϊόντα προσθήκης με ουρία	9 % επί των ολικών μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων κατ' ανώτατο όριο

## ▼ B

Λιπαρά οξέα αδιάλυτα σε πετρελαϊκό αιθέρα	2 % επί των ολικών λιπαρών οξέων κατ' ανώτατο όριο
Αριθμός υπεροξειδίων	3 κατ' ανώτατο όριο
Εποξειδία	Περιεκτικότητα σε οξυγόνο αιθυλενοξειδίου 0,03 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## E 481 ΣΤΕΑΤΟΪΛΟ-2-ΓΑΛΑΚΤΥΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

<b>Συνώνυμα</b>	Στεατοϋλογαλακτυλικό νάτριο· στεατοϋλογαλακτικό νάτριο
<b>Ορισμός</b>	Μείγμα αλάτων με νάτριο του στεατοϋλογαλακτυλικού οξέος και των πολυμερών του με μικρές ποσότητες αλάτων άλλων συγγενών οξέων με νάτριο, παρασκευαζόμενο με αντίδραση στεατικού οξέος με γαλακτικό οξύ. Το προϊόν είναι δυνατόν να περιέχει και άλλα βρώσιμα λιπαρά οξέα, ελεύθερα ή εστεροποιημένα, προερχόμενα από το χρησιμοποιούμενο στεατικό οξύ
Αριθ. EINECS	246-929-7
Χημική ονομασία	Δι-2-στεατοϋλο-γαλακτικό νάτριο Δι(2-στεατοϋλοξυ)προπιονικό νάτριο
Χημικός τύπος	$C_{21}H_{39}O_4Na \cdot C_{19}H_{35}O_4Na$ (κύρια συστατικά)
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή εύθρυπτο στερεό, λευκού ή ελαφρώς υποκίτρινου χρώματος, με χαρακτηριστική οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή λιπαρών οξέων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή γαλακτικού οξέος	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο στο νερό. Διαλυτό σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Νάτριο	Τουλάχιστον 2,5 % και έως 5 % κατ' ανώτατο όριο
Αριθμός σαπωνοποίησης	Τουλάχιστον 90 και έως 190 κατ' ανώτατο όριο
Βαθμός οξύτητας	Τουλάχιστον 60 και έως 130 κατ' ανώτατο όριο
Ολικό γαλακτικό οξύ	Τουλάχιστον 15 % και έως 40 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## E 482 ΣΤΕΑΤΟΪΛΟ-2-ΓΑΛΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

<b>Συνώνυμα</b>	Στεατοϋλο-γαλακτικό ασβέστιο
<b>Ορισμός</b>	Μείγμα αλάτων με ασβέστιο του στεατοϋλογαλακτυλικού οξέος και των πολυμερών του με μικρές ποσότητες αλάτων άλλων συγγενών οξέων με ασβέστιο, παρασκευαζόμενο με αντίδραση στεατικού οξέος με γαλακτικό οξύ. Το προϊόν είναι δυνατόν να περιέχει και άλλα βρώσιμα λιπαρά οξέα, ελεύθερα ή εστεροποιημένα, προερχόμενα από το χρησιμοποιούμενο στεατικό οξύ

**▼ B**

Αριθ. EINECS	227-335-7
Χημική ονομασία	Δι-2-στεατοϋλο-γαλακτικό ασβέστιο Δι(2-στεατοϋλοξυ)προπιονικό ασβέστιο
Χημικός τύπος	C <sub>42</sub> H <sub>78</sub> O <sub>8</sub> Ca · C <sub>38</sub> H <sub>70</sub> O <sub>8</sub> Ca, C <sub>40</sub> H <sub>74</sub> O <sub>8</sub> Ca (κύρια συστατικά)
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή εύθρυπτο στερεό, λευκού ή ελαφρώς υποκίτρινου χρώματος, με χαρακτηριστική οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή λιπαρών οξέων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή γαλακτικού οξέος	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Λίγο διαλυτό σε θερμό νερό
<b>Καθαρότητα</b>	
Ασβέστιο	Τουλάχιστον 1 % και έως 5,2 % κατ' ανώτατο όριο
Αριθμός σαπωνοποίησης	Τουλάχιστον 125 και έως 190 κατ' ανώτατο όριο
Ολικό γαλακτικό οξύ	Τουλάχιστον 15 % και έως 40 % κατ' ανώτατο όριο
Βαθμός οξύτητας	Τουλάχιστον 50 και έως 130 κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 483 ΤΡΥΓΙΚΟ ΣΤΕΑΤΥΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Τρυγικός στεατυλοπαλμιτυλεστέρας
<b>Ορισμός</b>	Προϊόν εστεροποίησης του τρυγικού οξέος με στεατυλική αλκοόλη του εμπορίου, αποτελούμενη βασικά από στεατυλική και παλμιτυλική αλκοόλη. Το προϊόν συνίσταται κυρίως από το διεστέρα με μικρές ποσότητες μονοεστέρα και πρώτων υλών που δεν έχουν αντιδράσει
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Τρυγικό διστεατύλιο Τρυγικό διπαλμιτύλιο Τρυγικό στεατυλοπαλμιτύλιο
Χημικός τύπος	C <sub>40</sub> H <sub>78</sub> O <sub>6</sub> (Τρυγικό διστεατύλιο) C <sub>36</sub> H <sub>70</sub> O <sub>6</sub> (Τρυγικό διπαλμιτύλιο) C <sub>38</sub> H <sub>74</sub> O <sub>6</sub> (Τρυγικό στεατυλοπαλμιτύλιο)
Μοριακό βάρος	655 (Τρυγικό διστεατύλιο) 599 (Τρυγικό διπαλμιτύλιο) 627 (Τρυγικό στεατυλοπαλμιτύλιο)
Δοκιμασία	Συνολική περιεκτικότητα σε εστέρες τουλάχιστον 90 %, που αντιστοιχεί σε αριθμό σαπωνοποίησης τουλάχιστον 163 και έως 180 κατ' ανώτατο όριο
<b>Περιγραφή</b>	Λιπαρό στερεό (σε θερμοκρασία 25 °C) χρώματος υπόλευκου

**▼ B****Ταυτοποίηση**

Δοκιμή τρυγικών ιόντων  
Πεδίο τιμών σημείου τήξης

Δοκιμή θετική  
Από 67 °C έως 77 °C. Μετά από σαπωνοποίηση οι κορεσμένες λιπαρές αλκοόλες με μακρά αλυσίδα ατόμων άνθρακα τήκονται σε θερμοκρασία 49 °C έως 55 °C

**Καθαρότητα**

Αριθμός υδροξυλίου  
Βαθμός οξύτητας  
Ολικό τρυγικό οξύ  
Θεική τέφρα  
Αρσενικό  
Μόλυβδος  
Υδράργυρος  
Κάδμιο  
Ασαπωνοποίητες ύλες  
Αριθμός ιωδίου

Τουλάχιστον 200 και έως 220 κατ' ανώτατο όριο  
5,6 κατ' ανώτατο όριο  
Τουλάχιστον 18 % και έως 35 % κατ' ανώτατο όριο  
0,5 % κατ' ανώτατο όριο (800 ± 25 °C)  
3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο  
2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο  
1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο  
1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο  
Τουλάχιστον 77 % και έως 83 % κατ' ανώτατο όριο  
4 κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Wijs)

**E 491 ΜΟΝΟΣΤΕΑΤΙΚΗ ΣΟΡΒΙΤΑΝΗ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS  
Χημική ονομασία  
Χημικός τύπος  
Μοριακό βάρος  
Δοκιμασία

Μείγμα των προϊόντων μερικής εστεροποίησης της σορβιτόλης και των ανυδρικών παραγώγων της με βρώσιμο στεατικό οξύ του εμπορίου  
215-664-9

**Περιγραφή**

Περιεκτικότητα σε μείγμα εστέρων σορβιτόλης, σορβιτάνης και ισοσορβιδίου τουλάχιστον 95 %  
Ελαφρά σφαιρίδια ή νιφάδες ή σκληρό κηρώδες στερεό χρώματος υπόλευκου έως χρυσοκάστανου με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Διαλυτή σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από το σημείο τήξης της σε τολουόλιο, διοξάνιο, τετραχλωράνθρακα, αιθέρα, μεθανόλη, αιθανόλη και ανιλίνη, αδιάλυτη σε πετρελαϊκό αιθέρα και ακετόνη· αδιάλυτη σε κρύο νερό αλλά κολλοειδώς διαλυτή σε θερμό νερό. Σηματοποιεί θολά διαλύματα σε θερμοκρασίες άνω των 50 °C σε ορυκτέλαια και οξικό αιθυλεστέρα

**▼ M28**

Δοκιμασία ταυτοποίησης

Βάσει βαθμού οξύτητας, αριθμού ιωδίου (όχι πάνω από 4), αεριοχρωματογραφίας

**▼ B**

Φάσμα απορρόφησης υπερύθρου

Το χαρακτηριστικό φάσμα των προϊόντων μερικής εστεροποίησης λιπαρών οξέων με πολυόλες

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό  
Θεική τέφρα  
Βαθμός οξύτητας  
Αριθμός σαπωνοποίησης

2 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)  
0,5 % κατ' ανώτατο όριο  
10 κατ' ανώτατο όριο  
Τουλάχιστον 147 και έως 157 κατ' ανώτατο όριο

**▼ B**

Αριθμός υδροξυλίου	Τουλάχιστον 235 και έως 260 κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 492 ΤΡΙΣΤΕΑΤΙΚΗ ΣΟΡΒΙΤΑΝΗ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Μείγμα των προϊόντων μερικής εστεροποίησης της σορβιτόλης και των ανυδρικών παραγώγων της με βρώσιμο στεατικό οξύ του εμπορίου

Αριθ. EINECS

247-891-4

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε μείγμα εστέρων σορβιτόλης, σορβιτάνης και ισοσορβιδίου τουλάχιστον 95 %

**Περιγραφή**

Ελαφρά σφαιρίδια ή νιφάδες ή σκληρό κηρώδες στερεό χρώματος υπόλευκου έως χρυσοκάστανου με ελαφρά οσμή

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Λίγο διαλυτή σε τολουόλιο, αιθέρα, τετραχλωράνθρακα και οξικό αιθυλεστέρα, κολλοειδώς διαλυτή σε πετρελαϊκό αιθέρα, ορυκτέλαια, φυτικά έλαια, ακετόνη και διοξάνιο, αδιάλυτη σε νερό, μεθανόλη και αιθανόλη

**▼ M28**

Δοκιμασία ταυτοποίησης

Βάσει βαθμού οξύτητας, αριθμού ιωδίου (όχι πάνω από 4), αεριοχρωματογραφίας

**▼ B**

Φάσμα απορρόφησης υπερύθρου

Το χαρακτηριστικό φάσμα των προϊόντων μερικής εστεροποίησης λιπαρών οξέων με πολυόλες

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό

2 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

Θεϊκή τέφρα

0,5 % κατ' ανώτατο όριο

Βαθμός οξύτητας

15 κατ' ανώτατο όριο

Αριθμός σαπωνοποίησης

Τουλάχιστον 176 και έως 188 κατ' ανώτατο όριο

Αριθμός υδροξυλίου

Τουλάχιστον 66 και έως 80 κατ' ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 493 ΜΟΝΟΛΑΥΡΙΚΗ ΣΟΡΒΙΤΑΝΗ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Μείγμα των προϊόντων μερικής εστεροποίησης της σορβιτόλης και των ανυδρικών παραγώγων της με βρώσιμο λαυρικό οξύ του εμπορίου

Αριθ. EINECS

215-663-3

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

**▼ B**

Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε μείγμα εστέρων σορβιτόλης, σορβιτάνης και ισοσορβιδίου τουλάχιστον 95 %
<b>Περιγραφή</b>	Κεχριμπαρόχρωμο, ελαιώδες παχύρρευστο υγρό, ελαφρά σφαιρίδια ή νιφάδες ή σκληρό κηρώδες στερεό χρώματος υπόλευκου έως χρυσοκάστανου με ελαφρά οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Κολλοειδώς διαλυτή σε θερμό και κρύο νερό
Φάσμα απορρόφησης υπερύθρου	Το χαρακτηριστικό φάσμα των προϊόντων μερικής εστεροποίησης λιπαρών οξέων με πολυόλες
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	2 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Θεική τέφρα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Βαθμός οξύτητας	7 κατ' ανώτατο όριο
Αριθμός σαπωνοποίησης	Τουλάχιστον 155 και έως 170 κατ' ανώτατο όριο
Αριθμός υδροξυλίου	Τουλάχιστον 330 και έως 358 κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 494 ΜΟΝΟΕΛΑΪΚΗ ΣΟΡΒΙΤΑΝΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Μείγμα των προϊόντων μερικής εστεροποίησης της σορβιτόλης και των ανυδρικών παραγώγων της με βρώσιμο ελαϊκό οξύ του εμπορίου. Το βασικό συστατικό είναι η μονοελαϊκή 1,4-σορβιτάνη. Μεταξύ των υπολοίπων συστατικών συγκαταλέγονται το μονοελαϊκό ισοσορβίδιο και η διελαϊκή και τριελαϊκή σορβιτάνη.
Αριθ. EINECS	215-665-4
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε μείγμα εστέρων σορβιτόλης, σορβιτάνης και ισοσορβιδίου τουλάχιστον 95 %
<b>Περιγραφή</b>	Κεχριμπαρόχρωμο παχύρρευστο υγρό, ελαφρά σφαιρίδια ή νιφάδες ή σκληρό κηρώδες στερεό χρώματος υπόλευκου έως χρυσοκάστανου με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτή σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από το σημείο τήξης της σε αιθανόλη, αιθέρα, οξικό αιθυλεστέρα, ανιλίνη, τολουόλιο, διοξάνιο, πετρελαϊκό αιθέρα και τετραχλωράνθρακα. Αδιάλυτη σε κρύο νερό, κολλοειδώς διαλυτή σε θερμό νερό
Αριθμός ιωδίου	Ο αριθμός ιωδίου του υπολείμματος ελαϊκού οξέος που λαμβάνεται με σαπωνοποίηση της εξεταζόμενης μονοελαϊκής σορβιτάνης κυμαίνεται από 80 έως 100
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	2 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Θεική τέφρα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο



**▼ B**

Βαθμός οξύτητας	8 κατ' ανώτατο όριο
Αριθμός σαπωνοποίησης	Τουλάχιστον 145 και έως 160 κατ' ανώτατο όριο
Αριθμός υδροξυλίου	Τουλάχιστον 193 και έως 210 κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 495 ΜΟΝΟΠΑΛΜΙΤΙΚΗ ΣΟΡΒΙΤΑΝΗ****Συνώνυμα**

Παλμιτική σορβιτάνη

**Ορισμός**

Μείγμα των προϊόντων μερικής εστεροποίησης της σορβιτόλης και των ανυδρικών παραγώγων της με βρώσιμο παλμιτικό οξύ του εμπορίου

Αριθ. EINECS

247-568-8

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε μείγμα εστέρων σορβιτόλης, σορβιτάνης και ισοσορβιδίου τουλάχιστον 95 %

**Περιγραφή**

Ελαφρά σφαιρίδια ή νιφάδες ή σκληρό κηρώδες στερεό χρώματος υπόλευκου έως χρυσοκάστανου με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Διαλυτή σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από το σημείο τήξης της σε αιθανόλη, μεθανόλη, αιθέρα, οξικό μεθυλεστέρα, ανιλίνη, τολουόλιο, διοξάνιο, πετρελαϊκό αιθέρα και τετραχλωράνθρακα. Αδιάλυτη σε κρύο νερό αλλά κολλοειδώς διαλυτή σε θερμό νερό

**▼ M28**

Δοκιμασία ταυτοποίησης

Βάσει βαθμού οξύτητας, αριθμού ιωδίου (όχι πάνω από 4), αεριοχρωματογραφίας

**▼ B**

Φάσμα απορρόφησης υπερύθρου

Το χαρακτηριστικό φάσμα των προϊόντων μερικής εστεροποίησης λιπαρών οξέων με πολυόλες

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό

2 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

Θεϊκή τέφρα

0,5 % κατ' ανώτατο όριο

Βαθμός οξύτητας

7,5 κατ' ανώτατο όριο

Αριθμός σαπωνοποίησης

Τουλάχιστον 140 και έως 150 κατ' ανώτατο όριο

Αριθμός υδροξυλίου

Τουλάχιστον 270 και έως 305 κατ' ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M5****E 499 ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑΣΤΕΡΟΛΗ ΦΥΤΟΣΤΕΡΟΛΕΣ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Οι πλούσιες σε στιγμαστερόλη φυτοστερόλες παράγονται από σόγια και είναι απλό μείγμα καθορισμένης χημικής σύστασης που περιέχει τουλάχιστον 95 % φυτοστερόλες (στιγμαστερόλη, β-σιτοστερόλη, καμπεστερόλη και βρασικαστερόλη), από τις οποίες η στιγμαστερόλη αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 85 % των πλούσιων σε στιγμαστερόλη φυτοστερολών.

▼ **M5**

Ευρωπαϊκός κατάλογος των χημικών ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο (Einecs)	
Χημική ονομασία	
Στιγμαστερόλη	(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5-αιθυλο-6-μεθυλ-επτ-3-εν-2-υλο)-10,13-διμεθυλο-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-δωδεκαϋδρο-1H-κυκλοπεντα[α]φαινανθρεν-3-όλη
β-σιτοστερόλη	(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2S,5S)-5-αιθυλο-6-μεθυλεπταν-2-υλο]-10,13-διμεθυλο-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-δωδεκαϋδρο-1H-κυκλοπεντα[α]φαινανθρεν-3-όλη
Καμπεστερόλη	(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5,6-διμεθυλεπταν-2-υλο)-10,13-διμεθυλο-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-δωδεκαϋδρο-1H-κυκλοπεντα[α]φαινανθρεν-3-όλη
Βρασικαστερόλη	(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-διμεθυλεπτα-3-εν-2-υλο]-10,13-διμεθυλο-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-δωδεκαϋδρο-1H-κυκλοπεντα[α]φαινανθρεν-3-όλη
Χημικός τύπος	
Στιγμαστερόλη	C <sub>29</sub> H <sub>48</sub> O
β-σιτοστερόλη	C <sub>29</sub> H <sub>50</sub> O
Καμπεστερόλη	C <sub>28</sub> H <sub>48</sub> O
Βρασικαστερόλη	C <sub>28</sub> H <sub>46</sub> O
Μοριακό βάρος	
Στιγμαστερόλη	412,6 g/mol
β-σιτοστερόλη	414,7 g/mol
Καμπεστερόλη	400,6 g/mol
Βρασικαστερόλη	398,6 g/mol
Δοκιμασία (προϊόντα που περιέχουν μόνον ελεύθερες στερόλες και στανόλες)	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 % επί συνόλου ελεύθερων στερολών/στανολών στο άνυδρο προϊόν.
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνες, χάπια ή παστίλιες, λευκά έως υπόλευκα, ελεύθερης ροής· άχρωμα έως ανοιχτοκίτρινα υγρά
<b>Αριθ. ταυτοποίησης</b>	
Διαλυτότητα	Πρακτικά αδιάλυτο στο νερό. Οι φυτοστερόλες και φυτοστανόλες είναι διαλυτές σε ακετόνη και οξικό αιθυλεστέρα.
Περιεκτικότητα σε στιγμαστερόλη	85 % και άνω (β/β)
Άλλες φυτοστερόλες/στανόλες: είναι ξεχωριστά είτε σε συνδυασμό συμπεριλαμβανομένων των: βρασικαστερόλης, καμπεστανόλης, καμπεστερόλης, Δ-7-καμπεστερόλης, χοληστερόλης, κλεροστερόλης, σιτοστανόλης και β-σιτοστερόλης.	15 % κατ' ανώτατο όριο (w/w)
<b>Καθαρότητα</b>	
Ολική τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Υπολειμματικοί διαλύτες	Αιθανόλη: 5 000 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Μεθανόλη: 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Περιεκτικότητα σε νερό	4 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
Συνολικός αριθμός μικροοργανισμών	1 000 CFU/g κατ' ανώτατο όριο
Ζυμομύκτης	100 CFU/g κατ' ανώτατο όριο
Ευρωτομύκτης	100 CFU/g κατ' ανώτατο όριο

▼ **M5**

<i>Escherichia coli</i>	10 CFU/g κατ' ανώτατο όριο
<i>Salmonella</i> spp.	Απουσία σε 25 g

▼ **B****E 500 (i) ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	Σόδα
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	207-838-8
Χημική ονομασία	Ανθρακικό νάτριο
Χημικός τύπος	$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (n = 0, 1 ή 10)
Μοριακό βάρος	106,00 (άνυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε $\text{Na}_2\text{CO}_3$ τουλάχιστον 99 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή, κοκκώδης ή κρυσταλλική σκόνη Η άνυδρη μορφή είναι υγροσκοπική, η δεκαένυδρη παρουσιάζει αποσάθρωση
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ανθρακικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτά στο νερό. Αδιάλυτα σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	2 % (άνυδρο), 15 % (μονοένυδρο) ή 55 %-65 % (δεκαένυδρο) κατ' ανώτατο όριο (70 °C με βαθμιαία αύξηση στους 300 °C μέχρι σταθερού βάρους)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 500 (ii) ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Διττανθρακικό νάτριο· όξινο ανθρακικό νάτριο· διττανθρακική σόδα· σόδα ζαχαροπλαστικής
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	205-633-8
Χημική ονομασία	Όξινο ανθρακικό νάτριο
Χημικός τύπος	$\text{NaHCO}_3$
Μοριακό βάρος	84,01
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμη ή λευκή κρυσταλλική μάζα ή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ανθρακικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	Από 8,0 έως 8,6 (διάλυμα 1 %)
Διαλυτότητα	Διαλυτό στο νερό. Αδιάλυτο σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	0,25 % κατ' ανώτατο όριο [4 ώρες, υπεράνω πυριτικής πηκτής (silica gel)]
Αμμωνιακά άλατα	Μετά από θέρμανση δεν ανιχνεύεται οσμή αμμωνίας

**▼ B**

Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 500 (iii) ΣΕΣΚΙΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	208-580-9
Χημική ονομασία	Διπλό άλας ουδέτερου και όξινου ανθρακικού νατρίου
Χημικός τύπος	$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{NaHCO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Μοριακό βάρος	226,03
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα από 35,0 % έως 38,6 % σε $\text{NaHCO}_3$ και από 46,4 % έως 50,0 % σε $\text{Na}_2\text{CO}_3$
<b>Περιγραφή</b>	Λευκές νιφάδες, κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ανθρακικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό
<b>Καθαρότητα</b>	
Χλωριούχο νάτριο	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Σίδηρος	20 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 501 (i) ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	209-529-3
Χημική ονομασία	Ανθρακικό κάλιο
Χημικός τύπος	$\text{K}_2\text{CO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (n = 0 ή 1,5)
Μοριακό βάρος	138,21 (άνυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή, πολύ υγροσκοπική σκόνη Η ένυδρη μορφή απαντά ως μικροί, λευκοί, ημιδιαφανείς κρύσταλλοι ή κόκκοι
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ανθρακικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Πολύ διαλυτά στο νερό. Αδιάλυτα σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	5 % (άνυδρο) ή 18 % (ένυδρο) κατ' ανώτατο όριο (180 °C, 4 ώρες)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## ▼ B

Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
------------	---------------------------

**E 501 (ii) ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΑΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Διτανθρακικό κάλιο· όξινο ανθρακικό κάλιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	206-059-0
Χημική ονομασία	Όξινο ανθρακικό κάλιο
Χημικός τύπος	KHCO <sub>3</sub>
Μοριακό βάρος	100,11
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 % και έως 101,0 % κατ' ανώτατο όριο σε KHCO <sub>3</sub> επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Αχρωμοί κρύσταλλοι ή λευκή σκόνη ή κόκκοι
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ανθρακικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό. Αδιάλυτο σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,25 % κατ' ανώτατο όριο [4 ώρες, υπεράνω πυριτικής πηκτής (silica gel)]
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 503 (i) ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Τα ανθρακικά άλατα του αμμωνίου αποτελούνται από καρβαμίδικό αμμώνιο, ανθρακικό αμμώνιο και όξινο ανθρακικό αμμώνιο σε ποικίλες αναλογίες
Αριθ. EINECS	233-786-0
Χημική ονομασία	Ανθρακικό αμμώνιο
Χημικός τύπος	CH <sub>6</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , CH <sub>8</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub> και CH <sub>5</sub> NO <sub>3</sub>
Μοριακό βάρος	Καρβαμίδικό αμμώνιο 78,06· ανθρακικό αμμώνιο 98,73· όξινο ανθρακικό αμμώνιο 79,06
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε NH <sub>3</sub> τουλάχιστον 30,0 % και έως 34,0 % κατ' ανώτατο όριο
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή σκόνη ή σκληρές, λευκές ή ημιδιαφανείς μάζες ή κρύσταλλοι. Εκτιθέμενο στον αέρα καθίσταται αδιαφανές και μετατρέπεται τελικά σε λευκούς πορώδεις σβώλους ή σκόνη (διτανθρακικό αμμωνίου) λόγω απώλειας αμμωνίας και διοξειδίου του άνθρακα
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή αμμωνίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ανθρακικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	Περίπου 8,6 (διάλυμα 5 %)
Διαλυτότητα	Διαλυτό στο νερό

**▼ B****Καθαρότητα**

Μη πτητικές ύλες	500 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Χλωριόντα	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Θειικά ιόντα	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 503 (ii) ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ****Συνώνυμα**

Διττανθρακικό αμμώνιο

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS	213-911-5
Χημική ονομασία	Όξινο ανθρακικό αμμώνιο
Χημικός τύπος	CH <sub>5</sub> NO <sub>3</sub>
Μοριακό βάρος	79,06
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 %

**Περιγραφή**

Λευκοί κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή αμμωνίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ανθρακικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	Περίπου 8,0 (διάλυμα 5 %)
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό. Αδιάλυτο σε αιθανόλη

**Καθαρότητα**

Μη πτητικές ύλες	500 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Χλωριόντα	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Θειικά ιόντα	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 504(i) ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ****Συνώνυμα**

Υδρομαγνησίτης

**Ορισμός**

Τα ανθρακικά άλατα του μαγνησίου είναι βασικό ένυδρο ή μονοένυδρο ανθρακικό μαγνήσιο ή συνδυασμός των δύο

Αριθ. EINECS	208-915-9
Χημική ονομασία	Ανθρακικό μαγνήσιο
Χημικός τύπος	MgCO <sub>3</sub> · nH <sub>2</sub> O
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε Mg τουλάχιστον 24 % και έως 26,4 % κατ' ανώτατο όριο

**Περιγραφή**

Άοσμη, ελαφρά, λευκή εύθρυπτη μάζα ή ογκώδης λευκή σκόνη

**▼ B****Ταυτοποίηση**

Δοκιμή μαγνησίου

Δοκιμή θετική

Δοκιμή ανθρακικών ιόντων

Δοκιμή θετική

Διαλυτότητα

Πρακτικά αδιάλυτα στο νερό ή στην αιθανόλη

**Καθαρότητα**

Ύλες αδιάλυτες σε οξέα

0,05 % κατ' ανώτατο όριο

Υδατοδιαλυτές ύλες

1,0 % κατ' ανώτατο όριο

Ασβέστιο

0,4 % κατ' ανώτατο όριο

Αρσενικό

4 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 504 (ii) ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ****Συνώνυμα**

Όξινο ανθρακικό μαγνήσιο· ένυδρο βασικό ανθρακικό μαγνήσιο· υδροξείδιο του ανθρακικού μαγνησίου

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS

235-192-7

Χημική ονομασία

Ένυδρο υδροξείδιο του ανθρακικού μαγνησίου

Χημικός τύπος

 $4\text{MgCO}_3\text{Mg}(\text{OH})_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 

Μοριακό βάρος

485

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε Mg τουλάχιστον 40,0 % και έως 45,0 % κατ' ανώτατο όριο, υπολογιζόμενη σε MgO

**Περιγραφή**

Ελαφρά, λευκή εύθρυπτη μάζα ή ογκώδης λευκή σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή μαγνησίου

Δοκιμή θετική

Δοκιμή ανθρακικών ιόντων

Δοκιμή θετική

Διαλυτότητα

Πρακτικά αδιάλυτο στο νερό. Αδιάλυτο σε αιθανόλη

**Καθαρότητα**

Ύλες αδιάλυτες σε οξέα

0,05 % κατ' ανώτατο όριο

Υδατοδιαλυτές ύλες

1,0 % κατ' ανώτατο όριο

Ασβέστιο

1,0 % κατ' ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 507 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ****Συνώνυμα**

Υδροχλώριο· σπίρτο του άλατος

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS

231-595-7

Χημική ονομασία

Υδροχλωρικό οξύ

**▼ B**

Χημικός τύπος	HCl
Μοριακό βάρος	36,46
Δοκιμασία	Το υδροχλωρικό οξύ διατίθεται στο εμπόριο σε ποικίλες συγκεντρώσεις. Το πυκνό υδροχλωρικό οξύ περιέχει τουλάχιστον 35,0 % HCl
<b>Περιγραφή</b>	Διαυγές, άχρωμο ή ελαφρά υποκίτρινο, διαβρωτικό υγρό με δριμυία οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή οξέος	Δοκιμή θετική
Δοκιμή χλωριόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Διαλυτό στο νερό και σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Ολικές οργανικές ενώσεις	Ολικές οργανικές ενώσεις (που δεν περιέχουν φθόριο): 5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Βενζόλιο: 0,05 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Φθοριωμένες ενώσεις (ολικές): 25 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μη πτητικές ύλες	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Αναγωγικές ουσίες	70 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (ως SO <sub>2</sub> )
Οξειδωτικές ουσίες	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (ως Cl <sub>2</sub> )
Θειικά ιόντα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Σίδηρος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 508 ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Συλβίνης· συλβίτης
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-211-8
Χημική ονομασία	Χλωριούχο κάλιο
Χημικός τύπος	KCl
Μοριακό βάρος	74,56
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ξηράς ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμοι επιμήκεις, πολυγωνικοί ή κυβοειδείς κρύσταλλοι ή λευκή κοκκώδης σκόνη, άοσμα
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό. Αδιάλυτο σε αιθανόλη
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή χλωριόντων	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	1 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)
Δοκιμή νατρίου	Αρνητική



**▼ B**

Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 509 ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	233-140-8
Χημική ονομασία	Χλωριούχο ασβέστιο
Χημικός τύπος	$\text{CaCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (n = 0,2 ή 6)
Μοριακό βάρος	110,99 (άνυδρο), 147,02 (διένυδρο), 219,08 (εξαένυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 93,0 % επί άνυδρης ουσίας

**Περιγραφή**

Λευκή, άοσμη, υγροσκοπική σκόνη ή ρευστοποιούμενοι κρύσταλλοι

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή χλωριόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Διαλυτό στο νερό και σε αιθανόλη

**Καθαρότητα**

Άλατα μαγνησίου και αλκαλίων	5 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηράς ουσίας (υπολογιζόμενα ως θειικά άλατα)
Φθόριο	40 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 511 ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	232-094-6
Χημική ονομασία	Χλωριούχο μαγνήσιο
Χημικός τύπος	$\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
Μοριακό βάρος	203,30
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 %

**Περιγραφή**

Αχρωμες, άοσμες, πολύ υγροσκοπικές νιφάδες ή κρύσταλλοι

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή μαγνησίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή χλωριόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Πολύ διαλυτό στο νερό, εύκολα διαλυτό σε αιθανόλη

**Καθαρότητα**

Αμμώνιο	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ B**

Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 512 ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ (II)**

<b>Συνώνυμα</b>	Χλωριούχος κασσίτερος· διχλωριούχος κασσίτερος
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-868-0
Χημική ονομασία	Διένυδρος χλωριούχος κασσίτερος (II)
Χημικός τύπος	$\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Μοριακό βάρος	225,63
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98,0 %
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμοι ή λευκοί κρύσταλλοι Μπορεί να έχει ελαφρά οσμή υδροχλωρικού οξέος
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή κασσίτερου (II)	Δοκιμή θετική
Δοκιμή χλωριόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Νερό: διαλυτός σε ποσότητα νερού μικρότερη από το βάρος του, με περίσσεια όμως νερού σχηματίζει αδιάλυτο βασικό άλας Αιθανόλη: διαλυτός
<b>Καθαρότητα</b>	
Θεικά ιόντα	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 513 ΘΕΙΚΟ ΟΞΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	Έλαιο βιτριολίου· θεικό οξύ
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-639-5
Χημική ονομασία	Θεικό οξύ
Χημικός τύπος	$\text{H}_2\text{SO}_4$
Μοριακό βάρος	98,07
Δοκιμασία	Το θεικό οξύ διατίθεται στο εμπόριο σε ποικίλες συγκεντρώσεις. Η πυκνή μορφή περιέχει τουλάχιστον 96,0 %
<b>Περιγραφή</b>	Διαυγές, άχρωμο ή ελαφρώς καστανόχρωμο, πολύ διαβρωτικό ελαιώδες υγρό
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή οξέος	Δοκιμή θετική
Δοκιμή θεικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Αναμείξιμο με νερό με παραγωγή μεγάλης ποσότητας θερμότητας, καθώς και με αιθανόλη

**▼ B****Καθαρότητα**

Τέφρα	0,02 % κατ' ανώτατο όριο
Αναγωγικές ύλες	40 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (ως SO <sub>2</sub> )
Νιτρικά ιόντα	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί του H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )
Χλωριόντα	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Σίδηρος	20 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Σελήνιο	20 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 514 (i) ΘΕΠΚΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Θειϊκό νάτριο
Χημικός τύπος	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> · nH <sub>2</sub> O (n = 0 ή 10)
Μοριακό βάρος	142,04 (άνυδρο) 322,04 (δεκαένυδρο)

Δοκιμασία Περικτικότητα τουλάχιστον 99,0 % επί άνυδρης ουσίας

**Περιγραφή**

Άχρωμοι κρύσταλλοι ή λεπτόκοκκη, λευκή, κρυσταλλική σκόνη  
Το δεκαένυδρο εμφανίζει αποσάθρωση

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή θεικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	Ουδέτερο ή ελαφρώς αλκαλικό, προσδιοριζόμενο με χαρτί ηλιοτροπίου (διάλυμα 5 %)

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	1,0 % κατ' ανώτατο όριο (άνυδρο) ή 57 % κατ' ανώτατο όριο (δεκαένυδρο) στους 130 °C
Σελήνιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 514 (ii) ΟΞΙΝΟ ΘΕΠΚΟ ΝΑΤΡΙΟ****Συνώνυμα**

Όξινο θειικό άλας νατρίου· nitre cake

**Ορισμός**

Χημική ονομασία	Όξινο θειικό νάτριο
Χημικός τύπος	NaHSO <sub>4</sub>
Μοριακό βάρος	120,06

**▼ B**

Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95,2 %
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί, άοσμοι κρύσταλλοι ή κόκκοι
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμήθεικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	Τα διαλύματα είναι ισχυρώς όξινα
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,8 % κατ' ανώτατο όριο
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,05 % κατ' ανώτατο όριο
Σελήνιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 515 (i) ΘΕΠΚΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Θειϊκό κάλιο
Χημικός τύπος	$K_2SO_4$
Μοριακό βάρος	174,25
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 %
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμοι ή λευκοί κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμήθεικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	Από 5,5 έως 8,5 (διάλυμα 5 %)
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό, αδιάλυτο σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Σελήνιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 515 (ii) ΟΞΙΝΟ ΘΕΠΚΟ ΚΑΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Όξινοθειικό άλας καλίου
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Όξινοθειικό κάλιο
Χημικός τύπος	$KHSO_4$

**▼ B**

Μοριακό βάρος	136,17
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 %
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί ρευστοποιούμενοι κρύσταλλοι, τεμάχια ή κόκκοι
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Σημείο τήξης	197 °C
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό, αδιάλυτο σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Σελήνιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 516 ΘΕΠΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Γύψος· σεληνίτης· ανυδρίτης
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-900-3
Χημική ονομασία	Θευικό ασβέστιο
Χημικός τύπος	$\text{CaSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (n = 0 ή 2)
Μοριακό βάρος	136,14 (άνυδρο), 172,18 (διένυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λεπτόκοκκη, λευκή έως ελαφρά κιτρινόλευκη άοσμη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή θεικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Λίγο διαλυτό στο νερό, αδιάλυτο σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	Άνυδρο: 1,5 % κατ' ανώτατο όριο (250 °C, μέχρι σταθερού βάρους) Διένυδρο: 23 % κατ' ανώτατο όριο (250 °C, μέχρι σταθερού βάρους)
Φθόριο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Σελήνιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 517 ΘΕΠΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-984-1
Χημική ονομασία	Θευικό αμμώνιο

**▼ B**

Χημικός τύπος	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
Μοριακό βάρος	132,14
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 % και 100,5 % κατ' ανώτατο όριο
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή σκόνη, στυλπνές πλάκες ή κρυσταλλικά θραύσματα
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή αμμωνίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμήθειικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό, αδιάλυτο σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την καύση	0,25 % κατ' ανώτατο όριο
Σελήνιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 520 ΘΕΠΙΚΟ ΑΡΓΙΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Στυπτηρία
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Θειικό αργίλιο
Χημικός τύπος	Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub>
Μοριακό βάρος	342,13
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5 % επί πυρωμένης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή σκόνη, στυλπνές πλάκες ή κρυσταλλικά θραύσματα
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή αργιλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμήθειικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	2,9 ή μεγαλύτερο (διάλυμα 5 %)
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό, αδιάλυτο σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την καύση	5 % κατ' ανώτατο όριο (500 °C, 3 ώρες)
Αλκάλια και αλκαλικές γαίες	0,4 % κατ' ανώτατο όριο
Σελήνιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 521 ΘΕΠΙΚΟ ΑΡΓΙΛΙΟΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Στυπτηρία σόδας· στυπτηρία νατρίου
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	233-277-3

**▼ B**

Χημική ονομασία	Θειικό αργιλιονάτριο
Χημικός τύπος	$\text{AlNa}(\text{SO}_4)_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ( $n = 0$ ή $12$ )
Μοριακό βάρος	242,09 (άνυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα, επί άνυδρης ουσίας, τουλάχιστον 96,5 % (άνυδρο) και 99,5 % (δωδεκαένυδρο)
<b>Περιγραφή</b>	Διαφανείς κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή αργιλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή θειικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Το δωδεκαένυδρο είναι εύκολα διαλυτό στο νερό. Η άνυδρη μορφή είναι δυσδιάλυτη στο νερό. Και οι δύο μορφές είναι αδιάλυτες σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	Άνυδρη μορφή: 10,0 % κατ' ανώτατο όριο (220 °C, 16 ώρες) Δωδεκαένυδρο: 47,2 % κατ' ανώτατο όριο (50 °C - 55 °C, επί 1 ώρα και, στη συνέχεια, 200 °C επί 16 ώρες)
Αμμωνιακά άλατα	Μετά από θέρμανση δεν ανιχνεύεται οσμή αμμωνίας
Σελήνιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 522 ΘΕΪΚΟ ΑΡΓΙΛΙΟΚΑΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Στυπτηρία καλίου· στυπτηρία ποτάσας
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	233-141-3
Χημική ονομασία	Δωδεκαένυδρο θειϊκό αργιλιοκάλιο
Χημικός τύπος	$\text{AlK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$
Μοριακό βάρος	474,38
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5 %
<b>Περιγραφή</b>	Μεγάλοι, διαφανείς κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή αργιλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή θειικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	Από 3,0 έως 4,0 (διάλυμα 10 %)
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό, αδιάλυτο σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Αμμωνιακά άλατα	Μετά από θέρμανση δεν ανιχνεύεται οσμή αμμωνίας
Σελήνιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **B**

Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 523 ΘΕΠΙΚΟ ΑΡΓΙΑΙΟΑΜΜΩΝΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Στυπτηρία αμμωνίου
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	232-055-3
Χημική ονομασία	Εναμμώνιο θεικό αργίλιο
Χημικός τύπος	$\text{AlNH}_4(\text{SO}_4)_2 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$
Μοριακό βάρος	453,32
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5 %
<b>Περιγραφή</b>	Μεγάλοι, άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή αργιλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή αμμωνίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή θειικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό σε νερό, διαλυτό σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Αλκάλια και αλκαλικές γαίες	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Σελήνιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 524 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	Καυστική σόδα· αλισίβα
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	215-185-5
Χημική ονομασία	Υδροξείδιο του νατρίου
Χημικός τύπος	NaOH
Μοριακό βάρος	40,0
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα των στερεών μορφών τουλάχιστον 98,0 % σε ολικά αλκάλια (ως NaOH). Περιεκτικότητα των διαλυμάτων κατ' αναλογία, με βάση τη δηλούμενη ή την αναγραφόμενη στην ετικέτα εκατοστιαία αναλογία NaOH
<b>Περιγραφή</b>	Λευκά ή σχεδόν λευκά σφαιρίδια, νιφάδες, ραβδία, συντηγμένες μάζες ή άλλες μορφές. Τα διαλύματα είναι διανυγία ή ελαφρώς θολά, άχρωμα ή ελαφρώς έγχρωμα, ισχυρώς καυστικά και υγροσκοπικά και όταν εκτίθενται στον αέρα, απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα, σχηματίζοντας ανθρακικό νάτριο



**▼ B**

<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
pH	Ισχυρώς αλκαλικό (διάλυμα 1 %)
Διαλυτότητα	Πολύ διαλυτό στο νερό. Εύκολα διαλυτό σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Αδιάλυτες στο νερό και οργανικές ύλες	Διάλυμα 5 % είναι τελείως διαυγές και άχρωμο έως ελαφρώς έγχρωμο
Ανθρακικά ιόντα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (ως Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	0,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 525 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	Καυστική ποτάσσα
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	215-181-3
Χημική ονομασία	Υδροξείδιο του καλίου
Χημικός τύπος	KOH
Μοριακό βάρος	56,11
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 85,0 % σε αλκάλια, εκφρασμένη σε KOH
<b>Περιγραφή</b>	Λευκά ή σχεδόν λευκά σφαιρίδια, νιφάδες, ραβδία, συντηγμένες μάζες ή άλλες μορφές
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
pH	Ισχυρώς αλκαλικό (διάλυμα 1 %)
Διαλυτότητα	Πολύ διαλυτό στο νερό. Εύκολα διαλυτό σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	Διάλυμα 5 % είναι τελείως διαυγές και άχρωμο
Ανθρακικά ιόντα	3,5 % κατ' ανώτατο όριο (ως K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 526 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	Σβησμένη άσβεστος· εφυδατωμένη άσβεστος
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	215-137-3
Χημική ονομασία	Υδροξείδιο του ασβεστίου
Χημικός τύπος	Ca(OH) <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	74,09

**▼ B**

Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 92,0 %
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή αλκαλίων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Λίγο διαλυτό στο νερό. Αδιάλυτο σε αιθανόλη. Διαλυτό σε γλυκερόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Τέφρα αδιάλυτη σε οξέα	1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Άλατα μαγνησίου και αλκαλίων	2,7 % κατ' ανώτατο όριο
Βάριο	300 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 527 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	Υγρή αμμωνία· ισχυρό αμμωνιακό διάλυμα
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Υδροξείδιο του αμμωνίου
Χημικός τύπος	NH <sub>4</sub> OH
Μοριακό βάρος	35,05
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 27 % σε NH <sub>3</sub>
<b>Περιγραφή</b>	Διαυγές, άχρωμο διάλυμα, με εξαιρετικά δριμεία, χαρακτηριστική οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή αμμωνίας	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Μη πτητικές ύλες	0,02 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 528 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Υδροξείδιο του μαγνησίου
Χημικός τύπος	Mg(OH) <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	58,32
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95,0 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμη, λευκή ογκώδης σκόνη

**▼ B****Ταυτοποίηση**

Δοκιμή μαγνησίου

Δοκιμή θετική

Δοκιμή αλκαλίων

Δοκιμή θετική

Διαλυτότητα

Πρακτικά αδιάλυτο στο νερό και στην αιθανόλη

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση

2,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)

Απώλεια κατά την καύση

33 % κατ' ανώτατο όριο (800 °C μέχρι σταθερού βάρους)

Οξείδιο του ασβεστίου

1,5 % κατ' ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 529 ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ****Συνώνυμα**

Άσβεστος

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS

215-138-9

Χημική ονομασία

Οξείδιο του ασβεστίου

Χημικός τύπος

CaO

Μοριακό βάρος

56,08

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95,0 % επί πυρωμένης ουσίας

**Περιγραφή**

Άσμεες, σκληρές, λευκές ή λευκόφαιες μάζες κόκκων ή λευκή έως υπόφαιη σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή αλκαλίων

Δοκιμή θετική

Δοκιμή ασβεστίου

Δοκιμή θετική

Αντίδραση με το νερό

Κατά τη διαβροχή του δείγματος με νερό παράγεται θερμότητα

Διαλυτότητα

Λίγο διαλυτό στο νερό. Αδιάλυτο σε αιθανόλη. Διαλυτό σε γλυκερόλη

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την καύση

10,0 % κατ' ανώτατο όριο (περίπου 800 °C μέχρι σταθερού βάρους)

Ύλες αδιάλυτες σε οξέα

1,0 % κατ' ανώτατο όριο

Βάριο

300 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Άλατα μαγνησίου και αλκαλίων

3,6 % κατ' ανώτατο όριο

Φθόριο

50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 530 ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS

215-171-9

Χημική ονομασία

Οξείδιο του μαγνησίου

**▼ B**

Χημικός τύπος	MgO
Μοριακό βάρος	40,31
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98,0 % επί πυρωμένης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Πολύ ογκώδης, λευκή σκόνη γνωστή ως ελαφρύ οξείδιο του μαγνησίου ή σχετικά πυκνή λευκή σκόνη γνωστή ως βαρύ οξείδιο του μαγνησίου. 5 g ελαφρού οξειδίου του μαγνησίου καταλαμβάνουν όγκο τουλάχιστον 33 ml, ενώ 5 g βαρέος οξειδίου του μαγνησίου καταλαμβάνουν όγκο 20 ml κατ' ανώτατο όριο
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή αλκαλίων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή μαγνησίου	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Πρακτικά αδιάλυτο στο νερό. Αδιάλυτο σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την καύση	5,0 % κατ' ανώτατο όριο (περίπου 800 °C μέχρι σταθερού βάρους)
Οξείδιο του ασβεστίου	1,5 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M20****E 534 ΤΡΥΓΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	Μεσο-τρυγικός σίδηρος· σύμπλοκο του τρυγικού νατρίου με τριχλωριούχο σίδηρο
<b>Ορισμός</b>	Ο τρυγικός σίδηρος παρασκευάζεται από τον ισομερισμό L-τρυγικού μέχρις ότου επιτευχθεί μείγμα σε κατάσταση χημικής ισορροπίας D-, L- και μεσο-τρυγικού με επακόλουθη προσθήκη τριχλωριούχου σιδήρου.
Αριθμός CAS	1280193-05-9
Χημική ονομασία	Σύμπλοκο τρισθενούς σιδήρου με D(+)-, L(-)- και μεσο-2,3 διυδροξυβουτανιοδικά οξέα
Χημικός τύπος	Fe(OH) <sub>2</sub> C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>6</sub> Na
Μοριακό βάρος	261,93
<b>Περιεκτικότητα</b>	
Μεσο-τρυγικό	> 28 %, εκφραζόμενο ως ανιόν σε ξηρή βάση
D(-)- και L(+)- τρυγικό	> 10 %, εκφραζόμενο ως ανιόν σε ξηρή βάση
Τρισθενής σίδηρος	> 8 %, εκφραζόμενο ως ανιόν σε ξηρή βάση
<b>Περιγραφή</b>	Σκούρο πράσινο υδατικό διάλυμα που περιέχει κατά κανόνα περίπου 35 % κατά βάρος σύμπλοκα προϊόντων
<b>Ταυτοποίηση</b>	Εύκολα διαλυτό στο νερό Θετικές δοκιμές για τρυγικά ιόντα και σίδηρο. pH υδατικού διαλύματος με συγκέντρωση συμπλόκων 35 %: μεταξύ 3,5 και 3,9
<b>Καθαρότητα</b>	
Χλωριούχα	25 % κατ' ανώτατο όριο
Νάτριο	23 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Οξαλικά ιόντα	1,5 % κατ' ανώτατο όριο, που εκφράζεται σε οξαλικά ιόντα σε ξηρή βάση

▼ **B****E 535 ΣΙΔΗΡΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Πρωσσικό κίτρινο της σόδας· σιδηροεξακυανιούχο νάτριο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	237-081-9
Χημική ονομασία	Σιδηροκυανιούχο νάτριο
Χημικός τύπος	$\text{Na}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$
Μοριακό βάρος	484,1
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 %
<b>Περιγραφή</b>	Κίτρινοι κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή σιδηροκυανιούχων ιόντων	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Ελεύθερη υγρασία	1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,03 % κατ' ανώτατο όριο
Χλωριόντα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Θειικά ιόντα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερα κυανιόντα	Δεν ανιχνεύονται
Σιδηροκυανιούχα ιόντα	Δεν ανιχνεύονται
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 536 ΣΙΔΗΡΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Πρωσσικό κίτρινο της ποτάσας· σιδηροεξακυανιούχο κάλιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	237-722-2
Χημική ονομασία	Σιδηροκυανιούχο κάλιο
Χημικός τύπος	$\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$
Μοριακό βάρος	422,4
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 %
<b>Περιγραφή</b>	Κρύσταλλοι χρώματος κίτρινου του λεμονιού
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή σιδηροκυανιούχων ιόντων	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Ελεύθερη υγρασία	1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,03 % κατ' ανώτατο όριο
Χλωριόντα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο

**▼ B**

Θειικά ιόντα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερα κυανιόντα	Δεν ανιχνεύονται
Σιδηροκυανιούχα ιόντα	Δεν ανιχνεύονται
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 538 ΣΙΔΗΡΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Πρωσσικό κίτρινο της ασβέστου· σιδηροεξακυανιούχο ασβέστιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	215-476-7
Χημική ονομασία	Σιδηροκυανιούχο ασβέστιο
Χημικός τύπος	$\text{Ca}_2\text{Fe}(\text{CN})_6 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$
Μοριακό βάρος	508,3
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 %
<b>Περιγραφή</b>	Κίτρινοι κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή σιδηροκυανιούχων ιόντων	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Ελεύθερη υγρασία	1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,03 % κατ' ανώτατο όριο
Χλωριόντα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Θειικά ιόντα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερα κυανιόντα	Δεν ανιχνεύονται
Σιδηροκυανιούχα ιόντα	Δεν ανιχνεύονται
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 541 ΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΡΓΙΛΙΟΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	SALP
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	232-090-4
Χημική ονομασία	Τετραένυδρο όξινο φωσφορικό τριαργιλιονάτριο (Α)· όξινο φωσφορικό διαργιλιοτρινάτριο (Β)
Χημικός τύπος	$\text{NaAl}_3\text{H}_{14}(\text{PO}_4)_8 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (Α) $\text{Na}_3\text{Al}_2\text{H}_{15}(\text{PO}_4)_8$ (Β)
Μοριακό βάρος	949,88 (Α) 897,82 (Β)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95,0 % (και οι δύο μορφές)

**▼ B**

<b>Περιγραφή</b>	Λευκή άοσμη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή αργιλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή φωσφορικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	Όξινο, προσδιοριζόμενο με χαρτί ηλιοτροπίου
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο στο νερό. Διαλυτό σε υδροχλωρικό οξύ
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την καύση	19,5 % - 21,0 % (A) (750 °C - 800 °C, 2 ώρες) 15 % - 16 % (B) (750 °C - 800 °C, 2 ώρες)
Φθόριο	25 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	4 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>E 551 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ</b>	
<b>Συνώνυμα</b>	Πυριτία· διοξείδιο του πυριτίου
<b>Ορισμός</b>	Το διοξείδιο του πυριτίου είναι μια άμορφη ουσία που παράγεται συνθετικά, είτε με διεργασία υδρόλυσης σε φάση ατμών, η οποία παρέχει καπνοπυριτία, είτε με υγρή διεργασία, η οποία παρέχει πυριτικό ίζημα, πυριτική πηκτή (silica gel) ή ένυδρη πυριτία. Η καπνοπυριτία παράγεται σε άνυδρη ουσιαστικά κατάσταση, ενώ τα προϊόντα της υγρής διεργασίας λαμβάνονται ως υδρίτες ή περιέχουν επιφανειακά προσροφημένο νερό
Αριθ. EINECS	231-545-4
Χημική ονομασία	Διοξείδιο του πυριτίου
Χημικός τύπος	(SiO <sub>2</sub> ) <sub>n</sub>
Μοριακό βάρος	60,08 (SiO <sub>2</sub> )
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα έπειτα από πύρωση τουλάχιστον 99,0 % (καπνοπυριτία) ή 94,0 % (ένυδρες μορφές)
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή, χνοώδης σκόνη ή κόκκοι. Υγροσκοπικά
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή πυριτίας	Θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	2,5 % κατ' ανώτατο όριο (καπνοπυριτία, 105 °C, 2 ώρες) 8,0 % κατ' ανώτατο όριο (πυριτικό ίζημα και πυριτική πηκτή, 105 °C, 2 ώρες)

**▼ B**

Απώλεια κατά την καύση	70 % κατ' ανώτατο όριο (ένυδρη πυριτία, 105 °C, 2 ώρες) 2,5 % κατ' ανώτατο όριο μετά από ξήρανση (1 000 °C, καπνοπυριτία)
Διαλυτά ιονιζόμενα άλατα	8,5 % κατ' ανώτατο όριο μετά από ξήρανση (1 000 °C, ένυδρες μορφές)
Αρσενικό	5,0 % κατ' ανώτατο όριο (ως Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )
Μόλυβδος	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 552 ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	Το πυριτικό ασβέστιο είναι ένυδρο ή άνυδρο πυριτικό άλας με ποικίλες αναλογίες CaO και SiO <sub>2</sub> . Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένο από αμιάντο.
Χημική ονομασία	215-710-8
Χημικός τύπος	Πυριτικό ασβέστιο
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα επί άνυδρης ουσίας: — ως SiO <sub>2</sub> , τουλάχιστον 50 % και έως 95 % κατ' ανώτατο όριο — ως CaO, τουλάχιστον 3 % και έως 35 % κατ' ανώτατο όριο

**Περιγραφή**

Λευκή έως υπόλευκη ρέουσα σκόνη της οποίας η όψη δεν μεταβάλλεται μετά την απορρόφηση σχετικά μεγάλων ποσοτήτων νερού ή άλλων υγρών

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή πυριτικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Σχηματισμός πηκτής	Σχηματίζει πηκτή με ανόργανα οξέα

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	10 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)
Απώλεια κατά την καύση	Τουλάχιστον 5 % και έως 14 % κατ' ανώτατο όριο (1 000 °C, μέχρι σταθερού βάρους)
Νάτριο	3 % κατ' ανώτατο όριο
Φθόριο	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 553a (i) ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	Το πυριτικό μαγνήσιο είναι μια σύνθετη ένωση με γραμμομοριακή αναλογία οξειδίου του μαγνησίου προς διοξείδιο του πυριτίου περίπου 2:5
Χημική ονομασία	



**▼ B**

Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 15 % σε MgO και τουλάχιστον 67 % σε SiO <sub>2</sub> επί πυρωμένης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Πολύ λεπτόκοκκη, λευκή, άοσμη σκόνη, χωρίς αδρομερείς κόκκους
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή μαγνησίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή πυριτικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	Από 7,0 έως 10,8 (πηκτό εναιώρημα 10 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	15 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)
Απώλεια κατά την καύση	15 % κατ' ανώτατο όριο μετά από ξήρανση (1 000 °C, 20 min)
Υδατοδιαλυτά άλατα	3 % κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερα αλκάλια	1 % κατ' ανώτατο όριο (ως NaOH)
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 553a (ii) ΤΡΙΠΥΡΙΤΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	239-076-7
Χημική ονομασία	Τριπυριτικό μαγνήσιο
Χημικός τύπος	Mg <sub>2</sub> Si <sub>3</sub> O <sub>8</sub> · xH <sub>2</sub> O (σύνθεση κατά προσέγγιση)
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 29,0 % σε MgO και τουλάχιστον 65,0 % σε SiO <sub>2</sub> και τα δύο επί πυρωμένης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λεπτόκοκκη, λευκή σκόνη, χωρίς αδρομερείς κόκκους
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή μαγνησίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή πυριτικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	Από 6,3 έως 9,5 (πηκτό εναιώρημα 5 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την καύση	Τουλάχιστον 17 % και έως 34 % κατ' ανώτατο όριο (1 000 °C)
Υδατοδιαλυτά άλατα	2 % κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερα αλκάλια	1 % κατ' ανώτατο όριο (ως NaOH)
Φθόριο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ B**E 553b ΤΑΛΚΗΣ****Συνώνυμα**

Στεατίτης

**Ορισμός**

Φυσική μορφή του ένυδρου ορθοπυριτικού μαγνησίου που περιέχει διάφορες αναλογίες συναφών ορυκτών, όπως α-χαλαζία, ασβεστίτη, χλωρίτη, δολομίτη, μαγνησίτη και φλογοπίτη. Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένο από αμίαντο.

Αριθ. EINECS

238-877-9

Χημική ονομασία

Μεταπυριτικό υδροξείδιο του μαγνησίου

Χημικός τύπος

 $Mg_3(Si_4O_{10})(OH)_2$ 

Μοριακό βάρος

379,22

Δοκιμασία

**Περιγραφή**

Ελαφρά, ομοιογενής, λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη, λιπαρή στην αφή

**Ταυτοποίηση**

Φάσμα απορρόφησης υπερύθρου

Χαρακτηριστικές κορυφές στα 3 677, 1 018 και 669  $cm^{-1}$ 

Περίθλαση ακτίνων X

Κορυφές στα 9,34/4,66/3,12 Å

Διαλυτότητα

Αδιάλυτος στο νερό και στην αιθανόλη

**Καθαρότητα**

Απόλεια κατά την ξήρανση

0,5 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 1 ώρα)

Υλες διαλυτές σε οξέα

6 % κατ' ανώτατο όριο

Υδατοδιαλυτές ύλες

0,2 % κατ' ανώτατο όριο

Σίδηρος διαλυτός σε οξέα

Δεν ανιχνεύεται

Αρσενικό

10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 554 ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΑΡΓΙΛΙΟΝΑΤΡΙΟ****Συνώνυμα**

Αργιλοπυριτικό νάτριο· μεικτό πυριτικό άλας νατρίου-αργιλίου

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Πυριτικό αργιλιονάτριο

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα επί άνυδρης ουσίας:

— ως  $SiO_2$ , τουλάχιστον 66,0 % και κατ' ανώτατο όριο 88,0 %— ως  $Al_2O_3$ , τουλάχιστον 5,0 % και κατ' ανώτατο όριο 15,0 %**Περιγραφή**

Λεπτόκοκκη λευκή άμορφη σκόνη ή σφαιρίδια

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή νατρίου

Δοκιμή θετική

Δοκιμή αργιλίου

Δοκιμή θετική

Δοκιμή πυριτικών ιόντων

Δοκιμή θετική

pH

Από 6,5 έως 11,5 (πηκτό εναώρημα 5 %)

**▼ B****Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	8,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)
Απώλεια κατά την καύση	Τουλάχιστον 5,0 % και έως 11,0 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας (1 000 °C, μέχρι σταθερού βάρους)
Νάτριο	Τουλάχιστον 5 % και έως 8,5 % κατ' ανώτατο όριο (ως Na <sub>2</sub> O) επί άνυδρης ουσίας
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 555 ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΑΡΓΙΛΙΟΚΑΛΙΟ****Συνώνυμα**

Μαρμαρυγίας

**Ορισμός**

Ο φυσικός μαρμαρυγίας αποτελείται κυρίως από πυριτικό αργιλιό-κάλιο (μοσχοβίτης)

Αριθ. EINECS

310-127-6

Χημική ονομασία

Πυριτικό αργιλιόκάλιο

Χημικός τύπος

KAl<sub>2</sub>[AlSi<sub>3</sub>O<sub>10</sub>](OH)<sub>2</sub>

Μοριακό βάρος

398

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 %

**Περιγραφή**

Κρυσταλλικά πλακίδια ή σκόνη ανοικτού φαιού έως λευκού χρώματος

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Αδιάλυτο στο νερό, στα αραιά οξέα και αλκάλια και στους οργανικούς διαλύτες

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)
Αντιμόνιο	20 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Ψευδάργυρος	25 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Βάριο	25 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Χρόμιο	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Χαλκός	25 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Νικέλιο	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M3****E 556 ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΑΡΓΙΛΙΑΣΒΕΣΤΙΟ <sup>(1)</sup>****▼ B****Συνώνυμα**

Αργιλοπυριτικό ασβέστιο· μεικτό πυριτικό άλας αργιλίου-ασβεστίου

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Πυριτικό αργιλιασβέστιο

<sup>(1)</sup> Περίοδος εφαρμογής: έως τις 31 Ιανουαρίου 2014.

**▼ B**

Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Περιεκτικότητα επί άνυδρης ουσίας:
	— ως SiO <sub>2</sub> , τουλάχιστον 44,0 % και κατ' ανώτατο όριο 50,0 %
	— ως Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , τουλάχιστον 3,0 % και κατ' ανώτατο όριο 5,0 %
	— ως CaO, τουλάχιστον 32,0 % και κατ' ανώτατο όριο 38,0 %
	Λεπτόκοκκη, λευκή, ρέουσα σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή αργιλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή πυριτικών ιόντων	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	10,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)
Απώλεια κατά την καύση	Τουλάχιστον 14,0 % και έως 18,0 κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας (1 000 °C, μέχρι σταθερού βάρους)
Φθόριο	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M3****E 559 ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΑΡΓΙΛΙΟ (ΚΑΟΛΙΝΗΣ) (1)****▼ B**

<b>Συνώνυμα</b>	Καολίνης, βαρύς ή ελαφρύς
<b>Ορισμός</b>	Το ένυδρο πυριτικό αργίλιο (καολίνης) είναι καθαρμένη λευκή εύπλαστη άργιλος η οποία συνίσταται από καολινίτη, πυριτικό αργιλικόκάλιο, άστριο και χαλαζία. Η επεξεργασία δεν πρέπει να περιλαμβάνει πύρωση. Η ακατέργαστη καολινιτική άργιλος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πυριτικού αργιλίου πρέπει να μην περιέχει διοξίνη σε επίπεδα επικίνδυνα για την υγεία ή ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένο από αμίαντο
Αριθ. EINECS	215-286-4 (καολινίτης)
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	Al <sub>2</sub> Si <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (OH) <sub>4</sub> (καολινίτης)
Μοριακό βάρος	264
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 90 % (άθροισμα πυριτίας και αλουμίνας, μετά την καύση)
	Πυριτία (SiO <sub>2</sub> ) Από 45 % έως 55 %
	Αλουμίνα (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) Από 30 % έως 39 %
<b>Περιγραφή</b>	Λεπτόκοκκη, λευκή ή λευκόφαιη, λιπαρή σκόνη. Ο καολίνης συνίσταται από χαλαρά συσσωματώματα τυχαία προσανατολισμένων σωρών από νιφάδες καολινίτη ή από μεμονωμένες εξαγωνικές νιφάδες
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή οξειδίου του αργιλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή πυριτικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Περίθλαση ακτινών X:	Χαρακτηριστικές κορυφές στα 7,18/3,58/2,38/1,78 Å
Φάσμα απορρόφησης υπερύθρου	Κορυφές στα 3 700 και 3 620 cm <sup>-1</sup>

(1) Περίοδος εφαρμογής: έως τις 31 Ιανουαρίου 2014.

**▼ B****Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την καύση	Από 10 % έως 14 % (1 000 °C, μέχρι σταθερού βάρους)
Υδατοδιαλυτές ύλες	0,3 % κατ' ανώτατο όριο
Ύλες διαλυτές σε οξέα	2 % κατ' ανώτατο όριο
Σίδηρος	5 % κατ' ανώτατο όριο
Οξειδίο του καλίου (K <sub>2</sub> O)	5 % κατ' ανώτατο όριο
Άνθρακας	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 570 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Λιπαρά οξέα με ευθεία αλυσίδα, καπρυλικό οξύ (C<sub>8</sub>), καπρικό οξύ (C<sub>10</sub>), λαυρικό οξύ (C<sub>12</sub>), μυριστικό οξύ (C<sub>14</sub>), παλμιτικό οξύ (C<sub>16</sub>), στεατικό οξύ (C<sub>18</sub>), ελαϊκό οξύ (C<sub>18:1</sub>)

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

οκτανικό οξύ (C<sub>8</sub>), δεκανικό οξύ (C<sub>10</sub>), δωδεκανικό οξύ (C<sub>12</sub>), δεκατετρανικό οξύ (C<sub>14</sub>), δεκαεξανικό οξύ (C<sub>16</sub>), δεκαοκτανικό οξύ (C<sub>18</sub>), 9-δεκαοκτενικό οξύ (C<sub>18:1</sub>)

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

Τουλάχιστον 98 % με χρωματογραφία

**Περιγραφή**

Άχρωμο υγρό ή λευκό στερεό λαμβανόμενο από έλαια και λίπη

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή ταυτοποίησης

Τα επιμέρους λιπαρά οξέα μπορούν να ταυτοποιηθούν από τον βαθμό οξύτητας, τον αριθμό ιωδίου και με αεριοχρωματογραφία

**Καθαρότητα**

Υπόλειμμα κατά την πύρωση

0,1 % κατ' ανώτατο όριο

Ασπαωνοποίητες ύλες

1,5 % κατ' ανώτατο όριο

Περιεκτικότητα σε νερό

0,2 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 574 ΓΛΥΚΟΝΙΚΟ ΟΞΥ****Συνώνυμα**

D-γλυκονικό οξύ· δεξτρονικό οξύ

**Ορισμός**

Το γλυκονικό οξύ είναι υδατικό διάλυμα γλυκονικού οξέος και γλυκονο-δ-λακτόνης

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Γλυκονικό οξύ

Χημικός τύπος

C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>7</sub> (γλυκονικό οξύ)

**▼ B**

Μοριακό βάρος	196,2
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 49,0 % (ως γλυκονικό οξύ)
<b>Περιγραφή</b>	Αχρωμο έως ανοικτό κίτρινο, διαυγές σιροπιώδες υγρό
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή σχηματισμού φαινυλδραζινικού παραγώγου	Θετική. Η σχηματιζόμενη ένωση τήκεται σε θερμοκρασία μεταξύ 196 °C και 202 °C με διάσπαση
<b>Καθαρότητα</b>	
Υπόλειμμα κατά την πύρωση	1,0 % κατ' ανώτατο όριο στους 550 °C +/- 20 °C έως ότου εξαφανιστούν τα οργανικά κατάλοιπα (μαύρες κηλίδες)
Αναγωγικές ύλες	2,0 % κατ' ανώτατο όριο (ως D-γλυκόζη)
Χλωριόντα	350 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Θειικά ιόντα	240 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Θειώδη ιόντα	20 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 575 ΓΛΥΚΟΝΟ-δ-ΛΑΚΤΟΝΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Γλυκονολακτόνη· GDL· δ-λακτόνη D-γλυκονικού οξέος· δ-γλυκονο-λακτόνη
<b>Ορισμός</b>	Η γλυκονο-δ-λακτόνη είναι ο κυκλικός 1,5-ενδομοριακός εστέρας του D-γλυκονικού οξέος. Σε υδατικό περιβάλλον υδrolύεται προς μείγμα ισορροπίας D-γλυκονικού οξέος (55 % - 66 %) και των λακτονών δ και γ
Αριθ. EINECS	202-016-5
Χημική ονομασία	D-γλυκονο-1,5-λακτόνη
Χημικός τύπος	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>6</sub>
Μοριακό βάρος	178,14
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λεπτόκοκκη, λευκή, σχεδόν άοσμη, κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή αντίδρασης γλυκονικού οξέος με φαινυλδραζίνη	Θετική. Η σχηματιζόμενη ένωση τήκεται σε θερμοκρασία μεταξύ 196 °C και 202 °C με διάσπαση
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό. Μέτρια διαλυτό σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Αναγωγικές ουσίες	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (ως D-γλυκόζη)
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 576 ΓΛΥΚΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Άλας του D-γλυκονικού οξέος με νάτριο
<b>Ορισμός</b>	Παρασκευάζεται με ζύμωση ή χημική καταλυτική οξείδωση

**▼ B**

Αριθ. EINECS	208-407-7
Χημική ονομασία	D-γλυκονικό νάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> NaO <sub>7</sub> (άνυδρο)
Μοριακό βάρος	218,14
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 %
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή έως χρυσοκάστανη, κοκκώδης έως λεπτόκοκκη κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή γλυκονικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Πολύ διαλυτό στο νερό. Μέτρια διαλυτό σε αιθανόλη
pH	Από 6,5 έως 7,5 (διάλυμα 10 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Αναγωγικές ύλες	1,0 % κατ' ανώτατο όριο (ως D-γλυκόζη)
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 577 ΓΛΥΚΟΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Άλας του D-γλυκονικού οξέος με κάλιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	206-074-2
Χημική ονομασία	D-Γλυκονικό κάλιο
Χημικός τύπος	C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> KO <sub>7</sub> (άνυδρο) C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> KO <sub>7</sub> · H <sub>2</sub> O (μονοένυδρο)
Μοριακό βάρος	234,25 (άνυδρο) 252,26 (μονοένυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,0 % και έως 103,0 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηράς ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμη, ρέουσα λευκή έως λευκοκίτρινη, κρυσταλλική σκόνη ή κόκκοι
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή γλυκονικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	Από 7,0 έως 8,3 (διάλυμα 10 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	Άνυδρο: 3,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες, υπό κενό) Μονοένυδρο: τουλάχιστον 6 % και έως 7,5 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες, υπό κενό)
Αναγωγικές ουσίες	1,0 % κατ' ανώτατο όριο (ως D-γλυκόζη)
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 578 ΓΛΥΚΟΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Άλας του D-γλυκονικού οξέος με ασβέστιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	206-075-8
Χημική ονομασία	D-γλυκονικό ασβέστιο

**▼ B**

Χημικός τύπος	$C_{12}H_{22}CaO_{14}$ (άνυδρο) $C_{12}H_{22}CaO_{14} \cdot H_2O$ (μονοένυδρο)
Μοριακό βάρος	430,38 (άνυδρο) 448,39 (μονοένυδρο)
Δοκιμασία	άνυδρο: περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % και έως 102 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηράς ουσίας μονοένυδρο: τουλάχιστον 98 % και έως 102 % κατ' ανώτατο όριο στην «ως έχει» μορφή
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμοι, λευκοί κρυσταλλικοί κόκκοι ή σκόνη, σταθεροί στον αέρα
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή γλυκονικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Διαλυτότητα	Διαλυτό στο νερό, αδιάλυτο σε αιθανόλη
pH	Από 6,0 έως 8,0 (διάλυμα 5 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	3,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 16 ώρες) (άνυδρο) 2,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 16 ώρες) (μονοένυδρο)
Αναγωγικές ουσίες	1,0 % κατ' ανώτατο όριο (ως D-γλυκόζη)
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 579 ΓΛΥΚΟΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	206-076-3
Χημική ονομασία	Διένυδρος D-γλυκονικός υποσίδηρος· διένυδρος γλυκονικός σίδηρος (II)
Χημικός τύπος	$C_{12}H_{22}FeO_{14} \cdot 2H_2O$
Μοριακό βάρος	482,17
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 % επί ξηράς ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Σκόνη ή κόκκοι χρώματος ωχροκιτρινοπράσινου έως φαιοκίτρινου, που ενδεχομένως αναδίδουν ελαφρά οσμή καμένης ζάχαρης
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτός στο νερό με ήπια θέρμανση. Πρακτικά αδιάλυτος σε αιθανόλη
Δοκιμή ιόντων δισθενούς σιδήρου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή αντίδρασης γλυκονικού οξέος με φαινυλδραζίνη	Θετική
pH	Από 4 έως 5,5 (διάλυμα 10 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	10 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 16 ώρες)
Οξαλικό οξύ	Δεν ανιχνεύεται
Σίδηρος (III)	2 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο



**▼ B**

Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αναγωγικές ουσίες	0,5 % κατ' ανώτατο όριο, εκφραζόμενη σε γλυκόζη

**E 585 ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	Γαλακτικός σίδηρος (II)· 2-υδροξυπροπανικός σίδηρος (II)· άλας του 2-υδροξυπροπανικού οξέος με σίδηρο (2 +)
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	227-608-0
Χημική ονομασία	2-Υδροξυπροπανικός σίδηρος(II)
Χημικός τύπος	$C_6H_{10}FeO_6 \cdot nH_2O$ (n = 2 ή 3)
Μοριακό βάρος	270,02 (διένυδρος) 288,03 (τριένυδρος)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 96 % επί ξηράς ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοπράσινοι κρύσταλλοι ή ανοικτοπράσινη σκόνη με χαρακτηριστική οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτός σε νερό. Πρακτικά αδιάλυτος σε αιθανόλη
Δοκιμή ιόντων δισθενούς σιδήρου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή γαλακτικών ιόντων	Δοκιμή θετική
pH	Από 4 έως 6 (διάλυμα 2 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	18 % κατ' ανώτατο όριο (100 °C, υπό κενό, πίεση περίπου 700 mm Hg)
Σίδηρος (III)	0,6 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 586 4-ΕΞΥΛΟΡΕΣΟΡΚΙΝΟΛΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	4-εξυλοβενζολοδιόλη-1,3· εξυλορεσορκινόλη
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	205-257-4
Χημική ονομασία	4-εξυλορεσορκινόλη
Χημικός τύπος	$C_{12}H_{18}O_2$
Μοριακό βάρος	197,24
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 98 % επί ξηράς ουσίας (4 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου)
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή σκόνη

**▼ B**

<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτή σε αιθέρα και ακετόνη· πολύ λίγο διαλυτή σε νερό.
Δοκιμή νιτρικού οξέος	Σε 1 ml κορεσμένου διαλύματος του δείγματος, προστίθεται 1 ml νιτρικού οξέος. Εμφανίζεται ανοικτό κόκκινο χρώμα
Δοκιμή βρωμίου	Σε 1 ml κορεσμένου διαλύματος του δείγματος, προστίθεται 1 ml βρωμιούχου νερού (αντιδραστήριο βρωμίου TS). Το σχηματιζόμενο κίτρινο, κροκυδάδες ίζημα διαλύεται και προκύπτει κίτρινο διάλυμα
<b>Καθαρότητα</b>	
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	62 °C έως 67 °C
Οξύτητα	0,05 % κατ' ανώτατο όριο
Θευκή τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Ρεσορκινόλη και άλλες φαινόλες	Ανακινείται περίπου 1 g του δείγματος με 50 ml νερού για λίγα λεπτά, το διάλυμα διηθείται και στο διήθημα προστίθενται 3 σταγόνες διαλύματος τριχλωριούχου σιδήρου (TS). Δεν εμφανίζεται κόκκινο ή κυανό χρώμα
Νικέλιο	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 620 ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ ΟΞΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	L-γλουταμινικό οξύ· L-α-αμινογλουταρικό οξύ
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	200-293-7
Χημική ονομασία	L-γλουταμινικό οξύ· L-2-αμινοπεντανοδικαρβονικό οξύ
Χημικός τύπος	C <sub>5</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>4</sub>
Μοριακό βάρος	147,13
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 % και έως 101,0 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας
Διαλυτότητα	Μέτρια διαλυτό στο νερό· πρακτικά αδιάλυτο στην αιθανόλη ή στον αιθέρα
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή γλουταμινικού οξέος (με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας)	Δοκιμή θετική
Ειδική στροφική ικανότητα	[α] <sub>D</sub> <sup>20</sup> από + 31,5° έως + 32,2° [διάλυμα 10 % (επί άνυδρης ουσίας) σε HCl 2N, σωλήνας 200 mm]
pH	Από 3,0 έως 3,5 (κορεσμένο διάλυμα)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	0,2 % κατ' ανώτατο όριο (80 °C, 3 ώρες)
Θευκή τέφρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Χλωρίοντα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Πυρρολιδονοκαρβοξυλικό οξύ	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	2,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## ▼ B

## E 621 ΟΞΙΝΟ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

<b>Συνώνυμα</b>	Γλουταμινικό νάτριο· MSG
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	205-538-1
Χημική ονομασία	Μονοένυδρο όξινο L-γλουταμινικό νάτριο
Χημικός τύπος	$C_5H_8NaNO_4 \cdot H_2O$
Μοριακό βάρος	187,13
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 % και έως 101,0 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό· πρακτικά αδιάλυτο στην αιθανόλη ή στον αιθέρα
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί, πρακτικά άοσμοι κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή γλουταμινικού οξέος (με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας)	Δοκιμή θετική
Ειδική στροφική ικανότητα	$[\alpha]_D^{20}$ από + 24,8° έως + 25,3° [διάλυμα 10 % (επί άνυδρης ουσίας) σε HCl 2N, σωλήνας 200 mm]
pH	Από 6,7 έως 7,2 (διάλυμα 5 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (98 °C, 5 ώρες)
Χλωριόντα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Πυρρολιδοκαρβοξυλικό οξύ	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## E 622 ΟΞΙΝΟ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

<b>Συνώνυμα</b>	Γλουταμινικό κάλιο· MPG
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	243-094-0
Χημική ονομασία	Μονοένυδρο όξινο L-γλουταμινικό κάλιο
Χημικός τύπος	$C_5H_8KNO_4 \cdot H_2O$
Μοριακό βάρος	203,24
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 % και έως 101,0 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό· πρακτικά αδιάλυτο στην αιθανόλη ή στον αιθέρα
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί, πρακτικά άοσμοι κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή γλουταμινικού οξέος (με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας)	Δοκιμή θετική

**▼ B**

Ειδική στροφοική ικανότητα	$[\alpha]_D^{20}$ από + 22,5° έως + 24,0° [διάλυμα 10 % (επί άνυδρης ουσίας) σε HCl 2N, σωλήνας 200 mm]
pH	Από 6,7 έως 7,3 (διάλυμα 2 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	0,2 % κατ' ανώτατο όριο (80 °C, 5 ώρες)
Χλωριόντα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Πυρρολιδοκαρβοξυλικό οξύ	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 623 ΟΞΙΝΟ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Γλουταμινικό ασβέστιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	242-905-5
Χημική ονομασία	δι-L-γλουταμινικό ασβέστιο
Χημικός τύπος	$C_{10}H_{16}CaN_2O_8 \cdot nH_2O$ (n = 0, 1, 2 ή 4)
Μοριακό βάρος	332,32 (άνυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98,0 % και έως 102,0 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό· πρακτικά αδιάλυτο στην αιθανόλη ή στον αιθέρα
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί, πρακτικά άοσμοι κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή γλουταμινικού οξέος (με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας)	Δοκιμή θετική
Ειδική στροφοική ικανότητα	$[\alpha]_D^{20}$ από + 27,4° έως + 29,2° (για το διγλουταμινικό ασβέστιο με n = 4) [διάλυμα 10 % (επί άνυδρης ουσίας) σε HCl 2N, σωλήνας 200 mm]
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	19,0 % κατ' ανώτατο όριο (για το διγλουταμινικό ασβέστιο με n = 4) (Karl Fischer)
Χλωριόντα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Πυρρολιδοκαρβοξυλικό οξύ	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 624 ΟΞΙΝΟ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Γλουταμινικό αμμώνιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-447-1
Χημική ονομασία	Μονοένυδρο όξινο L-γλουταμινικό μονοαμμώνιο
Χημικός τύπος	$C_5H_{12}N_2O_4 \cdot H_2O$
Μοριακό βάρος	182,18
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 % και κατ' ανώτατο όριο 101,0 % επί άνυδρης ουσίας

**▼ B**

Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό· πρακτικά αδιάλυτο στην αιθανόλη ή στον αιθέρα
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί, πρακτικά άοσμοι κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή αμμωνίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή γλουταμινικού οξέος (με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας)	Δοκιμή θετική
Ειδική στροφοική ικανότητα	$[\alpha]_D^{20}$ από + 25,4° έως + 26,4° [διάλυμα 10 % (επί άνυδρης ουσίας) σε HCl 2N, σωλήνας 200 mm]
pH	Από 6,0 έως 7,0 (διάλυμα 5 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (50 °C, 4 ώρες)
Θεική τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Πυρρολιδοκαρβοξυλικό οξύ	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 625 ΟΞΙΝΟ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Γλουταμινικό μαγνήσιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	242-413-0
Χημική ονομασία	Τετραένυδρο δι-L-γλουταμινικό μαγνήσιο
Χημικός τύπος	$C_{10}H_{16}MgN_2O_8 \cdot 4H_2O$
Μοριακό βάρος	388,62
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95,0 % και έως 105,0 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας
Διαλυτότητα	Πολύ διαλυτό σε νερό· πρακτικά αδιάλυτο στην αιθανόλη ή στον αιθέρα
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμοι, λευκοί ή υπόλευκοι κρύσταλλοι ή σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή μαγνησίου	Δοκιμή θετική
Δοκιμή γλουταμινικού οξέος (με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας)	Δοκιμή θετική
Ειδική στροφοική ικανότητα	$[\alpha]_D^{20}$ από + 23,8° έως + 24,4° [διάλυμα 10 % (επί άνυδρης ουσίας) σε HCl 2N, σωλήνας 200 mm]
pH	Από 6,4 έως 7,5 (διάλυμα 10 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	24 % κατ' ανώτατο όριο (Karl Fischer)
Χλωρίοντα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Πυρρολιδοκαρβοξυλικό οξύ	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 626 ΓΟΥΑΝΙΛΙΚΟ ΟΞΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	5'-γουανιλικό οξύ
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	201-598-8

**▼ B**

Χημική ονομασία	Γουανοσινο-5'-μονοφωσφορικό οξύ
Χημικός τύπος	$C_{10}H_{14}N_5O_8P$
Μοριακό βάρος	363,22
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,0 % επί άνυδρης ουσίας
Διαλυτότητα	Λίγο διαλυτό στο νερό, πρακτικά αδιάλυτο σε αιθανόλη
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμοι, άχρωμοι ή λευκοί κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή ριβόζης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή οργανοφωσφορικών ενώσεων	Δοκιμή θετική
pH	Από 1,5 έως 2,5 (διάλυμα 0,25 %)
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης διαλύματος 20 mg/l σε HCl 0,01N στα 256 nm
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	1,5 % κατ' ανώτατο όριο (120 °C, 4 ώρες)
Άλλα νουκλεοτίδια	Δεν ανιχνεύονται με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 627 ΓΟΥΑΝΙΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ****Συνώνυμα**

Γουανιλικό νάτριο· 5'-γουανιλικό νάτριο

**Ορισμός****▼ M3**

Αριθ. Einecs 226-914-1

**▼ B**

Χημική ονομασία	Γουανοσινο-5'-μονοφωσφορικό νάτριο
Χημικός τύπος	$C_{10}H_{12}N_5Na_2O_8P \cdot nH_2O$ (n = ca. 7)
Μοριακό βάρος	407,19 (άνυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,0 % επί άνυδρης ουσίας
Διαλυτότητα	Διαλυτό στο νερό, μέτρια διαλυτό στην αιθανόλη, πρακτικά αδιάλυτο στον αιθέρα
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμοι, άχρωμοι ή λευκοί κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή ριβόζης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή οργανοφωσφορικών ενώσεων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
pH	Από 7,0 έως 8,5 (διάλυμα 5 %)
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης διαλύματος 20 mg/l σε HCl 0,01 N στα 256 nm
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	25 % κατ' ανώτατο όριο (120 °C, 4 ώρες)
Άλλα νουκλεοτίδια	Δεν ανιχνεύονται με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ B**E 628 ΓΟΥΑΝΙΛΙΚΟ ΚΑΛΙΟ****Συνώνυμα**

Γουανιλικό κάλιο· 5'-γουανιλικό κάλιο

**Ορισμός**▼ M3

Αριθ. Einecs

221-849-5

▼ B

Χημική ονομασία

Γουανοσινο-5'-μονοφωσφορικό κάλιο

Χημικός τύπος

C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>K<sub>2</sub>N<sub>5</sub>O<sub>8</sub>P

Μοριακό βάρος

439,40

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,0 % επί άνυδρης ουσίας

Διαλυτότητα

Εύκολα διαλυτό στο νερό, πρακτικά αδιάλυτο σε αιθανόλη

**Περιγραφή**

Άοσμοι, άχρωμοι ή λευκοί κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή ριβόζης

Δοκιμή θετική

Δοκιμή οργανοφωσφορικών ενώσεων

Δοκιμή θετική

Δοκιμή καλίου

Δοκιμή θετική

pH

Από 7,0 έως 8,5 (διάλυμα 5 %)

Φασματομετρία

Μέγιστο απορρόφησης διαλύματος 20 mg/l σε HCl 0,01N στα 256 nm

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση

5 % κατ' ανώτατο όριο (120 °C, 4 ώρες)

Άλλα νουκλεοτίδια

Δεν ανιχνεύονται με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 629 ΓΟΥΑΝΙΛΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ****Συνώνυμα**

5'-γουανιλικό ασβέστιο

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Γουανοσινο-5'-μονοφωσφορικό ασβέστιο

Χημικός τύπος

C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>CaN<sub>5</sub>O<sub>8</sub>P · nH<sub>2</sub>O

Μοριακό βάρος

401,20 (άνυδρο)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,0 % επί άνυδρης ουσίας

Διαλυτότητα

Μέτρια διαλυτό στο νερό

**Περιγραφή**

Άοσμοι, λευκοί ή υπόλευκοι κρύσταλλοι ή σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή ριβόζης

Δοκιμή θετική

Δοκιμή οργανοφωσφορικών ενώσεων

Δοκιμή θετική

Δοκιμή ασβεστίου

Δοκιμή θετική

pH

Από 7,0 έως 8,0 (διάλυμα 0,05 %)

Φασματομετρία

Μέγιστο απορρόφησης διαλύματος 20 mg/l σε HCl 0,01N στα 256 nm

**▼ B****Καθαρότητα**

Απόλεια κατά την ξήρανση

23,0 % κατ' ανώτατο όριο (120 °C, 4 ώρες)

Άλλα νουκλεοτίδια

Δεν ανιχνεύονται με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 630 ΙΝΟΣΙΝΙΚΟ ΟΞΥ****Συνώνυμα**

5'-Ινοσινικό οξύ

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS

205-045-1

Χημική ονομασία

Ινοσινό-5'-μονοφωσφορικό οξύ

Χημικός τύπος

C<sub>10</sub>H<sub>13</sub>N<sub>4</sub>O<sub>8</sub>P

Μοριακό βάρος

348,21

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,0 % επί άνυδρης ουσίας

Διαλυτότητα

Εύκολα διαλυτό στο νερό, λίγο διαλυτό στην αιθανόλη

**Περιγραφή**

Άοσμοι, άχρωμοι ή λευκοί κρύσταλλοι ή σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή ριβόζης

Δοκιμή θετική

Δοκιμή οργανοφωσφορικών ενώσεων

Δοκιμή θετική

pH

Από 1,0 έως 2,0 (διάλυμα 5 %)

Φασματομετρία

Μέγιστο απορρόφησης διαλύματος 20 mg/l σε HCl 0,01N στα 250 nm

**Καθαρότητα**

Απόλεια κατά την ξήρανση

3,0 % κατ' ανώτατο όριο (120 °C, 4 ώρες)

Άλλα νουκλεοτίδια

Δεν ανιχνεύονται με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 631 ΙΝΟΣΙΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ****Συνώνυμα**

Ινοσινικό νάτριο· 5'-ινοσινικό νάτριο

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS

225-146-4

Χημική ονομασία

Ινοσινό-5'-μονοφωσφορικό νάτριο

Χημικός τύπος

C<sub>10</sub>H<sub>11</sub>N<sub>4</sub>Na<sub>2</sub>O<sub>8</sub>P · H<sub>2</sub>O

Μοριακό βάρος

392,17 (άνυδρο)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,0 % επί άνυδρης ουσίας

Διαλυτότητα

Διαλυτό στο νερό, μέτρια διαλυτό στην αιθανόλη, πρακτικά αδιάλυτο στον αιθέρα

**Περιγραφή**

Άοσμοι, άχρωμοι ή λευκοί κρύσταλλοι ή σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή ριβόζης

Δοκιμή θετική

Δοκιμή οργανοφωσφορικών ενώσεων

Δοκιμή θετική

Δοκιμή νατρίου

Δοκιμή θετική



**▼ B**

pH	Από 7,0 έως 8,5
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης διαλύματος 20 mg/l σε HCl 0,01N στα 250 nm
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	28,5 % κατ' ανώτατο όριο (Karl Fischer)
Άλλα νουκλεοτίδια	Δεν ανιχνεύονται με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 632 ΙΝΟΣΙΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Ινοσινικό κάλιο· 5'-ινοσινικό κάλιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	243-652-3
Χημική ονομασία	Ινοσινο-5'-μονοφωσφορικό κάλιο
Χημικός τύπος	C <sub>10</sub> H <sub>11</sub> K <sub>2</sub> N <sub>4</sub> O <sub>8</sub> P
Μοριακό βάρος	424,39
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,0 % επί άνυδρης ουσίας
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό· πρακτικά αδιάλυτο σε αιθανόλη
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμοι, άχρωμοι ή λευκοί κρύσταλλοι ή σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή ριβόζης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή οργανοφωσφορικών ενώσεων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική
pH	Από 7,0 έως 8,5 (διάλυμα 5 %)
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης διαλύματος 20 mg/l σε HCl 0,01N στα 250 nm
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	10,0 % κατ' ανώτατο όριο (Karl Fischer)
Άλλα νουκλεοτίδια	Δεν ανιχνεύονται με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 633 ΙΝΟΣΙΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	5'-ινοσινικό ασβέστιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Ινοσινο-5'-μονοφωσφορικό ασβέστιο
Χημικός τύπος	C <sub>10</sub> H <sub>11</sub> CaN <sub>4</sub> O <sub>8</sub> P · nH <sub>2</sub> O
Μοριακό βάρος	386,19 (άνυδρο)
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,0 % επί άνυδρης ουσίας
Διαλυτότητα	Μέτρια διαλυτό στο νερό·
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμοι, άχρωμοι ή λευκοί κρύσταλλοι ή σκόνη

**▼ B****Ταυτοποίηση**

Δοκιμή ριβόζης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή οργανοφωσφορικών ενώσεων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
pH	Από 7,0 έως 8,0 (διάλυμα 0,05 %)
Φασματομετρία	Μέγιστο απορρόφησης διαλύματος 20 mg/l σε HCl 0,01N στα 250 nm

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό	23,0 % κατ' ανώτατο όριο (Karl Fischer)
Άλλα νουκλεοτίδια	Δεν ανιχνεύονται με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 634 ΑΛΑΤΑ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΤΩΝ 5'-ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Τα άλατα με ασβέστιο των 5'-ριβονουκλεοτιδίων είναι κυρίως μείγμα ινοσινο-5'-μονοφωσφορικού ασβεστίου και γουανοσινο-5'-μονοφωσφορικού ασβεστίου
Χημικός τύπος	$C_{10}H_{11}N_4CaO_8P \cdot nH_2O$ $C_{10}H_{12}N_5CaO_8P \cdot nH_2O$
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα στα δύο κύρια συστατικά τουλάχιστον 97 % και σε κάθε συστατικό χωριστά τουλάχιστον 47,0 % και έως 53 % κατ' ανώτατο όριο, σε όλες τις περιπτώσεις επί άνυδρης ουσίας
Διαλυτότητα	Μέτρια διαλυτά στο νερό

**Περιγραφή**

Άσσοι, λευκοί ή σχεδόν λευκοί κρύσταλλοι ή σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Δοκιμή ριβόζης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή οργανοφωσφορικών ενώσεων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ασβεστίου	Δοκιμή θετική
pH	Από 7,0 έως 8,0 (διάλυμα 0,05 %)

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό	23,0 % κατ' ανώτατο όριο (Karl Fischer)
Άλλα νουκλεοτίδια	Δεν ανιχνεύονται με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 635 ΑΛΑΤΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΤΩΝ 5'-ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ****Συνώνυμα**

Νατριούχα 5'-ριβονουκλεοτίδια

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Τα άλατα με νάτριο των 5'-ριβονουκλεοτιδίων είναι κυρίως μείγμα ινοσινο-5'-μονοφωσφορικού νατρίου και γουανοσινο-5'-μονοφωσφορικού νατρίου

**▼ B**

Χημικός τύπος	$C_{10}H_{11}N_4O_8P \cdot nH_2O$ $C_{10}H_{12}N_5Na_2O_8P \cdot nH_2O$
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα στα δύο κύρια συστατικά τουλάχιστον 97 % και σε κάθε συστατικό χωριστά τουλάχιστον 47,0 % και έως 53 % κατ' ανώτατο όριο, σε όλες τις περιπτώσεις επί άνυδρης ουσίας
Διαλυτότητα	Διαλυτά στο νερό, μέτρια διαλυτά στην αιθανόλη, πρακτικά αδιάλυτα στον αιθέρα
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμοι, λευκοί ή σχεδόν λευκοί κρύσταλλοι ή σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή ριβόζης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή οργανοφωσφορικών ενώσεων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
pH	Από 7,0 έως 8,5 (διάλυμα 5 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	26,0 % κατ' ανώτατο όριο (Karl Fischer)
Άλλα νουκλεοτίδια	Δεν ανιχνεύονται με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 640 ΓΛΥΚΙΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ**

## (i) ΓΛΥΚΙΝΗ

<b>Συνώνυμα</b>	Αμινοξικό οξύ· γλυκόκολλα
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	200-272-2
Χημική ονομασία	Αμινοξικό οξύ
Χημικός τύπος	$C_2H_5NO_2$
Μοριακό βάρος	75,07
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98,5 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή αμινοξέων	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλειμα κατά την ξήρανση	0,2 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 3 ώρες)
Υπόλειμμα κατά την πύρωση	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## (ii) ΓΛΥΚΙΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	227-842-3

**▼ B**

Χημική ονομασία	Γλυκινικό νάτριο
Χημικός τύπος	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>2</sub> Na
Μοριακό βάρος	98
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98,5 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή αμινοξέων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή νατρίου	Δοκιμή θετική
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,2 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 3 ώρες)
Υπόλειμμα κατά την πύρωση	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M18****E 641 L-ΛΕΥΚΙΝΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	2-αμινοϊσοβουτυλοξικό οξύ· L-2-αμινο-4-μεθυλοβαλεριανικό οξύ· α-αμινοϊσοκαπροϊκό οξύ· (S)-2-αμινο-4-μεθυλοβουτανοϊκό οξύ· L-leu
<b>Ορισμός</b>	
Einecs	200-522-0
Αριθμός CAS	61-90-5
Χημική ονομασία	L-λευκίνη L-2-αμινο-4-μεθυλοπεντανικό οξύ
Χημικός τύπος	C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	131,17
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98,5 % και έως 101,0 % κατ' ανώτατο όριο στην άνυδρη μορφή
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή ή υπόλευκη κρυσταλλική σκόνη ή γυαλιστερές νιφάδες
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτή σε νερό, οξικό οξύ, αραιό HCl και αλκαλικά υδροξειδία και ανθρακικά άλατα· λίγο διαλυτή σε αιθανόλη
Ειδική στροφική ικανότητα	[α] <sub>D</sub> <sup>20</sup> μεταξύ + 14,5° και + 16,5° (διάλυμα 4 % (στην άνυδρη μορφή) σε HCl 6N)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (100 - 105 °C)
Θεική τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Χλωριούχα	200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Θειικά άλατα	300 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αμμώνιο	200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Σίδηρος	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ B****E 650 ΟΞΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	Διένυδρο άλας του οξικού οξέος με ψευδάργυρο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Διένυδρος οξικός ψευδάργυρος
Χημικός τύπος	$C_4H_6O_4 \cdot Zn \cdot 2H_2O$
Μοριακό βάρος	219,51
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % και έως 102 % κατ' ανώτατο όριο σε $C_4H_6O_4 \cdot Zn \cdot 2H_2O$
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμοι κρύσταλλοι ή λεπτόκοκκη, υπόλευκη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή οξικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή ψευδαργύρου	Δοκιμή θετική
pH	Από 6,0 έως 8,0 (διάλυμα 5 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Ύλες αδιάλυτες στο νερό	0,005 % κατ' ανώτατο όριο
Χλωριόντα	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Θεικά ιόντα	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αλκάλια και αλκαλικές γαίες	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Οργανικές πτητικές προσμείξεις	Δοκιμή θετική
Σίδηρος	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	20 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 900 ΔΙΜΕΘΥΛΟΠΟΛΥΣΙΛΟΞΑΝΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	Πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο· έλαιο σιλκόνης· διμεθυλοσιλικόνη
-----------------	---

**▼ B**

<b>Ορισμός</b>	Το διμεθυλοπολυσιλοξάνιο είναι μείγμα πλήρως μεθυλιωμένων γραμμικών πολυμερών σιλοξανίων που περιέχουν επαναλαμβανόμενες δομικές μονάδες με χημικό τύπο $(\text{CH}_3)_2 \text{SiO}$ και είναι σταθεροποιημένα με ακραίες (καταληκτικές) προστατευτικές τριμεθυλοσιλοξομάδες με τον τύπο $(\text{CH}_3)_3 \text{SiO}$
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Διμεθυλοσιλοξάνια και διμεθυλοσιλικόνες
Χημικός τύπος	$(\text{CH}_3)_3\text{-Si-[O-Si(CH}_3)_2]_n\text{-O-Si(CH}_3)_3$
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε ολικό πυρίτιο τουλάχιστον 37,3 % και έως 38,5 % κατ' ανώτατο όριο
<b>Περιγραφή</b>	Διαυγές, άχρωμο, παχύρρευστο υγρό
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Ειδικό βάρος (25 °C /25 °C)	Από 0,964 έως 0,977
Δείκτης διάθλασης	$[\eta]_D^{25}$ από 1 400 έως 1 405
Φάσμα απορρόφησης υπερύθρου	Το φάσμα απορρόφησης υπερύθρου ενός υγρού υμενίου του δείγματος, τοποθετημένου μεταξύ δύο πλακών γλωριούχου νατρίου, εμφανίζει σχετικά μέγιστα στα ίδια μήκη κύματος με εκείνα ανάλογου παρασκευάσματος προτύπου διμεθυλοπολυσιλοξανίου αναφοράς
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (150 °C, 4 ώρες)
Ιξώδες	Τουλάχιστον $1,00 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$ στους 25 °C
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 901 ΚΗΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ, ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	Λευκός κηρός· κίτρινος κηρός
<b>Ορισμός</b>	Ο κίτρινος κηρός μελισσών είναι κηρός που λαμβάνεται με τήξη, με θερμό νερό, των τοιχωμάτων κηρηθρών κατασκευασμένων από μέλισσες του είδους <i>Apis mellifera</i> L. και απομάκρυνση των ξένων υλών Ο λευκός κηρός λαμβάνεται με λεύκανση του κίτρινου κηρού μελισσών
Αριθ. EINECS	232-383-7
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοκίτρινα (λευκή μορφή) ή υποκίτρινα έως καστανόφαια (κίτρινη μορφή) τεμάχια ή πλάκες με λεπτόκοκκα και μη κρυσταλλικά θραύσματα, που έχουν ευχάριστη οσμή μελιού
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	Από 62 °C έως 65 °C

**▼ B**

Ειδικό βάρος	0,96 περίπου
Διαλυτότητα	Αδιάλυτος στο νερό, μέτρια διαλυτός σε αλκοόλη, πολύ διαλυτός σε χλωροφόρμιο και αιθέρα
<b>Καθαρότητα</b>	
Βαθμός οξύτητας	Τουλάχιστον 17 και έως 24 κατ' ανώτατο όριο
Αριθμός σαπωνοποίησης	87-104
Αριθμός υπεροξειδίων	5 κατ' ανώτατο όριο
Γλυκερόλη και άλλες πολυόλες	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (ως γλυκερόλη)
Κηριζίνη, παραφίνες και ορισμένοι άλλοι κηροί	Φέρονται 3,0 g δείγματος σε σφαιρική φιάλη των 100 ml, προστίθεται 30 ml διαλύματος υδροξειδίου του καλίου 4 % w/v σε απαλλαγμένη από αλδεϋδες αιθανόλη και το μείγμα υποβάλλεται σε ήπιο βρασμό με κάθετο ψυκτήρα επί 2 ώρες. Αφαιρείται ο ψυκτήρας και εισάγεται αμέσως θερμομέτρο. Η φιάλη τοποθετείται σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 80 °C και αφήνεται να ψυχθεί με συνεχή περιδί-νιση. Δεν σχηματίζεται ίζημα μέχρις ότου η θερμοκρασία φθάσει τους 65 °C, παρόλο που το διάλυμα μπορεί να είναι οπαλίζον.
Λίπη, ιαπωνικός κηρός, κολοφώνιο και σάπωνες	Υποβάλλεται σε βρασμό 1 g δείγματος με 35 ml διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 1:7, επί 30 min, ενώ ο όγκος διατηρείται σταθερός με την προσθήκη νερού κατά διαστήματα, και έπειτα το μείγμα ψύχεται. Ο κηρός αποχωρίζεται και το υγρό παραμένει διαυγές. Το ψυχρό μείγμα διηθείται και προστίθεται υδροχλωρικό οξύ για την οξίνιση του διηθήματος. Δεν σχηματίζεται ίζημα.
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 902 ΚΑΝΔΕΛΛΙΑΚΟΣ ΚΗΡΟΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Ο κανδελλικός κηρός είναι καθαρμένος κηρός που λαμβάνεται από τα φύλλα του φυτού καντελίλλα ( <i>Euphorbia antisiphilitica</i> )
Αριθ. EINECS	232-347-0
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Σκληρός, κιτρινοκάστανος, αδιαφανής έως ημιδιαφανής κηρός
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Ειδικό βάρος	0,98 περίπου
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	Από 68,5 °C έως 72,5 °C
Διαλυτότητα	Αδιάλυτος σε νερό, διαλυτός σε αιθανόλη και τολουόλιο
<b>Καθαρότητα</b>	
Βαθμός οξύτητας	Τουλάχιστον 12 και έως 22 κατ' ανώτατο όριο
Αριθμός σαπωνοποίησης	Τουλάχιστον 43 και έως 65 κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ B**E 903 ΚΑΡΝΑΟΥΒΙΚΟΣ ΚΗΡΟΣ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS

232-399-4

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

**Περιγραφή**

Ανοικτοκάστανη προς ωχροκίτρινη σκόνη ή νιφάδες ή σκληρό και εύθρυπτο στερεό με ρητινώδη θραύσματα

**Ταυτοποίηση**

Ειδικό βάρος

0,997 περίπου

Πεδίο τιμών σημείου τήξης

Από 82 °C έως 86 °C

Διαλυτότητα

Αδιάλυτος στο νερό, εν μέρει διαλυτός σε ζέουσα αιθανόλη, διαλυτός σε χλωροφόρμιο και διαιθυλαιθέρα

**Καθαρότητα**

Θεϊκή τέφρα

0,25 % κατ' ανώτατο όριο

Βαθμός οξύτητας

Τουλάχιστον 2 και έως 7 κατ' ανώτατο όριο

Αριθμός σαπωνοποίησης

Τουλάχιστον 71 και έως 88 κατ' ανώτατο όριο

Ασαπωνοποίητες ύλες

Τουλάχιστον 50 % και έως 55 % κατ' ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 904 ΣΕΛΑΚ****Συνώνυμα**

Λευκασμένη γομολάκα· λευκή γομολάκα

**Ορισμός**Το σέλακ είναι η καθαρή και λευκασμένη λάκκα – το ρητινώδες έκκριμα – του εντόμου *Laccifer* (*Tachardia*) *lacca* Kerr (οικογένεια *Coccidae*)

Αριθ. EINECS

232-549-9

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

**Περιγραφή**

Λευκασμένο σέλακ — Υπόλευκη, άμορφη, κοκκώδης ρητίνη

Λευκασμένο σέλακ χωρίς κηρό — Ανοικτοκίτρινη, άμορφη, κοκκώδης ρητίνη

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Αδιάλυτο στο νερό, εύκολα διαλυτό (αν και με πολύ αργό ρυθμό) σε αλκοόλη, λίγο διαλυτό σε ακετόνη

Βαθμός οξύτητας

Από 60 έως 89



▼ **B****Καθαρότητα**

Απόλεια κατά την ξήρανση	6,0 % κατ' ανώτατο όριο [40 °C, υπεράνω πυριτικής πηκτής (silica gel), 15 ώρες,]
Κολοφόνιο	Απουσία
Κηρός	Λευκασμένο σέλακ: 5,5 % κατ' ανώτατο όριο Λευκασμένο σέλακ χωρίς κηρό: 0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 905 ΜΙΚΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΗΡΟΣ****Συνώνυμα**

Κηρός πετρελαίου· κηρός υδρογονανθράκων · κηρός Fischer-Tropsch· συνθετικός κηρός· συνθετική παραφίνη

**Ορισμός**

Εξευγενισμένα μείγματα στερεών, κορεσμένων υδρογονανθράκων, που λαμβάνονται από πετρέλαιο ή συνθετικές πρώτες ύλες

**Περιγραφή**

Λευκός έως κεχριμπαρόχρωμος, άσπιμος κηρός

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα	Αδιάλυτος στο νερό, πολύ λίγο διαλυτός στην αιθανόλη
Δείκτης διάθλασης	$[n]_D^{100}$ 1,434-1,448 Εναλλακτικά $[n]_D^{120}$ 1,426-1,440

**Καθαρότητα**

Μοριακό βάρος	Τουλάχιστον 500 (μέσο)
Ιξώδες	Τουλάχιστον $1,1 \times 10^{-5} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$ στους 100 °C Εναλλακτικά: Τουλάχιστον $0,8 \times 10^{-5} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$ στους 120 °C, εάν το προϊόν είναι στερεό στους 100 °C
Υπόλειμμα κατά την πύρωση	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Αριθμός ατόμων άνθρακα στο σημείο απόσταξης του 5 %	5 % μέγιστο ποσοστό μορίων με αριθμό ατόμων άνθρακα μικρότερο των 25
Χρώμα	Δοκιμή θετική
Θείο	0,4 % κ.β. κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Πολυκυκλικές αρωματικές ενώσεις	Βενζο[α]πυρένιο, 50 μg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 907 ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥ-1-ΔΕΚΕΝΙΟ****Συνώνυμα**

Υδρογονωμένο πολυδεκένιο-1· υδρογονωμένη πολυ-α-ολεφίνη

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	$C_{10n}H_{20n+2}$ όπου $n = 3 - 6$
Μοριακό βάρος	560 (μέσο)
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 98,5 % υδρογονωμένου πολυ-1-δεκενίου, με την ακόλουθη κατανομή ολιγομερών: $C_{30}$ : 13 – 37 % $C_{40}$ : 35 – 70 % $C_{50}$ : 9 – 25 % $C_{60}$ : 1 – 7 %

**▼ B**

<b>Περιγραφή</b>	
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο στο νερό· λίγο διαλυτό στην αιθανόλη· διαλυτό στο τολουόλιο
Καύση	Καίγεται με ζωηρή φλόγα, αναδίδοντας τη χαρακτηριστική οσμή της παραφίνης
Ιξώδες	Από $5,7 \times 10^{-6}$ έως $6,1 \times 10^{-6} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$ στους 100 °C
<b>Καθαρότητα</b>	
Ενώσεις με αριθμό ατόμων άνθρακα μικρότερο από 30	1,5 % κατ' ανώτατο όριο
Ουσίες που απανθρακώνονται εύκολα	Το χρώμα δοκιμαστικού σωλήνα που περιέχει θειικό οξύ και 5 g δείγματος υδρογονωμένου πολυ-1-δεκενίου, ύστερα από ανακίνηση επί 10 λεπτά σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας βρασμού, είναι έως αμυδρά αχροκίτρινο.
Νικέλιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M15****▼ B****E 914 ΚΗΡΟΣ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΩΝ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Πολικά προϊόντα αντίδρασης από ήπια οξείδωση πολυαιθυλενίου
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Οξειδωμένο πολυαιθυλένιο
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Σχεδόν λευκές νιφάδες, σκόνη, κόκκοι ή σφαιρίδια
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Πυκνότητα	Από 0,92 έως 1,05 (20 °C)
Σημείο στάξης	Μεγαλύτερο των 95 °C
<b>Καθαρότητα</b>	
Βαθμός οξύτητας	70 κατ' ανώτατο όριο
Ιξώδες	Τουλάχιστον $8,1 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$ στους 120 °C
Άλλοι τύποι κηρών	Δεν ανιχνεύονται (με θερμοδομετρία διαφορικής σάρωσης και/ή φασματοσκοπία υπερύθρου)
Οξυγόνο	9,5 % κατ' ανώτατο όριο
Χρώμιο	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ B**E 920 L-ΚΥΣΤΕΪΝΗ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Υδροχλωρική ή μονοένυδρη υδροχλωρική L-κυστεΐνη. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ανθρώπινα μαλλιά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αυτής της ουσίας

Αριθ. EINECS

200-157-7 (άνυδρο)

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

 $C_3H_7NO_2S \cdot HCl \cdot nH_2O$  (όπου  $n = 0$  ή  $1$ )

Μοριακό βάρος

157,62 (άνυδρο)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98,0 % και έως 101,5 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας

**Περιγραφή**

Λευκή σκόνη ή άχρωμοι κρύσταλλοι

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Εύκολα διαλυτή στο νερό και σε αιθανόλη

Πεδίο τιμών σημείου τήξης

Η άνυδρη μορφή τήκεται στους 175 °C περίπου

Ειδική στροφική ικανότητα

 $[\alpha]_D^{20}$ : από + 5,0° έως + 8,0° ή $[\alpha]_D^{25}$ : από + 4,9° έως 7,9°**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση

από 8,0 % έως 12,0 %

2,0 % κατ' ανώτατο όριο (άνυδρη μορφή)

Υπόλειμμα κατά την πύρωση

0,1 % κατ' ανώτατο όριο

Αμμωνιακά ιόντα

200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Αρσενικό

1,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 927b ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΟ****Συνώνυμα**

Ουρία

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS

200-315-5

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

 $CH_4N_2O$ 

Μοριακό βάρος

60,06

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 % επί άνυδρης ουσίας

**▼ B**

<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμη έως λευκή, πρισματική, κρυσταλλική σκόνη ή μικρά, λευκά σφαιρίδια
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Πολύ διαλυτό στο νερό Διαλυτό σε αιθανόλη
Καθίζηση με νιτρικό οξύ	Η δοκιμή κρίνεται θετική, εάν σχηματιστεί λευκό κρυσταλλικό ίζημα
Χρωματική αντίδραση	Η δοκιμή κρίνεται θετική, εάν εμφανιστεί ερυθροϊώδης χρώση
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	132 °C έως 135 °C
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	1,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 1 ώρα)
Θεική τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Ύλες αδιάλυτες σε αιθανόλη	0,04 % κατ' ανώτατο όριο
Αλκαλικότητα	Δοκιμή θετική
Αμμωνιακά ιόντα	500 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Διουρία	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 938 ΑΡΓΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-147-0
Χημική ονομασία	Αργό
Χημικός τύπος	Ar
Ατομικό βάρος	40
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 99 %
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμο, άοσμο, άφλεκτο αέριο
<b>Ταυτοποίηση</b>	
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	0,05 % κατ' ανώτατο όριο
Μεθάνιο και άλλοι υδρογονάνθρακες	100 μl/l κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενοι ως μεθάνιο)

**E 939 ΗΛΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-168-5
Χημική ονομασία	Ήλιο
Χημικός τύπος	He
Ατομικό βάρος	4
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 99 %

**▼ B**

<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμο, άοσμο, άφλεκτο αέριο
<b>Ταυτοποίηση</b>	
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	0,05 % κατ' ανώτατο όριο
Μεθάνιο και άλλοι υδρογονάνθρακες	100 μl/l κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενοι ως μεθάνιο)

**E 941 ΑΖΩΤΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	231-783-9
Χημική ονομασία	Άζωτο
Χημικός τύπος	N <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	28
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 99 %
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμο, άοσμο, άφλεκτο αέριο
<b>Ταυτοποίηση</b>	
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	0,05 % κατ' ανώτατο όριο
Μονοξειδίο του άνθρακα	10 μl/l κατ' ανώτατο όριο
Μεθάνιο και άλλοι υδρογονάνθρακες	100 μl/l κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενοι ως μεθάνιο)
Διοξειδίο και μείγμα οξειδίων του αζώτου	10 μl/l κατ' ανώτατο όριο
Οξυγόνο	1 % κατ' ανώτατο όριο

**E 942 ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	233-032-0
Χημική ονομασία	Υποξειδίο του αζώτου
Χημικός τύπος	N <sub>2</sub> O
Μοριακό βάρος	44
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 99 %
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμο, άφλεκτο αέριο, με σχετικά ευχάριστη οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	0,05 % κατ' ανώτατο όριο
Μονοξειδίο του άνθρακα	30 μl/l κατ' ανώτατο όριο
Διοξειδίο και μείγμα οξειδίων του αζώτου	10 μl/l κατ' ανώτατο όριο

**▼ B****E 943a ΒΟΥΤΑΝΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	n-Βουτάνιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Βουτάνιο
Χημικός τύπος	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
Μοριακό βάρος	58,12
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 96 %
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμο αέριο ή υγρό με ήπια, χαρακτηριστική οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Τάση ατμών	108,935 kPa στους 20 °C
<b>Καθαρότητα</b>	
Μεθάνιο	0,15 % v/v κατ' ανώτατο όριο
Αιθάνιο	0,5 % v/v κατ' ανώτατο όριο
Προπάνιο	1,5 % v/v κατ' ανώτατο όριο
Ισοβουτάνιο	3,0 % v/v κατ' ανώτατο όριο
Βουταδιένο-1,3	0,1 % v/v κατ' ανώτατο όριο
Υγρασία	0,005 % κατ' ανώτατο όριο

**E 943b ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	2-μεθυλοπροπάνιο
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	2-μεθυλοπροπάνιο
Χημικός τύπος	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH CH <sub>3</sub>
Μοριακό βάρος	58,12
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 94 %
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμο αέριο ή υγρό με ήπια, χαρακτηριστική οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Τάση ατμών	205,465 kPa στους 20 °C
<b>Καθαρότητα</b>	
Μεθάνιο	0,15 % v/v κατ' ανώτατο όριο
Αιθάνιο	0,5 % v/v κατ' ανώτατο όριο
Προπάνιο	2,0 % v/v κατ' ανώτατο όριο
n-Βουτάνιο	4,0 % v/v κατ' ανώτατο όριο
Βουταδιένο-1,3	0,1 % v/v κατ' ανώτατο όριο
Υγρασία	0,005 % κατ' ανώτατο όριο

**▼ B****E 944 ΠΡΟΠΑΝΙΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

**Περιγραφή****Ταυτοποίηση**

Τάση ατμών

**Καθαρότητα**

Μεθάνιο

Αιθάνιο

Ισοβουτάνιο

n-Βουτάνιο

Βουταδιένιο-1,3

Υγρασία

Προπάνιο

CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>

44,09

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 %

Άχρωμο αέριο ή υγρό με ήπια, χαρακτηριστική οσμή

732,910 kPa στους 20 °C

0,15 % v/v κατ' ανώτατο όριο

1,5 % v/v κατ' ανώτατο όριο

2,0 % v/v κατ' ανώτατο όριο

1,0 % v/v κατ' ανώτατο όριο

0,1 % v/v κατ' ανώτατο όριο

0,005 % κατ' ανώτατο όριο

**E 948 ΟΞΥΓΟΝΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

**Περιγραφή****Ταυτοποίηση****Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό

Μεθάνιο και άλλοι υδρογονάνθρακες

231-956-9

Οξυγόνο

O<sub>2</sub>

32

Τουλάχιστον 99 %

Άχρωμο, άοσμο, άφλεκτο αέριο

0,05 % κατ' ανώτατο όριο

100 μl/l κατ' ανώτατο όριο (υπολογιζόμενοι ως μεθάνιο)

**E 949 ΥΔΡΟΓΟΝΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

215-605-7

Υδρογόνο

H<sub>2</sub>

2

**▼ B**

Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,9 %
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμο, άοσμο, εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο
<b>Ταυτοποίηση</b>	
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	0,005 % v/v κατ' ανώτατο όριο
Οξυγόνο	0,001 % v/v κατ' ανώτατο όριο
Άζωτο	0,07 % v/v κατ' ανώτατο όριο

**E 950 ΑΚΕΣΟΥΛΦΑΜΗ Κ**

<b>Συνώνυμα</b>	Ακεσουλφάμη (άλας με Κ): άλας με κάλιο του 2,2-διοξειδίου της 3,4-διυδρο-6-μεθυλ-1,2,3-οξαθειαζινόνης-4
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	259-715-3
Χημική ονομασία	άλας με κάλιο του 6-μεθυλ-1,2,3-οξαθειαζιν-4(3H)-ονο-2,2-διοξειδίου
Χημικός τύπος	C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> KNO <sub>4</sub> S
Μοριακό βάρος	201,24
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> KNO <sub>4</sub> S τουλάχιστον 99 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμη, λευκή κρυσταλλική σκόνη, 200 φορές περίπου γλυκύτερη από τη σακχαρόζη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Πολύ διαλυτή στο νερό, πολύ λίγο διαλυτή στην αιθανόλη
Απορρόφηση υπεριώδους	Μέγιστο απορρόφησης 227 ± 2 nm για διάλυμα 10 mg σε 1 000 ml νερού
Δοκιμή καλίου	Δοκιμή θετική (υποβάλλεται σε δοκιμή το υπόλειμμα της πύρωσης 2 g δείγματος)
Δοκιμή καθίζησης	Σε διάλυμα 0,2 g δείγματος σε μείγμα 2 ml οξικού οξέος και 2 ml νερού προστίθενται λίγες σταγόνες διαλύματος κοβαλτινιτρώδους νατρίου 10 %. Σχηματίζεται κίτρινο ίζημα
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	1 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)
Οργανικές προσμείξεις	Δοκιμή θετική για 20 mg/kg συστατικών ενεργών στο υπεριώδες
Φθόριο	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 951 ΑΣΠΑΡΤΑΜΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Μεθυλεστέρας της ασπαρτυλοφαινυλαλανίνης
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	245-261-3
Χημική ονομασία	1-μεθυλεστέρας της N-(L-α-ασπαρτυλο)-L-φαινυλαλανίνης, 3-αμινο-N-(α-καρβομεθοξυ-φαινηθυλο)ηλεκτραμικός N-μεθυλεστέρας
Χημικός τύπος	C <sub>14</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
Μοριακό βάρος	294,31



## ▼ B

Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε $C_{14}H_{18}N_2O_5$ τουλάχιστον 98 % και έως 102 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή, άοσμη, κρυσταλλική σκόνη με γλυκεϊά γεύση, 200 φορές περίπου γλυκύτερη από τη σακχαρόζη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Λίγο διαλυτή στο νερό και στην αιθανόλη
pH	Από 4,5 έως 6,0 (διάλυμα 1:125)
Ειδική στροφική ικανότητα	$[\alpha]_D^{20}$ : + 14,5° έως + 16,5° Προσδιορίζεται σε διάλυμα 4:100 σε μυρμηκικό οξύ 15N εντός 30 λεπτών από την παρασκευή του διαλύματος του δείγματος
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	4,5 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)
Θειική τέφρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Διαπερατότητα	Η διαπερατότητα διαλύματος 1 % σε υδροχλωρικό οξύ 2N, προσδιοριζόμενη σε κυψελίδα 1 cm στα 430 nm με κατάλληλο φασματοφωτόμετρο και με υδροχλωρικό οξύ 2N ως διάλυμα αναφοράς, είναι τουλάχιστον 0,95, ισοδύναμη με απορρόφηση 0,022 περίπου κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί ξηρού)
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί ξηρού)
5-βενζυλο-3,6-διοξο-2-πιπεραζινοξικό οξύ	1,5 % κατ' ανώτατο όριο (επί ξηρού)

**E 952 ΚΥΚΛΑΜΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟ**

## (i) ΚΥΚΛΑΜΙΚΟ ΟΞΥ

<b>Συνώνυμα</b>	Κυκλοεξυλοσουλφαμικό οξύ· ένωση του κυκλαμικού οξέος
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	202-898-1
Χημική ονομασία	Κυκλοεξανοσουλφαμικό οξύ· κυκλοεξυλαμινοσουλφονικό οξύ
Χημικός τύπος	$C_6H_{13}NO_3S$
Μοριακό βάρος	179,24
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα του κυκλοεξυλοσουλφαμικού οξέος σε $C_6H_{13}NO_3S$ τουλάχιστον 98 % και έως το ισοδύναμο του 102 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Πρακτικά άχρωμη, λευκή κρυσταλλική σκόνη. 40 φορές περίπου γλυκύτερη από τη σακχαρόζη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτά στο νερό και σε αιθανόλη
Δοκιμή καθίζησης	Διάλυμα 2 % οξινίζεται με υδροχλωρικό οξύ, προστίθεται 1 ml ενός κατά προσέγγιση γραμμομοριακού υδατικού διαλύματος χλωριούχου βαρίου και εφόσον εμφανιστεί θόλωμα ή σχηματιστεί ίζημα, το διάλυμα διηθείται. Στο διαυγές διάλυμα προστίθεται 1 ml διαλύματος νιτρώδους νατρίου 10 %. Σχηματίζεται λευκό ίζημα.
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	1 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 1 ώρα)
Σελήνιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη σε σελήνιο επί ξηρού)

**▼ B**

Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Κυκλοεξυλαμίνη	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Δικυκλοεξυλαμίνη	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Ανιλίνη	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
<b>(ii) ΚΥΚΛΑΜΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ</b>	
<b>Συνώνυμα</b>	Ένωση του κυκλαμικού οξέος· άλας με νάτριο του κυκλαμικού οξέος
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	205-348-9
Χημική ονομασία	Κυκλοεξανοσουλφαμικό νάτριο· κυκλοεξυλοσουλφαμικό νάτριο
Χημικός τύπος	$C_6H_{12}NNaO_3S$ και η διένυδρη μορφή $C_6H_{12}NNaO_3S \cdot 2H_2O$
Μοριακό βάρος	201,22 για την άνυδρη μορφή 237,22 για την ένυδρη μορφή
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 98 % και έως 102 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηράς ουσίας Διένυδρη μορφή: τουλάχιστον 84 % επί ξηράς ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμοι κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη λευκού χρώματος, 30 φορές περίπου γλυκύτερο από τη σακχαρόζη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτό σε νερό, πρακτικά αδιάλυτο σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	1 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 1 ώρα) 15,2 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες) για τη διένυδρη μορφή
Σελήνιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη σε σελήνιο επί ξηρού)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Κυκλοεξυλαμίνη	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Δικυκλοεξυλαμίνη	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Ανιλίνη	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
<b>(iii) ΚΥΚΛΑΜΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ</b>	
<b>Συνώνυμα</b>	Ένωση του κυκλαμικού οξέος· άλας με ασβέστιο του κυκλαμικού οξέος
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	205-349-4
Χημική ονομασία	Κυκλοεξανοσουλφαμικό ασβέστιο· κυκλοεξυλοσουλφαμικό ασβέστιο
Χημικός τύπος	$C_{12}H_{24}CaN_2O_6S_2 \cdot 2H_2O$
Μοριακό βάρος	432,57
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 98 % και έως 101 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηράς ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί, άχρωμοι κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη, 30 φορές περίπου γλυκύτερο από τη σακχαρόζη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτό στο νερό, μέτρια διαλυτό σε αιθανόλη

**▼ B****Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	1 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 1 ώρα) 8,5 % κατ' ανώτατο όριο (140 °C, 4 ώρες) για τη διένυδρη μορφή
Σελήνιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη σε σελήνιο επί ξηρού)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Κυκλοεξυλαμίνη	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Δικυκλοεξυλαμίνη	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Ανιλίνη	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)

**E 953 ISOMALT (ΙΣΟΜΑΛΤΙΤΟΛΗ)****Συνώνυμα**

Υδρογονωμένη ισομαλτουλόζη

**Ορισμός**

Παρασκευάζεται με ενζυμική μετατροπή σακχαρόζης με μη βιώσιμα κύτταρα του βακτηρίου *Protaminobacter rubrum*, την οποία ακολουθεί καταλυτική υδρογόνωση

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Η ισομαλτιτόλη είναι μείγμα υδρογονωμένων μονο- και δισακχαριτών με βασικά συστατικά τους δισακχαρίτες:

6-O-α-D-γλυκοπυρανοζυλο-D-σορβιτόλη (1,6-GPS) και  
διένυδρη 1-O-α-D-γλυκοπυρανοζυλο-D-μαννιτόλη (1,1-GPM)

Χημικός τύπος

6-O-α-D-γλυκοπυρανοζυλο-D-σορβιτόλη:  $C_{12}H_{24}O_{11}$   
διένυδρη 1-O-α-D-γλυκοπυρανοζυλο-D-μαννιτόλη:  $C_{12}H_{24}O_{11} \cdot 2H_2O$

Μοριακό βάρος

6-O-α-D-γλυκοπυρανοζυλο-D-σορβιτόλη: 344,3  
διένυδρη 1-O-α-D-γλυκοπυρανοζυλο-D-μαννιτόλη: 380,3

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε υδρογονωμένους μονο- και δισακχαρίτες τουλάχιστον 98 % και σε μείγμα 6-O-α-D-γλυκοπυρανοζυλο-D-σορβιτόλης και διένυδρης 1-O-α-D-γλυκοπυρανοζυλο-D-μαννιτόλης τουλάχιστον 86 %, προσδιοριζόμενη επί άνυδρης ουσίας.

**▼ M4****Περιγραφή**

Άοσμη, λευκή, ελαφρώς υγροσκοπική, κρυσταλλική μάζα ή υδατικό διάλυμα με ελάχιστη συγκέντρωση 60 %

**▼ B****Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Αδιάλυτη στο νερό, πολύ λίγο διαλυτή στην αιθανόλη.

Δοκιμή HPLC

Από τη σύγκριση με κατάλληλη πρότυπη ισομαλτιτόλη αναφοράς προκύπτει ότι οι 2 κύριες κορυφές στο χρωματογράφημα του διαλύματος δοκιμής είναι παρόμοιες ως προς τον χρόνο κατακράτησης με τις 2 κύριες κορυφές του χρωματογραφήματος του διαλύματος αναφοράς.

**▼ M4****Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό

7 % κατ' ανώτατο όριο για στέρεο προϊόν (μέθοδος Karl Fischer)

Αγωγιμότητα

Όχι περισσότερο από 20  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (σε διάλυμα 20 % ξηρής ύλης) σε θερμοκρασία 20 °C

D-μαννιτόλη

3 % κατ' ανώτατο όριο

D-σορβιτόλη

6 % κατ' ανώτατο όριο

▼ **M4**

Αναγωγικά σάκχαρα	0,3 % κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε γλυκόζη επί ξηρού)
Νικέλιο	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενο επί ξηρού)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενο επί ξηρού)
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενο επί ξηρού)

▼ **B****E 954 ΣΑΚΧΑΡΙΝΕΣ**

## (i) ΣΑΚΧΑΡΙΝΗ

**Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS	201-321-0
Χημική ονομασία	3-οξο-2,3-δihυδροβενζο(d)ισοθειαζολο-1,1-dιοξειδίο
Χημικός τύπος	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>3</sub> S
Μοριακό βάρος	183,18
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>3</sub> S τουλάχιστον 99 % και έως 101 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας

**Περιγραφή**

Λευκοί κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη, άοσμα ή με ελαφρά αρωματική οσμή, 300 έως 500 φορές περίπου γλυκύτερη από τη σακχαρόζη

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα	Λίγο διαλυτή στο νερό, διαλυτή σε αλκαλικά διαλύματα, μέτρια διαλυτή στην αιθανόλη
-------------	--

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	1 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	226 έως 230 °C
Θειική τέφρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Βενζοϊκό και σαλικυλικό οξύ	Σε 10 ml διαλύματος 1:20, το οποίο έχει προηγουμένως οξιμιστεί με 5 σταγόνες οξικού οξέος, προστίθενται 3 σταγόνες ενός κατά προσέγγιση γραμμομοριακού υδατικού διαλύματος χλωριούχου σιδήρου (III). Δεν εμφανίζεται ίζημα ή ιώδης χρώση
ο-Τολουολοσουλφοναμίδιο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
p-Τολουολοσουλφοναμίδιο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
p-Σουλφοναμίδιο του βενζοϊκού οξέος	25 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Ουσίες που απαριθμούνται εύκολα	Απουσία
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Σελήνιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)

## (ii) ΣΑΚΧΑΡΙΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

**Συνώνυμα**

Σακχαρίνη· άλας με νάτριο της σακχαρίνης

**Ορισμός**

Αριθ. EINECS	204-886-1
Χημική ονομασία	ο-Βενζοσουλφιμιδικό νάτριο· άλας με νάτριο του 2,3-dihυδρο-3-οξο-βενζισοσουλφοναζολίου· οξοβενζισοσουλφοναζόλιο· διένυδρο άλας με νάτριο του 1,2-βενζισοθειαζολιν-3-ονο-1,1-dιοξειδίου

**▼ B**

Χημικός τύπος	$C_7H_4NNaO_3S \cdot 2H_2O$
Μοριακό βάρος	241,19
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε $C_7H_4NNaO_3S$ τουλάχιστον 99 % και έως 101 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική, αποσπασμένη σκόνη, άοσμα ή με ελαφρά οσμή, 300 έως 500 φορές περίπου γλυκύτερο από τη σακχαρόζη σε αραιά διαλύματα.
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό, μέτρια διαλυτό σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	15 % κατ' ανώτατο όριο (120 °C, 4 ώρες)
Βενζοϊκό και σαλικυλικό οξύ	Σε 10 ml διαλύματος 1:20, το οποίο έχει προηγουμένως οξιμιστεί με 5 σταγόνες οξικού οξέος, προστίθενται 3 σταγόνες ενός κατά προσέγγιση γραμμομοριακού υδατικού διαλύματος χλωριούχου σιδήρου(III). Δεν εμφανίζεται ίζημα ή ιώδης χρώση
ο-Τολουολοσουλφοναμίδιο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
p-Τολουολοσουλφοναμίδιο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
p-σουλφοναμίδιο του βενζοϊκού οξέος	25 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Ουσίες που απανθρακώνονται εύκολα	Απουσία
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Σελήνιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
<b>(iii) ΣΑΚΧΑΡΙΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ</b>	
<b>Συνώνυμα</b>	Σακχαρίνη· άλας με ασβέστιο της σακχαρίνης
<b>Ορισμός</b>	
Χημική ονομασία	ο-Βενζοσουλφιμιδικό ασβέστιο· άλας με ασβέστιο του 2,3-διυδρο-3-οξοβενζισοσουλφοναζολίου· ένυδρο (7:2) άλας με ασβέστιο του 1,2-βενζισοθειαζολιν-3-ονο-1,1-διοξειδίου
Αριθ. EINECS	229-349-9
Χημικός τύπος	$C_{14}H_8CaN_2O_6S_2 \cdot 3\frac{1}{2}H_2O$
Μοριακό βάρος	467,48
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε $C_{14}H_8CaN_2O_6S_2$ τουλάχιστον 95 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη, άοσμα ή με ελαφρά οσμή, 300 έως 500 φορές περίπου γλυκύτερο από τη σακχαρόζη σε αραιά διαλύματα.
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό, διαλυτό σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	13,5 % κατ' ανώτατο όριο (120 °C, 4 ώρες)
Βενζοϊκό και σαλικυλικό οξύ	Σε 10 ml διαλύματος 1:20, το οποίο έχει προηγουμένως οξιμιστεί με 5 σταγόνες οξικού οξέος, προστίθενται 3 σταγόνες ενός κατά προσέγγιση γραμμομοριακού υδατικού διαλύματος χλωριούχου σιδήρου (III). Δεν εμφανίζεται ίζημα ή ιώδης χρώση

## ▼ B

ο-Τολουολοσουλφοναμίδιο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο εκφραζόμενη επί ξηρού
p-Τολουολοσουλφοναμίδιο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο εκφραζόμενη επί ξηρού
p-Σουλφοναμίδιο του βενζοϊκού οξέος	25 mg/kg κατ' ανώτατο όριο εκφραζόμενη επί ξηρού
Ουσίες που απανθρακώνονται εύκολα	Απουσία
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Σελήνιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
<b>(iv) ΣΑΚΧΑΡΙΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ</b>	
<b>Συνώνυμα</b>	Σακχαρίνη· άλας με κάλιο της σακχαρίνης
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	ο-Βενζοσουλφιμιδικό κάλιο· άλας με κάλιο του 2,3-διυδρο-3-οξο-βενζισοσουλφοναζολίου· μονοένυδρο άλας με κάλιο του 1,2-βενζισοθειαζολιν-3-ονο-1,1-διοξειδίου
Χημικός τύπος	C <sub>7</sub> H <sub>4</sub> KNO <sub>3</sub> S·H <sub>2</sub> O
Μοριακό βάρος	239,77
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε C <sub>7</sub> H <sub>4</sub> KNO <sub>3</sub> S τουλάχιστον 99 % και έως 101 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη, άοσμη ή με ελαφρά οσμή και με εντόνως γλυκιά γεύση, ακόμη και σε πολύ αραιά διαλύματα, 300 έως 500 φορές περίπου γλυκύτερο από τη σακχαρόζη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτό στο νερό, μέτρια διαλυτό σε αιθανόλη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	8 % κατ' ανώτατο όριο (120 °C, 4 ώρες)
Βενζοϊκό και σαλικυλικό οξύ	Σε 10 ml διαλύματος 1 προς 20, το οποίο έχει προηγουμένως οξινιστεί με 5 σταγόνες οξικού οξέος, προστίθενται 3 σταγόνες ενός κατά προσέγγιση γραμμομοριακού υδατικού διαλύματος χλωριούχου σιδήρου (III). Δεν εμφανίζεται ίζημα ή ιώδης χρώση
ο-Τολουολοσουλφοναμίδιο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
p-Τολουολοσουλφοναμίδιο	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
p-Σουλφοναμίδιο του βενζοϊκού οξέος	25 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Ουσίες που απανθρακώνονται εύκολα	Απουσία
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Σελήνιο	30 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)

**E 955 ΣΟΥΚΡΑΛΟΖΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	4,1',6'-Τριχλωρογαλακτοσακχαρόζη
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	259-952-2
Χημική ονομασία	1,6-διχλωρο-1,6-διδεσοξυ-β-D-φρουκτοφουρανοζυλο-4-χλωρο-4-δεσοξυ-α-D-γαλακτοπυρανοζίτης
Χημικός τύπος	C <sub>12</sub> H <sub>19</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>8</sub>
Μοριακό βάρος	397,64

## ▼ B

Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε $C_{12}H_{19}Cl_3O_8$ τουλάχιστον 98 % και έως 102 % κατ' ανώτατο όριο επί άνυδρης ουσίας.
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή έως υπόλευκη, πρακτικά άοσμη κρυσταλλική σκόνη.
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτή στο νερό, τη μεθανόλη και την αιθανόλη Λίγο διαλυτή στον οξικό αιθυλεστέρα
Φάσμα απορρόφησης υπερύθρου	Το φάσμα υπερύθρου κολλοειδούς διαλύματος του δείγματος σε βρωμιούχο κάλιο εμφανίζει σχετικά μέγιστα στα ίδια περίπου μήκη κύματος με εκείνα του φάσματος αναφοράς που λαμβάνεται με τη χρήση πρότυπης σουκραλόζης αναφοράς.
Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας	Η κύρια κηλίδα που αντιστοιχεί στο διάλυμα δοκιμής έχει την ίδια τιμή Rf με εκείνη της κύριας κηλίδας του πρότυπου διαλύματος Α που χρησιμοποιείται στη δοκιμή άλλων χλωριωμένων δισακχαριτών. Αυτό το πρότυπο διάλυμα παρασκευάζεται με τη διάλυση 1,0 g πρότυπης σουκραλόζης αναφοράς σε 10 ml μεθανόλης.
Ειδική στροφική ικανότητα	$[\alpha]_D^{20} + 84,0^\circ$ έως $+ 87,5^\circ$ υπολογιζόμενη επί άνυδρης ουσίας (υδατικό διάλυμα 10 % w/v)
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	2,0 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Θεική τέφρα	0,7 % κατ' ανώτατο όριο
Άλλοι χλωριωμένοι δισακχαρίτες	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Χλωριωμένοι μονοσακχαρίτες	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Τριφαινολοφωσφονοξείδιο	150 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μεθανόλη	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## E 957 ΘΑΥΜΑΤΙΝΗ

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	258-822-2
Χημική ονομασία	Η θαυματίνη λαμβάνεται με υδατική εκχύλιση (pH 2,5 έως 4,0) των επισπέρμιων του καρπού στελεχών του φυτού <i>Thaumatococcus daniellii</i> (Benth) και αποτελείται ουσιαστικά από τις πρωτεΐνες θαυματίνη I και θαυματίνη II μαζί με μικρότερες ποσότητες φυτικών συστατικών που προέρχονται από την πρώτη ύλη
Χημικός τύπος	Πολυπεπτίδιο με 207 αμινοξέα
Μοριακό βάρος	Θαυματίνη I 22209 Θαυματίνη II 22293
Δοκιμασία	Ελάχιστη περιεκτικότητα σε άζωτο 15,1 % επί ξηράς ουσίας, ισοδύναμη με περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες τουλάχιστον 93 % ( $N \times 6,2$ )
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμη σκόνη υπόλευκου χρώματος, 2 000 έως 3 000 φορές περίπου γλυκύτερη από τη σακχαρόζη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Πολύ διαλυτή στο νερό, αδιάλυτη σε ακετόνη
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	9 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C μέχρι σταθερού βάρους)
Υδατάνθρακες	3 % κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Θεική τέφρα	2 % κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Αργίλιο	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)

**▼ B**

Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Μόλυβδος	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
Ολικός αριθμός αεροβίων μικροβίων	1 000 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 1 g

**E 959 ΝΕΟΕΣΠΕΡΙΔΙΝΗ DC**

<b>Συνώνυμα</b>	Διυδροχάλκωνη νεοεσπεριδίνης· NHDC· διυδροχάλκωνο-4'-β-νεοεσπεριδοζίνη εσπερετίνης· νεοεσπεριδίνη DC
<b>Ορισμός</b>	Λαμβάνεται με καταλυτική υδρογόνωση της νεοεσπεριδίνης
Αριθ. EINECS	243-978-6
Χημική ονομασία	Διυδροχάλκωνη 2-O-α-L-ραμνοπυρανοζυλο-4'-β-D-γλυκοπυρανοζυλοεσπερετίνης
Χημικός τύπος	C <sub>28</sub> H <sub>36</sub> O <sub>15</sub>
Μοριακό βάρος	612,6
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 96 % επί ξηράς ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Υπόλευκη, άοσμη, κρυσταλλική σκόνη 1 000 έως 1 800 φορές περισσότερο γλυκύτερη από τη σακχαρόζη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτή σε θερμό νερό, πολύ λίγο διαλυτή σε κρύο νερό, πρακτικά αδιάλυτη σε αιθέρα και βενζόλιο
Μέγιστο απορρόφησης υπεριώδους	282 έως 283 nm για διάλυμα 2 mg σε 100 ml μεθανόλης
Δοκιμή Neu	Διαλύονται περίπου 10 mg νεοεσπεριδίνης DC σε 1 ml μεθανόλης και προστίθεται 1 ml μεθανολικού διαλύματος βορικού 2-αμιναιθυλοδιφαινυλίου. Εμφανίζεται έντονη κίτρινη χρώση
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	11 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 3 ώρες)
Θεική τέφρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο εκφραζόμενη επί ξηρού
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)

**▼ M33****E 960a ΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΣΤΕΒΙΟΛΗΣ ΑΠΟ ΣΤΕΒΙΑ****▼ M21**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Η διαδικασία παρασκευής περιλαμβάνει δύο κύρια στάδια: το πρώτο στάδιο συνίσταται σε εκχύλιση με νερό των φύλλων του φυτού <i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni και αρχικό καθαρισμό του εκχυλίσματος με χρωματογραφία ιοντοαντάλλαξης για να παραχθεί το αρχικό εκχύλισμα γλυκοζιτών της στεβιόλης, ενώ κατά το δεύτερο στάδιο, οι γλυκοζίτες της στεβιόλης ανακρυσταλλώνονται από μεθανόλη ή υδατικό διάλυμα αιθανόλης και το τελικό προϊόν αποτελείται τουλάχιστον κατά 95 % από τους 11 συγγενείς γλυκοζίτες της στεβιόλης που αναφέρονται παρακάτω, σε οποιονδήποτε συνδυασμό ή αναλογία.  Το πρόσθετο μπορεί να περιέχει υπολείμματα των ιοντοανταλλακτικών ρητινών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παρασκευή. Πολλοί άλλοι συγγενείς γλυκοζίτες της στεβιόλης, οι οποίοι παράγονται κατά τη διεργασία παρασκευής αλλά δεν απαντούν στο φυτό <i>Stevia rebaudiana</i> , ανιχνεύονται σε μικρές ποσότητες (0,10 έως 0,37 % w/w).



## ▼ M21

Χημική ονομασία

Στεβιολοβιοζίτης: 13-[(2-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκό οξύ

Ρουβουσοζίτης: 13-β-D-γλυκοπυρανοζυλοξυκαουρ-16-εν-18-οϊκός β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας

Δουλοκοζίτης A: 13-[(2-O-α-L-ραμνοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας

Στεβιοζίτης: 13-[(2-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας

Ρεβαουδιοζίτης A: 13-[(2-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-3-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας

Ρεβαουδιοζίτης B: 13-[(2-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-3-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκό οξύ

Ρεβαουδιοζίτης C: 13-[(2-O-α-L-ραμνοπυρανοζυλο-3-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας

Ρεβαουδιοζίτης D: 13-[(2-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-3-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός 2-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας

Ρεβαουδιοζίτης E: 13-[(2-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός 2-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας

Ρεβαουδιοζίτης F: 13-[2-O-β-D-ξυλοφουρανοζυλο-3-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας

Ρεβαουδιοζίτης M: 13-[(2-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-3-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός 2-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-3-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας

Μοριακός τύπος

Κοινή ονομασία	Τύπος	Συντελεστής μετατροπής
Στεβιόλη	C <sub>20</sub> H <sub>30</sub> O <sub>3</sub>	1,00
Στεβιολοβιοζίτης	C <sub>32</sub> H <sub>50</sub> O <sub>13</sub>	0,50
Ρουβουσοζίτης	C <sub>32</sub> H <sub>50</sub> O <sub>13</sub>	0,50
Δουλοκοζίτης A	C <sub>38</sub> H <sub>60</sub> O <sub>17</sub>	0,40
Στεβιοζίτης	C <sub>38</sub> H <sub>60</sub> O <sub>18</sub>	0,40
Ρεβαουδιοζίτης A	C <sub>44</sub> H <sub>70</sub> O <sub>23</sub>	0,33
Ρεβαουδιοζίτης B	C <sub>38</sub> H <sub>60</sub> O <sub>18</sub>	0,40
Ρεβαουδιοζίτης C	C <sub>44</sub> H <sub>70</sub> O <sub>22</sub>	0,34
Ρεβαουδιοζίτης D	C <sub>50</sub> H <sub>80</sub> O <sub>28</sub>	0,29
Ρεβαουδιοζίτης E	C <sub>44</sub> H <sub>70</sub> O <sub>23</sub>	0,33
Ρεβαουδιοζίτης F	C <sub>43</sub> H <sub>68</sub> O <sub>22</sub>	0,34
Ρεβαουδιοζίτης M	C <sub>56</sub> H <sub>90</sub> O <sub>33</sub>	0,25

▼ **M21**

Μοριακό βάρος και αριθ. CAS	Κοινή ονομασία	Αριθμός CAS	Μοριακό βάρος (σε g/mol)
	Στεβιόλη		318,46
	Στεβιολοβιοζίτης	41093-60-1	642,73
	Ρουβουσοζίτης	64849-39-4	642,73
	Δουλοκοζίτης A	64432-06-0	788,87
	Στεβιοζίτης	57817-89-7	804,88
	Ρεβαουδιοζίτης A	58543-16-1	967,01
	Ρεβαουδιοζίτης B	58543-17-2	804,88
	Ρεβαουδιοζίτης C	63550-99-2	951,02
	Ρεβαουδιοζίτης D	63279-13-0	1 129,15
	Ρεβαουδιοζίτης E	63279-14-1	967,01
	Ρεβαουδιοζίτης F	438045-89-7	936,99
	Ρεβαουδιοζίτης M	1220616-44-3	1 291,30
Δοκιμασία	Ελάχιστη περιεκτικότητα σε στεβιολοβιοζίτη, ρουβουσοζίτη, δουλοκοζίτη A, στεβιοζίτη, ρεβαουδιοζίτες A, B, C, D, E, F και M 95 % επί ξηρού, σε οποιονδήποτε συνδυασμό και αναλογία.		
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή έως υποκίτρινη σκόνη, 200 έως 350 φορές περίπου γλυκύτερη από τη σακχαρόζη (σε 5 % ισοδυναμία σακχαρόζης).		
<b>Ταυτοποίηση</b>			
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτοί έως λίγο διαλυτοί στο νερό		
pH	Από 4,5 έως 7,0 (διάλυμα 1:100)		
<b>Καθαρότητα</b>			
Ολική τέφρα	1 % κατ' ανώτατο όριο		
Απώλεια κατά την ξήρανση	6 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)		
Υπολειμματικοί διαλύτες	200 mg/kg μεθανόλης κατ' ανώτατο όριο 5 000 mg/kg αιθανόλης κατ' ανώτατο όριο		
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο		
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο		

▼ **M33****E 960c(i) ΡΕΒΑΟΥΔΙΟΖΙΤΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΙΤΩΝ ΣΤΕΒΙΟΛΗΣ ΑΠΟ ΣΤΕΒΙΑ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	<p>Ο ρεβαουδιοζίτης M είναι γλυκοζίτης στεβιόλης που αποτελείται κυρίως από ρεβαουδιοζίτη M με μικρές ποσότητες άλλων γλυκοζιτών στεβιόλης, όπως ο ρεβαουδιοζίτης A, ο ρεβαουδιοζίτης B, ο ρεβαουδιοζίτης D, ο ρεβαουδιοζίτης I και ο στεβιοζίτης.</p> <p>Ο ρεβαουδιοζίτης M λαμβάνεται μέσω ενζυμικής βιομετατροπής κεκαθαμένων εκχυλισμάτων γλυκοζιτών στεβιόλης (95 % γλυκοζίτες στεβιόλης) από φυτά <i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni με χρήση ενζύμων UDP-γλυκοζυλοτρανσφεράσης και συνθάσης σακχαρόζης που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους ζυμομύκητες <i>K. phaffii</i> (παλαιότερα γνωστό ως <i>Pichia pastoris</i>) UGT-a και <i>K. phaffii</i> UGT-b, τα οποία επιτελούν τη μεταφορά γλυκόζης από σακχαρόζη και UDP-γλυκόζη σε γλυκοζίτες στεβιόλης μέσω γλυκοζιτικών δεσμών.</p>

▼ **M33**

	Μετά την απομάκρυνση των ενζύμων με διαχωρισμό στερεού-υγρού και θερμική επεξεργασία, ο καθαρισμός περιλαμβάνει συμπύκνωση του ρεβαουδιοζίτη Μ με προσρόφηση σε ρητίνη, ακολουθούμενη από επανακρυστάλλωση του ρεβαουδιοζίτη Μ από την οποία προκύπτει τελικό προϊόν που περιέχει τουλάχιστον 95 % ρεβαουδιοζίτη Μ. ► <b>M38</b> Βιώσιμα κότταρα των ζυμομυκήτων <i>K. phaffii</i> UGT-a και <i>K. phaffii</i> UGT-b και το DNA τους δεν ανιχνεύονται στο πρόσθετο τροφίμων. ◀		
Χημική ονομασία	Ρεβαουδιοζίτης Μ: 13-[(2-O-β-D-γλυκοκυρανοζυλο-3-O-β-D-γλυκοκυρανοζυλο-β-D-γλυκοκυρανοζυλο)οξυ]καουρ-16-εν-18-οϊκός 2-O-β-D-γλυκοκυρανοζυλο-3-O-β-D-γλυκοκυρανοζυλο-β-D-γλυκοκυρανοζυλεστέρας		
Μοριακός τύπος	Κοινή ονομασία	Τύπος	Συντελεστής μετατροπής
	Ρεβαουδιοζίτης Μ	C <sub>56</sub> H <sub>90</sub> O <sub>33</sub>	0,25
Μοριακό βάρος και αριθ. CAS	Κοινή ονομασία	Αριθμός CAS	Μοριακό βάρος (σε g/mol)
	Ρεβαουδιοζίτης Μ	1220616-44-3	1 291,29
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 95 % ρεβαουδιοζίτης Μ επί ξηράς ουσίας.		
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή έως υποκίτρινη σκόνη, 200 έως 350 φορές περίπου γλυκύτερη από τη σακχαρόζη (σε 5 % ισοδυναμία σακχαρόζης).		
<b>Ταυτοποίηση</b>			
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτός έως λίγο διαλυτός στο νερό		
pH	Από 4,5 έως 7,0 (διάλυμα 1:100)		
<b>Καθαρότητα</b>			
Ολική τέφρα	1 % κατ' ανώτατο όριο		
Απώλεια κατά την ξήρανση	6 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)		
Υπολειμματικός διαλύτης	5 000 mg/kg αιθανόλης κατ' ανώτατο όριο		
Αρσενικό	0,015 mg/kg κατ' ανώτατο όριο		
Μόλυβδος	0,2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο		
Κάδμιο	0,015 mg/kg κατ' ανώτατο όριο		
Υδράργυρος	0,07 mg/kg κατ' ανώτατο όριο		
Υπολειμματική πρωτεΐνη	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο		
Μέγεθος σωματιδίων	74 μm τουλάχιστον [με κόσκινο βροχίδων #200 με όριο μεγέθους σωματιδίων 74 μm]		

## ▼ M38

**Ε 960c(ii) ΡΕΒΑΟΥΔΙΟΖΙΤΗΣ Μ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΡΕΒΑΟΥΔΙΟΖΙΤΗ Α ΑΠΟ ΚΕΚΑΘΑΡΜΕΝΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΛΛΩΝ ΣΤΕΒΙΑΣ**

<b>Συνώνυμα</b>			
<b>Ορισμός</b>	<p>Ο ρεβαουδιοζίτης Μ που παράγεται μέσω ενζυμικής μετατροπής ρεβαουδιοζίτη Α ο οποίος προέρχεται από κεκαθαρμένα εκχυλίσματα φύλλων στέβιας είναι γλυκοζίτης στεβιόλης που αποτελείται κυρίως από ρεβαουδιοζίτη Μ με μικρές ποσότητες άλλων γλυκοζιτών στεβιόλης, όπως ο ρεβαουδιοζίτης Α και ο ρεβαουδιοζίτης D.</p> <p>Ο ρεβαουδιοζίτης Μ παράγεται μέσω ενζυμικής μετατροπής του ρεβαουδιοζίτη Α (γλυκοζίτης στεβιόλης) από κεκαθαρμένα εκχυλίσματα (95 % γλυκοζίτες στεβιόλης) τα οποία λαμβάνονται από το φυτό <i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni με τη χρήση ενζύμων UDP-γλυκοσυλοτρανσφεράσης και συνθάσης σακχαρόζης που παράγονται από τα γενετικά τροποποιημένα στελέχη <i>E. coli</i> (pPM294, pFAF170 και pSK401) τα οποία επιτελούν τη μεταφορά γλυκόζης από σακχαρόζη και UDP-γλυκόζη σε γλυκοζίτες στεβιόλης μέσω γλυκοζιτικών δεσμών. Μετά την απομάκρυνση των ενζύμων με διαχωρισμό στερεού-υγρού και θερμική επεξεργασία, ο καθαρισμός περιλαμβάνει συμπύκνωση του ρεβαουδιοζίτη Μ με προσρόφηση σε ρητίνη, ακολουθούμενη από επανακρυστάλλωση των γλυκοζιτών στεβιόλης από την οποία προκύπτει τελικό προϊόν που περιέχει τουλάχιστον 95 % ρεβαουδιοζίτη Μ. Βιόσιμα κύτταρα <i>E. coli</i> (pPM294, pFAF170 και pSK401) και το DNA τους δεν ανιχνεύονται στο πρόσθετο τροφίμων.</p>		
Χημική ονομασία	Ρεβαουδιοζίτης Μ: 13-[(2-Ο-β-D-γλυκοπιρανοζυλο-3-Ο-β-D-γλυκοπιρανοζυλο-β-D-γλυκοπιρανοζυλ)οξυ]καουρ-16-εν-18-οϊκός 2-Ο-β-D-γλυκοπιρανοζυλο-3-Ο-β-D-γλυκοπιρανοζυλο-β-D-γλυκοπιρανοζυλεστέρας		
Μοριακός τύπος	Κοινή ονομασία	Τύπος	Συντελεστής μετατροπής
	Ρεβαουδιοζίτης Μ	C <sub>56</sub> H <sub>90</sub> O <sub>33</sub>	0,25
Μοριακό βάρος και αριθ. CAS	Κοινή ονομασία	Αριθμός CAS	Μοριακό βάρος (σε g/mol)
	Ρεβαουδιοζίτης Μ	1220616-44-3	1 291,29
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 95 % ρεβαουδιοζίτης Μ επί ξηράς ουσίας.		
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή έως υποκίτρινη σκόνη, 150 έως 350 φορές περίπου γλυκύτερη από τη σακχαρόζη (σε 5 % ισοδυναμία σακχαρόζης).		
<b>Ταυτοποίηση</b>			
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτός έως λίγο διαλυτός στο νερό		
pH	Από 4,5 έως 7,0 (διάλυμα 1:100)		
<b>Καθαρότητα</b>			
Ολική τέφρα	1 % κατ' ανώτατο όριο		
Απώλεια κατά την ξήρανση	6 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)		
Υπολειμματικός διαλύτης	5 000 mg/kg αιθανόλης κατ' ανώτατο όριο		
Αρσενικό	0,015 mg/kg κατ' ανώτατο όριο		
Μόλυβδος	0,2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο		
Κάδμιο	0,015 mg/kg κατ' ανώτατο όριο		

## ▼ M38

Υδράργυρος	0,07 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υπολειμματική πρωτεΐνη	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μέγεθος σωματιδίων	74 µm τουλάχιστον [με κόσκινο βροχίδων #200 με όριο μεγέθους σωματιδίων 74 µm]

**E 960c(iii) ΡΕΒΑΟΥΔΙΟΖΙΤΗΣ D ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΡΕΒΑΟΥΔΙΟΖΙΤΗ Α ΑΠΟ ΚΕΚΑΘΑΡΜΕΝΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΛΛΩΝ ΣΤΕΒΙΑΣ**

<b>Συνώνυμα</b>			
<b>Ορισμός</b>	<p>Ο ρεβαουδιοζίτης D που παράγεται μέσω ενζυμικής μετατροπής του ρεβαουδιοζίτη A ο οποίος προέρχεται από κεκαθαρμένα εκχυλίσματα φύλλων στέβιας είναι γλυκοζίτης στεβιόλης που αποτελείται κυρίως από ρεβαουδιοζίτη D με μικρές ποσότητες άλλων γλυκοζιτών στεβιόλης, όπως ο ρεβαουδιοζίτης A και ο ρεβαουδιοζίτης M.</p> <p>Ο ρεβαουδιοζίτης D παράγεται μέσω ενζυμικής μετατροπής του ρεβαουδιοζίτη A (γλυκοζίτης στεβιόλης) από κεκαθαρμένα εκχυλίσματα (95 % γλυκοζίτες στεβιόλης) τα οποία λαμβάνονται από το φυτό <i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni με τη χρήση ενζύμων UDP-γλυκοσυλοτρανσφεράσης και συνθάσης σακχαρόζης που παράγονται από τα γενετικώς τροποποιημένα στελέχη <i>E. coli</i> (pPM294, pFAF170 και pSK401) τα οποία επιτελούν τη μεταφορά γλυκόζης από σακχαρόζη και UDP-γλυκόζη σε γλυκοζίτες στεβιόλης μέσω γλυκοζιτικών δεσμών. Μετά την απομάκρυνση των ενζύμων με διαχωρισμό στερεού-υγρού και θερμική επεξεργασία, ο καθαρισμός περιλαμβάνει συμπύκνωση του ρεβαουδιοζίτη D με προσρόφιση σε ρητίνη, ακολουθούμενη από επανακρυστάλλωση των γλυκοζιτών στεβιόλης από την οποία προκύπτει τελικό προϊόν που περιέχει τουλάχιστον 95 % ρεβαουδιοζίτη D και ρεβαουδιοζίτη A. Βιώσιμα κύτταρα <i>E. coli</i> (pPM294, pFAF170 και pSK401) και το DNA τους δεν ανιχνεύονται στο πρόσθετο τροφίμων.</p>		
Χημική ονομασία	<p>Ρεβαουδιοζίτης D: 13-[(2-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-3-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός 2-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας.</p> <p>Ρεβαουδιοζίτης A: 13-[(2-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-3-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας</p>		
Μοριακός τύπος	Κοινή ονομασία	Τύπος	Συντελεστής μετατροπής
	Ρεβαουδιοζίτης D	C <sub>50</sub> H <sub>80</sub> O <sub>28</sub>	0,29
	Ρεβαουδιοζίτης A	C <sub>44</sub> H <sub>70</sub> O <sub>23</sub>	0,33
Μοριακό βάρος και αριθ. CAS	Κοινή ονομασία	Αριθμός CAS	Μοριακό βάρος (σε g/mol)
	Ρεβαουδιοζίτης D	63279-13-0	1 291,15
	Ρεβαουδιοζίτης A	58543-16-1	967,01
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 95 % ρεβαουδιοζίτες D και A επί ξηράς ουσίας.		
Περιγραφή	Λευκή έως υποκίτρινη σκόνη, 150 έως 350 φορές περίπου γλυκύτερη από τη σακχαρόζη (σε 5 % ισοδυναμία σακχαρόζης).		
<b>Ταυτοποίηση</b>			
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτός έως λίγο διαλυτός στο νερό		
pH	Από 4,5 έως 7,0 (διάλυμα 1:100)		

## ▼ M38

<b>Καθαρότητα</b>	
Ολική τέφρα	1 % κατ' ανώτατο όριο
Απώλεια κατά την ξήρανση	6 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)
Υπολειμματικός διαλύτης	5 000 mg/kg αιθανόλης κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	0,015 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	0,2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	0,015 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	0,07 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υπολειμματική πρωτεΐνη	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μέγεθος σωματιδίων	74 μm τουλάχιστον [με κόσκινο βροχίδων #200 με όριο μεγέθους σωματιδίων 74 μm]

**E 960c(iv) ΡΕΒΑΟΥΔΙΟΖΙΤΗΣ ΑΜ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕΒΙΟΖΙΤΗΣ ΑΠΟ ΚΕΚΑΘΑΡΜΕΝΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΛΛΩΝ ΣΤΕΒΙΑΣ**

<b>Συνώνυμα</b>			
<b>Ορισμός</b>	<p>Ο ρεβαουδιοζίτης ΑΜ που παράγεται μέσω ενζυμικής μετατροπής του στεβιοζίτη ο οποίος προέρχεται από κεκαθαρμένα εκχυλίσματα φύλλων στέβιας είναι γλυκοζίτης στεβιόλης που αποτελείται κυρίως από ρεβαουδιοζίτη ΑΜ με μικρές ποσότητες άλλων γλυκοζιτών στεβιόλης, όπως ο στεβιοζίτης και ο ρεβαουδιοζίτης Ε.</p> <p>Ο ρεβαουδιοζίτης ΑΜ παράγεται μέσω ενζυμικής μετατροπής του στεβιοζίτη (γλυκοζίτης στεβιόλης) ο οποίος προέρχεται από κεκαθαρμένα εκχυλίσματα (95 % γλυκοζίτες στεβιόλης) τα οποία λαμβάνονται από το φυτό <i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni με τη χρήση ενζύμων UDP-γλυκοσυλοτρανσφεράσης και συνθάσης σακχαρόζης που παράγονται από τα γενετικώς τροποποιημένα στελέχη <i>E. coli</i> (pPM294, pFAF170 και pSK401) τα οποία επιτελούν τη μεταφορά γλυκόζης από σακχαρόζη και UDP-γλυκόζη σε γλυκοζίτες στεβιόλης μέσω γλυκοζιτικών δεσμών. Μετά την απομάκρυνση των ενζύμων με διαχωρισμό στερεού-υγρού και θερμική επεξεργασία, ο καθαρισμός περιλαμβάνει συμύκνωση του ρεβαουδιοζίτη ΑΜ με προσρόφηση σε ρητίνη, ακολουθούμενη από επανακρυστάλλωση των γλυκοζιτών στεβιόλης από την οποία προκύπτει τελικό προϊόν που περιέχει τουλάχιστον 95 % ρεβαουδιοζίτη ΑΜ. Βιόσιμα κύτταρα <i>E. coli</i> (pPM294, pFAF170 και pSK401) και το DNA τους δεν ανιχνεύονται στο πρόσθετο τροφίμων.</p>		
Χημική ονομασία	Ρεβαουδιοζίτης ΑΜ: 13-[(2-Ο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξυ]καουρ-16-εν-18-οϊκός 2-Ο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-3-Ο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας.		
Μοριακός τύπος	Κοινή ονομασία	Τύπος	Συντελεστής μετατροπής
	Ρεβαουδιοζίτης ΑΜ	C <sub>50</sub> H <sub>80</sub> O <sub>28</sub>	0,29
Μοριακό βάρος και αριθ. CAS	Κοινή ονομασία	Αριθμός CAS	Μοριακό βάρος (σε g/mol)
	Ρεβαουδιοζίτης ΑΜ	2222580-26-7	1 291,15

▼ **M38**

Δοκιμασία	Τουλάχιστον 95 % ρεβαουδιοζίτης AM επί ξηράς ουσίας.
Περιγραφή	Λευκή έως υποκίτρινη σκόνη, 150 έως 350 φορές περίπου γλυκύτερη από τη σακχαρόζη (σε 5 % ισοδυναμία σακχαρόζης).
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Εύκολα διαλυτός έως λίγο διαλυτός στο νερό
pH	Από 4,5 έως 7,0 (διάλυμα 1:100)
<b>Καθαρότητα</b>	
Ολική τέφρα	1 % κατ' ανώτατο όριο
Απώλεια κατά την ξήρανση	6 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)
Υπολειμματικός διαλύτης	5 000 mg/kg αιθανόλης κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	0,015 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	0,2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	0,015 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	0,07 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υπολειμματική πρωτεΐνη	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μέγεθος σωματιδίων	74 μm τουλάχιστον [με κόσκινο βροχίδων #200 με όριο μεγέθους σωματιδίων 74 μm]

▼ **M40****E 960d ΓΛΥΚΟΖΥΑΙΩΜΕΝΟΙ ΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΣΤΕΒΙΟΛΗΣ**

Συνώνυμα	
Ορισμός	Μείγμα μεγαλύτερων γλυκοζιτών στεβιόλης που παράγονται με τη γλυκοζυλίωση γλυκοζιτών στεβιόλης οι οποίοι εκχυλίζονται από φύλλα του φυτού <i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni. Το μείγμα αποτελείται από γλυκοζυλιωμένους γλυκοζίτες στεβιόλης και υπολειμματικούς μητρικούς γλυκοζίτες στεβιόλης από φύλλα στέβιας. Οι γλυκοζυλιωμένοι γλυκοζίτες στεβιόλης παράγονται με κατεργασία των γλυκοζιτών στεβιόλης, εκχυλισμένων από φύλλα στέβιας, και αμύλου κατάλληλου για κατανάλωση από τον άνθρωπο με γλυκανο-τρανσφεράση κυκλομαλτοδεξτρίνης (EC 2.4.1.19) που προέρχεται από μη ΓΤΟ στέλεχος <i>Anoxybacillus caldiproteolyticus</i> St-88. Το ένζυμο μεταφέρει μονάδες γλυκόζης από το άμυλο στους γλυκοζίτες στεβιόλης. Το υλικό που προκύπτει θερμαίνεται και υποβάλλεται σε κατεργασία με ενεργό άνθρακα για την απομάκρυνση του ενζύμου, στη συνέχεια διέρχεται από ρητίνη προσρόφησης/εκρόφησης για να απομακρυνθεί το υπολειμματικό υδρολυμένο άμυλο (δεξτρίνη), και ακολουθεί καθαρισμός και παρασκευή του τελικού προϊόντος με τη χρήση διεργασιών που μπορεί να περιλαμβάνουν αποχρωματισμό, συμπύκνωση και ξήρανση με ψεκασμό.
Χημική ονομασία	Στεβιολοβιοζίτης: 13-[(2-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκό οξύ Ρουβουσοζίτης: 13-β-D-γλυκοπυρανοζυλοξυκαουρ-16-εν-18-οϊκός β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας Δουλοζίτης A: 13-[(2-O-α-L-ραμνοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας Στεβιοζίτης: 13-[(2-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας Ρεβαουδιοζίτης A: 13-[(2-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-3-O-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας

## ▼ M40

	<p>Ρεβασουδιοζίτης Β: 13-[(2-Ο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-3-Ο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκό οξύ</p> <p>Ρεβασουδιοζίτης C: 13-[(2-Ο-α-L-ραμνοπυρανοζυλο-3-Ο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας</p> <p>Ρεβασουδιοζίτης D: 13-[(2-Ο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-3-Ο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός 2-Ο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας</p> <p>Ρεβασουδιοζίτης E: 13-[(2-Ο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός 2-Ο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας</p> <p>Ρεβασουδιοζίτης F: 13-[2-Ο-β-D-ξυλοφουρανοζυλο-3-Ο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας</p> <p>Ρεβασουδιοζίτης M: 13-[(2-Ο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-3-Ο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο)οξύ]καουρ-16-εν-18-οϊκός 2-Ο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-3-Ο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο-β-D-γλυκοπυρανοζυλεστέρας</p> <p>Και τα γλυκοζυλιωμένα παράγωγά τους (1-20 πρόσθετες μονάδες γλυκόζης)</p>		
Μοριακός τύπος	<b>Κοινή ονομασία</b>	<b>Τύπος</b>	<b>Συντελεστής μετατροπής</b>
	n-Γλυκοζυλιωμένος στεβιολοβιοζίτης	$C_{(32+n*6)}H_{(50+n*10)}O_{(13+n*5)}$	
	n-Γλυκοζυλιωμένος ρουβουσοζίτης	$C_{(32+n*6)}H_{(50+n*10)}O_{(13+n*5)}$	
	n-Γλυκοζυλιωμένος δουλκοζίτης Α	$C_{(38+n*6)}H_{(60+n*10)}O_{(17+n*5)}$	
	n-Γλυκοζυλιωμένος στεβιοζίτης	$C_{(38+n*6)}H_{(60+n*10)}O_{(18+n*5)}$	
	n-Γλυκοζυλιωμένος ρεβασουδιοζίτης Α	$C_{(44+n*6)}H_{(70+n*10)}O_{(23+n*5)}$	
	n-Γλυκοζυλιωμένος ρεβασουδιοζίτης Β	$C_{(38+n*6)}H_{(60+n*10)}O_{(18+n*5)}$	
	n-Γλυκοζυλιωμένος ρεβασουδιοζίτης C	$C_{(44+n*6)}H_{(70+n*10)}O_{(22+n*5)}$	
	n-Γλυκοζυλιωμένος ρεβασουδιοζίτης D	$C_{(50+n*6)}H_{(80+n*10)}O_{(28+n*5)}$	
	n-Γλυκοζυλιωμένος ρεβασουδιοζίτης E	$C_{(44+n*6)}H_{(70+n*10)}O_{(23+n*5)}$	
	n-Γλυκοζυλιωμένος ρεβασουδιοζίτης F	$C_{(43+n*6)}H_{(68+n*10)}O_{(22+n*5)}$	
	n-Γλυκοζυλιωμένος ρεβασουδιοζίτης M	$C_{(56+n*6)}H_{(90+n*10)}O_{(33+n*5)}$	
	<p>n: αριθμός μονάδων γλυκόζης που προστέθηκαν ενζυμικά στον μητρικό γλυκοζίτη στεβιόλης (n = 1-20)</p> <p>Τυπικός συντελεστής μετατροπής για μείγματα γλυκοζυλιωμένων γλυκοζιτών στεβιόλης = 0,20 (επί ξηράς ουσίας, χωρίς δεξτρίνη)</p>		
	Στεβιόλη	$C_{20}H_{30}O_3$	1,00



▼ **M40**

	Στεβιολοβιοζίτης	C <sub>32</sub> H <sub>50</sub> O <sub>13</sub>	0,50
	Ρουβουσοζίτης	C <sub>32</sub> H <sub>50</sub> O <sub>13</sub>	0,50
	Δουλκοζίτης A	C <sub>38</sub> H <sub>60</sub> O <sub>17</sub>	0,40
	Στεβιοζίτης	C <sub>38</sub> H <sub>60</sub> O <sub>18</sub>	0,40
	Ρεβαουδιοζίτης A	C <sub>44</sub> H <sub>70</sub> O <sub>23</sub>	0,33
	Ρεβαουδιοζίτης B	C <sub>38</sub> H <sub>60</sub> O <sub>18</sub>	0,40
	Ρεβαουδιοζίτης C	C <sub>44</sub> H <sub>70</sub> O <sub>22</sub>	0,34
	Ρεβαουδιοζίτης D	C <sub>50</sub> H <sub>80</sub> O <sub>28</sub>	0,29
	Ρεβαουδιοζίτης E	C <sub>44</sub> H <sub>70</sub> O <sub>23</sub>	0,33
	Ρεβαουδιοζίτης F	C <sub>43</sub> H <sub>68</sub> O <sub>22</sub>	0,34
	Ρεβαουδιοζίτης M	C <sub>56</sub> H <sub>90</sub> O <sub>33</sub>	0,25
Μοριακό βάρος και αριθ. CAS	<b>Κοινή ονομασία</b>	<b>Αριθμός CAS</b>	<b>Μοριακό βάρος (σε g/mol)</b>
	n-Γλυκοζυλιωμένος στεβιολοβιοζίτης	Μη διαθέσιμος	642,73+n*162,15
	n-Γλυκοζυλιωμένος ρουβουσοζίτης	Μη διαθέσιμος	642,73+n*162,15
	n-Γλυκοζυλιωμένος δουλκοζίτης A	Μη διαθέσιμος	788,87+n*162,15
	n-Γλυκοζυλιωμένος στεβιοζίτης	Μη διαθέσιμος	804,88+n*162,15
	n-Γλυκοζυλιωμένος ρεβαουδιοζίτης A	Μη διαθέσιμος	967,01+n*162,15
	n-Γλυκοζυλιωμένος ρεβαουδιοζίτης B	Μη διαθέσιμος	804,88+n*162,15
	n-Γλυκοζυλιωμένος ρεβαουδιοζίτης C	Μη διαθέσιμος	951,02+n*162,15
	n-Γλυκοζυλιωμένος ρεβαουδιοζίτης D	Μη διαθέσιμος	1129,15+n*162,15
	n-Γλυκοζυλιωμένος ρεβαουδιοζίτης E	Μη διαθέσιμος	967,01+n*162,15
	n-Γλυκοζυλιωμένος ρεβαουδιοζίτης F	Μη διαθέσιμος	936,99+n*162,15
	n-Γλυκοζυλιωμένος ρεβαουδιοζίτης M	Μη διαθέσιμος	1291,30+n*162,15
	Στεβιόλη		318,46
	Στεβιολοβιοζίτης	41093-60-1	642,73
	Ρουβουσοζίτης	64849-39-4	642,73
	Δουλκοζίτης A	64432-06-0	788,87
	Στεβιοζίτης	57817-89-7	804,88
	Ρεβαουδιοζίτης A	58543-16-1	967,01
	Ρεβαουδιοζίτης B	58543-17-2	804,88
	Ρεβαουδιοζίτης C	63550-99-2	951,02
	Ρεβαουδιοζίτης D	63279-13-0	1 129,15
	Ρεβαουδιοζίτης E	63279-14-1	967,01
	Ρεβαουδιοζίτης F	438045-89-7	936,99
	Ρεβαουδιοζίτης M	1220616-44-3	1 291,30

▼ **M40**

Δοκιμασία	Τουλάχιστον 95 % των ολικών γλυκοζιτών στεβιόλης, που αποτελούνται από τους προαναφερθέντες γλυκοζίτες στεβιόλης μαζί με τα γλυκοζυλωμένα παράγωγά τους (1-20 πρόσθετες μονάδες γλυκόζης), επί ξηράς ουσίας χωρίς δεξτρίνη.
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή έως υποκίτρινη σκόνη, 100 έως 200 φορές περίπου γλυκύτερη από τη σακχαρόζη (σε 5 % ισοδυναμία σακχαρόζης).
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτό στο νερό
pH	Από 4,5 έως 7,0 (διάλυμα 1:100)
<b>Καθαρότητα</b>	
Ολική τέφρα	1 % κατ' ανώτατο όριο
Απώλεια κατά την ξήρανση	6 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 2 ώρες)
Υπολειμματικός διαλύτης	200 mg/kg μεθανόλης κατ' ανώτατο όριο 3 000 mg/kg αιθανόλης κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	0,015 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
Ολικός αριθμός (αερόβιων) μικροοργανισμών	1 000 CFU/g κατ' ανώτατο όριο
Ζυμομύκητες και υφομύκητες	200 CFU/g κατ' ανώτατο όριο
<i>E. coli</i>	Απουσία σε 1 g
<i>Salmonella</i>	Απουσία σε 25 g

▼ **B****E 961 ΝΕΟΤΑΜΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	1-μεθυλεστέρας της N-[N-(3,3-διμεθυλοβουτυλ)-L-α-ασπαρτυλο]-L-φαινυλαλανίνης· μεθυλεστέρας της N-(3,3-διμεθυλοβουτυλ)-L-ασπαρτυλο-L-φαινυλαλανίνης.
<b>Ορισμός</b>	Η νεοτάμη παρασκευάζεται με αντίδραση της ασπαρτάμης με 3,3-διμεθυλοβουτυραλδεΐδη σε μεθανόλη παρουσία υδρογόνου υπό πίεση και με καταλύτη παλλάδιο/άνθρακα. Ακολουθεί απομόνωση και καθαρισμός της ουσίας με διήθηση, στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί γη διατόμων. Μετά την απομάκρυνση του διαλύτη με απόσταξη, ακολουθεί έκπλυση της νεοτάμης με νερό, απομόνωση με φυγοκέντρηση και, τέλος, ξήρανση υπό κενό
Αριθ. CAS	165450-17-9
Χημική ονομασία	1-μεθυλεστέρας της N-[N-(3,3-διμεθυλοβουτυλ)-L-α-ασπαρτυλο]-L-φαινυλαλανίνης
Χημικός τύπος	C <sub>20</sub> H <sub>30</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
Μοριακό βάρος	378,47
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή έως υπόλευκη σκόνη
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 97,0 % επί ξηράς ουσίας
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	4,75 % (w/w) στους 60 °C στο νερό, διαλυτή σε αιθανόλη και οξικό αιθυλεστέρα

▼ B**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό	5 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer, μέγεθος δείγματος 25 ± 5 mg)
pH	5,0 – 7,0 (υδατικό διάλυμα 0,5 %)
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	81 °C έως 84 °C
N-[(3,3-διμεθυλοβουτυλ)-L-α-ασπαρτυλο]-L-φαινυλαλανίνη	1,5 % κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 962 ΑΛΑΣ ΑΣΠΑΡΤΑΜΗΣ-ΑΚΕΣΟΥΛΦΑΜΗΣ****Συνώνυμα**

Ασπαρτάμη- ακεσουλφάμη· άλας ασπαρτάμης- ακεσουλφάμης

**Ορισμός**

Το άλας παρασκευάζεται με θέρμανση διαλύματος ασπαρτάμης και ακεσουλφάμης Κ σε αναλογία περίπου 2:1 (w/w) με όξινο pH μέχρι να επιτευχθεί κρυστάλλωση. Το κάλιο και η υγρασία απομακρύνονται. Το προϊόν είναι πιο σταθερό από την αμιγή ασπαρτάμη.

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Άλας του L-φαινυλαλανυλο-2-μεθυλ-L-α-ασπαρτικού οξέος με 6-μεθυλ-1,2,3-οξαθειαζιν-4(3H)-ονο-2,2-διοξειδίο

Χημικός τύπος

C<sub>18</sub>H<sub>23</sub>O<sub>9</sub>N<sub>3</sub>S

Μοριακό βάρος

457,46

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα 63,0 % έως 66,0 % σε ασπαρτάμη (επί ξηράς ουσίας) και 34,0 % έως 37,0 % σε ακεσουλφάμη (όξινη μορφή επί ξηράς ουσίας)

**Περιγραφή**

Λευκή, άοσμη, κρυσταλλική σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Μέτρια διαλυτό στο νερό· λίγο διαλυτό σε αιθανόλη

Διαπερατότητα

Η διαπερατότητα διαλύματος 1 % σε νερό, προσδιοριζόμενη σε κυβελίδα του 1 cm στα 430 nm, με κατάλληλο φασματοφωτόμετρο και με νερό ως διάλυμα αναφοράς, είναι τουλάχιστον 0,95, ισοδύναμη με απορρόφηση 0,022 περίπου κατ' ανώτατο όριο.

Ειδική στροφική ικανότητα

[α]<sub>D</sub><sup>20</sup> + 14,5° έως + 16,5°

Προσδιορίζεται σε συγκέντρωση 6,2 g σε 100ml μυρμηκικού οξέος (15N) εντός 30 λεπτών από την παρασκευή του διαλύματος. Η υπολογιζόμενη ειδική στροφική ικανότητα διορθώνεται με διαίρεση διά 0,646 για να ληφθεί υπόψη η περιεκτικότητα σε ασπαρτάμη του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης

**▼ B****Καθαρότητα**

Απόλεια κατά την ξήρανση	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)
5-βενζυλο-3,6-διοξο-2-πιπεραζινοξικό οξύ	0,5 % κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M1****E 964 ΣΙΡΟΠΙ ΠΟΛΥΓΛΥΣΙΤΟΛΗΣ****Συνώνυμα**

Υδρογονωμένη υδρόλυση αμύλου, υδρογονωμένο σιρόπι γλυκόζης και πολυγλυσιτόλης.

**Ορισμός**

Μείγμα που αποτελείται κυρίως από μαλιτιτόλη και σορβιτόλη και μικρότερες ποσότητες υδρογονωμένων ολιγο- και πολυσακχαριτών και μαλτριτόλη. Παρασκευάζεται με την καταλυτική υδρογόνωση μείγματος προϊόντων υδρόλυσης αμύλου το οποίο αποτελείται από γλυκόζη, μαλτόζη και πολυμερή γλυκόζης υψηλότερου μοριακού βάρους, παρόμοια με τη διαδικασία καταλυτικής υδρογόνωσης που χρησιμοποιείται για την παρασκευή σιροπιού μαλιτιτόλης. Από το σιρόπι που προκύπτει απομακρύνονται τα άλατα με ανταλλαγή ιόντων και ακολουθεί συμπύκνωση στο επιθυμητό επίπεδο.

Einecs

Χημική ονομασία

Σορβιτόλη: D-γλυκιτόλη

Μαλιτιτόλη: (α)-D-γλυκοπυρανοζυλο-1,4-D-γλυκιτόλη

Χημικός τύπος

Σορβιτόλη: C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>O<sub>6</sub>Μαλιτιτόλη: C<sub>12</sub>H<sub>24</sub>O<sub>11</sub>

Μοριακό βάρος

Σορβιτόλη: 182,2

Μαλιτιτόλη: 344,3

Δοκιμασία

Τουλάχιστον 99 % υδρογονωμένους σακχαρίτες σε άνυδρη βάση, τουλάχιστον 50 % πολυόλες υψηλού μοριακού βάρους, τουλάχιστον 50 % μαλιτιτόλη και τουλάχιστον 20 % σορβιτόλη σε άνυδρη βάση.

**Περιγραφή**

Άχρωμο, άοσμο και διαυγές παχύρευστο υγρό

**Στοιχεία αναγνώρισης**

Διαλυτότητα

Πολύ διαλυτό στο νερό και λίγο διαλυτό στην αιθανόλη

Δοκιμή μαλιτιτόλης

Δοκιμή θετική

Δοκιμή σορβιτόλης

Σε 5 g του δείγματος προστίθενται 7 ml μεθανόλης, 1 ml βενζαλδεΐδης και 1 ml υδροχλωρικού οξέος. Αναμειγνύονται και ανακινούνται σε μηχανικό τάρρακτρο μέχρι να εμφανιστούν κρύσταλλοι. Οι κρύσταλλοι διηθούνται και διαλύονται σε 20 ml ζέοντος ύδατος που περιέχει 1 g διττανθρακικού νατρίου. Οι κρύσταλλοι διηθούνται, εκπλύνονται με 5 ml μείγματος νερού και μεθανόλης (1 προς 2) και ξηραίνονται στον αέρα. Οι κρύσταλλοι του μονοβενζυλιδενοπαράγωγου της σορβιτόλης που λαμβάνονται κατ' αυτό τον τρόπο τήκονται σε θερμοκρασία 173 - 179 °C.

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό	31 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Χλωριόντα	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Θειικά ιόντα	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αναγωγικά σάκχαρα	0,3 % κατ' ανώτατο όριο
Νικέλιο	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος:	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ B

## E 965 (i) ΜΑΛΤΙΤΟΛΕΣ

<b>Συνώνυμα</b>	D-Μαλτιτόλη· υδρογονωμένη μαλτόζη
<b>Ορισμός</b>	Οι μαλτιτόλες παρασκευάζονται με υδρογόνωση D-μαλτόζης. Αποτελούνται κυρίως από D-μαλτιτόλη. Μπορεί να περιέχουν μικρές ποσότητες σορβιτόλης και συγγενών πολυαλκοολών.
Αριθ. EINECS	209-567-0
Χημική ονομασία	(α)-D-γλυκοπυρανοζυλο-1,4-D-γλυκικόλη
Χημικός τύπος	C <sub>12</sub> H <sub>24</sub> O <sub>11</sub>
Μοριακό βάρος	344,3
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % σε D-μαλτιτόλη C <sub>12</sub> H <sub>24</sub> O <sub>11</sub> επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή κρυσταλλική σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Πολύ διαλυτές στο νερό, λίγο διαλυτές στην αιθανόλη
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	148 έως 151 °C
Ειδική στροφική ικανότητα	[α] <sub>D</sub> <sup>20</sup> + 105,5° έως + 108,5° (διάλυμα 5 % w/v)
<b>▼ <u>M4</u></b>	
<b>Καθαρότητα</b>	
Όψη υδατικού διαλύματος	Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο
Περιεκτικότητα σε νερό	1 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Αγωγιμότητα	Όχι περισσότερο από 20 μS/cm (σε διάλυμα 20 % ξηρής ύλης) σε θερμοκρασία 20 °C
Αναγωγικά σάκχαρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενα σε γλυκόζη επί ξηρού)
Νικέλιο	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενο επί ξηρού)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενο επί ξηρού)
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενο επί ξηρού)

▼ B

## E 965 (ii) ΣΙΡΟΠΙ ΜΑΛΤΙΤΟΛΗΣ

<b>Συνώνυμα</b>	Υδρογονωμένο σιρόπι γλυκόζης υψηλής περιεκτικότητας σε μαλτόζη· υδρογονωμένο σιρόπι γλυκόζης· υγρή μαλτιτόλη
<b>Ορισμός</b>	Μείγμα αποτελούμενο κυρίως από μαλτιτόλη με σορβιτόλη και υδρογονωμένους ολιγο- και πολυσακχαρίτες. Παρασκευάζεται με καταλυτική υδρογόνωση σιροπίου γλυκόζης υψηλής περιεκτικότητας σε μαλτόζη ή με υδρογόνωση των επιμέρους συστατικών του και ανάμειξη. Το προϊόν διατίθεται στο εμπόριο τόσο υπό μορφή σιροπίου όσο και ως στερεό προϊόν.
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ολικούς υδρογονωμένους σακχαρίτες 99 % επί άνυδρης ουσίας και σε μαλτιτόλη 50 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Άχρωμα και άοσμα, διαυγή παχύρρευστα υγρά ή λευκές κρυσταλλικές μάζες

**▼ B****Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Δοκιμή HPLC

Πολύ διαλυτό στο νερό, λίγο διαλυτό στην αιθανόλη

Από τη σύγκριση με κατάλληλη πρότυπη μαλιτιτόλη αναφοράς προκύπτει ότι η κύρια κορυφή στο χρωματογράφημα του διαλύματος δοκιμής είναι παρόμοια ως προς τον χρόνο κατακράτησης με την κύρια κορυφή του χρωματογραφήματος του διαλύματος αναφοράς (ISO 10504:1998).

**▼ M4****Καθαρότητα**

Όψη υδατικού διαλύματος

Περιεκτικότητα σε νερό

Αγωγιμότητα

Αναγωγικά σάκχαρα

Νικέλιο

Μόλυβδος

Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο

31 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

Όχι περισσότερο από 10 μS/cm (στο προϊόν αυτό καθαυτό) σε θερμοκρασία 20 °C

0,3 % κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενα σε γλυκόζη επί ξηρού)

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ B****E 966 ΛΑΚΤΙΤΟΛΗ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

Λακτίτης· λακτοζιτόλη· λακτοβιοσίτης

Η λακτιτόλη παρασκευάζεται με καταλυτική υδρογόνωση της λακτόζης

209-566-5

4-O-β-D-γαλακτοπυρανοζυλο-D-γλυκιτόλη

C<sub>12</sub>H<sub>24</sub>O<sub>11</sub>

344,3

Τουλάχιστον 95 % επί ξηρού

**Περιγραφή**

Κρυσταλλική σκόνη ή άχρωμο διάλυμα. Τα κρυσταλλικά προϊόντα συναντώνται σε άνυδρη, μονοένυδρη και διένυδρη μορφή. Ως καταλύτης χρησιμοποιείται νικέλιο.

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Ειδική στροφική ικανότητα

Πολύ διαλυτή στο νερό

$[\alpha]_D^{20} = +13^\circ$  έως  $+16^\circ$  υπολογιζόμενη επί άνυδρης ουσίας (υδατικό διάλυμα 10 % w/v)

**Καθαρότητα**

Περιεκτικότητα σε νερό

Άλλες πολυόλες

Αναγωγικά σάκχαρα

Χλωρίοντα

Θειικά ιόντα

Θειική τέφρα

Νικέλιο

Αρσενικό

Μόλυβδος

Κρυσταλλικά προϊόντα: 10,5 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

2,5 % κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)

0,2 % κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη σε γλυκόζη επί ξηρού)

100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)

200 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)

0,1 % κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενη επί ξηρού)

**▼ B****E 967 ΞΥΛΙΤΟΛΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Ξυλιτόλη
<b>Ορισμός</b>	Η Ξυλιτόλη αποτελείται κυρίως από D-Ξυλιτόλη. Το μέρος που δεν είναι D-Ξυλιτόλη αποτελείται από συγγενείς ουσίες, όπως η L-αραβιτιτόλη, η γαλακτιτόλη, η μαννιτόλη, η σορβιτόλη
Αριθ. EINECS	201-788-0
Χημική ονομασία	D-Ξυλιτόλη
Χημικός τύπος	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> O <sub>5</sub>
Μοριακό βάρος	152,2
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε Ξυλιτόλη τουλάχιστον 98,5 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή, κρυσταλλική σκόνη, πρακτικά άοσμη.
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Πολύ διαλυτή στο νερό, μέτρια διαλυτή στην αιθανόλη
Πεδίο τιμών σημείου τήξης	92 έως 96 °C
pH	5 έως 7 (υδατικό διάλυμα 10 % w/v)
Φασματοσκοπία απορρόφησης υπεριώθρου	Σύγκριση με πρότυπο αναφοράς, όπως π.χ. EP ή USP
<b>▼ M4</b>	
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	Το ανώτερο 1 % (μέθοδος Karl Fischer)
Αγωγιμότητα	Όχι περισσότερο από 20 μS/cm (σε διάλυμα 20 % ξηρής ύλης) σε θερμοκρασία 20 °C
Αναγωγικά σάκχαρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε γλυκόζη επί ξηρού)
Άλλες πολυαλκοόλες	1 % κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενες επί ξηρού)
Νικέλιο	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενο επί ξηρού)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενο επί ξηρού)
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (εκφραζόμενο επί ξηρού)

**▼ B****E 968 ΕΡΥΘΡΙΤΟΛΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Μεσο-ερυθριτόλη· τετραϋδροξυβουτάνιο· ερυθρίτης
<b>Ορισμός</b>	Λαμβάνεται με ζύμωση πηγής υδατανθράκων με τη βοήθεια ασφαλών, οσμόφυλων ζυμομυκήτων, κατάλληλων για τρόφιμα, όπως ο <i>Moniliella pollinis</i> ή ο <i>Moniliella megachilensis</i> , ακολουθούμενη από καθαρισμό και ξήρανση
Αριθ. EINECS	205-737-3
Χημική ονομασία	Βουτανοτετρόλη-1,2,3,4
Χημικός τύπος	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub>
Μοριακό βάρος	122,12
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 99 % μετά από ξήρανση
<b>Περιγραφή</b>	Λευκοί, άοσμοι, μη υγροσκοπικοί, θερμοσταθεροί κρύσταλλοι, με γλυκύτητα που ανέρχεται στο 60 – 80 % περίπου της γλυκύτητας της σακχαρόζης.

**▼ B****Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Εύκολα διαλυτή στο νερό, λίγο διαλυτή στην αιθανόλη, αδιάλυτη στον διαιθλαιθέρα.

Πεδίο τιμών σημείου τήξης

119-123 °C

**▼ M4****Καθαρότητα**

Απόλεια κατά την ξήρανση

0,2 % κατ' ανώτατο όριο (70 °C, 6 ώρες, σε ξηραντήρα κενού)

Αγωγιμότητα

Όχι περισσότερο από 20 μS/cm (σε διάλυμα 20 % ξηρής ύλης) σε θερμοκρασία 20 °C

Αναγωγικές ουσίες

0,3 % κατ' ανώτατο όριο, εκφρασμένες σε D-γλυκόζη

Ριβιτόλη και γλυκερόλη

0,1 % κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

0,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M11****E 969 ANTBANTAMH****Συνώνυμα****Ορισμός**

Η χημική σύνθεση της αντβαντάμης (ANS9801) περιλαμβάνει τρία στάδια: παραγωγή του κύριου ενδιάμεσου προϊόντος, 3-υδροξυ- 4-μεθοξυκινναμωμάλδεϋδη (HMCA), ακολουθούμενη από υδρογόνωση για το σχηματισμό 3-(3-υδροξυ-4-μεθοξυφαινυλο)προπιοναλδεϋδης (HMPA). Στο τελευταίο στάδιο, το μεθανολικό διάλυμα HMPA (διήθημα) συνδυάζεται με ασπαρτάμη για να δώσει την ιμίνη η οποία, με εκλεκτική υδρογόνωση, δίνει την αντβαντάμη. Η ουσία αφήνεται να κρυσταλλωθεί και οι ακατέργαστοι κρύσταλλοι εκπλένονται. Το προϊόν επανακρυσταλλώνεται και οι κρύσταλλοι διαχωρίζονται, εκπλένονται και ξηραίνονται.

Αριθ. CAS

714229-20-6

Χημική ονομασία

1-μεθυλεστέρας της N-[N-[3-(3-υδροξυ-4-μεθοξυφαινυλο)προπιλο]-α-ασπαρτυλο]-L-φαινυλαλάνης, ένυδρος (IUPAC)

L-φαινυλαλάνη, N-[3- (3-υδροξυ-4-μεθοξυφαινυλο)προπιλο]-L-α-ασπαρτυλο-, 2-μεθυλεστέρας, ένυδρος (CA)

Μοριακός τύπος

C<sub>24</sub>H<sub>30</sub>N<sub>2</sub>O<sub>7</sub>·H<sub>2</sub>O

Μοριακό βάρος

476,52 g/mol (μονοένυδρη μορφή)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,0 % και όχι μεγαλύτερη από 102,0 % στην άνυδρη μορφή

**Περιγραφή**

Λευκή έως κίτρινη σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Σημείο τήξης

101,5 °C

**Καθαρότητα**N-[N-[3-(3-υδροξυ-4-μεθοξυφαι-  
νυλο)προπιλο]-α-ασπαρτυλο]-L-φαινυλα-  
λάνη (ANS9801-οξύ)

1,0 % κατ' ανώτατο όριο

Σύνολο άλλων σχετικών ουσιών

1,5 % κατ' ανώτατο όριο

Υπολειμματικοί διαλύτες

Οξικός ισοπροπιλεστέρας: 2 000 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Οξικός μεθυλεστέρας: 500 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μεθανόλη: 500 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

2-Προπανόλη: 500 mg/kg κατ' ανώτατο όριο



**▼ M11**

Περιεκτικότητα σε νερό	5,0 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Υπόλειμμα κατά την πύρωση	0,2 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Παλλάδιο	5,3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Λευκόχρυσος	1,7 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ B****E 999 ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΙΛΑΪΑΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	Εκχύλισμα φλοιού κουιλαΐας· εκχύλισμα φλοιού του Παναμά· εκχύλισμα κουιλαΐας· εκχύλισμα φλοιού Murillo· εκχύλισμα φλοιού της Κίνας
<b>Ορισμός</b>	Το εκχύλισμα κιλαΐας λαμβάνεται με υδατική εκχύλιση από το δέντρο <i>Quillaja saponaria</i> Molina ή άλλα είδη του γένους <i>Quillaja</i> της οικογένειας Rosaceae. Περιέχει ορισμένες τριτερπενοειδείς σαπωνίνες που αποτελούνται από γλυκοζίτες κιλαϊκού οξέος. Ενυπάρχουν επίσης και ορισμένα σάκχαρα, μεταξύ των οποίων γλυκόζη, γαλακτόζη, αραβινόζη, ξυλόζη και ραμνόζη, παράλληλα με ταννίνη, οξαλικό ασβέστιο και άλλα συστατικά σε ήσσονες ποσότητες
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Το εκχύλισμα κιλαΐας σε μορφή σκόνης έχει χρώμα ανοικτό καστανό με ρόδινη χροιά. Διατίθεται επίσης σε μορφή υδατικού διαλύματος
<b>Ταυτοποίηση</b>	
pH	Από 3,7 έως 5,5 (διάλυμα 4 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	6 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer) (μόνο για τη σκόνη)
Αρσενικό	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 1103 ΙΜΒΕΡΤΑΣΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Η ιμβερτάση παράγεται από τον μύκητα <i>Saccharomyces cerevisiae</i>
Αριθ. EINECS	232-615-7
Αριθ. επιτροπής ενζύμων:	EC 3.2.1.26
Συστηματική ονομασία	Φρουκτοϋδρολάση β-D-φρουκτοφουρανοζίτη

**▼ B**

Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	
<b>Ταυτοποίηση</b>	
<b>Καθαρότητα</b>	
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	0,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
Ολικός αριθμός βακτηριδίων	50 000 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
<i>Salmonella spp.</i>	Απουσία σε 25 g
Κολοβακτηρίδια	30 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 25 g
<b>E 1105 ΛΥΣΟΖΥΜΗ</b>	
<b>Συνώνυμα</b>	Υδροχλωρική λυσοζύμη· μουραμιδάση
<b>Ορισμός</b>	Η λυσοζύμη είναι γραμμικό πολυπεπίδιο, αποτελούμενο από 129 αμινοξέα, που λαμβάνεται από το λεύκωμα του αυγού της κότας. Η ενζυμική δράση της οφείλεται στην ικανότητά της να υδρολύει τους δεσμούς β(1-4) μεταξύ του N-ακετυλομουραμικού οξέος και της N-ακετυλογλυκοζαμίνης στην εξωτερική μεμβράνη των κυττάρων των βακτηριδίων, ιδίως των θετικών κατά Gram. Συνήθως λαμβάνεται ως υδροχλωρική λυσοζύμη
Αριθ. EINECS	232-620-4
Αριθ. επιτροπής ενζύμων:	EC 3.2.1.17
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	14 000 περίπου
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 950 mg/g επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή άοσμη σκόνη με ελαφρώς γλυκειά γεύση
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Ισοηλεκτρικό σημείο	10,7
pH	Από 3,0 έως 3,6 (υδατικό διάλυμα 2 %)
Φασματοφωτομετρία	Μέγιστο απορρόφησης υδατικού διαλύματος (25 mg/100 ml) στα 281 nm, ελάχιστο απορρόφησης στα 252 nm
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	6 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer) (μόνο για τη σκόνη)
Υπόλειμμα κατά την πύρωση	1,5 % κατ' ανώτατο όριο
Άζωτο	Τουλάχιστον 16,8 % και έως 17,8 % κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **B**

Μόλυβδος	5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
<b>Μικροβιολογικά κριτήρια</b>	
Ολικός αριθμός βακτηριδίων	$5 \times 10^4$ αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο
<i>Salmonella spp.</i>	Απουσία σε 25 g
<i>Staphylococcus aureus</i>	Απουσία σε 1 g
<i>Escherichia coli</i>	Απουσία σε 1 g

**E 1200 ΠΟΛΥΔΕΞΤΡΟΖΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Τροποποιημένες πολυδεξτρόζες
<b>Ορισμός</b>	Τυχαίας σύνδεσης πολυμερή γλυκόζης με ορισμένες ακραίες (καταληκτικές) ομάδες σορβιτόλης και με μόρια κιτρικού ή φωσφορικού οξέος συνδεδεμένα στα πολυμερή με μονο- ή διεστερικούς δεσμούς. Λαμβάνονται με τήξη και συμπύκνωση των συστατικών και συνίστανται από 90 περίπου μέρη D-γλυκόζης, 10 μέρη σορβιτόλης και 1 μέρος κιτρικού οξέος και/ή 0,1 μέρος φωσφορικού οξέος. Στα πολυμερή επικρατεί ο γλυκοζιτικός δεσμός 1,6, συναντώνται όμως και άλλοι δεσμοί. Τα προϊόντα περιέχουν μικρές ποσότητες ελεύθερης γλυκόζης, σορβιτόλης, λεβογλυκοζάνης (1,6-ανυδρικό παράγωγο της-D-γλυκόζης) και κιτρικού οξέος και μπορούν να εξουδετερωθούν με οποιαδήποτε βάση καθαρότητας κατάλληλης για τρόφιμα ή/και να αποχρωματιστούν και να απιονιστούν για περαιτέρω καθαρισμό. Τα προϊόντα μπορούν επίσης να υδρογονωθούν μερικώς με καταλύτη νικελίου Raney για αναγωγή της υπολειμματικής γλυκόζης. Η πολυδεξτρόζη N είναι εξουδετερωμένη πολυδεξτρόζη
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 90 % σε πολυμερές επί άνυδρης και απαλλαγμένης από τέφρα ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκό έως ανοικτό χρυσοκάστανο στερεό. Οι πολυδεξτρόζες διαλύονται στο νερό παρέχοντας διαυγή, άχρωμα έως αχρροκίτρινα διαλύματα
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή σακχαρόζης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή αναγωγικών σακχάρων	Δοκιμή θετική
pH	Από 2,5 έως 7,0 για την πολυδεξτρόζη (διάλυμα 10 %) Από 5,0 έως 6,0 για την πολυδεξτρόζη N (διάλυμα 10 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	4,0 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Θεϊκή τέφρα	0,3 % κατ' ανώτατο όριο (πολυδεξτρόζη) 2,0 % κατ' ανώτατο όριο (πολυδεξτρόζη N)
Νικέλιο	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για τις υδρογονωμένες πολυδεξτρόζες
1,6-ανυδρικό παράγωγο D-γλυκόζης	4,0 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηράς και απαλλαγμένης από τέφρα ουσίας
Γλυκόζη και σορβιτόλη	6,0 % κατ' ανώτατο όριο συνολικά επί ξηράς και απαλλαγμένης από τέφρα ουσίας· η γλυκόζη και η σορβιτόλη προσδιορίζονται χωριστά
Όριο μοριακού βάρους	Δοκιμή αρνητική για τα πολυμερή με μοριακό βάρος μεγαλύτερο από 22 000

**▼ B**

5-υδροξυμεθυλοφουρφοϋ-ράλη	0,1 % κατ' ανώτατο όριο (πολυδεξτρόζη) 0,05 % κατ' ανώτατο όριο (πολυδεξτρόζη N)
Μόλυβδος	0,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 1201 ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Ποβιδόνη· PVP· διαλυτή πολυβινυλοπυρρολιδόνη
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Πολυβινυλοπυρρολιδόνη, πολυ[1-(2-οξο-1-πυρρολιδινυλ)αιθυλένιο]
Χημικός τύπος	(C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> NO) <sub>n</sub>
Κατά βάρος μέσο μοριακό βάρος	Τουλάχιστον 25 000
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε άζωτο (N) τουλάχιστον 11,5 % και κατ' ανώτατο όριο 12,8 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτή στο νερό και στην αιθανόλη. Αδιάλυτη στον αιθέρα
pH	Από 3,0 έως 7,0 (διάλυμα 5 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	5 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Ολική τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Αλδεΐδες	500 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (ως ακεταλδεΐδη)
Ελεύθερη Ν-βινυλοπυρρολιδόνη	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδραζίνη	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 1202 ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΠΟΛΥΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Κροσποβιδόνη· πολυβιδόνη με σταυροδεσμούς· αδιάλυτη πολυβινυλοπυρρολιδόνη
<b>Ορισμός</b>	Η πολυβινυλοπολυπυρρολιδόνη είναι πολυ[1-(2-οξο-1-πυρρολιδινυλ)αιθυλένιο], με τυχαίους σταυροδεσμούς. Παράγεται με πολυμερισμό της Ν-βινυλο-2-πυρρολιδόνης παρουσία είτε καυστικού καταλύτη είτε Ν, Ν'-διβινυλ-ιμιδαζολιδόνης. Λόγω του ότι είναι αδιάλυτη σε όλους τους κοινούς διαλύτες, το εύρος τιμών του μοριακού βάρους δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αναλυτικά
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Πολυβινυλοπυρρολιδόνη· πολυ[1-(2-οξο-1-πυρρολιδινυλ)αιθυλένιο]
Χημικός τύπος	(C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> NO) <sub>n</sub>
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε άζωτο (N) τουλάχιστον 11 % και κατ' ανώτατο όριο 12,8 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή υγροσκοπική σκόνη με ελαφρά, μη δυσάρεστη οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Αδιάλυτη στο νερό, στην αιθανόλη και στον αιθέρα

**▼ B**

pH	Από 5,0 έως 8,0 (εναίωρημα σε νερό 1 %)
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	6 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Θεϊκή τέφρα	0,4 % κατ' ανώτατο όριο
Υδατοδιαλυτές ύλες	1 % κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερη Ν-βινυλοπυρρολιδόνη	10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερη Ν,Ν'-διβινυλ-ιμιδαζολιδόνη	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 1203 ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ****Συνώνυμα**

Πολυμερές βινυλικής αλκοόλης, PVOH

**Ορισμός**

Η πολυβινυλική αλκοόλη είναι συνθετική ρητίνη που παρασκευάζεται με πολυμερισμό του οξικού βινυλίου και μερική υδρόλυση του εστέρα παρουσία αλκαλικού καταλύτη. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος εξαρτώνται από τον βαθμό πολυμερισμού και τον βαθμό υδρόλυσης.

Χημική ονομασία

Ομοπολυμερές βινυλικής αλκοόλης

Χημικός τύπος

 $(C_2H_3OR)_n$  όπου R = H ή COCH<sub>3</sub>**Περιγραφή**

Άοσμη, άγευστη, ημιδιαφανής, λευκή ή υπόλευκη κοκκώδης σκόνη

**Ταυτοποίηση****▼ M17**

Διαλυτότητα

Διαλυτή στο νερό· πρακτικά αδιάλυτη ή αδιάλυτη στην αιθανόλη ( $\geq 99,8$  %)**▼ B**

Αντίδραση καθίζησης

Διαλύονται 0,25 g του δείγματος σε 5 ml νερού με θέρμανση. Το διάλυμα αφήνεται να ψυχθεί σε θερμοκρασία δωματίου. Με την προσθήκη 10 ml αιθανόλης στο διάλυμα αυτό σχηματίζεται λευκό θόλωμα ή κροκιδώδες ίζημα.

Χρωματική αντίδραση

Διαλύονται 0,01 g του δείγματος σε 100 ml νερού με θέρμανση. Το διάλυμα αφήνεται να ψυχθεί σε θερμοκρασία δωματίου. Με την προσθήκη, σε 5 ml του διαλύματος, μιας σταγόνας ιωδιούχου διαλύματος ελέγχου (TS) και λίγων σταγόνων διαλύματος βορικού οξέος εμφανίζεται κυανό χρώμα.

Διαλύονται 0,5 g του δείγματος σε 10 ml νερού με θέρμανση. Το διάλυμα αφήνεται να ψυχθεί σε θερμοκρασία δωματίου. Με την προσθήκη μιας σταγόνας ιωδιούχου διαλύματος ελέγχου (TS) σε 5 ml διαλύματος εμφανίζεται βαθυκόκκινο έως κυανό χρώμα.

Ιξώδες

4,8 έως 5,8 mPa.s (διάλυμα 4 % στους 20 °C) που ισοδυναμεί με μέσο μοριακό βάρος 26 000-30 000 Da

**Καθαρότητα**

Ύλες αδιάλυτες στο νερό

0,1 % κατ' ανώτατο όριο

Αριθμός σαπωνοποίησης

Από 125 έως 153 mg KOH/g

Βαθμός υδρόλυσης

86,5 έως 89,0 %

Βαθμός οξύτητας

3,0 κατ' ανώτατο όριο

Υπολείμματα διαλυτών

1,0 % μεθανόλης, 1,0 % οξικού μεθυλεστέρα κατ' ανώτατο όριο

pH

5,0 έως 6,5 (διάλυμα 4 %)

Απώλεια κατά την ξήρανση

5,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 3 ώρες)

Απώλεια κατά την καύση

1,0 % κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2,0 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **B****E 1204 ΠΟΥΛΟΥΛΑΝΗ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

**Περιγραφή****Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

pH

Καθίζηση με πολυαιθυλενογλυκόλη 600

Αποπολυμερισμός με πουλουλανάση

Ιξώδες

**Καθαρότητα**

Απόλεια κατά την ξήρανση

Μονο-, δι- και ολιγοσακχαρίτες

Μόλυβδος

**Μικροβιολογικά κριτήρια**

Ζυμομόκητες και ευρωτομούκητες

Κολοβακτηρίδια

Salmonella spp.

Γραμμική, ουδέτερη γλυκάνη που αποτελείται κυρίως από δομικές μονάδες μαλτοτριόζης που συνδέονται με γλυκοζιτικούς δεσμούς 1,6. Παράγεται με ζύμωση από υδρολυμένο άμυλο κατάλληλο για τρόφιμα, με τη χρήση μη τοξινογόνου στελέχους του *Aureobasidium pullulans*. Μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης, απομακρύνονται με μικροδιήθηση τα κύτταρα του μύκητα, το διήθημα αποστειρώνεται με θέρμανση, ενώ οι χρωστικές και οι άλλες προσμείξεις απομακρύνονται με προσρόφηση και χρωματογραφία ιονανταλλαγής

232-945-1

 $(C_6H_{10}O_5)_n$ 

Ελάχιστη περιεκτικότητα σε γλυκάνη 90 % επί ξηράς ουσίας

Λευκή ή υπόλευκη άοσμη σκόνη

Διαλυτή στο νερό, πρακτικά αδιάλυτη στην αιθανόλη

5,0 έως 7,0 (διάλυμα 10 %)

Προστίθενται 2 ml πολυαιθυλενογλυκόλης 600 σε 10 ml υδατικού διαλύματος πουλουλάνης 2 %. Σχηματίζεται λευκό ίζημα

Σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες φέρονται 10 ml διαλύματος πουλουλάνης 10 %. Στον ένα σωλήνα προστίθενται 0,1 ml διαλύματος πουλουλανάσης με δραστικότητα 10 μονάδες/g και στον άλλο 0,1 ml νερού. Μετά από επώαση στους 25 °C περίπου επί 20 λεπτά, το ιξώδες του διαλύματος που υπέστη κατεργασία με πουλουλανάση είναι εμφανώς χαμηλότερο από το ιξώδες του διαλύματος που δεν υπέστη κατεργασία

100 έως 180 mm<sup>2</sup>/s (υδατικό διάλυμα 10 % w/w στους 30 °C)

6 % κατ' ανώτατο όριο (90 °C, πίεση 50 mm Hg κατ' ανώτατο όριο, 6 ώρες)

10 % κατ' ανώτατο όριο, εκφραζόμενη σε γλυκόζη

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

100 αποικίες ανά γραμμάριο, κατ' ανώτατο όριο

Απουσία σε 25 g

Απουσία σε 25 g

**E 1205 ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΕΣ****Συνώνυμα**

Βασικό βουτυλιωμένο μεθακρυλικό συμπολυμερές· αμινομεθακρυλικό συμπολυμερές· συμπολυμερές E μεθακρυλικού αμιναλκυλίου· πολυμερές μεθακρυλικού βουτυλίου, μεθακρυλικού διμεθυλαμινοαιθυλίου, μεθακρυλικού μεθυλίου· πολυμερές μεθακρυλικού βουτυλίου, μεθακρυλικού μεθυλίου, μεθακρυλικού διμεθυλαμινοαιθυλίου

▼ **M22****Ορισμός**

Το βασικό μεθακρυλικό συμπολυμερές παρασκευάζεται με θερμικά ελεγχόμενο πολυμερισμό των μονομερών μεθακρυλικό μεθύλιο, μεθακρυλικό βουτύλιο και μεθακρυλικό διμεθυλαμινοαιθύλιο (διαλυμένων σε προπανόλη-2), με χρήση δότη ελευθέρων ριζών ως συστήματος εκκινητή. Ως παράγοντας τροποποίησης της αλυσίδας χρησιμοποιείται μία αλκυλομερκαπτάνη. Το πολυμερές διάλυμα υποβάλλεται σε διέλαση και κοκκοποίηση υπό κενό, ώστε να απομακρυνθούν τα υπολειμματικά πτητικά συστατικά. Οι κόκκοι που προκύπτουν διατίθενται με τη μορφή αυτή στο εμπόριο ή υποβάλλονται σε στάδιο άλεσης (μικροκονιοποίηση).

**▼ B**

Χημική ονομασία	Πολυ[(μεθακρυλικό βουτύλιο)- <i>co</i> -(μεθακρυλικό 2-διμεθυλαμινοαιθύλιο)- <i>co</i> -(μεθακρυλικό μεθύλιο)] 1:2:1
Χημικός τύπος	$\text{Poly}[(\text{CH}_2:\text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{CH}_3)_2)\text{-co-}(\text{CH}_2:\text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2\text{CH}_3)\text{-co-}(\text{CH}_2:\text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3)]$
Κατά βάρος μέσο μοριακό βάρος υπολογιζόμενο με χρωματογραφία διαπεράσεως πηκτής	47 000 g/mol περίπου

**▼ M22**

Κοκκομετρικός βαθμός της σκόνης (όταν χρησιμοποιείται σχηματίζει μεμβράνη)	< 50 μm τουλάχιστον 95 % < 20 μm τουλάχιστον 50 % < 3 μm κατ' ανώτατο όριο 10 %
--	---

**▼ B**

Δοκιμασία: (σύμφωνα με την Ph. Eur. 2.2.20 «ποτενσιομετρική τιτλοδότηση»)	Περιεκτικότητα 20,8 % - 25,5 % σε διμεθυλαμινοαιθυλομάδες (DMAE) επί ξηράς ουσίας
--	---

**Περιγραφή**

Οι κόκκοι είναι άχρωμοι ή έχουν κίτρινη χροιά, ενώ η σκόνη είναι λευκή

**Ταυτοποίηση**

Φασματοσκοπία απορρόφησης υπερύθρου	Να προσδιοριστεί
Ιξώδες διαλύματος 12,5 % σε μείγμα προπανόλης-2 και ακετόνης 60:40 (w/w)	3 – 6 mPa.s
Δείκτης διάθλασης	$[\eta]_{\text{D}}^{20}$ 1,380 – 1,385
Διαλυτότητα	1 g διαλύεται σε 7 g μεθανόλης, αιθανόλης, προπανόλης-2, διχλωρομεθανίου, υδατικού διαλύματος υδροχλωρικού οξέος 1N. Αδιάλυτο σε πετρελαϊκό αιθέρα.

**▼ M6****Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	2,0 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 3 h)
Αριθμός αλκαλίου	162-198 mg KOH/g ξηρής ουσίας
Θεϊκή τέφρα	0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Υπολειμματικά μονομερή	Μεθακρυλικό βουτύλιο < 1 000 mg/kg Μεθακρυλικό μεθύλιο < 1 000 mg/kg Μεθακρυλικό διμεθυλαμινοαιθύλιο < 1 000 mg/kg
Υπολείμματα διαλυτών	Προπανόλη-2 < 0,5 % Βουτανόλη < 0,5 % Μεθανόλη < 0,1 %
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Υδράργυρος	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Κάδμιο	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 1206 ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ****Συνώνυμα**

Πολυμερές ακρυλικού αιθυλίου μεθακρυλικού μεθυλίου· πολυμερές ακρυλικού αιθυλίου, μεθακρυλικού μεθυλίου· ακρυλικό αιθύλιο, πολυμερές με μεθακρυλικό μεθύλιο· πολυμερές μεθακρυλικού μεθυλίου, ακρυλικού αιθυλίου· μεθακρυλικό μεθύλιο, πολυμερές με ακρυλικό αιθύλιο

▼ **M6**

<b>Ορισμός</b>	Το ουδέτερο μεθακρυλικό πολυμερές είναι ένα πλήρως πολυμερισμένο πολυμερές μεθακρυλικού μεθυλίου και ακρυλικού αιθυλίου. Παράγεται με τη μέθοδο πολυμερισμού σε γαλάκτωμα. Παρασκευάζεται μέσω εκκινούμενου με οξειδοαναγωγή πολυμερισμού των μονομερών ακρυλικό αιθύλιο και μεθακρυλικό μεθύλιο με χρήση δότη ελεύθερων ριζών ως συστήματος εκκινητή οξειδοαναγωγής που σταθεροποιείται με μονοστεατυλαιθέρα της πολυαιθυλενογλυκόλης και βινυλικό οξύ/υδροξείδιο του νατρίου. Τα υπολειμματικά μονομερή απομακρύνονται με απόσταξη υδρατμών.
Αριθ. CAS	9010-88-2
Χημική ονομασία	Πολυ(ακρυλικό αιθύλιο-co-μεθακρυλικό μεθύλιο) 2:1
Χημικός τύπος	Πολυ[(CH <sub>2</sub> :CHCO <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> )-co-(CH <sub>2</sub> :C(CH <sub>3</sub> )CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> )]
Μέσο μοριακό βάρος	600 000 g/mol περίπου
Δοκιμασία / Υπόλειμμα εξάτμισης	28,5–31,5 % Διασπορά 1 g ξηραίνεται στον κλίβανο επί 3 ώρες στους 110 °C.
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή-γαλακτόχρους διασπορά (η εμπορική μορφή είναι 30 % διασπορά της ξηράς ύλης στο νερό) χαμηλού ιξώδους με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή.
<b>Τυποποίηση</b>	
Φασματοσκοπία απορρόφησης υπεράθρου	Το χαρακτηριστικό φάσμα της ένωσης
Ιξώδες	Μέγ. 50 mPa.s, 30 rpm/20 °C (ιξωδομετρία Brookfield)
Τιμή pH	5,5–8,6
Σχετική πυκνότητα (στους 20 °C)	1,037-1,047
Διαλυτότητα	Η διασπορά είναι αναμειζίμη με νερό σε οποιαδήποτε αναλογία. Το πολυμερές και η διασπορά είναι ευδιάλυτα σε ακετόνη, αιθανόλη και ισοπροπυλική αλκοόλη. Δεν είναι διαλυτά όταν αναμειγνύονται με 1 N υδροξείδιου του νατρίου σε αναλογία 1:2.
<b>Καθαρότητα</b>	
Θεϊκή τέφρα	0,4 % κατ' ανώτατο όριο στη διασπορά
Υπολειμματικά μονομερή	Σύνολο μονομερών (άθροισμα μεθακρυλικού μεθυλίου και ακρυλικού αιθυλεστέρα): 100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο στη διασπορά
Υπολειμματικός γαλακτωματοποιητής	Μονοστεατυλαιθέρας της πολυαιθυλενογλυκόλης (macrogol stearyl ether 20) σε ποσοστό 0,7 % κατ' ανώτατο όριο στη διασπορά
Υπολείμματα διαλυτών	Αιθανόλη 0,5 % κατ' ανώτατο όριο στη διασπορά Μεθανόλη 0,1 % κατ' ανώτατο όριο στη διασπορά
Αρσενικό	0,3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο στη διασπορά
Μόλυβδος	0,9 mg/kg κατ' ανώτατο όριο στη διασπορά
Υδράργυρος	0,03 mg/kg κατ' ανώτατο όριο στη διασπορά
Κάδμιο	0,3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο στη διασπορά

**E 1207 ANIONΙΚΟ ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ**

<b>Συνώνυμα</b>	Πολυμερές ακρυλικού μεθυλίου, μεθακρυλικού μεθυλίου, μεθακρυλικού οξέος· μεθακρυλικό οξύ, πολυμερές με ακρυλικό μεθύλιο και μεθακρυλικό μεθύλιο
-----------------	---



▼ **M6**

<b>Ορισμός</b>	Το ανιονικό μεθακρυλικό πολυμερές είναι ένα πλήρως πολυμερισμένο πολυμερές μεθακρυλικού οξέος, μεθακρυλικού μεθυλεστέρα και ακρυλικού μεθυλίου. Παρασκευάζεται σε υδατώδες μέσο με πολυμερισμό σε γαλάκτωμα μεθακρυλικού μεθυλίου, ακρυλικού μεθυλίου και μεθακρυλικού οξέος με χρήση δότη ελεύθερων ριζών ως συστήματος εκκινήτη που σταθεροποιείται με λαυρυλοθειικό νάτριο και μονοελαϊκή πολυοξυαιθυλενοσορβιτάνη (polysorbate 80). Τα υπολειμματικά μονομερή απομακρύνονται με απόσταξη υδρατμών.
Αριθ. CAS	26936-24-3
Χημική ονομασία	Πολυ(ακρυλικό μεθύλιο-co-μεθακρυλικό μεθύλιο-co-μεθακρυλικό οξύ) 7:3:1
Χημικός τύπος	Πολυ[(CH <sub>2</sub> :CHCO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> )-co-(CH <sub>2</sub> :C(CH <sub>3</sub> )CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> )-co-(CH <sub>2</sub> :C(CH <sub>3</sub> )COOH)]
Μέσο μοριακό βάρος	280 000 g/mol περίπου
Δοκιμασία / Υπόλειμμα εξάτμισης	28,5–31,5 % 1 g της διασποράς ξηραίνεται στον κλίβανο επί 5 ώρες στους 110 °C. 9,2–12,3 % μονάδων μεθακρυλικού οξέος στην ξηρή ύλη.
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή-γαλακτώχρους διασπορά (η εμπορική μορφή είναι 30 % διασπορά της ξηράς ύλης στο νερό) χαμηλού ιξώδους με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Φασματοσκοπία απορρόφησης υπερούθρου	Το χαρακτηριστικό φάσμα της ένωσης
Ιξώδες	Μέγ. 20 mPa.s, 30 rpm/20 °C (ιξωδομετρία Brookfield)
Τιμή pH	2,0–3,5
Σχετική πυκνότητα (στους 20 °C)	1,058-1,068
Διαλυτότητα	Η διασπορά είναι αναμειζιμη με νερό σε οποιαδήποτε αναλογία. Το πολυμερές και η διασπορά είναι ευδιάλυτα σε ακετόνη, αιθανόλη και ισοπροπυλική αλκοόλη. Είναι διαλυτά όταν αναμειγνύονται με 1 N υδροξειδίου του νατρίου σε αναλογία 1:2. Διαλυτά πάνω από pH 7,0.
<b>Καθαρότητα</b>	
Βαθμός οξύτητας	60–80 mg KOH/g ξηρής ουσίας
Θεϊκή τέφρα	0,2 % κατ' ανώτατο όριο στη διασπορά
Υπολειμματικά μονομερή	Σύνολο μονομερών (άθροισμα μεθακρυλικού οξέος, μεθακρυλικού μεθυλίου και ακρυλικού αιθυλεστέρα): 100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο στη διασπορά
Υπολειμματικοί γαλακτωματοποιητές	Λαυρυλοθειικό νάτριο σε ποσοστό 0,3 % κατ' ανώτατο όριο στην ξηρή ύλη Polysorbate 80 σε ποσοστό 1,2 % κατ' ανώτατο όριο στην ξηρή ύλη
Υπολείμματα διαλυτών	Μεθανόλη 0,1 % κατ' ανώτατο όριο στη διασπορά
Αρσενικό	0,3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο στη διασπορά
Μόλυβδος	0,9 mg/kg κατ' ανώτατο όριο στη διασπορά
Υδράργυρος	0,03 mg/kg κατ' ανώτατο όριο στη διασπορά
Κάδμιο	0,3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο στη διασπορά

▼ **M9****E 1208 ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗΣ-ΟΞΙΚΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ**

<b>Συνώνυμα</b>	Συμπολυβιδόνη· συμποδιόνη· συμπολυμερές 1-βινυλο-2-πυρρολιδινόνης-οξικού βινυλίου· 2-πυρρολιδινόνη, 1-αιθενυλο-, πολυμερές με οξικό αιθενύλιο
<b>Ορισμός</b>	Παράγεται με συμπολυμερισμό ελεύθερων ριζών N-βινυλο-2-πυρρολιδινόνης και οξικού βινυλίου σε διάλυμα προπαν-2-όλης, παρουσία εκκινητών
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Οξικού οξέος, αιθελνεστέρας, πολυμερές με 1-αιθενυλο-2-πυρρολιδινόνη-0
Χημικός τύπος	$(C_6H_9NO)_n.(C_4H_6O_2)_m$
Μοριακό βάρος μέσου ιξώδους	Μεταξύ 26 000 και 46 000 g/mol
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε άζωτο 7,0-8,0 %
<b>Περιγραφή</b>	Η φυσική κατάσταση περιγράφεται ως λευκή έως λευκοκίτρινη σκόνη ή νιφάδες με μέσο μέγεθος σωματιδίων 50-130 μm
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Ευδιάλυτο σε νερό, αιθανόλη, χλωριούχο αιθυλένιο και αιθέρα
Φασματοσκοπία απορρόφησης υπεριθρού	Να προσδιοριστεί
Ευρωπαϊκή δοκιμή χρωμάτων (χρώμα BY)	Ελάχιστο BY5
Τιμή K <sup>(1)</sup> (1 % στερεά σε υδατικό διάλυμα)	25,2-30,8
τιμή pH	3,0-7,0 (10 % υδατικό διάλυμα)
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα συμπολυμερούς σε οξικό βινύλιο	42,0 % κατ' ανώτατο όριο
Ελεύθερο οξικό βινύλιο	Έως 5 mg/kg
Ολική τέφρα	Έως 0,1 %
Αλδεΐδες	Έως 2 000 mg/kg (ως ακεταλδεΐδη)
Ελεύθερη N-βινυλοπυρρολιδόνη	Έως 5 mg/kg
Υδραζίνη	Έως 0,8 mg/kg
Συγκέντρωση υπεροξειδίων	Έως 400 mg/kg
Προπαν-2-όλη	Έως 150 mg/kg
Αρσενικό	Έως 3 mg/kg
Μόλυβδος	Έως 2 mg/kg
Υδράργυρος	Έως 1 mg/kg
Κάδμιο	Έως 1 mg/kg

<sup>(1)</sup> Τιμή K: Αδιάστατος δείκτης, που υπολογίζεται από τις μετρήσεις κινηματικού ιξώδους των αραιών διαλυμάτων και χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον πιθανό βαθμό πολυμερισμού ή το μοριακό μέγεθος ενός πολυμερούς.

▼ **M13****E 1209 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ-ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ****Συνώνυμα**

Εμβολιασμένο συμπολυμερές macrogol-πολυ(βινυλικής αλκοόλης)-πολυ(αιθανο-1,2-διόλη-εμβολιασμένη-αιθανόλη)-αιθανόλη, πολυμερές με οξυράνιο, εμβολιασμένο· οξυράνιο, πολυμερές με αιθανόλη, εμβολιασμένο· εμβολιασμένο συμπολυμερές οξειδίου του αιθυλενίου-βινυλικής αλκοόλης

**Ορισμός**

Το εμβολιασμένο συμπολυμερές πολυβινυλικής αλκοόλης-πολυαιθυλενογλυκόλης είναι ένα συνθετικό συμπολυμερές που αποτελείται από περίπου 75 % μονάδες PVA και 25 % μονάδες PEG.

Αριθμός CAS

96734-39-3

Χημική ονομασία

*Εμβολιασμένο* συμπολυμερές πολυβινυλικής αλκοόλης-πολυαιθυλενογλυκόλης

Χημικός τύπος

Μέσο μοριακό βάρος κατά βάρος

40 000 έως 50 000 g/mol

**Περιγραφή**

Λευκή έως αχνοκίτρινη σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Διαλυτότητα

Εύκολα διαλυτό στο νερό και σε αραιωμένα οξέα και αραιά διαλύματα αλκαλικών υδροξειδίων· πρακτικά αδιάλυτο σε αιθανόλη, οξικό οξύ, ακετόνη και χλωροφόρμιο

Υπέρυθρο φάσμα

Πρέπει να συμμορφώνεται

Τιμή pH

5,0 — 8,0

**Καθαρότητα**

Αριθμός σαπωνοποίησης

10 έως 75 mg KOH/g

Δυναμικό ιξώδες

50 έως 250 mPa·s

Απώλεια κατά την ξήρανση

5 % κατ' ανώτατο όριο

Θεική τέφρα

2 % κατ' ανώτατο όριο

Οξικό βινύλιο

20 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Οξικό οξύ/ολικά οξικά

1,5 % κατ' ανώτατο όριο

▼ **M26**

Αιθυλενογλυκόλες (μονο- και δι-)

400 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (μεμονωμένα ή σε συνδυασμό)

▼ **M13**

1,4-διοξάνιο

10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **M37**

\_\_\_\_\_

▼ **M13**

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ **M39****E 1210 ΚΑΡΒΟΜΕΡΕΣ****Συνώνυμα**

καρβομερές, καρβοξυπολυμεθυλένιο· ομοπολυμερές καρβομερούς

**Ορισμός**

Πολυμερή υψηλής μοριακής μάζας που λαμβάνονται με πολυμερισμό ακρυλικού οξέος και σταυροσύνδεση με αλλυλοπενταερυθριτόλη. Τα πολυμερή συντίθενται μέσα σε οξικό αιθυλεστερά, με τη χρήση υπεροξειδίου για την εκκίνηση πολυμερισμού ελεύθερης ρίζας.

Αριθ. CAS

9007-20-9 (κύριος CAS), 9003-01-4 (δευτερεύων CAS)

▼ **M39**

Χημική ονομασία	Ομοπολυμερές καρβομερούς, σταυροσυνδεδεμένο με αλλυλοπενταερυθριτόλη		
Χημικός τύπος	$-(\text{CH}_2-\text{CH})_m-(\text{XM})_p$ $\text{COOH}$		
Μέσο μοριακό βάρος	<b>m</b> : αριθμός μονάδων μονομερούς· <b>XM</b> : παράγοντας σχηματισμού σταυροσυνδέσεων, <b>p</b> : αριθμός μονάδων παράγοντα σχηματισμού σταυροσυνδέσεων, με $m \gg p$		
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα σε καρβοξυλικό οξύ τουλάχιστον 56 % και έως 68 % κατ' ανώτατο όριο (επί ξηράς ουσίας)		
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή ή σχεδόν λευκή, αφράτη, υγροσκοπική σκόνη ή κόκκοι		
<b>Ταυτοποίηση</b>	Το χαρακτηριστικό φάσμα της ένωσης		
Φασματοσκοπία εξασθενημένης ολικής ανάκλασης υπεράθρου	Το χαρακτηριστικό φάσμα της ένωσης		
Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού πρωτονίων	Το χαρακτηριστικό φάσμα της ένωσης		
Ιξώδες (ιξωδομετρία Brookfield, 20 rpm) 25 °C	Τύπος Β	Τύπος Α	Τύπος Α
	29 400-39 400 mPa.s	4 000-11 000 mPa.s	
Φυσική μορφή	σκόνη	σκόνη	κόκκοι
Διέλευση από πλέγμα 40 mesh, % 425 μm	-	-	95 τουλάχιστον
Διέλευση από πλέγμα 100 mesh, % 150 μm	-	-	10 το πολύ
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο στο νερό. Υδατοδιαγώσιμο, σχηματίζει υδρογέλες σε υδατικές διασπορές.		
<b>Καθαρότητα</b>	Ακρυλικό οξύ 100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο		
Υπολειμματικά μονομερή	Τρι- και τετρα-αλλυλοπενταερυθριτόλη 1 000 mg/kg κατ' ανώτατο όριο		
Υπολειμματικός παράγοντας σχηματισμού σταυροσυνδέσεων	Οξικός αιθυλεστέρας 0,5 % κ.β. κατ' ανώτατο όριο		
Υπολειμματικός διαλύτης	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο		
2-Αιθυλεξάνολη	100 mg/kg κατ' ανώτατο όριο		
Οξικός 2-αιθυλεξυλεστέρας	0,75 % κ.β. κατ' ανώτατο όριο		
Κλάσμα κατώτερου μοριακού βάρους < 1 000 Da	2 % κατ' ανώτατο όριο		
Απώλειες κατά την ξήρανση	2,5 % κατ' ανώτατο όριο		
Θευκή τέφρα			

▼ **B****E 1404 ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ ΑΜΥΛΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Αριθ. EINECS  
Χημική ονομασία  
Χημικός τύπος  
Μοριακό βάρος  
Δοκιμασία

Το οξειδωμένο άμυλο είναι άμυλο κατεργασμένο με υποχλωριώδες νάτριο

**▼ B**

<b>Περιγραφή</b>	Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη ή κόκκοι ή (εάν έχει προζελατινοποιηθεί) νιφάδες ή άμορφη ή χονδρόκοκκη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Παρατήρηση με μικροσκόπιο	Δοκιμή θετική (εάν δεν έχει προζελατινοποιηθεί)
Χρώση με ιώδιο	Δοκιμή θετική (βαθυκόανο έως ανοικτό κόκκινο χρώμα)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	15,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο σιτηρών 21,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο πατάτας 18,0 % κατ' ανώτατο όριο για άλλα άμυλα
Καρβοξύλια	1,1 % κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Διοξειδίο του θείου	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για τροποποιημένα άμυλα σιτηρών (επί άνυδρης ουσίας) 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για άλλα τροποποιημένα άμυλα, εκτός αν άλλως καθορίζεται (επί άνυδρης ουσίας)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Υδράργυρος	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 1410 ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΜΥΛΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Το δισόξινο φωσφορικό άμυλο είναι άμυλο εστεροποιημένο με ορθοφωσφορικό οξύ ή ορθοφωσφορικό νάτριο ή κάλιο ή με τριτολυφωσφορικό νάτριο
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη ή κόκκοι ή (εάν έχει προζελατινοποιηθεί) νιφάδες ή άμορφη ή χονδρόκοκκη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Παρατήρηση με μικροσκόπιο	Δοκιμή θετική (εάν δεν έχει προζελατινοποιηθεί)
Χρώση με ιώδιο	Δοκιμή θετική (βαθυκόανο έως ανοικτό κόκκινο χρώμα)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	15,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο σιτηρών 21,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο πατάτας 18,0 % κατ' ανώτατο όριο για άλλα άμυλα

**▼ B**

Υπολειμματικά φωσφορικά ιόντα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (ως P) για άμυλο σίτου ή πατάτας (επί άνδρης ουσίας) 0,4 % κατ' ανώτατο όριο (ως P) για άλλα άμυλα (επί άνδρης ουσίας)
Διοξείδιο του θείου	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για τροποποιημένα άμυλα σιτηρών (επί άνδρης ουσίας) 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για άλλα τροποποιημένα άμυλα, εκτός αν άλλως καθορίζεται (επί άνδρης ουσίας)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί άνδρης ουσίας)
Υδράργυρος	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 1412 ΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΜΥΛΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Το όξινο φωσφορικό άμυλο είναι άμυλο συνδεδεμένο με σταυροδεσμούς με τριμεταφωσφορικό νάτριο ή οξυγλωριούχο φωσφόρο

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

**Περιγραφή**

Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη ή κόκκοι ή (εάν έχει προζελατινοποιηθεί) νιφάδες ή άμορφη ή χονδρόκοκκη σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Παρατήρηση με μικροσκόπιο

Δοκιμή θετική (εάν δεν έχει προζελατινοποιηθεί)

Χρώση με ιώδιο

Δοκιμή θετική (βαθνύαο έως ανοικτό κόκκινο χρώμα)

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση

15,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο σιτηρών

21,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο πατάτας

18,0 % κατ' ανώτατο όριο για άλλα άμυλα

Υπολειμματικά φωσφορικά ιόντα

0,5 % κατ' ανώτατο όριο (ως P) για άμυλο σίτου ή πατάτας (επί άνδρης ουσίας)

0,4 % κατ' ανώτατο όριο (ως P) για άλλα άμυλα (επί άνδρης ουσίας)

Διοξείδιο του θείου

50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για τροποποιημένα άμυλα σιτηρών (επί άνδρης ουσίας)

10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για άλλα τροποποιημένα άμυλα, εκτός αν άλλως καθορίζεται (επί άνδρης ουσίας)

Αρσενικό

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί άνδρης ουσίας)

Υδράργυρος

0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο



#### E 1413 ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΜΕΝΟ ΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΜΥΛΟ

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Το φωσφορυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο είναι άμυλο που έχει υποβληθεί σε συνδυασμό κατεργασιών, όπως περιγράφεται για το δισόξινο και το όξινο φωσφορικό άμυλο
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη ή κόκκοι ή (εάν έχει προζελατινοποιηθεί) νιφάδες ή άμορφη ή χονδρόκοκκη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Παρατήρηση με μικροσκόπιο	Δοκιμή θετική (εάν δεν έχει προζελατινοποιηθεί)
Χρώση με ιώδιο	Δοκιμή θετική (βαθνύαυο έως ανοικτό κόκκινο χρώμα)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	15,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο σιτηρών 21,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο πατάτας 18,0 % κατ' ανώτατο όριο για άλλα άμυλα
Υπολειμματικά φωσφορικά ιόντα	0,5 % κατ' ανώτατο όριο (ως P) για άμυλο σίτου ή πατάτας (επί άνυδρης ουσίας) 0,4 % κατ' ανώτατο όριο (ως P) για άλλα άμυλα (επί άνυδρης ουσίας)
Διοξειδίο του θείου	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για τροποποιημένα άμυλα σιτηρών (επί άνυδρης ουσίας) 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για άλλα τροποποιημένα άμυλα, εκτός αν άλλως καθορίζεται (επί άνυδρης ουσίας)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Υδράργυρος	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

#### E 1414 ΑΚΕΤΥΛΙΩΜΕΝΟ ΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΜΥΛΟ

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Το ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο είναι άμυλο συνδεδεμένο με σταυροδεσμούς με τριμεταφωσφορικό νάτριο ή οξυγλωριούχο φωσφόρο και εστεροποιημένο με οξικό ανυδρίτη ή οξικό βινυλεστέρα
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη ή κόκκοι ή (εάν έχει προζελατινοποιηθεί) νιφάδες ή άμορφη ή χονδρόκοκκη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Παρατήρηση με μικροσκόπιο	Δοκιμή θετική (εάν δεν έχει προζελατινοποιηθεί)
Χρώση με ιώδιο	Δοκιμή θετική (βαθνύαυο έως ανοικτό κόκκινο χρώμα)

**▼ B****Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	15,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο σιτηρών 21,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο πατάτας 18,0 % κατ' ανώτατο όριο για άλλα άμυλα
Ακετυλομάδες	2,5 % κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Υπολειμματικά φωσφορικά ιόντα	0,14 % κατ' ανώτατο όριο (ως P) για άμυλο σίτου ή πατάτας (επί άνυδρης ουσίας) 0,04 % κατ' ανώτατο όριο (ως P) για άλλα άμυλα (επί άνυδρης ουσίας)
Οξικός βινυλεστέρας	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Διοξειδίο του θείου	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για τροποποιημένα άμυλα σιτηρών (επί άνυδρης ουσίας) 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για άλλα τροποποιημένα άμυλα, εκτός αν άλλως καθορίζεται (επί άνυδρης ουσίας)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Υδράργυρος	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 1420 ΑΚΕΤΥΛΙΩΜΕΝΟ ΑΜΥΛΟ****Συνώνυμα**

Οξικό άμυλο

**Ορισμός**

Το ακετυλιωμένο άμυλο είναι άμυλο εστεροποιημένο με οξικό ανυδρίτη ή οξικό βινυλεστέρα

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

**Περιγραφή**

Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη ή κόκκοι ή (εάν έχει προζελατινοποιηθεί) νιφάδες ή άμορφη ή χονδρόκοκκη σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Παρατήρηση με μικροσκόπιο

Δοκιμή θετική (εάν δεν έχει προζελατινοποιηθεί)

Χρώση με ιώδιο

Δοκιμή θετική (βαθυκόανο έως ανοικτό κόκκινο χρώμα)

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	15,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο σιτηρών 21,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο πατάτας 18,0 % κατ' ανώτατο όριο για άλλα άμυλα
Ακετυλομάδες	2,5 % κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Οξικός βινυλεστέρας	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Διοξειδίο του θείου	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για τροποποιημένα άμυλα σιτηρών (επί άνυδρης ουσίας) 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για άλλα τροποποιημένα άμυλα, εκτός αν άλλως καθορίζεται (επί άνυδρης ουσίας)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Υδράργυρος	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο



▼ B**E 1422 ΑΚΕΤΥΛΙΩΜΕΝΟ ΟΞΙΝΟ ΑΔΙΠΙΚΟ ΑΜΥΛΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Το ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό άμυλο είναι άμυλο συνδεδεμένο με σταυροδεσμούς με αδιπικό ανυδρίτη και εστεροποιημένο με οξικό ανυδρίτη
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη ή κόκκοι ή (εάν έχει προζελατινοποιηθεί) νιφάδες ή άμορφη ή χονδρόκοκκη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Παρατήρηση με μικροσκόπιο	Δοκιμή θετική (εάν δεν έχει προζελατινοποιηθεί)
Χρώση με ιώδιο	Δοκιμή θετική (βαθνύαο έως ανοικτό κόκκινο χρώμα)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ζήραση	15,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο σιτηρών 21,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο πατάτας 18,0 % κατ' ανώτατο όριο για άλλα άμυλα
Ακετυλομάδες	2,5 % κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Αδιπικές ομάδες	0,135 % κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Διοξειδίο του θείου	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για τροποποιημένα άμυλα σιτηρών (επί άνυδρης ουσίας) 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για άλλα τροποποιημένα άμυλα, εκτός αν άλλως καθορίζεται (επί άνυδρης ουσίας)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Υδράργυρος	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 1440 ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΑΜΥΛΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Το υδροξυπροπυλάμυλο είναι άμυλο αιθεροποιημένο με προπυλενοξείδιο
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη ή κόκκοι ή (εάν έχει προζελατινοποιηθεί) νιφάδες ή άμορφη ή χονδρόκοκκη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Παρατήρηση με μικροσκόπιο	Δοκιμή θετική (εάν δεν έχει προζελατινοποιηθεί)
Χρώση με ιώδιο	Δοκιμή θετική (βαθνύαο έως ανοικτό κόκκινο χρώμα)

**▼ B****Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	15,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο σιτηρών 21,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο πατάτας 18,0 % κατ' ανώτατο όριο για άλλα άμυλα
Υδροξυπροπυλομάδες	7,0 % κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Προπυλενοχλωρυδρίνη	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Διοξειδίο του θείου	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για τροποποιημένα άμυλα σιτηρών (επί άνυδρης ουσίας) 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για άλλα τροποποιημένα άμυλα, εκτός αν άλλως καθορίζεται (επί άνυδρης ουσίας)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Υδράργυρος	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 1442 ΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΑΜΥΛΟ****Συνώνυμα****Ορισμός**

Το όξινο φωσφορικό υδροξυπροπυλάμυλο είναι άμυλο συνδεδεμένο με σταυροδεσμούς με τριμεταφωσφορικό νάτριο ή οξυχλωριούχο φωσφόρο και αιθεροποιημένο με προπυλενοξειδίο

Αριθ. EINECS

Χημική ονομασία

Χημικός τύπος

Μοριακό βάρος

Δοκιμασία

**Περιγραφή**

Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη ή κόκκοι ή (εάν έχει προζελατινοποιηθεί) νιφάδες ή άμορφη ή χονδρόκοκκη σκόνη

**Ταυτοποίηση**

Παρατήρηση με μικροσκόπιο

Δοκιμή θετική (εάν δεν έχει προζελατινοποιηθεί)

Χρώση με ιώδιο

Δοκιμή θετική (βαθνύαο έως ανοικτό κόκκινο χρώμα)

**Καθαρότητα**

Απώλεια κατά την ξήρανση	15,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο σιτηρών 21,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο πατάτας 18,0 % κατ' ανώτατο όριο για άλλα άμυλα
Υδροξυπροπυλομάδες	7,0 % κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Υπολειμματικά φωσφορικά ιόντα	0,14 % κατ' ανώτατο όριο (ως P) για άμυλο σίτου ή πατάτας (επί άνυδρης ουσίας) 0,04 % κατ' ανώτατο όριο (ως P) για άλλα άμυλα (επί άνυδρης ουσίας)
Προπυλενοχλωρυδρίνη	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Διοξειδίο του θείου	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για τροποποιημένα άμυλα σιτηρών (επί άνυδρης ουσίας) 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για άλλα τροποποιημένα άμυλα, εκτός αν άλλως καθορίζεται (επί άνυδρης ουσίας)

▼ **B**

Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί άνδρης ουσίας)
Υδράργυρος	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 1450 ΟΚΤΕΝΥΛΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΜΥΛΟΝΑΤΡΙΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	SSOS
<b>Ορισμός</b>	Το οκτενυληλεκτρικό αμυλονάτριο είναι άμυλο εστεροποιημένο με οκτενυληλεκτρικό ανυδρίτη
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη ή κόκκοι ή (εάν έχει προζελατινοποιηθεί) νιφάδες ή άμορφη ή χονδρόκοκκη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Παρατήρηση με μικροσκόπιο	Δοκιμή θετική (εάν δεν έχει προζελατινοποιηθεί)
Χρώση με ιώδιο	Δοκιμή θετική (βαθύ κυανούν έως ανοικτό κόκκινο χρώμα)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απόλεια κατά την ξήρανση	15,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο σιτηρών 21,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο πατάτας 18,0 % κατ' ανώτατο όριο για άλλα άμυλα
Οκτενυληλεκτρομομάδες	3 % κατ' ανώτατο όριο (επί άνδρης ουσίας)
Υπόλειμμα οκτενυληλεκτρικού οξέος	0,3 % κατ' ανώτατο όριο (επί άνδρης ουσίας)
Διοξειδίο του θείου	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για τροποποιημένα άμυλα σιτηρών (επί άνδρης ουσίας) 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για άλλα τροποποιημένα άμυλα, εκτός αν άλλως καθορίζεται (επί άνδρης ουσίας)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί άνδρης ουσίας)
Υδράργυρος	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 1451 ΑΚΕΤΥΛΙΩΜΕΝΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ ΑΜΥΛΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Το ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο είναι άμυλο κατεργασμένο με υποχλωριώδες νάτριο και, στη συνέχεια, εστεροποιημένο με οξικό ανυδρίτη
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη ή κόκκοι ή (εάν έχει προζελατινοποιηθεί) νιφάδες ή άμορφη ή χονδρόκοκκη σκόνη

**▼ B**

<b>Ταυτοποίηση</b>	
Παρατήρηση με μικροσκόπιο	Δοκιμή θετική (εάν δεν έχει προξελατινοποιηθεί)
Χρώση με ιώδιο	Δοκιμή θετική (βαθνύκτανο έως ανοικτό κόκκινο χρώμα)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	15,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο σιτηρών 21,0 % κατ' ανώτατο όριο για άμυλο πατάτας 18,0 % κατ' ανώτατο όριο για άλλα άμυλα
Καρβοξύλια	1,3 % κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Ακετυλομάδες	2,5 % κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Διοξείδιο του θείου	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για τροποποιημένα άμυλα σιτηρών (επί άνυδρης ουσίας) 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για άλλα τροποποιημένα άμυλα, εκτός αν άλλως καθορίζεται (επί άνυδρης ουσίας)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Υδράργυρος	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 1452 ΑΡΓΙΛΙΟΥΧΟ ΟΚΤΕΝΥΛΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΜΥΛΟ**

<b>Συνώνυμα</b>	
<b>Ορισμός</b>	Το αργιλιούχο οκτενυληλεκτρικό άμυλο είναι άμυλο εστεροποιημένο με οκτενυληλεκτρικό ανυδρίτη και κατεργασμένο με θειικό αργίλιο
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	
Χημικός τύπος	
Μοριακό βάρος	
Δοκιμασία	
<b>Περιγραφή</b>	Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη ή κόκκοι ή (εάν έχει προξελατινοποιηθεί) νιφάδες ή άμορφη ή χονδρόκοκκη σκόνη
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Παρατήρηση με μικροσκόπιο	Δοκιμή θετική (εάν δεν έχει προξελατινοποιηθεί)
Χρώση με ιώδιο	Δοκιμή θετική (βαθνύκτανο έως ανοικτό κόκκινο χρώμα)
<b>Καθαρότητα</b>	
Απώλεια κατά την ξήρανση	21,0 % κατ' ανώτατο όριο
Οκτενυληλεκτρομάδες	3 % κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Υπόλειμμα οκτενυληλεκτρικού οξέος	0,3 % κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Διοξείδιο του θείου	50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για τροποποιημένα άμυλα σιτηρών (επί άνυδρης ουσίας) 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο για άλλα τροποποιημένα άμυλα, εκτός αν άλλως καθορίζεται (επί άνυδρης ουσίας)
Αρσενικό	1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)
Υδράργυρος	0,1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Αργίλιο	0,3 % κατ' ανώτατο όριο (επί άνυδρης ουσίας)

## ▼ B

## E 1505 ΚΙΤΡΙΚΟΣ ΤΡΙΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

<b>Συνώνυμα</b>	Κιτρικός αιθυλεστέρας
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	201-070-7
Χημική ονομασία	2-υδροξυπροπανο-1,2,3-τρικαρβοξυλικό τριαιθύλιο
Χημικός τύπος	C <sub>12</sub> H <sub>20</sub> O <sub>7</sub>
Μοριακό βάρος	276,29
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 %
<b>Περιγραφή</b>	Άοσμο, πρακτικά άχρωμο, ελαιώδες υγρό
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Ειδικό βάρος (25 °C/25 °C)	1,135-1,139
Δείκτης διάθλασης	[n] <sub>D</sub> <sup>20</sup> : 1,439-1,441
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	0,25 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Οξύτητα	0,02 % κατ' ανώτατο όριο (ως κιτρικό οξύ)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## E 1517 ΔΙΑΚΕΤΙΝΗ (ΔΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ)

<b>Συνώνυμα</b>	Διακετίνη
<b>Ορισμός</b>	Η διακετίνη αποτελείται κυρίως από ένα μείγμα οξικών 1,2- και 1,3-διεστέρων της γλυκερόλης και μικρές ποσότητες μονο- και τρι-εστέρων
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Διγλυκερίδιο του οξικού οξέος· Οξικός διεστέρας της προπανοτριόλης-1,2,3
Χημικός τύπος	C <sub>7</sub> H <sub>12</sub> O <sub>5</sub>
Μοριακό βάρος	176,17
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 94,0 %
<b>Περιγραφή</b>	Διαυγές, άχρωμο, υγροσκοπικό, σχετικά παχύρρευστο υγρό με ελαφρά οσμή λίπους
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτή στο νερό. Αναμειζίμη με αιθανόλη
Δοκιμή γλυκερόλης	Δοκιμή θετική
Δοκιμή οξικών ιόντων	Δοκιμή θετική
Ειδικό βάρος (20 °C/20 °C)	1,175-1,195
Πεδίο τιμών σημείου βρασμού	Από 259 έως 261 °C
<b>Καθαρότητα</b>	
Ολική τέφρα	0,02 % κατ' ανώτατο όριο
Οξύτητα	0,4 % (ως οξικό οξύ) κατ' ανώτατο όριο
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

▼ B**E 1518 ΤΡΙΑΚΕΤΙΝΗ (ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ)**

<b>Συνώνυμα</b>	Τριακετίνη
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	203-051-9
Χημική ονομασία	Τριγλυκερίδιο του οξικού οξέος
Χημικός τύπος	C <sub>9</sub> H <sub>14</sub> O <sub>6</sub>
Μοριακό βάρος	218,21
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98,0 %
<b>Περιγραφή</b>	Αχρωμο, κάπως ελαιώδες υγρό με ελαφρά οσμή λίπους
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Δοκιμή οξικών οξέων	Δοκιμή θετική
Δοκιμή γλυκερόλης	Δοκιμή θετική
Δείκτης διάθλασης	[n] <sub>D</sub> <sup>25</sup> από 1,429 έως 1,431
Ειδικό βάρος (25 °C/25 °C)	Από 1,154 έως 1,158
Πεδίο τιμών σημείου βρασμού	Από 258° έως 270 °C
<b>Καθαρότητα</b>	
Περιεκτικότητα σε νερό	0,2 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Θεϊκή τέφρα	0,02 % κατ' ανώτατο όριο (ως κιτρικό οξύ)
Αρσενικό	3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**E 1519 ΒΕΝΖΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ**

<b>Συνώνυμα</b>	Φαινυλοκαρβινόλη· φαινυλομεθυλική αλκοόλη· βενζολομεθανόλη· α-υδροξυτολουόλιο·
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	
Χημική ονομασία	Βενζυλική αλκοόλη· φαινυλομεθανόλη
Χημικός τύπος	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub> O
Μοριακό βάρος	108,14
Δοκιμασία	Τουλάχιστον 98,0 %
<b>Περιγραφή</b>	Αχρωμο, διαυγές υγρό με ελαφρά αρωματική οσμή
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτή στο νερό, στην αιθανόλη και στον αιθέρα
Δείκτης διάθλασης	[n] <sub>D</sub> <sup>20</sup> 1,538 - 1,541
Ειδικό βάρος (25 °C/25 °C)	1,042 - 1,047
Δοκιμή υπεροξειδίων	Δοκιμή θετική
Εύρος θερμοκρασιών απόσταξης	Τουλάχιστον το 95 % v/v του προϊόντος αποστάζει στους 202 °C έως 208 °C
<b>Καθαρότητα</b>	
Βαθμός οξύτητας	0,5 κατ' ανώτατο όριο
Αλδεΐδες	0,2 % v/v (ως βενζαλδεΐδη) κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## ▼ B

## E 1520 ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ-1, 2 (ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ)

<b>Συνώνυμα</b>	Προπυλενογλυκόλη
<b>Ορισμός</b>	
Αριθ. EINECS	200-338-0
Χημική ονομασία	1,2-διυδροξυπροπάνιο
Χημικός τύπος	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>
Μοριακό βάρος	76,10
Δοκιμασία	Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5 % επί άνυδρης ουσίας
<b>Περιγραφή</b>	Διαυγές, άχρωμο, υγροσκοπικό, παχύρρευστο υγρό
<b>Ταυτοποίηση</b>	
Διαλυτότητα	Διαλυτή στο νερό, στην αιθανόλη και στην ακετόνη
Ειδικό βάρος (20 °C/20 °C)	1,035 - 1,040
Δείκτης διάθλασης	[n] <sub>D</sub> <sup>20</sup> : 1,431 - 1,433
<b>Καθαρότητα</b>	
Δοκιμή απόσταξης	Το 99,5 % του προϊόντος αποστάζει στους 185 °C έως 189 °C. Το υπόλοιπο 0,5 % αποτελείται κυρίως από διμερή και ίχνη τριμερών της προπυλενογλυκόλης.
Θεική τέφρα	0,07 % κατ' ανώτατο όριο
Περιεκτικότητα σε νερό	1,0 % κατ' ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)
Μόλυβδος	2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

## E 1521 ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΕΣ

<b>Συνώνυμα</b>	PEG· μακρογύλη· πολυαιθυλενοξειδίο·
<b>Ορισμός</b>	Πολυμερή προσθήκης αιθυλενοξειδίου και νερού που συνήθως χαρακτηρίζονται από έναν αριθμό που αντιστοιχεί χονδρικά στο μοριακό τους βάρος.
Χημική ονομασία	α-υδρο-ω-υδροξυπολυ(οξυαιθανοδιόλη-1,2)
Χημικός τύπος	(C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O) <sub>n</sub> H <sub>2</sub> O (n = αριθμός μονάδων αιθυλενοξειδίου που αντιστοιχεί σε μοριακό βάρος 6 000, περίπου 140)
Μέσο μοριακό βάρος	380 έως 9 000 Da
Δοκιμασία	PEG 400: Τουλάχιστον 95 % και έως 105 % κατ' ανώτατο όριο PEG 3000: Τουλάχιστον 90 % και έως 110 % κατ' ανώτατο όριο PEG 3350: Τουλάχιστον 90 % και έως 110 % κατ' ανώτατο όριο PEG 4000: Τουλάχιστον 90 % και έως 110 % κατ' ανώτατο όριο PEG 6000: Τουλάχιστον 90 % και έως 110 % κατ' ανώτατο όριο PEG 8000: Τουλάχιστον 87,5 % και 112,5 % κατ' ανώτατο όριο
<b>Περιγραφή</b>	Η PEG 400 είναι διαυγές, παχύρρευστο, άχρωμο ή σχεδόν άχρωμο υγροσκοπικό υγρό Οι PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 και PEG 8000 είναι λευκά ή σχεδόν λευκά στερεά με κηρώδη ή παραφινώδη όψη

**▼ B****Ταυτοποίηση**

Πεδίο τιμών σημείου τήξης

PEG 400: 4-8 °C

PEG 3000: 50-56 °C

PEG 3350: 53-57 °C

PEG 4000: 53-59 °C

PEG 6000: 55-61 °C

PEG 8000: 55-62 °C

Ιξώδες

PEG 400: 105 έως 130 mPa.s στους 20 °C

PEG 3000: 75 έως 100 mPa.s στους 20 °C

PEG 3350: 83 έως 120 mPa.s στους 20 °C

PEG 4000: 110 έως 170 mPa.s στους 20 °C

PEG 6000: 200 έως 270 mPa.s στους 20 °C

PEG 8000: 260 έως 510 mPa.s στους 20 °C

Για τις πολυαιθυλενογλυκόλες με μέσο μοριακό βάρος μεγαλύτερο από 400, το ιξώδες προσδιορίζεται σε διάλυμα 50 % m/m της εξεταζόμενης ουσίας σε νερό

Διαλυτότητα

PEG 400: αναμίξιμη με νερό, πολύ διαλυτή στην ακετόνη, την αλκοόλη και το μεθυλενοχλωρίδιο, πρακτικά αδιάλυτη στα λιπαρά έλαια και τα ορυκτέλαια

PEG 3000 και PEG 3350: πολύ διαλυτές στο νερό και το μεθυλενοχλωρίδιο, πολύ λίγο διαλυτές στην αλκοόλη, πρακτικά αδιάλυτες στα λιπαρά έλαια και τα ορυκτέλαια

PEG 4000, PEG 6000 και PEG 8000: πολύ διαλυτές στο νερό και το μεθυλενοχλωρίδιο, πρακτικά αδιάλυτες στην αλκοόλη, στα λιπαρά έλαια και τα ορυκτέλαια.

**Καθαρότητα**

Αριθμός υδροξυλίου

PEG 400: 264-300

PEG 3000: 34-42

PEG 3350: 30-38

PEG 4000: 25-32

PEG 6000: 16-22

PEG 8000: 12-16

Θεική τέφρα

0,2 % κατ' ανώτατο όριο

1,4-διοξάνιο

10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

**▼ M37****▼ B**

Αιθυλενογλυκόλη και διαιθυλενογλυκόλη

Μέγιστη συνολική περιεκτικότητα 0,25 % w/w, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο