

368R0821

Άριθ. N 149/46

Επίσημη Έφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

29.6.68

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 821/68 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουνίου 1968

περί προσδιορισμού, των μετά μερική ως και ολοσχερή σχεδόν απόξεση του περικαρπίου τους και στρογγύλευση κατά τα δύο άκρα σπόρων σιτηρών, εφαρμοζομένου για τη χορήγηση έπιστροφής κατά την εξαγωγή

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τή συνθήκη περί ίδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τόν κανονισμό αριθ. 120/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1967 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών⁽¹⁾ και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 6,

Έκτιμώντας:

ότι η έπιστροφή κατά την εξαγωγή πρέπει να χορηγείται αφού ληφθεί υπόψη η ποιότης του μεταποιημένου προϊόντος των σιτηρών, το οποίο δικαιούται την εν λόγω έπιστροφή κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται όπως τα δημόσια χρήματα συμβάλλουν στην εξαγωγή προϊόντων κατωτέρας ποιότητος· ότι με την προοπτική αυτή είναι αναγκαίο να καταρτισθεί κατά τρόπο συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο από όλα τα Κράτη μέλη ένας όρισμός των σπόρων σιτηρών, οι οποίοι πρέπει να δικαιούνται της χορηγούμενης έπιστροφής για τους μετά μερική ως και ολοσχερή σχεδόν απόξεση του

περικαρπίου τους και στρογγύλευση κατά τα δύο άκρα, σπόρους σιτηρών·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Έπιτροπής Διαχειρίσεως Σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τη χορήγηση της έπιστροφής κατά την εξαγωγή, οι μετά μερική ως και ολοσχερή σχεδόν απόξεση του περικαρπίου τους και στρογγύλευση κατά τα δύο άκρα σπόροι είναι εκείνοι οι οποίοι ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1968.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Ιουνίου 1968.

Για την Έπιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean REY

(¹) ΕΕ αριθ. 117 της 13.6.1967, σ. 2269/67.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

**ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ «ΣΠΟΡΟΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΞΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟΥ»
(ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΥ) ΚΑΙ «ΣΠΟΡΟΙ ΜΕ ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΑΠΟΞΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟΥ ΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ»**

A. Στήν ἔννοια «σπόροι μέ μερική ἀπόξεση τοῦ περικαρπίου» ὑπάγονται οἱ ἀποφλοιωμένοι ἢ ἀποξεσθέντες σπόροι:

1. Ἀποφλοιωμένοι εἶναι:

οἱ σπόροι σιτηρῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀπαλλαγῇ τοῦ περικαρπίου τοὺς ἢ οἱ σπόροι σιτηρῶν μέ θράκτειον (βλέπε ἐπεξηγηματικές σημειώσεις στήν κλάση 10.03 σπόρων) οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀπαλλαγῇ τῶν θρακτείων, τὰ ὁποῖα προσφύονται ἰσχυρῶς στό περικάρπιο – παραδείγματος χάριν κριθή ἐνδεδυμένη – ἢ τὰ ὁποῖα περικλείουν τοὺς σπόρους τόσο σφικτά ὥστε τὰ θράκτεια δέν δύνανται νά ἀπομακρυνθοῦν διά κτυπήματος ἢ ἄλλου τρόπου, ὅπως γιά τή θρώμη.

2. Ἀποξεσθέντες εἶναι:

σπόροι (ὅσον ἀφορᾷ τήν κριθή, ἀπηλλαγμένοι τῶν θρακτείων) οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀπαλλαγῇ τοῦ μεγαλύτερου μέρους τοῦ περικαρπίου τοὺς καί τοῦ φλοιοῦ τοὺς.

B. Στήν ἔννοια «σπόροι μέ ὁλοσχερῇ σχεδόν ἀπόξεση τοῦ περικαρπίου τοὺς καί στρογγύλευση κατὰ τὰ δύο ἄκρα» ὑπάγονται:

α) οἱ σπόροι οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρίνονται στὸν κάτωθι ὁρισμό:

σπόροι σιτηρῶν, κυρίως κριθῆς, ἀπηλλαγμένοι ὁλοσχερῶς τοῦ περικαλύμματος τοῦ περικαρπίου, τῶν ἀγάνων καί τοῦ μεγαλύτερου μέρους τοῦ ἐξωτερικοῦ περιβλήματος καί στρώματος ἀλευρώνης, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐνιαίας διαστάσεως καί στρογγυλεμένου σχήματος,

β) καί πληροῦν ἐπὶ πλέον τοὺς κάτωθι δρους:

1. Ἀφαίρεση τοῦ περικαλύμματος, ἀποφλοιώση καί ἀπόξεση κατὰ τὸν ὁρισμό:

2. Ὁμοιομορφία τῶν σπόρων:

α) 75% τῶν σπόρων δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τὸ 20% τοῦ dm

β) 94% τῶν προστιθεμένων προοδευτικῶς σπόρων μεταξὺ 3 καί 97% δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τὸ 30% τοῦ dm

γ) 100% τῶν σπόρων δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τὸ 50% τοῦ dm κατ' ἀνώτατο ὄριο.

Προσδιορισμός τοῦ βαθμοῦ ὁμοιομορφίας διά τῆς κοκκομετρικῆς ἀναλύσεως διά κοσκίνου μέ στρογγυλές ὀπές.

dm: ἡ ἐνδιάμεσος ἀξία ἢ προσδιοριζομένη ἀπὸ τὴν καμπύλη τῶν λαμβανομένων συνόλων μετὰ τὴν κοκκομετρικὴ ἀνάλυση σέ περίπτωση διελεύσεως τοῦ 50% τοῦ προϊόντος.

Κοκκομετρικὴ ἀνάλυση

Συσκευές:

— Σύστημα κοσκίνων μέ στρογγυλές ὀπές (διαμέτρου 200 χιλιοστῶν, διαμέτρου ὀπῶν: 4,0 ἕως 1,0 χιλιοστῶν, μέ διαστήματα 0,25 χιλιοστῶν)

— συσκευή κοσκινίσματος – τὸ κοσκίνισμα πρέπει νά γίνεται διά τῆς χειρὸς· ἐξαρτήματα κοσκινίσματος (κύβοι ἀπὸ καουτσούκ 20 χιλιοστῶν ἀκμῆς)

— ζυγὸς ἀκριθείας.

Ἐκτέλεση:

Κατὰ κανόνα ἡ μέ μερική ἀπόξεση τοῦ περικαρπίου κριθῆ διέρχεται ἀπὸ 6 διαφορετικὰ κόσκινα, τὸ σύστημα κοσκίνων κλείεται στό ἐσωτερικὸ καί ἀνώτερο μέρος τοῦ, τὸ κόσκινο μέ τίς πλέον μεγαλύτερες ὀπές τοποθετεῖται ὑψηλά καί ὡς πυθμένας, πρέπει νά εἶναι κενὸ μετὰ τὸ κοσκίνισμα.

Κοσκινίζουμε διά χειρὸς, ἐπὶ πέντε λεπτά τουλάχιστον, δύο δείγματα τῆς μέ μερική ἀπόξεση τοῦ περικαρπίου κριθῆς ἐξακριθθέντος θάρους ἀπὸ 50 ἕως 100 γραμ. χρησιμοποιώντας ὡς ἐξαρτήματα κοσκινίσματος κύβους καουτσούκ.

Γιά νά κοσκινίσουμε κρατᾶμε μέ τὰ χέρια τὸ σύστημα κοσκινίσματος σέ ὀριζόντια σχεδόν θέση καί κινούμε 120 φορές περίπου ἀνά λεπτό, κάθε δέ χτύπημα ἔχει διαδρομὴ 70 χιλιοστῶν περίπου. Ἡ παλινδρομικὴ αὐτὴ κίνηση διακόπτεται ἀνά λεπτό γιά μία τριπλὴ κυκλικὴ κίνηση. Τὰ υπολείμματα τοῦ κοσκινίσματος ζυγίζόμενα, κατὰ προσέγγιση 0,1 γραμ. ἐκφράζονται σέ ποσοστὸ τοῦ κοσκινισθέντος προϊόντος, ζυγισθέντος ὑπὸ τύπον ἀκεραίων ἀριθμῶν καί ὑπολογίζουμε τοὺς μέσους δρους.

Οἱ μέσοι δροι ἐκφραζόμενοι σέ ποσοστὸ υπολειμμάτων κοσκινίσματος πρέπει νά προστεθοῦν ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν τιμὴ 0%· γιά τὰ υπολείμματα τοῦ κενοῦ κοσκίνου μέ τίς μεγάλες ὀπές, μεταφέρουμε τὰ προστιθέμενα ποσοστὰ Σ (%) ὡς καί τὰ ἀντίστοιχα μεγέθη ὀπῶν κοσκινίσματος πού ἀντιστοιχοῦν στοὺς ἄξονες συντεταγμένων ἐπὶ χάρτου μιλιμετρικοῦ τὰ Σ (%) σέ τετμημένες καί τίς διαμέτρους τῶν ὀπῶν, σέ χιλιοστά, σέ συντεταγμένες.

Ἡ καμπύλη ἢ λαμβανομένη συνδέοντας τὰ σημεῖα μέ εὐθεῖες γραμμές δίδει τὴν ἐνδιάμεσο ἀξία dm σέ ἑκατοστὰ τοῦ χιλιοστοῦ τοῦ πλάτους τῆς ὀπῆς γιά Σ (%) = 50.