

ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Απριλίου 1990

για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων

(90/206/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1970 περί πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/110/ΕΟΚ της Επιτροπής⁽²⁾, και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας:

ότι οι διατάξεις της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ προβλέπουν ότι το περιεχόμενο των παραρτημάτων πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων· ότι τα παραρτήματα κωδικοποιήθηκαν με την οδηγία 85/429/ΕΟΚ της Επιτροπής⁽³⁾·

ότι έγινε επιτυχής πειραματική εφαρμογή του αντιβιοτικού «Ανορασίνη» σε ορισμένα κράτη μέλη· ότι πρέπει να επιτραπεί προσωρινά αυτή η νέα χρήση σε εθνικό επίπεδο

αναμένοντας ότι θα μπορέσει να γίνει αποδεκτή σε κοινοτικό επίπεδο·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής για τις Ζωοτροφές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 1990.

Για την Επιτροπή

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής⁽¹⁾ ΕΕ αριθ. L 270 της 14.12.1970, σ. 1.⁽²⁾ ΕΕ αριθ. L 67 της 15.3.1990, σ. 44.⁽³⁾ ΕΕ αριθ. L 245 της 12.9.1985, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα II της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, στο τμήμα Α. «Αντιβιοτικά», η ονομασία της θέσης αριθ. 22 «Ανορασιπιν» συμπληρώνεται ως ακολούθως:

αριθ.	Προσθετικό	Χημικός τύπος περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Μέγιστη περιεκτικότητα		Περίοδος αδείας	
					Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα		
					mg/kg πλήρων ζωοτροφών			
			«Γαλακτοφόρες αγελάδες	—	4	10	Λοιπές διατάξεις	30.11.1990»
								<p>Οι οδηγίες χρήσεως περιέχουν την ένδειξη:</p> <p>“Η δόση Anoracipine στο ημερήσιο σιτη ρέσιο:</p> <p>— δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 mg</p> <p>— δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 50 mg.”</p>