

378L0386

25.4.78

Επίσημη Έφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. Ν 113/1

ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Απριλίου 1978

περί τροποποίησης των παραρτημάτων της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ «περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών»

(78/386/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τήν οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/55/ΕΟΚ⁽²⁾, και ιδίως το άρθρο 21α),

Έκτιμώντας:

ότι, λόγω της εξέλιξης των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, πρέπει να επέλθουν τροποποιήσεις στα παραρτήματα I, II και III της προαναφερθείσης οδηγίας για τους κατωτέρω λόγους:

ότι φαίνεται ενδεδειγμένο, προκειμένου να βελτιωθεί η γενετική αξία των σπόρων προς σπορά, να καθορισθούν κανόνες καθαρότητας της ποικιλίας τούς οποίους πρέπει να πληροί ή καλλιέργεια για όρισμένα είδη:

ότι, εν προκειμένω, φαίνεται ενδεδειγμένο στην περίπτωση των σπόρων προς σπορά αυτογάμων ειδών και ποικιλιών απομικτικών μονοκλώνων *Poa* spp., να προβλεφθούν κανόνες που αφορούν την ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας τούς οποίους πρέπει να πληρούν οι σπόροι προς σπορά:

ότι φαίνεται ενδεδειγμένο να προβλεφθούν οι όροι σχετικά με την καλλιέργεια, όσον αφορά την παρουσία επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι μειώνουν την αξία της χρησιμότητας των σπόρων προς σπορά:

ότι φαίνεται ενδεδειγμένο να καθορισθούν ιδιαίτεροι κανόνες όσον αφορά την ανώτατη περιεκτικότητα σε άλλους ανεπιθύμητους ή επιβλαβείς σπόρους, όπως σε *Agropyron repens*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis*, *Melilotus spec.*, *Sinapis arvensis* και *Raphanus raphanistrum* ή στα είδη *Rumex*, πλην του *Rumex acetosella*, που πρέπει να προστεθούν στο *Rumex crispus* και στο *Rumex obtusifolius*:

ότι φαίνεται απαραίτητο να έναρμονισθούν οι κανόνες που αφορούν την ελάχιστη βλαστητική ικανότητα και την ελάχιστη ειδική καθαρότητα, λόγω της ποιοτικής εξελίξεως που επιτεύχθηκε κανονικά από τούς σπόρους προς σπορά:

ότι όρισμένα μέτρα πρέπει να τροποποιηθούν για να προσαρμοσθούν στις προϋποθέσεις της επίσημης εξέτασεως των σπόρων προς σπορά που πραγματοποιείται κατά τις συνήθεις διεθνείς μεθόδους:

ότι τά μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμου Έπιτροπής Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 66/401/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

(¹) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66.

(²) ΕΕ αριθ. Ν 16 της 20.1.1978, σ. 23.

1. Το κείμενο του παραρτήματος I αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

1. Η προηγούμενη καλλιέργεια δεν έχει αποδώσει προϊόντα ασυμβίβαστα με την παραγωγή σπόρων προς σπορά του είδους και της ποικιλίας της καλλιέργειας και ή επιφάνεια παραγωγής είναι επαρκώς απηλλαγμένη από τέτοια φυτά που προέρχονται από προηγούμενες καλλιέργειες.
2. Η καλλιέργεια ανταποκρίνεται στους ακόλουθους κανόνες ως προς τις αποστάσεις από τις γειτονικές πηγές γύρεως που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητη ξένη επικονίαση.

(Σέ μέτρα)	
Καλλιέργεια	Ελάχιστες αποστάσεις
1	2
Brassica sp.p.:	
— για την παραγωγή των βασικών σπόρων προς σπορά	400
— για την παραγωγή των πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά	200
Είδη ή ποικιλίες πλην των Brassica spp., Pisum arvense και ποικιλίες απομικτικών μονοκλώνων Poa spp.:	
— για την παραγωγή σπόρων προς σπορά προορισμένων για πολλαπλασιασμό, πεδίο πολλαπλασιασμού έως 2 έκτ.	200
— για την παραγωγή σπόρων προς σπορά προορισμένων για πολλαπλασιασμό, πεδίο πολλαπλασιασμού πλέον των 2 έκτ.	100
— για την παραγωγή σπόρων προς σπορά προορισμένων για την παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών, πεδίο πολλαπλασιασμού έως 2 έκτ.	100
— για την παραγωγή σπόρων προς σπορά προορισμένων για την παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών, πεδίο πολλαπλασιασμού περισσότερων των 2 έκτ.	50

Οι αποστάσεις αυτές μπορούν να μην τηρούνται όταν υπάρχει επαρκής προστασία κατά κάθε ανεπιθύμητης ξένης επικονιάσεως.

3. Τα φυτά άλλων ειδών των οποίων οι σπόροι προς σπορά είναι δύσκολο να διακρίνονται από τους σπόρους προς σπορά της καλλιέργειας, κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών αναλύσεων είναι ανεκτά σε περιορισμένη ποσότητα.
 Ίδιαίτερα, οι καλλιέργειες των ειδών Lolium θα ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: ο αριθμός φυτών ενός είδους Lolium που δεν είναι σύμφωνα με την ποικιλία της καλλιέργειας δεν υπερβαίνει:
 — 1 ανά 50 τ.μ. για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά,
 — 1 ανά 10 τ.μ. για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά.
4. Η καλλιέργεια έχει επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα ποικιλίας. Οι καλλιέργειες ειδών ή ποικιλιών πλην των Pisum arvense ή των ποικιλιών των απομικτικών μονοκλώνων Poa spp. ανταποκρίνονται στις ακόλουθες ιδίως προϋποθέσεις: ο αριθμός των φυτών της καλλιέργειας που αναγνωρίζονται προφανώς ως μη σύμφωνα με την ποικιλία δεν υπερβαίνει:
 — 1 ανά 30 τ.μ. για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά,
 — 1 ανά 10 τ.μ. για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά.
5. Η παρουσία επιβλαβών οργανισμών, οι οποίοι μειώνουν την αξία της χρησιμότητας των σπόρων, δεν είναι ανεκτή παρά μόνο στο ελάχιστο δυνατό όριο.
6. Η τήρηση των κανόνων ή άλλων προϋποθέσεων που μνημονεύονται ανωτέρω ελέγχεται από επίσημες επί τόπου επιθεωρήσεις.

Οί επί τόπου αυτές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Α. Ή καλλιεργητική κατάσταση και τό στάδιο αναπτύξεως της καλλιέργειας νά επιτρέπουν ικανοποιητική εξέταση.
- Β. Νά διενεργείται μία τουλάχιστον επί τόπου επιθεώρηση.
- Γ. Τό ύψος, ό αριθμός και ή κατανομή των στοιχειωδών δειγματοληψιών πού ελέγχονται γιά νά εξετασθεί ή τήρηση των προϋποθέσεων πού καθορίζονται στό παρόν παράρτημα προσδιορίζονται μέ πρόσφορες μεθόδους.»

2. Τό κείμενο του παραρτήματος II αντικαθίσταται από τό ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ

1. Οί σπόροι πρὸς σπορά έχουν επαρκή ταυτότητα καί καθαρότητα ποικιλίας. Οί σπόροι πρὸς σπορά *Pisum arvense* καί των ποικιλιών απομικτικών μονοκλώνων *Poa spp.* ανταποκρίνονται ιδίως στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις: ή ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας είναι 98 %.

Ή ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται από επίσημες επί τόπου επιθεωρήσεις πού πραγματοποιούνται σύμφωνα μέ τις προϋποθέσεις πού προβλέπονται στό παράρτημα I.

2. Οί σπόροι ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες ή σέ άλλες προϋποθέσεις ὡς πρὸς τή βλαστητική ικανότητα, τήν ειδική καθαρότητα καί τήν περιεκτικότητα σέ σπόρους άλλων ειδών φυτών, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων λούπινου άλλου χρώματος καί πικρού:

Α. Πίνακας:

Είδη	Βλαστική ικανότητα		Ειδική καθαρότητα			
	Ελάχιστη βλαστική ικανότητα (% των καθαρών σπόρων)	Ανώτατη περιεκτικότητα των σκληρών σπόρων προς σπορά (% των καθαρών σπόρων)	Ελάχιστη ειδική καθαρότητα (% του βάρους)	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών (% βάρους)		
				Όλική	Ένα μόνο είδος	<i>Agropyron repens</i>
1	2	3	4	5	6	7
GRAMINEAE						
<i>Agrostis canina</i> ssp. <i>canina</i>	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
<i>Agrostis gigantea</i>	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3
<i>Agrostis stolonifera</i>	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
<i>Agrostis tenuis</i>	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
<i>Alopecurus pratensis</i>	70 (a)		75	2,5	1,0	0,3
<i>Arrhenatherum elatius</i>	75 (a)		90	3,0	1,0	(f) 0,5
<i>Dactylis glomerata</i>	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3
<i>Festuca arundinacea</i>	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
<i>Festuca ovina</i>	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5
<i>Festuca pratensis</i>	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
<i>Festuca rubra</i>	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5
<i>Lolium multiflorum</i>	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
<i>Lolium perenne</i>	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5
<i>Lolium X hybridum</i>	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
<i>Phleum bertolonii</i>	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
<i>Phleum pratense</i>	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
<i>Poa annua</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
<i>Poa nemoralis</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
<i>Poa palustris</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
<i>Poa pratensis</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
<i>Poa trivialis</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
<i>Trisetum flavescens</i>	70 (a)		75	3,0	1,0	(f) 0,3
LEGUMINOSAE						
<i>Hedysarum coronarium</i>	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0	
<i>Lotus corniculatus</i>	75 (a) (b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)	
<i>Lupinus albus</i>	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
<i>Lupinus angustifolius</i>	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
<i>Lupinus luteus</i>	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
<i>Medicago lupulina</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
<i>Medicago sativa</i>	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
<i>Medicago varia</i>	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
<i>Onobrychis sativa</i>	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0	
<i>Pisum arvense</i>	80 (a)		98	0,5	0,3	
<i>Trifolium alexandrinum</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
<i>Trifolium hybridum</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
<i>Trifolium incarnatum</i>	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
<i>Trifolium pratense</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
<i>Trifolium repens</i>	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
<i>Trifolium resupinatum</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
<i>Trigonella foenumgraecum</i>	80 (a)		95	1,0	0,5	
<i>Vicia faba</i> ssp. var. <i>equina</i>	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
<i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
<i>Vicia pannonica</i>	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
<i>Vicia sativa</i>	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
<i>Vicia villosa</i>	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
OTHER SPECIES						
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	80 (a)		98	1,0	0,5	
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i>	75 (a)		98	1,0	0,5	
<i>Raphanus sativus</i> ssp. <i>oleifera</i>	80 (a)		97	1,0	0,5	

Ειδική καθαρότητα				Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών σ' ένα δείγμα θάβους προβλεπόμενο στο παράρτημα III στήλη 4 (όλική κατά στήλη)			Όροι που αφορούν την περιεκτικότητα σε σπόρους του λουκινού άλλου χρώματος ή πικρού
Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους προς σπορά άλλων ειδών φυτών (% θάβους)				Avena fatua Avena ludoviciana, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. other than Rumex acetosella	
8	9	10	11	12	13	14	15
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0 (g)	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0 (h)	0 (j) (k)	2	
	0,3			0	0 (k)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (j)	20	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (j)	20	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
		0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (j)	20	

Β. Κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται όταν γίνεται αναφορά στον πίνακα τμήμα Ι σημείο 2 υπό Α του παρόντος παραρτήματος:

- α) Όλοι οι νωποί και υγιείς σπόροι που δεν έχουν εκβλαστήσει μετά από προεργασία θεωρούνται ως εκβλαστήσαντες σπόροι.
- β) Μέχρι του ποσού της ένδεδειγμένης ανώτατης περιεκτικότητας, οι σκληροί σπόροι θεωρούνται ως σπόροι ικανοί να εκβλαστήσουν.
- γ) Όλική ανώτατη περιεκτικότητα 0,8 % σε βάρος σπόρων προς σπορά άλλων ειδών Ροα δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας.
- δ) Όλική ανώτατη καθαρότητα 1 % σε βάρος σπόρων *Trifolium pratense* δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας.
- ε) Όλική ανώτατη περιεκτικότητα 0,5 σε βάρος σπόρων *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum arvense*, *Vicia faba* spp., *Vicia pannonica*, *Vicia sativa* και *Vicia villosa* σε ένα άλλο αντίστοιχο είδος δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας.
- στ) Το ανώτατο καθορισμένο ποσοστό σε βάρος σπόρων ενός μόνου είδους δεν εφαρμόζεται στους σπόρους προς σπορά της Ροα spp.
- ζ) Όλική ανώτατη καθαρότητα δύο σπόρων *Avena fatua*, *Avena ludoviciana* και *Avena sterilis* σε ένα δείγμα του καθορισμένου θάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας, εάν ένα δεύτερο δείγμα του αυτού θάρους είναι απαλλαγμένο σπόρων των ειδών αυτών.
- η) Η παρουσία ενός σπόρου *Avena fatua*, *Avena ludociana* και *Avena sterilis* εντός ενός δείγματος του καθορισμένου θάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας, εάν ένα δεύτερο δείγμα διπλασίου θάρους του καθορισμένου είναι απαλλαγμένο σπόρων των ειδών αυτών.
- θ) Η απογραφή των σπόρων *Avena fatua*, *Avena ludoviciana* και *Avena sterilis* μπορεί να μην πραγματοποιείται, εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των κανόνων που καθορίζονται στη στήλη 12.
- ι) Η απογραφή των σπόρων *Cuscuta* spp. μπορεί να μην πραγματοποιείται, εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των κανόνων που καθορίζονται στη στήλη 13.
- κ) Η παρουσία ενός σπόρου *Cuscuta* spp. σε ένα δείγμα του καθορισμένου θάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας εάν ένα δεύτερο δείγμα του ίδιου θάρους είναι απαλλαγμένο σπόρων *Cuscuta* spp.
- λ) Το βάρος του δείγματος για την απογραφή σπόρων *Cuscuta* spp. είναι διπλάσιο του θάρους που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ στήλη 4 για το αντίστοιχο είδος.
- μ) Η παρουσία ενός σπόρου *Cuscuta* spp. σε ένα δείγμα του προδιαγεγραμμένου θάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας εάν ένα δεύτερο δείγμα θάρους διπλασίου του προδιαγεγραμμένου είναι απαλλαγμένο σπόρων *Cuscuta* spp.
- ν) Η απογραφή των σπόρων *Rumex* spp. πλην των *Rumex acetosella* μπορεί να μην πραγματοποιείται, εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των κανόνων που καθορίζονται στη στήλη 14.
- ξ) Το ποσοστό σε αριθμό σπόρων προς σπορά λούπινου άλλου χρώματος δεν υπερβαίνει τό:
 - 2 % για το πικρό λούπινο,
 - 1 % στα άλλα λούπινα εκτός του πικρού.

- ο) Τό ποσοστό σέ αριθμό σπόρων πρὸς σπορά πικροῦ λούπινου σέ ποικιλίες ἄλλες ἀπὸ αὐτές τοῦ πικροῦ λούπινου δέν ὑπερβαίνει τό:
- 3% γιά τοὺς πιστοποιημένους σπόρους πρὸς σπορά τῆς πρώτης γενεᾶς μετὰ τοὺς βασικούς σπόρους,
 - 5% γιά τοὺς πιστοποιημένους σπόρους πρὸς σπορά τῶν ἐπομένων γενεῶν.
3. Ἡ παρουσία ἐπιβλαβῶν ὀργανισμῶν οἱ ὅποιοι μειώνουν τὴν ἀξία τῆς χρησιμότητος τῶν σπόρων πρὸς σπορά εἶναι ἀνεκτή στό ἐλάχιστο δυνατό ὄριο.

II. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ

Με τὴν ἐπιφύλαξη τῶν κατωτέρω διατάξεων, οἱ προϋποθέσεις τοῦ τμήματος I τοῦ παρόντος παραρτήματος ἐφαρμόζονται στοὺς βασικούς σπόρους πρὸς σπορά:

1. Οἱ σπόροι *Pisum arvense* καὶ τῶν ποικιλιῶν ἀπομικτικῶν μονοκλόνων *Poa spp.* ἀνταποκρίνονται στοὺς ἀκόλουθους κανόνες ἢ ἄλλες προϋποθέσεις. Ἡ ἐλάχιστη καθαρότητα τῆς ποικιλίας εἶναι 99,7%. Ἡ ἐλάχιστη καθαρότητα τῆς ποικιλίας ἐλέγχεται κυρίως κατὰ τὴν καλλιέργεια ἀπὸ ἐπίσημες ἐπὶ τόπου ἐπιθεωρήσεις πού πραγματοποιοῦνται μέ τίς προϋποθέσεις πού προβλέπονται στό παράρτημα I.
2. Οἱ σπόροι ἀνταποκρίνονται στοὺς ἀκόλουθους κανόνες καὶ ἄλλες προϋποθέσεις:
 - A. Πίνακας:

Είδη	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους προς σκορά άλλων ειδών φυτών							Λοιποί κανόνες ή προϋποθέσεις
	Σύνολο (% του θάρους)	Περιεκτικότητα σε δείγμα θάρους που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ στήλη 4 (σύνολο κατά στήλη)					Melilotus spp.	
		*Ένα μόνο είδος	Rumex spp. πλὴν τοῦ Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides			
1	2	3	4	5	6	7	8	
GRAMINEAE								
Agrostis canina ssp. canina	0,3	20	1	1	1		(i)	
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1		(i)	
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1		(i)	
Agrostis tenuis	0,3	20	1	1	1		(i)	
Alopecurus pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5		(i)	
Arrhenatherum elatius	0,3	20 (a)	5	5	5		(i) (i)	
Dactylis glomerata	0,3	20 (a)	5	5	5		(i)	
Festuca arundinacea	0,3	20 (a)	5	5	5		(i)	
Festuca ovina	0,3	20 (a)	5	5	5		(i)	
Festuca pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5		(i)	
Festuca rubra	0,3	20 (a)	5	5	5		(i)	
Lolium multiflorum	0,3	20 (a)	5	5	5		(i)	
Lolium perenne	0,3	20 (a)	5	5	5		(i)	
Lolium X hybridum	0,3	20 (a)	5	5	5		(i)	
Phleum bertolonii	0,3	20	2	1	1		(i)	
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1		(i)	
Poa annua	0,3	20 (b)	1	1	1		(f)	
Poa nemoralis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f)	
Poa palustris	0,3	20 (b)	1	1	1		(f)	
Poa pratensis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f)	
Poa trivialis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f)	
Trisetum flavescens	0,3	20 (c)	1	1	1		(i) (i)	

Είδη	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους προς σπορά άλλων ειδών φυτών						Λοιποί κανόνες ή προϋποθέσεις
	Σύνολο (% του βάρους)	Περιεκτικότητα σε άριθμό, σε δείγμα βάρους που προβλέπεται στο παράρτημα III στήλη 4 (σύνολο κατά στήλη)					
		Ένα μόνο είδος	Rumex spp. πλην του Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Meilolus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
LEGUMINOSAE							
Hedysarum coronarium	0,3	20	5			0 (e)	(i)
Lotus corniculatus	0,3	20	5			0 (e)	(g)
Lupinus albus	0,3	20	5			0(d)	(h)
Lupinus angustifolius	0,3	20	5			0(d)	(k)
Lupinus luteus	0,3	20	5			0(d)	(h)
Medicago lupulina	0,3	20	5			0 (e)	(k)
Medicago sativa	0,3	20	5			0	(i)
Medicago varia	0,3	20	5			0 (e)	(i)
Onobrychis sativa	0,3	20	5			0 (e)	(i)
Pisum arvense	0,3	20	5			0(d)	
Trifolium alexandrinum	0,3	20	5			0 (e)	(i)
Trifolium hybridum	0,3	20	5			0 (e)	(i)
Trifolium incarnatum	0,3	20	5			0 (e)	(i)
Trifolium pratense	0,3	20	5			0 (e)	(i)
Trifolium repens	0,3	20	5			0 (e)	(i)
Trifolium resupinatum	0,3	20	5			0 (d)	
Trigonella foenumgraecum	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba ssp. var. equina	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba var. minor	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia pannonica	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia sativa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia villosa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
OTHER SPECIES							
Brassica napus var. napobrassica	0,3	20	5				(i)
Brassica oleracea convar. acephala	0,3	20	5				(i)
Raphanus sativus ssp. oleifera	0,3	20	5				

B. Κανόνες καί άλλες προϋποθέσεις πού εφαρμόζονται όταν γίνεται αναφορά στον πίνακα τμήμα II σημείο 2 υπό Α του παρόντος παραρτήματος:

- α) Όλική ανώτατη περιεκτικότητα 80 σπόρων *Poa spp.* δέν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας.
- β) Η προϋπόθεση πού προβλέπεται στή στήλη 3 δέν εφαρμόζεται στους σπόρους πρὸς σπορά *Poa spp.* Η δλική ανώτατη περιεκτικότητα σέ σπόρους πρὸς σπορά *Poa spp.* ενός είδους άλλου από αυτό πού πρέπει νά εξετασθεῖ δέν πρέπει νά υπερβαίνει τόν 1 σέ ένα δείγμα 500 σπόρων.
- γ) Όλική ανώτατη περιεκτικότητα 20 σπόρων *Poa spp.* δέν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας.
- δ) Η απογραφή των σπόρων *Melilotus spp.* μπορεί νά μήν πραγματοποιεῖται, εκτός εάν υπάρχει άμφιβολία γιά τήν τήρηση των κανόνων πού καθορίζονται στή στήλη 7.
- ε) Η παρουσία ενός σπόρου *Melilotus spp.* σέ ένα δείγμα του καθορισμένου θάρους δέν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας αν ένα δεύτερο δείγμα θάρους διπλασίου του καθορισμένου είναι άπαλλαγμένο σπόρων *Melilotus spp.*
- στ) Η προϋπόθεση γ) πού προβλέπεται στό τμήμα I σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος δέν εφαρμόζεται.
- ζ) Η προϋπόθεση δ) πού προβλέπεται στό τμήμα I σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος δέν εφαρμόζεται.
- η) Η προϋπόθεση ε) πού προβλέπεται στό τμήμα I σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος δέν εφαρμόζεται.
- θ) Η προϋπόθεση στ) πού προβλέπεται στό τμήμα I σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος δέν εφαρμόζεται.
- ι) Οί προϋποθέσεις κ) καί μ) πού προβλέπονται στό τμήμα I σημείο 2 δέν εφαρμόζονται.
- κ) Στίς ποικιλίες άλλες από αυτές του πικρού λούπινου, τό ποσοστό σέ αριθμό σπόρων πρὸς σπορά πικρού λούπινου δέν υπερβαίνει τόν 1.

III. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ

Μέ τήν επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων, οί προϋποθέσεις του τμήματος I στοιχεῖα 2 καί 3 του παρόντος παραρτήματος εφαρμόζονται στους έμπορεύσιμους σπόρους.

1. Τά ποσοστά σέ θάρος πού καθορίζονται στίς στήλες 5 καί 6 του πίνακος τμήμα I στοιχείο 2 υπό Α του παρόντος παραρτήματος αὐξάνονται κατά 1.
2. Για τήν *Poa annua*, όλική ανώτατη περιεκτικότητα 10% σέ θάρος σπόρων είδων άλλων από τής *Poa* δέν θεωρείται ως μή καθαρότητα.
3. Για τά είδη τής *Poa* άλλα από τής *Poa annua* μία όλική ανώτατη περιεκτικότητα 3% σέ θάρος σπόρων άλλων από τής *P* δέν θεωρείται ως μή καθαρότητα.
4. Για τό *Hedysarum coronarium*, όλική ανώτατη περιεκτικότητα 1% σέ θάρος σπόρων *melilotus spp.* δέν θεωρείται ως μή καθαρότητα.
5. Η προϋπόθεση δ) πού προβλέπεται γιά τό *Lotus corniculatus* στό τμήμα I στοιχείο 2 του παρόντος παραρτήματος δέν εφαρμόζεται.

6. Για τα είδη του λούπινου:

- α) η ελάχιστη ειδική καθαρότητα είναι τα 97% του θάρους·
- β) το ποσοστό σε αριθμό σπόρων προς σπορά του λούπινου άλλου χρώματος δεν υπερβαίνει τούς:
- για το πικρό λούπινο: 4%·
 - για λούπινο πλήν του πικρού 2%·
- γ) το ποσοστό σε αριθμό σπόρων προς σπορά πικρού λούπινου δεν υπερβαίνει τούς 5 στα άλλα είδη του πικρού λούπινου.

7. Για τα είδη *Vicia* ολική ανωτάτη περιεκτικότητα 6% σε θάρος σπόρων *Vicia pannonica* και *Vicia villosa* ή καλλιεργημένων ειδών που συγγενεύουν προς άλλο αντίστοιχο είδος δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας.

8. Η ειδική ελάχιστη καθαρότητα για τα *Vicia pannonica*, *Vicia sativa* και *Vicia villosa* είναι 97% του θάρους.»

3. Το κείμενο του παραρτήματος III αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Είδη	Ανώτατον θάρος μιας παρτίδας (τόν.)	Ελάχιστον θάρος ενός δείγματος που πρέπει να ληφθεί ανά μία παρτίδα (γρ.)	Βάρος του δείγματος για τις απογραφές που προβλέπονται στο παράρτημα I στοιχείο 2 υπό Α στήλαι 12-14 και στο παράρτημα II τμήμα II στοιχείο 2 υπό Α, στήλαι 3-7 (γρ.)
1	2	3	4
GRAMINEAE			
<i>Agrostis canina</i> ssp. <i>canina</i>	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i>	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i>	10	50	5
<i>Agrostis tenuis</i>	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i>	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	200	80
<i>Dactylis glomerata</i>	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i>	10	100	50
<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60
<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
<i>Lolium X hybridum</i>	10	200	60
<i>Phleum bertolonii</i>	10	50	10
<i>Phleum pratense</i>	10	50	10
<i>Poa annua</i>	10	50	10
<i>Poa nemoralis</i>	10	50	5
<i>Poa palustris</i>	10	50	5
<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
<i>Trisetum flavescens</i>	10	50	5

Είδη	Ανώτατον βάρος μίας παρτίδας (τόν.)	Ελάχιστον βάρος ενός δείγματος που πρέπει να ληφθεί ανά μία παρτίδα (γρ.)	Βάρος του δείγματος διά τις απογραφές που προβλέπονται στο παράρτημα I στοιχείο 2 υπό Α στήλαι 12-14 και στο παράρτημα II τμήμα II στοιχείο 2 υπό Α, στήλαι 3-7 (γρ.)
1	2	3	4
LEGUMINOSAE			
Hedysarum coronarium			
— καρπός	10	1 000	300
— σπόρος	10	400	120
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	20	1 000	1 000
Lupinus angustifolius	20	1 000	1 000
Lupinus luteus	20	1 000	1 000
Medicago lupulina	10	300	50
Medicago sativa	10	300	50
Medicago varia	10	300	50
Onobrychis sativa			
— καρπός	10	600	600
— σπόρος	10	400	400
Pisum arvense	20	1 000	1 000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trigonella foenumgraecum	10	500	450
Vicia faba ssp. var. equina	20	1 000	1 000
Vicia faba var. minor	20	1 000	1 000
Vicia pannonica	20	1 000	1 000
Vicia sativa	20	1 000	1 000
Vicia villosa	20	1 000	1 000
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ			
Brassica napus var. napobrassica	10	200	100
Brassica oleracea convar. acephala	10	200	100
Raphanus sativus ssp. oleifera	10	300	300

Άρθρο 2

1. Τά Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς:

— τις διατάξεις του άρθρου 1 σημείο 1 της παρούσης οδηγίας όσον αφορά το παράρτημα I, σημεία 3 και 4, και του άρθρου 1 σημείο 2 της παρούσης οδηγίας όσον αφορά το παράρτημα II τμήμα I σημείο 1 και το παράρτημα II τμήμα II σημείο 1, την 1η Ιανουαρίου 1981,

— τις άλλες διατάξεις της παρούσης οδηγίας, τό θραδύτερο την 1η Ιουλίου 1980.

2. Τά Κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι σπόροι κτηνοτροφικών φυτών να μην υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό εμπορίας λόγω της εφαρμογής της παρούσης οδηγίας σε ήμερομηνίες διάφορες σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεύτερη περίπτωση.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 18 Απριλίου 1978.

Για την Επιτροπή

Finn GUNDELACH

Αντιπρόεδρος