

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

► **B**

► **M1** KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1421,

22. august 2022,

milles käsitletakse loa andmist taimest *Citrus sinensis* (L.) Osbeck saadud pressitud eeterliku apelsiniõli, destilleeritud eeterliku apelsiniõli ja fraktsioneerival destilleerimisel saadud apelsiniõlide kasutamiseks teatavate loomaliikide söödalisandina ◀

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 218, 23.8.2022, lk 27)

Muudetud:

Euroopa Liidu Teataja

► **M1** Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/239, 15. jaanuar 2024

nr	lehekülg	kuupäev
L 239	1	16.1.2024

▼B

▼M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1421,

22. august 2022,

milles käsitletakse loa andmist taimest *Citrus sinensis* (L.) Osbeck saadud pressitud eeterliku apelsiniõli, destilleeritud eeterliku apelsiniõli ja fraktsioneerival destilleerimisel saadud apelsiniõlide kasutamiseks teatavate loomaliikide söödalisandina

▼B

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

▼M1

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1. Lisas nimetatud aineid ja neid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 5. augustit 2024 kooskõlas enne 5. veebruari 2024 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.
2. Lisas nimetatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 5. veebruari 2025 kooskõlas enne 5. veebruari 2024 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.
3. Lisas nimetatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 5. veebruari 2026 kooskõlas enne 5. veebruari 2024 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.

▼B

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täis-sööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b143-eo	Pressitud eeterlik apelsiniõli	<i>Söödalisandi koostis</i> Taime <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vilja koorest saadud pressitud eeterlik apelsiniõli ⁽¹⁾ . Vedelik <i>Toimeaine kirjeldus</i> Taime <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vilja koorest külmpressimise teel saadud eeterlik õli, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu ⁽²⁾ . Lenduvas fraktsioonis: d-limoneeni: 93–97 % mürtseeni: 1,5–3,5 % sabineeni: 0,1–1,0 % α-pineeni: 0,4–0,8 % linalooli: 0,1–0,7 % dekanaali: 0,1–0,7 % oktanaali: 0,1–0,6 % perillaldehüüdi: < 0,05 %	Broilerkanad ja vähem levinud kodulinnuliikide nuumlinnud Munakanad ja vähem levinud kodulinnuliikide muna- ja aretuslinnud Broilerkalkunid	–	–	80	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishuhtes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Segamine muude botaaniliste lisanditega on lubatud tingimusel, et sellise seguga lisatava perillaldehüüdi sisaldus söödas on väiksem kui sisaldus, mis saavutatakse üheainsa söödalisandi kasutamisel asjaomase loomaliigi või -kategooria puhul soovitatavas või lubatud suurimas koguses. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	12. september 2032
			Kõik nuumamiseks ette nähtud sigalased	–	–	172		
			Kõikide sigalaste liikide põrsad	–	–	144		
			Kõikide sigalaste liikide emised	–	–	200		
			Mäletsejad	–	–	130		

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumum-sisaldus	Maksimu-msisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täis-sööda kilogrammi kohta			
		CASi number: 8028-48–6 EINECSi number: 232–433-8 FEMA number: 2825 CoE number: 143 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽³⁾ D-limoneeni (fütokeemilise markeri) sisalduse määramine söödalisandis: — gaaskromatograafia koos leekioni-satsiooni teel määramisega (GC-FID) (lähtuvalt standardist ISO 3140)	Hobused	—	—	230		
			Muud loomaliigid ja -kategooriad, v.a koerad, kassid, dekoratiivkalad ja dekoratiivlinnud	—	—	50		

⁽¹⁾ Sünonüümid: *Citrus sinensis* (L.) Pers., *Citrus aurantium* (L.) Dulcis.
⁽²⁾ „Natural sources of flavourings“ (Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad) – aruanne nr 2 (2007).
⁽³⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum-sisaldus	Maksimu-msisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täis-sööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b143-di	Destilleeritud eeterlik apelsiniõli	<i>Söödalisandi koostis</i> Taime <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vilja koorest saadud eeterliku apelsi-niõli destillaat (lenduv fraktsioon) Vedelik <i>Toimeaine kirjeldus</i> Taime <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vilja koorest külmpressimise teel saadud eeterliku apelsiniõli destillee-rimisel saadud lenduv fraktsioon, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu ⁽¹⁾ . D-limoneeni: 93–97,5 % mürtseeni: 1,5–3,5 % sabineeni: 0,2–1,0 % α-pineeni: 0,3–0,8 % linalooli: 0,05–0,5 % oktanaali: 0,05–0,4 % perillaldehüüdi: < 0,005 % CASi number: 8028-48–6 CoE number: 143	Broilerkanad ja vähem levinud kodulinnuliikide nuumlinnud Munakanad ja vähem levinud kodulinnuliikide muna- ja aretus-linnud Broilerkalkunid	–	–	80	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuum-töötlemisel. 3. Segamine muude botaaniliste lisanditega on lubatud tingimusel, et sellise seguga lisatava perillaldehüüdi sisaldus söödas on väiksem kui sisaldus, mis saavutatakse üheainsa sööda-lisandi kasutamisel asjaomase loomaliigi või -kategooria puhul soovitatavas või lubatud suurimas koguses. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelse-gude käitlemisel naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	12. september 2032
			<i>Sigalased</i>	–	–	200		
			Mäletsejad	–	–	130		
			Hobused	–	–	225		

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimums- isaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milli- grammides 12 % niiskuse- sisaldusega täissööda kilo- grammi kohta			
		<i>Analüüsimeetod</i> ⁽²⁾ D-limoneeni (fütokeemilise markeri) sisalduse määramine söödalisandis: — gaaskromatograafia koos leekioni- satsiooni teel määramisega (GC- FID) (lähtuvalt standardist ISO 3140)	Muud loomaliigid ja -kategooriad, v.a koerad, kassid, dekoratiivkalad ja dekoratiivlinnud	—	—	80		

⁽¹⁾ „Natural sources of flavourings“ (Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad) – aruanne nr 2 (2007).
⁽²⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täis-sööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b143-f	Fraktsioneerival destilleerimisel saadud apelsiniõli	Söödalisandi koostis	Broilerkanad ja vähem levinud kodulinnuliikide nuumlinnud	–	–	15,5	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishuhtes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Segamine muude botaaniliste lisanditega on lubatud tingimusel, et sellise seguga lisatava perillaldehüüdi sisaldus söödas on väiksem kui sisaldus, mis saavutatakse üheainsa söödalisandi kasutamisel asjaomase loomaliigi või -kategooria puhul soovitatavas või lubatud suurimas koguses. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	12. september 2032
		Taime <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vilja koorest fraktsioneerival destilleerimisel saadud õli	Munakanad ja vähem levinud kodulinnuliikide muna- ja aretuslinnud	–	–	23,5		
		Vedelik	Broilerkalkunid	–	–	21		
		Toimeaine kirjeldus	Kõik nuumamiseks ette nähtud sigalased	–	–	34		
		Taime <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vilja koorest pressimise teel saadud eeterliku apelsiniõli fraktsioneerival destilleerimisel saadud õli, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu ⁽¹⁾ .	Kõikide sigalaste liikide põrsad	–	–	28,5		
		Mittelenduvat fraktsiooni: 10,5 %	Kõikide sigalaste liikide emised	–	–	41,5		
		Lenduvas fraktsioonis:	Vasikad (piimaasendajas)	–	–	66,5		
		d-limoneeni: 89–96 %	Lambad ja kitsed	–	–	62,5		
dekanaali: 0,5–2 %	Muud nuumamiseks ette nähtud mäletsejad							
linalooli: 0,7–1,7 %								
mürtseeni: 0,1–1,0 %								
geraniaali: 0,1–1,0 %								
perillaldehüüdi: < 0,3 %								
CASi number: 8028-48–6								
FEMA number: 2822								

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumum-sisaldus	Maksimu-msisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täis-sööda kilogrammi kohta			
		<i>Analüüsimeetod</i> ⁽²⁾ D-limoneeni (fütokeemilise markeri) sisalduse määramine söödalisandis: — gaaskromatograafia koos leekioni-satsiooni teel määramisega (GC-FID) (lähtuvalt standardist ISO 3140)	Piimaandvad mälet-sejad, v.a piima-lambad ja piimakitsed	—	—	40,5		
			Hobused	—	—	62,5		
			Küülikud	—	—	25		
			Kalad, välja arvatud dekoratiivkalad	—	—	70		
			Muud loomaliigid ja -kategooriad, v.a koerad, kassid, dekoratiivkalad ja dekoratiivlinnud	—	—	15,5		

⁽¹⁾ „Natural sources of flavourings“ (Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad) – aruanne nr 2 (2007).
⁽²⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täis-sööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b143-f-i	Fraktsioneerival destilleerimisel saadud apelsiniõli	Söödalisandi koostis	Broilerkanad ja vähem levinud kodulinnuliikide nuumlinnud	–	–	5,5	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishuhtes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Segamine muude botaaniliste lisanditega on lubatud tingimusel, et sellise seguga lisatava perillaldehüüdi sisaldus söödas on väiksem kui sisaldus, mis saavutatakse üheainsa söödalisandi kasutamisel asjaomase loomaliigi või -kategooria puhul soovitatavas või lubatud suurimas koguses. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	12. september 2032
		Taime <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vilja koorest fraktsioneerival destilleerimisel saadud õli						
		Vedelik						
		Toimeaine kirjeldus	Munakanad ja vähem levinud kodulinnuliikide muna- ja aretuslinnud	–	–	8		
		Taime <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vilja koorest pressimise teel saadud eeterliku apelsiniõli fraktsioneerival destilleerimisel saadud õli, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu ⁽¹⁾ .	Broilerkalkunid	–	–	7		
		Mittelenduvat fraktsiooni: 20,9 %						
		Lenduvas fraktsioonis:	Kõik nuumamiseks ette nähtud sigalased	–	–	11,5		
		d-limoneeni: 79–89 %						
		dekanaali: 3,0–5,0 %	Kõikide sigalaste liikide põrsad	–	–	9,5		
linalooli: 2,0–5,0 %								
mürtseeni: 0,1–1,0 %	Kõikide sigalaste liikide emised	–	–	14				
geraniaali: 0,5–1,8 %								
perillaldehüüdi: < 0,6 %	Vasikad (piimaasendajas)	–	–	23				
CASi number: 8028-48–6								
FEMA number: 2822	Lambad ja kitsed	–	–	21,5				
	Muud nuumamiseks ette nähtud mäletsejad	–	–					

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täis-sööda kilogrammi kohta			
		<i>Analüüsimeetod</i> ⁽²⁾ D-limoneeni (fütokeemilise markeri) sisalduse määramine söödalisandis: — gaaskromatograafia koos leekionisatsiooni teel määramisega (GC-FID) (lähtuvalt standardist ISO 11024)	Piimaandvad mäletsejad, v.a piimalambad ja piimakitsed	—	—	14		
			Hobused	—	—	21,5		
			Küülikud	—	—	8,5		
			Kalad, välja arvatud dekoratiivkalad	—	—	24,5		
			Muud loomaliigid ja -kategooriad, v.a koerad, kassid, dekoratiivkalad ja dekoratiivlinnud	—	—	5,5		

⁽¹⁾ „Natural sources of flavourings“ (Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad) – aruanne nr 2 (2007).
⁽²⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b143-f-ii	Fraktsioneerival destilleerimisel saadud apelsiniõli	<i>Söödalisandi koostis</i> Taime <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vilja koorest fraktsioneerival destilleerimisel saadud õli Vedelik <i>Toimeaine kirjeldus</i> Taime <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vilja koorest pressimise teel saadud eeterliku apelsiniõli fraktsioneerival destilleerimisel saadud õli, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu ⁽¹⁾ . Mittelenduvat fraktsiooni: 18 % Lenduvas fraktsioonis: d-limoneeni: 85–95 % linalooli: 0,5–4 % CASi number: 8028-48–6 FEMA number: 2822	Kõik loomaliigid, v.a hobused, küülikud, koerad, kassid, dekoratiivkalad ja dekoratiivlinnud	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisharjumistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — nuumkanade ja vähem levinud kodulinnuliikide nuumlindude, munakanade ja vähem levinud kodulinnuliikide muna- ja aretuslindude, nuumkalkunite ja sigalaste puhul: 50 mg; — vasikate (piimaasendajas), lammaste ja kitsede puhul: 70 mg; — mäletsejate, välja arvatud lammaste ja kitsede puhul: 60 mg; — muude loomaliikide ja -kategooriate, v.a hobuste, küülikute, koerte, kasside, dekoratiivkalade ja dekoratiivlindude puhul: 2 mg“.	12. september 2032

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täis-sööda kilogrammi kohta			
		<i>Analüüsimeetod</i> ⁽²⁾ D-limoneeni (fütokeemilise markeri) sisalduse määramine söödalisandis: — gaaskromatograafia koos leekionisatsiooni teel määramisega (GC-FID) (lähtuvalt standardist ISO 3140)					4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	

⁽¹⁾ „Natural sources of flavourings“ (Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad) – aruanne nr 2 (2007).
⁽²⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>