

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 842/2012,**18. september 2012,****lantaankarbonaatoktahüdraadi valmistise lubamise kohta koerte söödalisisandina (loa omanik Bayer Animal Health GmbH)****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused.
- (2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus loa andmiseks lantaankarbonaatoktahüdraadi (CASI nr 6487-39-4) valmistisele. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (3) Taotlus käsitleb lantaankarbonaatoktahüdraadi (CASI number 6487-39-4) valmistise lubamist koerte söödalisisandina ning selle klassifitseerimist söödalisisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.
- (4) Komisjoni määrusega (EÜ) nr 163/2008 ⁽²⁾ anti kümneks aastaks luba kasutada valmistist kassidel.
- (5) Esitati uued andmed, mis toetavad taotlust anda luba kasutada lantaankarbonaatoktahüdraati (CASI number 6487-39-4) koerte söödalisisandina. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 6. märtsi 2012. aasta arvamuses järeldusele, et lantaankarbonaa-

toktahüdraat ei kahjusta kavandatud kasutustingimustel sihtliikide tervist ⁽³⁾. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et lantaankarbonaatoktahüdraat võib vähendada fosfori biosaadavust täiskasvanud koertel. Toiduohutusamet ei kommenteerinud siiski selle pikaajalist toimet. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödalisisandi analüüsi meetodi kohta söödas.

- (6) Lantaankarbonaatoktahüdraadi (CASI nr 6487-39-4) hindamine näitas, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel. Samuti on asjakohane näha ette turustamisjärgne järelevalve pikaajaliste kahjulike mõjude kohta.

- (7) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised lisandid”, lubatakse kasutada söödalisisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnenädal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel
president

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

⁽²⁾ ELT L 50, 23.2.2008, lk 3.

⁽³⁾ EFSA Journal 2012; 10(3):2618.

Söödalisandi identifitseeri- misnumber	Loa omanik	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksi- mumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: muud zootehnilised lisandid (vähendavad fosfori eritumist uriini kaudu).

4d1	Bayer Animal Health GmbH	Lantaankarbo- naatoktahüd- raat	<i>Söödalisandi koostis</i> Lantaankarbonaatoktahüdraadi valmistis Toimeainena vähemalt 85 % lantaankarbonaa- toktahüdraati <i>Toimeaine kirjeldus</i> Lantaankarbonaatoktahüdraat $\text{La}_2(\text{CO}_3)_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ CASi number 6487-39-4 <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Karbonaadi määramine söödalisandis: ühenduse meetod (komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009) ⁽²⁾ Lantaani määramine söödalisandis ja söödas: induktiivsidestatud plasma aatomiemissioons- pektroskoopia (ICP-AES).	Koerad	—	1 500	7 500	Nõutav on turustusjärgne järelevalve kroo- nilise kahjuliku mõju väljaselgitamiseks. Lisandi kasutamisel peab olema märgi- tud: — täiskasvanud koertele; — soovitatud kogus märgsöödale lisamisel on 20–25 % kuivaine puhul: 340–2 100 mg/kg; — vältida samaaegset suure fosforisisaldu- sega söötade tarvitamist.	9. oktoober 2022
-----	-----------------------------------	---------------------------------------	--	--------	---	-------	-------	--	------------------

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad söödalisandite referentlabori veebilehel järgmisel aadressil: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

⁽²⁾ ELT L 54, 26.2.2009, lk 1.