

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/54,

14. detsember 2016,

milles käsitletakse loa andmist 2-metüülpropan-1-ooli, isopentanooli, 3,7-dimetüülloktaan-1-ooli, 2-etüülheksaan-1-ooli, 2-metüülpropanaali, 3-metüülbutanaali, 2-metüülbutüüraldehüüdi, 3-metüülvõihappe, 2-metüülpalderjanhappe, 2-etüülvõihappe, 2-metüülvõihappe, 2-metüülheptaanhappe, 4-metüülnonaanhappe, 4-metüülloktaanhappe, isobutüülatsetaadi, isobutüülbutüraadi, 3-metüülbutüülheksanaadi, 3-metüülbutüüldodekanaadi, 3-metüülbutüülloktanaadi, 3-metüülbutüülpropionaadi, 3-metüülbutüülformiaadi, glütserüültributüraadi, isobutüülisobutüraadi, isopentüülisobutüraadi, isobutüülisovaleraadi, isopentüül-2-metüülbutüraadi, 2-metüülbutüülisovaleraadi ja 2-metüülbutüülbutüraadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöödades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Nimetatud määruse artikliga 10 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.
- (2) Direktiivi 70/524/EMÜ alusel on antud tähtajatu luba 2-metüülpropan-1-ooli, isopentanooli, 3,7-dimetüülloktaan-1-ooli, 2-etüülheksaan-1-ooli, 2-metüülpropanaali, 3-metüülbutanaali, 2-metüülbutüüraldehüüdi, 3-metüülvõihappe, 2-metüülpalderjanhappe, 2-etüülvõihappe, 2-metüülvõihappe, 2-metüülheptaanhappe, 4-metüülnonaanhappe, 4-metüülloktaanhappe, isobutüülatsetaadi, isobutüülbutüraadi, 3-metüülbutüülheksanaadi, 3-metüülbutüüldodekanaadi, 3-metüülbutüülloktanaadi, 3-metüülbutüülpropionaadi, 3-metüülbutüülformiaadi, glütserüültributüraadi, isobutüülisobutüraadi, isopentüülisobutüraadi, isobutüülisovaleraadi, isopentüül-2-metüülbutüraadi, 2-metüülbutüülisovaleraadi ja 2-metüülbutüülbutüraadi (edaspidi „kõnealused ained“) kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 1 kanti need ained hiljem olemasolevate toodetena söödalisandite registrisse.
- (3) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 on esitatud taotlus kõnealuste ainete uuesti hindamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina. Taotleja taotles kõnealuste söödalisandite liigitamist söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 17. oktoobri 2012. aasta arvamuses ⁽³⁾ järeldusele, et söödas kasutamise kavandatud tingimuste korral ei avalda kõnealused ained kahjulikku mõju loomade tervisele, inimeste tervisele ega keskkonnale. Samuti jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kõnealused ained on toidus kasutada lubatud lõhna- ja maitseained, mille tõhusus on tõendatud, kuna nende otstarve söödas kasutamisel on sarnane nende otstarbega toidus kasutamisel.
- (5) Toiduohutusamet järeldas, et kui asjakohased kaitsemeetmed on võetud, on need ained kasutaja jaoks ohutud. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduvate kõnealuste söödalisandite analüüsimeetodi kohta.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2012; 10(10):2927.

- (6) Kõnealuste ainete hindamisel ilmnes, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuste ainete kasutamiseks vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele. Kõnealuste ainete suhtes tuleks kehtestada soovitatud maksimaalne sisaldus. Kõnealuseid aineid võib kasutada segasöödas, mida manustatakse veega.
- (7) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuste ainete lubamise tingimuste muudatuse viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperioodi, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1. Lisas nimetatud aineid ja neid aineid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 6. augustit 2017 kooskõlas enne 6. veebruari 2017 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.
2. Lisas nimetatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 6. veebruari 2018 kooskõlas enne 6. veebruari 2017 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.
3. Lisas nimetatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 6. veebruari 2019 kooskõlas enne 6. veebruari 2017 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2016

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNKER

Söödalisandi identifitseerimis-number	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülem-piir	Miinimumsi-saldus	Maksimumsi-saldus	Muud sätted	Loa kehtivus-aja lõpp
						Toimeaine sisaldus milligram-mides ühes kilogrammis täis-söödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b02001	—	2-metüül- propaan-1- ool	Söödalisandi koostis 2-metüülpropaan-1-ool Toimeaine kirjeldus 2-metüülpropaan-1-ool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₄H₁₀O CASi number 78-83-1 FLAVISi number 02.001 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 2-metüülpropaan-1-ooli määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eel- segus: gaaskromatograafia-massi- spektromeetria retentsioo- niaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik looma- liigid	—	—	—	- Lisand lisatakse söödale eelse- guna. - Söödalisandi ja eelsegu kasuta- misjuhistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. - Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. - Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimum- sisaldus täissöödas. - Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eel- segu, söödamaterjali ja sega- sööda märgisel asjaomase funkt- sionaalrühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifitseeri- misnumber ning toimeaine lisa- tud kogus.	6. veebruar 2027
---------	---	--------------------------------	---	-----------------------	---	---	---	--	---------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b02003	—	Isopentanool	<i>Söödalisandi koostis</i> isopentanool <i>Toimeaine kirjeldus</i> isopentanool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₅ H ₁₂ O CASi number 123–51-3 FLAVISi number 02.003 <i>Analüüsimeetod ⁽¹⁾</i> isopentanolli määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisharjutustes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b02026	—	3,7-dime- tüüloktaan- 1-ool	Söödalisandi koostis 3,7-dimetüülloktaan-1-ool Toimeaine kirjeldus 3,7-dimetüülloktaan-1-ool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 90 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₂₂ O CASi number 106–21-8 FLAVISi number 02.026 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 3,7-dimetüülloktaan-1-ooli määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eel- segus: gaaskromatograafia-massi- spektromeetria retentsioo- niaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik looma- liigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelse- guna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasuta- misjuhistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav maksi- mumsisaldus on sigade ja kodulindude puhul 1 mg ning kõikide muude liikide ja kategooriate puhul 1,5 mg sel- lise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimum- sisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eel- segu, söödamaterjali ja sega- sööda märgisel asjaomase funk- tsionaalrühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifitseeri- misnumber ning toimeaine lisa- tud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b02082	—	2-etüülheksaan-1-ool	Söödalisandi koostis 2-etüülheksaan-1-ool Toimeaine kirjeldus 2-etüülheksaan-1-ool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C ₈ H ₁₈ O CASi number 104–76-7 FLAVISi number 02.082 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 2-etüülheksaan-1-ooli määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegu: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishetkel märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b05004	—	2-metüülpropanaal	Söödalisandi koostis 2-metüülpropanaal Toimeaine kirjeldus 2-metüülpropanaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₄ H ₈ O CASi number 78–84-2 FLAVISi number 05.004 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 2-metüülpropanaali määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishetkel märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b05006	—	3-metüülbutanaal	Söödalisandi koostis 3-metüülbutanaal Toimeaine kirjeldus 3-metüülbutanaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 95 % Keemiline valem: C ₅ H ₁₀ O CASi number 590–86-3 FLAVISi number 05.006 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 3-metüülbutanaali määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishetkedel märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b05049	—	2-metüülbutüüraldehüüd	Söödalisandi koostis 2-metüülbutüüraldehüüd <i>Toimeaine kirjeldus</i> 2-metüülbutüüraldehüüd Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C ₅ H ₁₀ O CASi number 96–17-3 FLAVISi number 05.049 <i>Analüüsimeetod ⁽¹⁾</i> 2-metüülbutüüraldehüüdi määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsiooniaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishistetes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b08008	—	3-metüül- võihape	Söödalisandi koostis 3-metüülvõihape Toimeaine kirjeldus 3-metüülvõihape Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 99 % Keemiline valem: C ₅ H ₁₀ O ₂ CASi number 503–74-2 FLAVISi number 08.008 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 3-metüülvõihappe määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishistetes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b08031	—	2-metüülpalderjanhape	Söödalisandi koostis 2-metüülpalderjanhape <i>Toimeaine kirjeldus</i> 2-metüülpalderjanhape Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₆ H ₁₂ O ₂ CASi number 97–61-0 FLAVISi number 08.031 <i>Analüüsimeetod ⁽¹⁾</i> 2-metüülpalderjanhappe määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishistetes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b08045	—	2-etüülvõihape	Söödalisandi koostis 2-etüülvõihape Toimeaine kirjeldus 2-etüülvõihape Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₆H₁₂O₂ CASi number 88–09-5 FLAVISi number 08.045 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 2-etüülvõihappe määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisharjutistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b08046	—	2-metüül- võihape	Söödalisandi koostis 2-metüülvõihape <i>Toimeaine kirjeldus</i> 2-metüülvõihape Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₅ H ₁₀ O ₂ CASi number 116–53-0 FLAVISi number 08.046 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ 2-metüülvõihappe määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishistetes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b08047	—	2-metüülheptaanhape	Söödalisandi koostis 2-metüülheptaanhape Toimeaine kirjeldus 2-metüülheptaanhape Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C ₈ H ₁₆ O ₂ CASi number 1188-02–9 FLAVISi number 08.047 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 2-metüülheptaanhappe määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamist juhistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b08062	—	4-metüülno- naanhape	<i>Söödalisandi koostis</i> 4-metüülnoaanhape <i>Toimeaine kirjeldus</i> 4-metüülnoaanhape Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₂₀ O ₂ CASi number 45019-28-1 FLAVISi number 08.062 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ 4-metüülnoaanhappe määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsiooniaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik looma- liigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus on sigade ja kodulindude puhul 1 mg ning kõikide muude liikide ja kategooriate puhul 1,5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b08063	—	4-metüüloktaanhape	Söödalisandi koostis 4-metüüloktaanhape Toimeaine kirjeldus 4-metüüloktaanhape Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C₉H₁₈O₂ CASi number 54947-74-9 FLAVISi number 08.063 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 4-metüüloktaanhappe määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishetkel märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b09005	—	Isobutüülatsetaat	Söödalisandi koostis isobutüülatsetaat Toimeaine kirjeldus isobutüülatsetaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 95 % Keemiline valem: C₆H₁₂O₂ CASi number 110–19-0 FLAVISi number 09.005 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ isobutüülatsetaadi määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamist juhistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b09043	—	Isobutüülbutüraat	Söödalisandi koostis isobutüülbutüraat Toimeaine kirjeldus isobutüülbutüraat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₈ H ₁₆ O ₂ CASi number 539–90-2 FLAVISi number 09.043 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ isobutüülbutüraadi määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegudes: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishetkel märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b09070	—	3-metüülbutüülheksanaat	Söödalisandi koostis 3-metüülbutüülheksanaat Toimeaine kirjeldus 3-metüülbutüülheksanaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₁₁H₂₂O₂ CASi number 2198-61-0 FLAVISi number 09.070 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 3-metüülbutüülheksanaadi määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishetkedes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus on sigade ja kodulindude puhul 1 mg ning kõikide muude liikide ja kategooriate puhul 1,5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b09103	—	3-metüülbutüüldodekanaat	Söödalisandi koostis 3-metüülbutüüldodekanaat Toimeaine kirjeldus 3-metüülbutüüldodekanaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C₁₇H₃₄O₂ CASi number 6309-51-9 FLAVISi number 09.103 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 3-metüülbutüüldodekanaadi määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisharjumistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus on sigade ja kodulindude puhul 1 mg ning kõikide muude liikide ja kategooriate puhul 1,5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b09120	—	3-metüülbutüül-oktanaat	Söödalisandi koostis 3-metüülbutüül-oktanaat Toimeaine kirjeldus 3-metüülbutüül-oktanaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₁₃H₂₆O₂ CASi number 2035-99–6 FLAVISi number 09.120 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 3-metüülbutüül-oktanaadi määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishetkedel märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus on sigade ja kodulindude puhul 1 mg ning kõikide muude liikide ja kategooriate puhul 1,5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b09136	—	3-metüülbutüülpropionaat	Söödalisandi koostis 3-metüülbutüülpropionaat <i>Toimeaine kirjeldus</i> 3-metüülbutüülpropionaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₈ H ₁₆ O ₂ CASi number 105–68-0 FLAVISi number 09.136 <i>Analüüsimeetod ⁽¹⁾</i> 3-metüülbutüülpropionaadi määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishetkedel märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b09162	—	3-metüülbutüülformiaat	Söödalisandi koostis 3-metüülbutüülformiaat Toimeaine kirjeldus 3-metüülbutüülformiaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 92 % Keemiline valem: C ₆ H ₁₂ O ₂ CASi number 110–45-2 FLAVISi number 09.162 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 3-metüülbutüülformiaadi määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsiooniaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamist juhistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b09211	—	Glütserüültributüraat	Söödalisandi koostis glütserüültributüraat Toimeaine kirjeldus glütserüültributüraat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 99 % Keemiline valem: C₁₅H₂₆O₆ CASi number 60–01-5 FLAVISi number 09.211 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ glütserüültributüraadi määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegu: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishetkel märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b09417	—	Isobutüüliisobutüraat	Söödalisandi koostis isobutüüliisobutüraat Toimeaine kirjeldus isobutüüliisobutüraat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₈ H ₁₆ O ₂ CASi number 97–85-8 FLAVISi number 09.417 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ isobutüüliisobutüraadi määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegu: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsiooniaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishetkel märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b09419	—	Isopentüülisobutüraat	Söödalisandi koostis isopentüülisobutüraat Toimeaine kirjeldus isopentüülisobutüraat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₉ H ₁₈ O ₂ CASi number 3.1.2050 FLAVISi number 09.419 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ isopentüülisobutüraadi määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishetkel märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b09472	—	Isobutüüli- sovaleraat	Söödalisandi koostis isobutüüli-sovaleraat Toimeaine kirjeldus isobutüüli-sovaleraat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₉ H ₁₈ O ₂ CASi number 589–59-3 FLAVISi number 09.472 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ isobutüüli-sovaleraadi määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamist juhistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b09530	—	Isopentüül-2-metüülbutüraat	Söödalisandi koostis isopentüül-2-metüülbutüraat Toimeaine kirjeldus isopentüül-2-metüülbutüraat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 95 % Keemiline valem: C₁₀H₂₀O₂ CASi number 27625-35-0 FLAVISi number 09.530 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ isopentüül-2-metüülbutüraadi määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisharjumuste märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b09531	—	2-metüülbutüülisovaleraat	Söödalisandi koostis 2-metüülbutüülisovaleraat Toimeaine kirjeldus 2-metüülbutüülisovaleraat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₂₀ O ₂ CASi number 2445-77-4 FLAVISi number 09.531 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 2-metüülbutüülisovaleraadi määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsiooniaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishetkel märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	
2b09659	—	2-metüülbutüülbutüraat	Söödalisandi koostis 2-metüülbutüülbutüraat Toimeaine kirjeldus 2-metüülbutüülbutüraat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 95 % Keemiline valem: C ₉ H ₁₈ O ₂ CASi number 51115-64-1 FLAVISi number 09.659 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 2-metüülbutüülbutüraadi määramiseks söödalisandis ja sööda maitsestamise eelsegus: gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishetkedes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Toimeaine soovitatav sisaldus on kuni 5 mg sellise täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %. 4. Söödalisandi märgisel esitatakse toimeaine soovitatav maksimumsisaldus täissöödas. 5. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral esitatakse eelsegu, söödamaterjali ja segasööda märgisel asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning toimeaine lisatud kogus.	6. veebruar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajate jaoks ohutu kasutamise korra ja asjakohased korralduslikud meetmed, et ära hoida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada lubatava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	

(¹) Analüüsimetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebisaidil <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>