

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/403 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE**(2019. március 13.)****a „Deosan Activate BPF based on Iodine” biocid termékcsalád uniós engedélyezéséről**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 44. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

- (1) 2015. július 7-én a Diversey Europe Operations B.V. az 528/2012/EU rendelet 43. cikkének (1) bekezdésével összhangban kérelmet nyújtott be egy, a rendelet V. melléklete szerinti 3. termékcsoporthoz tartozó, „Deosan Activate BPF based on Iodine” nevet viselő biocid termékcsalád (a továbbiakban: termékcsalád) engedélyezése iránt. Az Egyesült Királyság illetékes hatósága beleegyezett abba, hogy az 528/2012/EU rendelet 43. cikke (1) bekezdésének megfelelően értékelje a kérelmet. A kérelem BC-JN018376-30 ügyszámra került bejegyzésre a biocid termékek nyilvántartásába.
- (2) A biocid termékcsalád jódot tartalmaz hatóanyagként, amely szerepel az engedélyezett hatóanyagoknak az 528/2012/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében említett uniós jegyzékében. Tekintettel a hatóanyag lényegi tulajdonságaira és az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ⁽²⁾ foglalt, az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumokra, a Bizottság mérlegelni fogja a jód, többek között a poli(vinil-pirrolidon) jód, jóváhagyása felülvizsgálatának szükségességét az 528/2012/EU rendelet 15. cikkének megfelelően. A Bizottság a felülvizsgálat eredményétől függően határoz arról, hogy az 528/2012/EU rendelet 48. cikkével összhangban felül kell-e vizsgálni a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó termékek uniós engedélyeit.
- (3) 2017. december 20-án az értékelő illetékes hatóság az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtotta értékelő jelentését, valamint értékelésének következtetéseit az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (a továbbiakban: ügynökség).
- (4) 2018. július 6-án az ügynökség az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (3) bekezdésének megfelelően véleményt ⁽³⁾ nyújtott be a Bizottsághoz, amely tartalmazta a biocid termékcsaládhoz tartozó biocid termék jellemzői összefoglalójának tervezetét (a továbbiakban: a termék jellemzőinek összefoglalója) és a termékcsaládra vonatkozó végső értékelő jelentést. Véleményében az ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy a termékcsalád megfelel az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének s) pontjában meghatározott „biocidtermék-család” fogalom meghatározásának, amelynek az említett rendelet 42. cikke (1) bekezdésével összhangban uniós engedély adható, valamint hogy a termékcsalád, amennyiben megfelel a termék jellemzői összefoglalójának tervezetében foglaltaknak, teljesíti a rendelet 19. cikkének (1) és (6) bekezdésében meghatározott feltételeket.
- (5) 2018. szeptember 17-én az ügynökség az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Unió valamennyi hivatalos nyelvén benyújtotta a Bizottsághoz a termék jellemzői összefoglalójának tervezetét.
- (6) A Bizottság egyetért az Ügynökség véleményével, ezért úgy ítéli meg, hogy helyénvaló uniós engedélyt adni a biocid termékcsaládnak.
- (7) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

⁽¹⁾ HL L 167., 2012.6.27., 1. o.⁽²⁾ A Bizottság (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. szeptember 4.) az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumoknak az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (HL L 301., 2017.11.17., 1. o.)⁽³⁾ Az ECHA 2018. július 6-i véleménye a „Deosan Activate BPF based on Iodine” uniós engedélyezéséről (ECHA/BPC/207/2018).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Diversey Europe Operations B.V. EU-0019228-0000 engedélyszámon uniós engedélyt kap a „Deosan Activate BPF based on Iodine” biocid termékcsaládra vonatkozóan.

Az uniós engedély 2019. április 3-tól 2029. március 31-ig érvényes.

Az uniós engedély feltétele, hogy a termékcsalád megfeleljen a biocid termék jellemzőire vonatkozó, a mellékletben szereplő összefoglalónak.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

MELLÉKLET

A biocid termékcsalád jellemzőinek összefoglalója

Deosan Activate BPF based on Iodine

03. terméktípus – Állat-egészségügy (fertőtlenítőszer)

Engedélyszám: EU-0019228-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: EU-0019228-0000

I. RÉSZ

ELSŐ INFORMÁCIÓS SZINT

1. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

1.1. Termékcsalád neve

Név	Deosan Activate BPF based on Iodine
-----	-------------------------------------

1.2. Termék típusa(i)

Termék típusa(i)	03. terméktípus – Állat-egészségügy (fertőtlenítőszer)
------------------	--

1.3. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Diversey Europe Operations B.V.
	Cím	Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, Hollandia
Engedélyszám	EU-0019228-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	EU-0019228-0000	
Az engedélyezés dátuma	2019. április 3. y	
Az engedély lejáratának dátuma	2029. március 31.	

1.4. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Diversey Europe Operations B.V.
A gyártó címe	Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Hollandia
Gyártási helyek	Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Olaszország Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid) Spanyolország Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Hollandia Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alferton Egyesült Királyság Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Németország

1.5. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	Jód
A gyártó neve	ACF Minera S.A.
A gyártó címe	San Martin No 499, 1100000 Iquique Chile
Gyártási helyek	Lagunas mine, 118 0000 Pozo Almonte Chile

Hatóanyag	Jód
A gyártó neve	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
A gyártó címe	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Chile
Gyártási helyek	Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Chile

Hatóanyag	Jód
A gyártó neve	Cosayach Nitratos S.A.
A gyártó címe	Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Chile
Gyártási helyek	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 118 0000 Pozo Almonte Chile

Hatóanyag	Jód
A gyártó neve	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
A gyártó címe	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Japán
Gyártási helyek	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Japán

Hatóanyag	Jód
A gyártó neve	ISE Chemicals Corporation
A gyártó címe	3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Japán
Gyártási helyek	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, 299-3201 Chiba Japán

Hatóanyag	Jód
A gyártó neve	Atacama Minerals SCM
A gyártó címe	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes, 8320000 Santiago Chile
Gyártási helyek	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility, 3580000 Antofagasta Chile

2. TERMÉKCSALÁD ÖSSZETÉTELE ÉS FORMULÁCIÓJA

2.1. Termékcsalád összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)	
					Legalább	Legfeljebb
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	0,3	1,6

2.2. Formuláció típusa(i)

Formuláció(k)	AL – Egyéb folyadék E – Oldható koncentrátum GW – Vízben oldódó gél
---------------	---

II. RÉSZ

MÁSODIK INFORMÁCIÓS SZINT – META-SPC(K)

META-SPC 1

1. META-SPC 1 ADMINISZTRATÍV ADATAI

1.1. Meta-SPC 1 azonosítója

Azonosító	Meta SPC 1 – Deosan Activate BPF – Concentrate
-----------	--

1.2. Engedélyszám pótszáma

Szám	1-1
------	-----

1.3. Termék típusa(i)

Termék típusa(i)	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
------------------	---

2. META-SPC 1 ÖSSZETÉTELE

2.1. Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 1 összetételére vonatkozóan

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)	
					Legalább	Legfeljebb
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	1,35	1,6

2.2. A meta-SPC 1 formulációjának típusa

Formuláció(k)	E – Oldható koncentrátum
---------------	--------------------------

3. A META-SPC 1 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI

Figyelmeztető mondatok	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A tartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti rendelkezéseknek megfelelően. A edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti rendelkezéseknek megfelelően.

4. A META-SPC 1 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)

4.1. A felhasználás leírása

1 táblázat. # 1 – 1. sz. felhasználás Fejés előtti fertőtlenítés, kézi bemártás (koncentrátum) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi bemártás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés előtt tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra. Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt kézi bemártási módszerrel
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell. Fejés előtti alkalmazás, állatonként, naponta háromszor Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezherdő 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.1.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében ez a következő lehet: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell.

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt kézi bemártási módszerrel.

Fejés előtti alkalmazás, állatonként, naponta háromszor.

Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás

4.1.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.2. A felhasználás leírása

2 táblázat. # 2 – 2. sz. felhasználás Fejés előtti fertőtlenítés, kézi habosítás (koncentrátum) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi habosítás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés előtt tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt kézi habosítási módszerrel
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell. Fejés előtti alkalmazás, állatonként, naponta háromszor Maximális felviendő anyag: 5 ml/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezherdó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.2.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell..

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt kézi habosítós felviteli módszerrel.

Fejés előtti alkalmazás, állatonként, naponta háromszor.

Maximális felviendő anyag: 5 ml termék/állat/alkalmazás

4.2.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.2.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.2.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.2.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.3. A felhasználás leírása

3 táblázat. # 3 – 3. sz. felhasználás Fejés előtti fertőtlenítés, kézi permetezés (koncentrátum) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi permetezés Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés előtt tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt kézi permetezési módszerrel.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell. Fejés előtti alkalmazás, állatonként, naponta háromszor Maximális felviendő anyag: 15 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezholdó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.3.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell.

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt kézi permetezési felviteli módszerrel.

Fejés előtti alkalmazás, állatonként, naponta háromszor

Maximális felviendő anyag: 15 ml termék/állat/alkalmazás

4.3.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék kezelési fázisában (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának a termékinformációk között kell megadnia)

4.3.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.3.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.3.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.4. A felhasználás leírása

4 táblázat. # 4 – 4. sz. felhasználás Fejés utáni fertőtlenítés, kézi bemártás (koncentrátum) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi bemártás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után kézi bemártási módszerrel.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell. Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta háromszor Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás/
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezherdő 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.4.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után kézi bemártási módszerrel.

1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell.

Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta háromszor (összesen a napi 5 alkalmazást ne haladja meg)

Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás

4.4.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.4.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.4.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.4.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.5. A felhasználás leírása

5 táblázat. # 5 – 5. sz. felhasználás Fejés utáni fertőtlenítés, kézi habosítás (koncentrátum) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi habosítás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után kézi habosítási módszerrel.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell. Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta háromszor Maximális felviendő anyag: 5 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezherdő 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.5.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után kézi habosítási módszerrel.

1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell.

Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta háromszor.

Maximális felviendő anyag: 5 ml termék/állat/alkalmazás

4.5.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.5.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.5.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.5.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.6. A felhasználás leírása

6 táblázat. # 6 – 6. sz. felhasználás Fejés utáni fertőtlenítés, kézi permetezés (koncentrátum) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi permetezés Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után kézi permetezési módszerrel.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell. Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta háromszor Maximális felviendő anyag: 15 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezholdó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.6.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után kézi permetezési módszerrel.

1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell.

Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta háromszor.

Maximális felviendő anyag: 15 ml termék/állat/alkalmazás

4.6.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék kezelési fázisában (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának a termékinformációk között kell megadnia)

4.6.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.6.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.6.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.7. A felhasználás leírása

7 táblázat. # 7 – 7. sz. felhasználás Fejés utáni fertőtlenítés, automatikus permetezés (koncentrátum) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Automatikus permetezés Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után automatikus permetezési módszerrel.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell. Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta ötször. Nem kombinálható fejés előtti fertőtlenítéssel. Maximális felviendő anyag: 15 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezholdó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.7.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után automatikus permetezési módszerrel.

1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell.

Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta ötször. Nem kombinálható jóddal alapú fejés előtti fertőtlenítéssel.

Maximális felviendő anyag: 15 ml termék/állat/alkalmazás

4.7.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.7.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.7.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.7.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.8. A felhasználás leírása

8 táblázat. # 8 – 8. sz. felhasználás Fejés utáni fertőtlenítés, Félautomatikus bemártás (concentrate) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Félautomatikus bemártás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után félautomatikus bemártási módszerrel.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell. Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta háromszor Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezherdő 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.8.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után félautomatikus bemártási módszerrel.

1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell.

Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta háromszor.

Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás

4.8.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.8.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.8.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.8.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.9. A felhasználás leírása

9 táblázat. # 9 – 9. sz. felhasználás Fejés előtti és utáni fertőtlenítés, kézi bemártás (koncentrátum) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi bemártás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés előtt és után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt és után kézi bemártási módszerrel
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell. 3 fejés előtti és 3 fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta (összesen a napi 5 alkalmazást ne haladja meg) Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezholdó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.9.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell.

Közvetlenül vigye fel az állatok tőgybimbóira fejés előtt és után kézi bemártási módszerrel.

3 fejés előtti és 3 fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta (összesen a napi 5 alkalmazást ne haladja meg)

Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás

4.9.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.9.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.9.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.9.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.10. A felhasználás leírása

10 táblázat. # 10 – 10. sz. felhasználás Fejés előtti és utáni fertőtlenítés, kézi habosítás (koncentrátum) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi habosítás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés előtt és után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt és után kézi habosítási módszerrel
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell. 3 fejés előtti és 3 fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta (összesen a napi 5 alkalmazást ne haladja meg). Maximális felviendő anyag: 5 ml/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezholdó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.10.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell.

Közvetlenül vigye fel az állatok tőgybimbóira fejés előtt és után kézi habosítási módszerrel.

3 fejés előtti és 3 fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta (összesen a napi 5 alkalmazást ne haladja meg).

Maximális felviendő anyag: 5 ml termék/állat/alkalmazás.

4.10.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.10.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.10.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.10.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.11. A felhasználás leírása

11 táblázat. # 11 – 11. sz. felhasználás Fejés előtti és utáni fertőtlenítés, kézi permetezés (koncentrátum) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi permetezés Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés előtt és után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt és után kézi permetezési módszerrel.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell. 3 fejés előtti és 3 fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta (összesen a napi 5 alkalmazást ne haladja meg) Maximális felviendő anyag: 15 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezherdő 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.11.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

1,5 % jódot tartalmazó termékek esetében: Hígítson 1 rész terméket 4 rész vízzel 0,3 % használati jódkoncentráció eléréséhez. Más koncentrációjú termékek esetében ezt az utasítást módosítani kell.

Közvetlenül vigye fel az állatok tőgybimbóira fejés előtt és után kézi permetezési módszerrel.

3 fejés előtti és 3 fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta (összesen a napi 5 alkalmazást ne haladja meg).

Maximális felviendő anyag: 15 ml termék/állat/alkalmazás

4.11.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék kezelési fázisában (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának a termékinformációk között kell megadnia)

Alkalmazzon megfelelő védőcipőt (EN 13832) a termék alkalmazásakor.

Védő kezeslábas (legalább 6. típusú, EN 13034) viselése szükséges.

4.11.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.11.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.11.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS ⁽¹⁾ A META-SPC 1-RA/RE VONATKOZÓAN

5.1. **Használati utasítások**

Használat előtt a terméket 20 °C-nál magasabb hőmérsékletre kell felmelegíteni

Fejés előtt:

A terméket mindegyik tőgybimbó teljes hosszában vigye fel.

A baktériumok és élesztőgomba elleni hatékony felhasználás érdekében a termék behatási ideje legalább 30 másodperc.

A megfelelő érintkezési idő elteltével gondosan távolítsa el a terméket egyszer használatos papírtörülkövel/törleruhával, hogy a tőgybimbók tiszták és szárazak legyenek.

Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m)

Fejés után:

Rögtön a fejés után vigye fel a terméket mindegyik tőgybimbó teljes hosszában úgy, hogy ellepje.

A megfelelő érintkezési időtartam biztosítása érdekében ügyelni kell arra, hogy a terméket alkalmazás után nem távolítják el (pl. tartsa a teheneket álló helyzetben legalább 5 percig)

Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m)

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Ezt a terméket a fejés előtti és a fejés utáni fertőtlenítésre is fel lehet használni kombinációban (állatonként naponta legfeljebb 5 alkalmazás megengedett). Más jódalapú készítménnyel nem kombinálható.

Adagolópumpa használata javasolt a terméknek az alkalmazáskor használt berendezésbe való betöltéséhez.

5.3. **Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

Belélegzés: Normál használat esetén nincsenek ismert hatások vagy tünetek.

Bőrrel való érintkezés: Normál használat esetén nincsenek ismert hatások vagy tünetek.

Szemmel való érintkezés: Normál használat esetén nincsenek ismert hatások vagy tünetek.

Lenyelés: Normál használat esetén nincsenek ismert hatások vagy tünetek

Belélegzés után: Gondoskodjon friss levegőről; tünetek esetén forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossa le szappanos vízzel és alaposan öblítse le.

Szemmel való érintkezés után: Öblítse ki a nyitott szemet néhány percig folyó víz alatt (legalább 15 percig).

Lenyelés után: Öblítse ki a száját, és igyon sok vizet. Azonnal hívjon orvost.

Ha orvosi tanácsra van szükség, vigye magával a termék csomagoló anyagát vagy címkéjét.

Stabilitás és reakciókészség:

Reakciókészség: Normál tárolási és felhasználási körülmények között nincs ismert reakcióképességgel kapcsolatos veszély.

Kémiai stabilitás: Normál tárolási és felhasználási körülmények között stabil.

Veszélyes reakciók lehetősége: Normál tárolási és felhasználási körülmények között nincs ismert veszélyes reakció.

Kerülendő körülmények: Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem ismert.

⁽¹⁾ Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 1 bármely engedélyezett felhasználásain belül.

Veszélyes bomlástermékek: Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem ismert.

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Védőgát nagyobb mennyiségű kiömlött folyadékok összegyűjtésére.

Akadályozza meg a kiömlött anyag szétterjedését és/vagy itassa fel inert anyaggal, majd helyezze megfelelő tárolóedénybe.

Akadályozza meg, hogy az elfolyt anyag a lefolyóba, csatornába vagy vízi utakba kerüljön.

Ártalmatlanítás céljára gyűjtse össze megfelelő zárt tárolóedényekben.

Ne helyezze a kiömlött anyagokat az eredeti tartályba.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Az üres tartályokat selejtezés előtt háromszor ki kell öblíteni

Az állati tőgyek letörlésére és a terméktől való mentesítésére használt papírtörülközőket normál/háztartási hulladékként kell ártalmatlanítani.

A hígítatlan terméket ne engedje a csatornába.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Csak eredeti, zárt tárolóedényben tárolja

Fagytól védje

Ne tárolja 40°C feletti hőmérsékleten

Eltarthatóság: 24 hónap

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Nincs

7. HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 1-BAN/BEN

7.1. Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név	Deosan Activate Pre AG106 Deosan Activate Pre				
Engedélyszám	EU-0019228-0001 1-1				
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	1,5

7.2. Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név	Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Conc. Deosan Hitech concentrate Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. Iodine Concentrate				
Engedélyszám	EU-0019228-0002 1-1				
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	1,5

META-SPC 2

1. META-SPC 2 ADMINISZTRATÍV ADATAI

1.1. **Meta-SPC 2 azonosítója**

Azonosító	Meta SPC 2 – Deosan Activate BPF – RTU liquid
-----------	---

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-2
------	-----

1.3. **Termék típusa(i)**

Termék típusa(i)	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszeresek)
------------------	---

2. META-SPC 2 ÖSSZETÉTELE

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 2 összetételére vonatkozóan**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)	
					Legalább	Legfeljebb
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2. **A meta-SPC 2 formulációjának típusa**

Formuláció(k)	AL – Egyéb folyadék
---------------	---------------------

3. A META-SPC 2 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI

Figyelmeztető mondatok	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A tartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti rendelkezéseknek megfelelően. A edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti rendelkezéseknek megfelelően.

4. A META-SPC 2 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)

4.1. **A felhasználás leírása****12 táblázat. # 1 – 12. sz. felhasználás Fejés előtti fertőtlenítés, kézi bemártás (használatra kész folyadék) használata**

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszeresek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi bemártás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés előtt tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt kézi bemártási módszerekkel

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa. Fejés előtti alkalmazás, állatonként, naponta háromszor. Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezholdó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.1.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt kézi bemártási módszerekkel.

0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa.

Fejés előtti alkalmazás, állatonként, naponta háromszor.

Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás

4.1.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.2. A felhasználás leírása

13 táblázat. # 2 – 13. sz. felhasználás Fejés előtti fertőtlenítés, kézi habosítás (használatra kész folyadék) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi habosítás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés előtt tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt kézi habosítási módszerrel.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa. Fejés előtti alkalmazás, állatonként, naponta háromszor. Maximális felviendő anyag: 5 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezholdó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.2.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa.

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt kézi habosítós felviteli módszerrel.

Fejés előtti alkalmazás, állatonként, naponta háromszor.

Maximális felviendő anyag: 5 ml termék/állat/alkalmazás

4.2.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.2.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.2.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.2.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.3. A felhasználás leírása

14 táblázat. # 3 – 14. sz. felhasználás Fejés előtti fertőtlenítés, kézi permetezés (használatra kész folyadék) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi permetezés Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés előtt tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt kézi permetezési módszerrel.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa. Fejés előtti alkalmazás, állatonként, naponta háromszor. Maximális felviendő anyag: 15 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezholdó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.3.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt kézi permetezési módszerrel.

0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa.

Fejés előtti alkalmazás, állatonként, naponta háromszor.

Maximális felviendő anyag: 15 ml termék/állat/alkalmazás

4.3.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék kezelési fázisában (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának a termékinformációk között kell megadnia)

4.3.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.3.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.3.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.4. A felhasználás leírása

15 táblázat. # 4 – 15. sz. felhasználás – Fejés utáni fertőtlenítés, kézi bemártás (használatra kész folyadék) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi bemártás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után kézi bemártási módszerrel.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa. Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta háromszor. Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezholdó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.4.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után kézi bemártási módszerrel.

0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa.

Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta háromszor.

Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás

4.4.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.4.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.4.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.4.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.5. A felhasználás leírása

16 táblázat. # 5 – 16. sz. felhasználás – Fejés utáni fertőtlenítés, kézi habosítás (használatra kész folyadék) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi habosítás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után kézi habosítási módszerrel.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa. Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta háromszor. Maximális felviendő anyag: 5 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezholdó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.5.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után kézi habosítási módszerrel.)

0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa.

Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta háromszor.

Maximális felviendő anyag: 5 ml termék/állat/alkalmazás

4.5.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.5.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.5.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.5.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.6. A felhasználás leírása

17 táblázat. # 6 – 17. sz. felhasználás – Fejés utáni fertőtlenítés, kézi permetezés (használatra kész folyadék) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi permetezés Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra. Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után kézi permetezési módszerrel.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa. Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta háromszor. Maximális felviendő anyag: 15 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezholdó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.6.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után kézi permetezési módszerrel.

0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa.

Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta háromszor.

Maximális felviendő anyag: 15 ml termék/állat/alkalmazás

4.6.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék kezelési fázisában (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának a termékinformációk között kell megadnia)

4.6.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.6.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.6.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.7. A felhasználás leírása

18 táblázat. # 7 – 18. számú felhasználás– Fejés utáni fertőtlenítés, automatikus permetezés (nem kombinálható fejés előtti fertőtlenítéssel (használatra kész folyadék) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Automatikus permetezés Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra. Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után automatikus permetezési módszerrel.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa. Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta ötször. Nem kombinálható jódd alapú fejés előtti fertőtlenítéssel. Maximális felviendő anyag: 15 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezherdő. 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.7.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után automatikus permetezési módszerrel.

0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa.

Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta ötször. Nem kombinálható jódd alapú fejés előtti fertőtlenítéssel.

Maximális felviendő anyag: 15 ml termék/állat/alkalmazás

4.7.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.7.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.7.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.7.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.8. A felhasználás leírása

19 táblázat. # 8 – 19. sz. felhasználás – Fejés utáni fertőtlenítés, félautomatikus bemártás (használatra kész folyadék) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszeresek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Félautomatikus bemártás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után félautomatikus bemártási módszerrel..

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa. Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta ötször. Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezhordó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.8.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után félautomatikus bemártási módszerrel.

0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa.

Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta ötször.

Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás

4.8.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.8.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.8.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.8.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.9. A felhasználás leírása

20 táblázat. # 9 – 20. sz. felhasználás – Fejés előtti és utáni fertőtlenítés, kézi bemártás (használatra kész folyadék) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi bemártás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés előtt és után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra. Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt és után kézi bemártási módszerrel.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa. 3 fejés előtti és 3 fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta (összesen a napi 5 alkalmazást ne haladja meg). Maximális felvi endő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezholdó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.9.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt kézi bemártási módszerekkel.

0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa.

3 fejés előtti és 3 fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta (összesen a napi 5 alkalmazást ne haladja meg).

Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás

4.9.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék kezelési fázisában (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának a termékinformációk között kell megadnia)

4.9.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.9.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.9.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.10. A felhasználás leírása

21 táblázat. # 10 – 21. sz. felhasználás – Fejés előtti és utáni fertőtlenítés, kézi habosítás (használatra kész folyadék) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszeresek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi habosítás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés előtt és után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra. Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt és után kézi habosítási módszerrel.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa. 3 fejés előtti és 3 fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta (összesen a napi 5 alkalmazást ne haladja meg). Maximális felviendő anyag: 5 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezholdó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.10.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa.

Közvetlenül vigye fel az állatok tőgybimbóira fejés előtt és után kézi habosítási módszerrel.

3 fejés előtti és 3 fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta (összesen a napi 5 alkalmazást ne haladja meg).

Maximális felviendő anyag: 5 ml termék/állat/alkalmazás

4.10.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék kezelési fázisában (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának a termékinformációk között kell megadnia)

4.10.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.10.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.10.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.11. A felhasználás leírása

22 táblázat. # 11 – 22. sz. felhasználás – Fejés előtti és utáni fertőtlenítés, kézi habosítás (használatra kész folyadék) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi permetezés Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés előtt és után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt és után kézi permetezési módszerrel.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa. 3 fejés előtti és 3 fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta (összesen akár 5 alkalmazás). Maximális felviendő anyag: 15 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezholdó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.11.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt és után kézi permetezési módszerrel.

0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa.

3 fejés előtti és 3 fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta (összesen a napi 5 alkalmazást ne haladja meg).

Maximális felviendő anyag: 15 ml termék/állat/alkalmazás

4.11.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék kezelési fázisában (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának a termékinformációk között kell megadnia)

Alkalmazzon megfelelő védőcipőt (EN 13832) a termék alkalmazásakor.

Védő kezelábas (legalább 6. típusú, EN 13034) viselése szükséges

4.11.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.11.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.11.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS ⁽²⁾ A META-SPC 2-RA/RE VONATKOZÓAN

5.1. Használati utasítások

Használat előtt a terméket 20 °C-nál magasabb hőmérsékletre kell felmelegíteni

Fejés előtt:

A terméket mindegyik tőgybimbó teljes hosszában vigye fel.

A baktériumok és élesztőgomba elleni hatékony felhasználás érdekében a termék behatási ideje legalább 30 másodperc.

A megfelelő érintkezési idő elteltével gondosan távolítsa el a terméket egyszer használatos papírtörölővel/törölőruhával, hogy a tőgybimbók tiszták és szárazak legyenek.

Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m)

⁽²⁾ Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 2 bármely engedélyezett felhasználásain belül.

Fejés után:

Rögtön a fejés után vigye fel a terméket mindegyik tőgybimbó teljes hosszában úgy, hogy ellepje.

A megfelelő érintkezési időtartam biztosítása érdekében ügyelni kell arra, hogy a terméket alkalmazás után nem távolítják el (pl. tartsa a teheneket álló helyzetben legalább 5 percig)

Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m)

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Ezt a terméket a fejés előtti és a fejés utáni fertőtlenítésre is fel lehet használni kombinációban (állatonként naponta legfeljebb 5 alkalmazás megengedett). Más jódalapú készítménnyel nem kombinálható.

Adagolópumpa használata javasolt a terméknek az alkalmazáskor használt berendezésbe való betöltéséhez.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Belélegzés: Normál használat esetén nincsenek ismert hatások vagy tünetek.

Bőrrel való érintkezés: Normál használat esetén nincsenek ismert hatások vagy tünetek.

Szemmel való érintkezés: Normál használat esetén nincsenek ismert hatások vagy tünetek.

Lenyelés: Normál használat esetén nincsenek ismert hatások vagy tünetek

Belélegzés után: Gondoskodjon friss levegőről; tünetek esetén forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossa le szappanos vízzel és alaposan öblítse le.

Szemmel való érintkezés után: Öblítse ki a nyitott szemet néhány percig folyó víz alatt (legalább 15 percig).

Lenyelés után: Öblítse ki a száját, és igyon sok vizet. Azonnal hívjon orvost.

Ha orvosi tanácsra van szükség, vigye magával a termék csomagoló anyagát vagy címkéjét.

Stabilitás és reakciókészség:

Reakciókészség: Normál tárolási és felhasználási körülmények között nincs ismert reakcióképességgel kapcsolatos veszély.

Kémiai stabilitás: Normál tárolási és felhasználási körülmények között stabil.

Veszélyes reakciók lehetősége: Normál tárolási és felhasználási körülmények között nincs ismert veszélyes reakció.

Kerülendő körülmények: Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem ismert.

Veszélyes bomlástermékek: Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem ismert.

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Védőgát nagyobb mennyiségű kiömlött folyadékok összegyűjtésére.

Akadályozza meg a kiömlött anyag szétterjedését és/vagy itassa fel inert anyaggal, majd helyezze megfelelő tárolóedénybe.

Akadályozza meg, hogy az elfolyt anyag a lefolyóba, csatornába vagy vízi utakba kerüljön.

Ártalmatlanítás céljára gyűjtse össze megfelelő zárt tárolóedényekben.

Ne helyezze a kiömlött anyagokat az eredeti tartályba.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Az üres tartályokat selejtezés előtt háromszor ki kell öblíteni.

Az állati tőgyek letörlésére és a terméktől való mentesítésére használt papírtörülközőket normál/háztartási hulladékként kell ártalmatlanítani.

A hígítatlan terméket ne engedje a csatornába.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Csak eredeti, zárt tárolóedényben tárolja

Fagytól védje

Ne tárolja 30°C feletti hőmérsékleten

Eltarthatóság: 24 hónap

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Nincs

7. HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 2-BAN/BEN

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Deosan Activate Pre RTU AG108 Deosan Activate Pre RTU				
Engedélyszám	EU-0019228-0003 1-2				
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.2. **Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Deosan Activate Pre/Post AG217 Deosan Activate Pre/Post Iodine Plus Pre & Post Deosan D4T Super AG211 Agros Iodo Agros Iodo Multi Poviclyn liquido				
Engedélyszám	EU-0019228-0004 1-2				
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.3. **Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Deosan Activate PVP Plus AG215 Deosan Activate PVP Plus Agros Iodo-Prev POS-Ordenha Deosan Hitech 2 AG214 Iodine Teat Dip Solution				
Engedélyszám	EU-0019228-0005 1-2				
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	0,3

META-SPC 3

1. META-SPC 3 ADMINISZTRATÍV ADATAI

1.1. **Meta-SPC 3 azonosítója**

Azonosító	Meta SPC 3 – Deosan Activate BPF – RTU gel
-----------	--

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-3
------	-----

1.3. **Termék típusa(i)**

Termék típusa(i)	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
------------------	---

2. META-SPC 3 ÖSSZETÉTELE

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 3 összetételére vonatkozóan**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)	
					Legalább	Legfeljebb
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2. **A meta-SPC 3 formulációjának típusa**

Formuláció(k)	GW – Vízben oldódó gél
---------------	------------------------

3. A META-SPC 3 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI

Figyelmeztető mondatok	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A tartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti rendelkezéseknek megfelelően. A edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti rendelkezéseknek megfelelően.

4. A META-SPC 3 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)

4.1. **A felhasználás leírása****23 táblázat. # 1 – 23. sz. felhasználás – Fejés előtti fertőtlenítés, kézi bemártás (használatra kész gél) használata**

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi bemártás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés előtt tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt kézi bemártási módszerrel.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa. Fejés előtti alkalmazás, állatonként, naponta háromszor. Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezhordó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.1.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt kézi bemártási módszerrel.

0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa.

Fejés előtti alkalmazás, állatonként, naponta háromszor.

Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás

4.1.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.2. A felhasználás leírása

24 táblázat. # 2 – 24. sz. felhasználás – Fejés utáni fertőtlenítés, kézi bemártás (használatra kész gél) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi bemártás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után kézi bemártási módszerrel.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa. Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta háromszor. Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezhordó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.2.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után kézi bemártási módszerrel.

0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa.

Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta kétszer-háromszor.

Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás

4.2.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.2.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.2.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.2.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.3. A felhasználás leírása

25 táblázat. # 3 – 25. sz. felhasználás – Fejés utáni fertőtlenítés, félautomatikus bemártás (használatra kész gél) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Félautomatikus bemártás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés után, tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után félautomatikus bemártási módszerrel.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa. Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta háromszor. Maximális felvi endő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás.
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemezfordó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.3.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés után félautomatikus bemártási módszerrel.

0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa.

Fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta háromszor.

Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás

4.3.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.3.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.3.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.3.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.4. A felhasználás leírása

26 táblázat. # 4 – 26. sz. felhasználás – Fejés előtti és utáni fertőtlenítés, kézi bemártás (használatra kész gél) használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Kézi bemártás Tőgybimbó-fertőtlenítő szer, fejés előtt és után tejtermelő állatokon történő közvetlen alkalmazásra. Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt és után kézi bemártási módszerrel.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m) - 0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa. 3 fejés előtti és 3 fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta (összesen a napi 5 alkalmazást ne haladja meg). Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás.
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	1, 5 és 20 literes HDPE vagy f-HDPE kanna 200 literes HDPE vagy f-HDPE lemez hordó 950 literes HDPE vagy f-HDPE közepes nagyságú konténer (IBC)

4.4.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Közvetlenül kell felvinni az állatok tőgybimbóira fejés előtt és után kézi bemártási módszerrel.

0,3 % m/m jódot tartalmazó felhasználásra kész készítmény. Használat előtt ne hígítsa.

3 fejés előtti és 3 fejés utáni alkalmazás, állatonként, naponta (összesen akár 5 alkalmazás)

Maximális felviendő anyag: 10 ml termék/állat/alkalmazás.

4.4.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt amikor a terméket bemártással felviszi (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának a termékinformációk között kell megadnia).

4.4.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

4.4.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás.

4.4.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5. szakaszt – Általános használati utasítás

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS ^(*) A META-SPC 3-RA/RE VONATKOZÓAN

5.1. Használati utasítások

Használat előtt a terméket 20 °C-nál magasabb hőmérsékletre kell felmelegíteni.

Fejés előtt:

A terméket mindegyik tőgybimbó teljes hosszában vigye fel.

A baktériumok és élesztőgombák elleni hatékony felhasználás érdekében a termék behatási ideje legalább 30 másodperc.

A megfelelő érintkezési idő elteltével gondosan távolítsa el a terméket egyszer használatos papírtörülkövel/törleruhával, hogy a tőgybimbók tiszták és szárazak legyenek.

Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m)

^(*) Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 3 bármely engedélyezett felhasználásain belül.

Fejés után:

Rögtön a fejés után vigye fel a terméket mindegyik tőgybimbó teljes hosszában úgy, hogy ellepje.

A megfelelő érintkezési időtartam biztosítása érdekében ügyelni kell arra, hogy a terméket alkalmazás után nem távolítsák el (pl. tartsa a teheneket álló helyzetben legalább 5 percig).

Használati jódkoncentráció 3 000 mg/kg (0,3 % m/m)

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Ezt a terméket a fejés előtti és a fejés utáni fertőtlenítésre is fel lehet használni kombinációban (állatonként naponta legfeljebb 5 alkalmazás megengedett). Más jódalapú készítménnyel nem kombinálható.

Adagolópumpa használata javasolt a terméknek az alkalmazáskor használt berendezésbe való betöltéséhez.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Belélegzés: Normál használat esetén nincsenek ismert hatások vagy tünetek.

Bőrrel való érintkezés: Normál használat esetén nincsenek ismert hatások vagy tünetek.

Szemmel való érintkezés: Normál használat esetén nincsenek ismert hatások vagy tünetek.

Lenyelés: Normál használat esetén nincsenek ismert hatások vagy tünetek.

Belélegzés után: Gondoskodjon friss levegőről; tünetek esetén forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossa le szappanos vízzel és alaposan öblítse le.

Szemmel való érintkezés után: Öblítse ki a nyitott szemet néhány percig folyó víz alatt (legalább 15 percig).

Lenyelés után: Öblítse ki a száját, és igyon sok vizet. Azonnal hívjon orvost.

Ha orvosi tanácsra van szükség, vigye magával a termék csomagoló anyagát vagy címkéjét.

Stabilitás és reakciókészség:

Reakciókészség: Normál tárolási és felhasználási körülmények között nincs ismert reakcióképességgel kapcsolatos veszély.

Kémiai stabilitás: Normál tárolási és felhasználási körülmények között stabil.

Veszélyes reakciók lehetősége: Normál tárolási és felhasználási körülmények között nincs ismert veszélyes reakció.

Kerülendő körülmények: Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem ismert.

Veszélyes bomlástermékek: Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem ismert.

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Védőgát nagyobb mennyiségű kiömlött folyadékok összegyűjtésére.

Akadályozza meg a kiömlött anyag szétterjedését és/vagy itassa fel inert anyaggal, majd helyezze megfelelő tárolóedénybe.

Akadályozza meg, hogy az elfolyt anyag a lefolyóba, csatornába vagy vízi utakba kerüljön.

Ártalmatlanítás céljára gyűjtse össze megfelelő zárt tárolóedényekben.

Ne helyezze a kiömlött anyagokat az eredeti tartályba.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Az üres tartályokat selejtezés előtt háromszor ki kell öblíteni.

Az állati tőgyek letörlésére és a terméktől való mentesítésére használt papírtörülközőket normál/háztartási hulladékként kell ártalmatlanítani.

A hígítatlan terméket ne engedje a csatornába.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Csak eredeti, zárt tárolóedényben tárolja

Fagytól védje

Ne tárolja 30°C feletti hőmérsékleten

Eltarthatóság: 18 hónap

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Nincs

7. HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 3-BAN/BEN**7.1. Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Deosan Activate Barrier AG216 Agros Iodo Pósz Povisyl espeso				
Engedélyszám	EU-0019228-0006 1-3				
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	0,3