

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 28.)

az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata értelmében a Közöségi Hálózatnak jelentendő fertőző betegségek esetdefinícióinak megállapításáról szóló 2002/253/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2008) 1589. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/426/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségben a fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról szóló, 1998. szeptember 24-i 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra ⁽¹⁾ és különösen annak 3. cikke c) bekezdésére,

mivel:

- (1) A 2002/253/EK bizottsági határozat ⁽²⁾ 2. cikkének megfelelően a szóban forgó határozat mellékletében szereplő esetdefiníciókat a legújabb tudományos ismeretek alapján szükséges mértékben módosítani kell.
- (2) Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK rendelet ⁽³⁾ 9. cikkével összhangban az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) a Bizottság felkérésére a tanácsadó fórummal egyetértésben az esetdefiníciókra vonatkozó technikai dokumentumot bocsátott rendelkezésre, segítve a Bizottságot intervencióstratégiák kifejlesztésében a felügyelet és reagálás terén. A technikai dokumentumot az ECDC honlapján is közzétették. A 2002/253/EK határozat mellékletében szereplő esetdefiníciókat e hozzájárulás alapján aktualizálni kell.
- (3) Az esetdefiníciók célja, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata szerinti közösségi hálózat

hatálya alá fokozatosan besorolandó fertőző betegségekről szóló, 1999. december 22-i 2000/96/EK bizottsági határozat ⁽⁴⁾ I. mellékletében szereplő betegségekkel és speciális egészségügyi problémákkal kapcsolatos jelentéstételt elősegítse. A 2002/253/EK határozat azonban nem ír elő jelentéstételi kötelezettséget.

- (4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2119/98/EK határozattal létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/253/EK határozat mellékletének helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 28-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

⁽¹⁾ HL L 268., 1998.10.3., 1. o. A legutóbb a 2007/875/EK bizottsági határozattal (HL L 344., 2007.12.28., 48. o.) módosított határozat.

⁽²⁾ HL L 86., 2002.4.3., 44. o. (A 2003/534/EK határozattal (HL L 184., 2007.7.23., 35. o.) módosított határozat.

⁽³⁾ HL L 142., 2004.4.30., 1. o.

⁽⁴⁾ HL L 28., 2000.2.3., 50. o. A legutóbb a 2007/875/EK határozattal módosított határozat.

MELLÉKLET

AZ ESETEK DEFINÍCIÓJÁHOZ ÉS OSZTÁLYOZÁSÁHOZ ALKALMAZOTT SZAKASZOK MAGYARÁZATA

Klinikai kritériumok

A klinikai kritériumok közé tartoznak a betegség általános és jellemző jelei és tünetei, amelyek egyenként vagy kombinálva alkotják a betegség egyértelmű vagy indikatív klinikai kórképét. A klinikai kritériumok a betegség általános leírását adják, és nem szükségszerűen jelzik a betegség valamennyi olyan jellemzőjét, amely a betegség esetenkénti klinikai diagnózisának felállításához szükséges.

Laboratóriumi kritériumok

A laboratóriumi kritériumokat az eset megerősítéséhez felhasznált laboratóriumi módszerek listája alkotja. Rendszerint a felsorolt vizsgálatok közül egyetlen is elegendő az eset megerősítéséhez. Ha a laboratóriumi megerősítéshez módszerek kombinációja szükséges, ezt külön jelzik. A laboratóriumi vizsgálat céljából gyűjtendő minta típusa kizárólag akkor kerül meghatározásra, ha csak bizonyos mintatípusokat tekintenek jellemzőnek a diagnózis megerősítése céljából. Bizonyos elismert kivételes esetekben szerepelnek a valószínűsíthető esetek laboratóriumi kritériumai is. Ez a lista olyan laboratóriumi módszereket sorol fel, amelyek felhasználhatók az esetdiagnózis alátámasztására, de amelyek nem megerősítő jellegűek.

Epidemiológiai kritériumok és epidemiológiai kapcsolat

Az epidemiológiai kritériumok akkor tekinthetők teljesültnek, ha megállapítható az epidemiológiai kapcsolat.

Az epidemiológiai kapcsolat a lappangási időszak alatt az alábbi hat feltétel legalább egyikeként határozható meg:

- Emberről emberre való terjedés: minden olyan személy, aki érintkezett egy laboratóriumiilag megerősítetten az adott betegségben szenvedő személlyel oly módon, hogy lehetősége volt arra, hogy megkapja a fertőzést.
- Állatról emberre való terjedés: bármely olyan személy, aki olyan állattal érintkezett, amelyben laboratóriumiilag kimutatták a fertőzést vagy kolonizációt, oly módon, hogy lehetősége volt arra, hogy megkapja a fertőzést.
- Közös forrással való érintkezés: bármely olyan személy, aki ki volt téve a fertőzés ugyanazon közös forrásának vagy hordozójának, mint egy megerősítetten fertőzött személy.
- Fertőzött étellel/ivóvízzel való érintkezés: minden olyan személy, aki laboratóriumiilag megerősítetten fertőzött étellel vagy fertőzött ivóvizet fogyasztott, vagy olyan személy, aki olyan állatból származó, potenciálisan fertőzött termékeket fogyasztott, amelyben laboratóriumiilag kimutatták a fertőzést vagy kolonizációt.
- Környezeti expozíció: bármely olyan személy, aki laboratóriumiilag megerősítetten fertőzött vízben fürdött vagy érintkezett fertőzött környezeti forrással.
- Laboratóriumi expozíció: bármely olyan laboratóriumban dolgozó személy, ahol lehetőség van az expozícióra.

Valamely személy akkor tekinthető megerősített esettel epidemiológiai kapcsolatban állónak, ha a fertőzés láncának legalább egy esetét laboratóriumiilag megerősítik. Faeco-orális vagy levegő útján terjedő fertőzés kitörése esetén a fertőzési láncot nem szükséges megállapítani ahhoz, hogy az esetet epidemiológiai kapcsolatban állónak tekintsék.

A fertőzés az alábbi módokon terjedhet:

- Levegőben való terjedés, köhögés, köpködés, éneklés vagy beszéd során a fertőzöttről származó folyadékcseppek a nyálkahártyára történő kibocsátásával, illetve akkor, amikor a levegőbe jutó mikrobás folyadékcseppeket egy másik személy belélegzi.
- Érintkezés, közvetlen érintkezés (faecal-orális, légzéssel kibocsátott folyadékcseppek, bőr- vagy szexuális érintkezés) a fertőzött személlyel vagy fertőzött állattal (harapás, érintés), vagy közvetett érintkezés fertőzött anyagokkal vagy tárgyakkal (fertőzőhordozó anyagok, fertőzött testnedvek, vér).
- Vertikális, anyáról gyermekre, gyakran méhen belül, vagy testnedvek véletlenszerű cseréje által, rendszerint a perinatális időszakban.
- Kórokozó-átvivő általi fertőzés, közvetett fertőzés fertőzött szúnyogokon, atkákon, legyeken és más rovarokon keresztül, amelyek csípésükkel adják át a fertőzést az emberi szervezetnek.
- Élelmiszer vagy víz, potenciálisan fertőzött élelmiszer vagy ivóvíz fogyasztása.

Esetek osztályozása

Az esetek a következőképpen osztályozhatók: gyanús, valószínűsíthető, megerősített. Az epidemiológiai kapcsolat felmérésének elősegítésére a kiegészítő információk között szerepelnek a betegségek lappangási idejére vonatkozó adatok.

Gyanús eset

Olyan eset, amely jelentési célokra gyanús esetként osztályozható. Rendszerint olyan eset, amelynél az esetdefinícióban ismertetett klinikai kritériumok szerepelnek, de a szóban forgó betegséget nem bizonyították epidemiológiailag vagy laboratóriumiilag. A gyanús eset meghatározására nagy szenzitivitás és alacsony specificitás jellemző. Lehetővé teszi a legtöbb eset kimutatását, de e kategóriába belekerül néhány téves (hamis pozitív) diagnózis is.

Valószínűsíthető eset

Olyan eset, amely jelentési célokra valószínűsíthető esetként osztályozható. Rendszerint olyan eset, amelynél jelen vannak az esetdefinícióban ismertetett klinikai kritériumok és az epidemiológiai kapcsolat. A valószínűsíthető eseteknél csak bizonyos betegségekre írnak elő laboratóriumi vizsgálatokat.

Megerősített eset

Olyan eset, amely jelentési célokra megerősített esetként osztályozható. A megerősített eseteket laboratóriumiilag megerősítették, és az esetdefinícióban ismertetett klinikai kritériumoknak megfelelőnek vagy nem felelhetnek meg. A megerősített eset definíciójára erős specificitás és kisebb szenzitivitás jellemző; ezért a felismert esetek legtöbbje valódi eset, habár néhány esetet nem tudnak kimutatni.

Egyes betegségek klinikai kritériumai nem utalnak arra a tényre, hogy számos akut eset tünetmentes (pl. hepatitis A, B és C, campylobacter, szalmonellózis), habár ezek az esetek közegészségügyi szempontból és nemzeti szinten lényegesek lehetnek.

A megerősített esetek az alábbiakban felsorolt három alkategória egyikébe tartoznak. Ezeket az alkategóriákat az adatok elemzésekor, az esetről való tájékoztatás során összegyűjtött változókat felhasználva hozzák létre.

Laboratóriumiilag megerősített eset klinikai kritériumokkal

Az eset megfelel az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumainak és az esetdefinícióban szereplő klinikai kritériumoknak.

Laboratóriumiilag megerősített eset ismeretlen klinikai kritériumokkal

Az eset megfelel az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumainak, de nem áll rendelkezésre információ a klinikai kritériumokról (pl. csak laboratóriumi jelentés).

Laboratóriumiilag megerősített eset klinikai kritériumok nélkül

Az eset megfelel az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumainak, viszont az esetdefinícióban szereplő klinikai kritériumoknak nem, vagy az eset tünetmentes.

SZERZETT IMMUNHIÁNYOS TÜNETEGYÜTTES (AIDS) ÉS HUMÁN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS- (HIV-) FERTŐZÉS

Klinikai kritériumok (AIDS)

Ide tartozik minden olyan személy, akinél az európai AIDS esetdefiníciójában szereplő klinikai tünetek valamelyike jelentkezik:

- Felnőttek és 13 évesnél idősebb serdülőkorúak ⁽¹⁾
- 13 év alatti gyermekek ⁽²⁾

Laboratóriumi kritériumok (HIV)

- Felnőttek, serdülőkorúak és 18 hónapos vagy annál idősebb gyermekek

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- A HIV-antitest kimutatására irányuló szűrővizsgálat vagy kombinált szűrővizsgálat (HIV- antitest és HIV p24 antigén) pozitív eredménye egy specifikusabb antitestvizsgálattal (pl. Western blot) megerősítve.
- 2 EIA antitest-vizsgálat pozitív eredménye egy további EIA-vizsgálat pozitív eredményével megerősítve

⁽¹⁾ Az AIDS Járványtanát Monitorizáló Európai Központ, az európai AIDS-felügyelet esetmeghatározásának 1993-as átdolgozása. AIDS-felügyelet Európában, negyedéves jelentés, 1993 (*AIDS Surveillance in Europe, Quarterly Report*) 37. szám: 23-28.

⁽²⁾ Az AIDS Járványtanát Monitorizáló Európai Központ, az európai AIDS-felügyelet esetmeghatározása gyermekeknél – 1995-ös felülvizsgálat. HIV/AIDS felügyelet Európában, negyedéves jelentés, 1995. (*HIV/AIDS Surveillance in Europe, Quarterly Report* 1995); 48. szám: 46-53.

- Két külön mintán kapott pozitív eredmény az alábbi három tényező legalább egyike tekintetében:
 - A HIV-nukleinsav (HIV-RNS vagy HIV-DNS) kimutatása
 - A HIV kimutatása HIV p24 antigénvizsgálattal, beleértve a neutralizációs vizsgálatot is
 - a HIV izolálása
 - 18 hónaposnál fiatalabb gyermekek
- Két külön mintán (a köldökszínórvér kivételével) kapott pozitív eredmény az alábbi három tényező legalább egyike tekintetében:
- a HIV izolálása
 - A HIV-nukleinsav (HIV-RNS vagy HIV-DNS) kimutatása
 - a HIV kimutatása HIV p24 antigénvizsgálattal, az egy hónapos vagy annál idősebb gyermekek esetében beleértve a neutralizációs vizsgálatot is.

Epidemiológiai kritériumok

n.a.

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

n.a.

C. Megerősített eset

- HIV-fertőzés

Minden olyan személy, akire teljesülnek a HIV-fertőzés laboratóriumi kritériumai

- AIDS

Minden olyan személy, akire teljesülnek az AIDS klinikai kritériumai és a HIV-fertőzés laboratóriumi kritériumai

LÉPFENE (ANTHRAX)

(*Bacillus anthracis*)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi klinikai formák legalább egyike:

Bőranthrax

Az alábbi két tünet legalább egyike:

- Papuláris vagy vesiculáris seb
- Ödémával övezett, bemélyedő pokolvar (eschar)

Bélanthrax

- Láz vagy lázas állapot

ÉS az alábbi két tünet legalább egyike:

- Heves hasi fájdalom
- Hasmenés

Tüdőanthrax

- Láz vagy lázas állapot

ÉS az alábbi két tünet legalább egyike:

- Akut légzési nehézség
- A mediastinum kiszélesedésének radiológiai bizonyítéka

Agyhártya/agyvelőanthrax (meningeális/meningoenkefalitisz-anthrax)

- Láz

ÉS az alábbi három tünet legalább egyike:

- Görcsroham
- Eszméletvesztés
- Meningeális tünetek

Anthrax septicaemia (vérmérgezés)

Laboratóriumi kritériumok

- A *Bacillus anthracis* izolálása klinikai mintából.
- A *Bacillus anthracis* nukleinsav kimutatása klinikai mintában

Klinikai tünetek hiányában az orrból tamponnal vett minta pozitív eredménye nem alkalmas az eset diagnózisának felállítására

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi három epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Állatról emberre való terjedés
- Közös forrással való érintkezés
- Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

A/H5 VAGY A/H5N1 TÍPUSÚ MADÁRINFLUENZA EMBERI SZERVEZETBEN

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

- Láz ÉS akut légzőszervi fertőzés jelei és tünetei
- Elhalálozás megmagyarázatlan akut légzőszervi megbetegedés következtében

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- Az A/H5N1 influenzavírus izolálása klinikai mintából
- Az A/H5 nukleinsav kimutatása klinikai mintában
- Az A/H5 influenzával szembeni specifikus antitest-reakció (négyzeres vagy magasabb emelkedés vagy egyetlen magas titer)

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- Emberről emberre terjedő fertőzés a valószínűsíthető vagy megerősített esettel való szoros érintkezés útján (egy méteren belül)
- Laboratóriumi expozíció: ahol lehetőség van az A/H5N1 influenzavírussal való érintkezésre
- Szoros érintkezés (egy méteren belül) megerősítetten A/H5N1 vírussal fertőzött állattal baromfi vagy vadmadarak kivételével (pl. macska, disznó)
- Olyan területen való tartózkodás vagy olyan terület meglátogatása, ahol az A/H5N1 típusú influenza jelenlétét gyanítják vagy megerősítették ⁽³⁾, és az alábbi két feltétel közül legalább egy teljesülése:
 - Szoros érintkezés (egy méteren belül) az érintett területen beteg vagy elhullott baromfival vagy vadmadarakkal ⁽⁴⁾
 - Az érintett területen található olyan otthonban vagy gazdaságban való tartózkodás, ahonnan beteg vagy elhullott baromfikról tettek jelentést az előző hónapban

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és epidemiológiai kritériumok

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akinél az A/H5 vagy A/H5N1 influenzavírus vizsgálata pozitív eredményű; a vizsgálatot olyan laboratórium végzi, amely nem az emberi influenzával foglalkozó referencialaboratóriumok közösségi hálózatába tartozó laboratórium

C. Nemzeti szinten megerősített eset

Minden olyan személy, akinél az A/H5 vagy A/H5N1 influenzavírus vizsgálata pozitív eredményű; a vizsgálatot az emberi influenzával foglalkozó referencialaboratóriumok közösségi hálózatába tartozó nemzeti referencialaboratórium végzi

D. WHO által megerősített eset

Minden olyan személy, akinek vizsgálati eredményét az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a H5-tel foglalkozó együttműködési központja erősíti meg

BOTULIZMUS

(*Clostridium botulinum*)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi klinikai formák legalább egyike:

Élelmiszer eredetű és seb okozta botulizmus

Az alábbi két tünet legalább egyike:

- Bilaterális koponyaideg-zavar (pl. kettős látás, homályos látás, nyelési zavar, bulbáris gyengeség)
- Perifériás szimmetrikus paralízis

Gyermekekori botulizmus

Minden olyan gyermek, akinél jelentkezik az alábbi hat tünet legalább egyike.

- Székrekedés
- Lehangoltság
- Szegényes táplálkozás

⁽³⁾ Lásd az Állatjárványügyi Világszervezet és az Európai Bizottság (SANCO) állatbetegségek bejelentő rendszerét, amely a következő internetcímen érhető el: http://www.oie.int/eng/en_index.htm és http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm#.

⁽⁴⁾ Nem ideértendő azok a látszólag egészséges madarak, amelyeket például vadászat céljából ejtettek el.

- Szemhéjcsüngés
- Nyelési zavar
- Általános izomgyengeség

A csecsemőknél (12 hónapnál fiatalabb gyermek) általában előforduló botulizmus-típus megtámadhatja a 12 hónaposnál idősebb gyermekeket és ritkán felnőtteket is megváltozott felépítésű gyomor-bélcsatorna és mikroflóra esetében.

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- A *C. botulinum* izolálása csecsemőkori botulizmus (széklet) vagy seb okozta botulizmus (sérülés) esetében (a *C. botulinum* izolálása felnőtt székletéből nem releváns az élelmiszer eredetű botulizmis diagnózishoz)
- A *botulinum* toxin kimutatása klinikai mintában

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Érintkezés közös forrással (pl. élelmiszer, tű vagy más eszköz megosztása)
- Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

BRUCELLÓZIS

(*Brucella* spp.)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél láz jelentkezik

ÉS az alábbi hét tünet közül legalább egy:

- Izzadás (heves, kellemetlen szagú, különösen éjszaka jelentkező)
- Hidegrázás
- Ízületi fájdalom
- Gyengeség
- Depresszió
- Fejfájás
- Anorexia

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- A *Brucella* spp. izolálása klinikai mintából
- *Brucellózissal* szembeni specifikus antitest-reakció (standard agglutinációs teszt, komplementkötési próba, ELISA)

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi négy epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés
- Fertőzött állatból származó termékkel (tej vagy tejtermékek) való érintkezés
- Állatról emberre terjedő fertőzés (fertőzött széklet vagy szervek, pl. hüvelyváladék, placenta)
- Közös forrással való érintkezés

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

CAMPYLOBACTER FERTŐZÉS

(*Campylobacter* spp.)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi három tünet legalább egyike:

- Hasmenés
- Hasi fájdalom
- Láz

Laboratóriumi kritériumok

- A *Campylobacter* spp. izolálása székletből vagy vérből

Lehetőség szerint el kell végezni a *Campylobacter* spp. elkülönítését

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi öt epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Állatról emberre való terjedés
- Emberről emberre való terjedés
- Közös forrással való érintkezés
- Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés
- Környezeti expozíció

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

CHLAMYDIA FERTŐZÉSEK

(Chlamydia trachomatis)

BELEÉRTVE A LYMPHOGRANULOMA VENEREUM-OT (LGV)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi klinikai formák legalább egyike:

Nem LGV Chlamydia fertőzés

Az alábbi hat tünet legalább egyike:

- Húgycsőgyulladás
- Mellékhere-gyulladás
- Akut petevezeték-gyulladás
- Akut méhbelhártya-gyulladás
- Méhnyakgyulladás
- Végbélgyulladás

Újszülötteknél az alábbi két tünet legalább egyike:

- Kötőhártya-gyulladás
- Tüdőgyulladás

LGV

Az alábbi öt tünet legalább egyike:

- Húgycsőgyulladás
- Genitális fekély
- Lágycső nyirokcsomóduzzanata
- Méhnyakgyulladás
- Végbélgyulladás

Laboratóriumi kritériumok

Nem LGV Chlamydia fertőzés

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- A *Chlamydia trachomatis* izolálása anogenitális területről vagy kötőhártyából vett mintából
- A *Chlamydia trachomatis* kimutatása DFA-vizsgálattal (direkt fluoreszcens antitestvizsgálat) klinikai mintában
- A *Chlamydia trachomatis* nukleinsav kimutatása klinikai mintában

LGV

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- A *Chlamydia trachomatis* izolálása anogenitális területről vagy kötőhártyából vett mintából
- A *Chlamydia trachomatis* nukleinsav kimutatása klinikai mintában

ÉS

- az L1, L2 vagy L3 szerotípus (genotípus) azonosítása

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel (szexuális érintkezés vagy vertikális fertőzés)

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

KOLERA

(*Vibrio cholerae*)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

- Hasmenés
- Hányás

Laboratóriumi kritériumok

- A *Vibrio cholerae* izolálása klinikai mintából
- ÉS
- az O1 vagy O139 antigén kimutatása az izolátumban
- ÉS
- A cholera-enterotoxin vagy a cholera-enterotoxin gén kimutatása az izolátumban

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi négy epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Közös forrással való érintkezés
- Emberről emberre való terjedés
- Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés
- Környezeti expozíció

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

A CREUTZFELDT-JAKOB BETEGSÉG VARIÁNSA (vCJD)**Előfeltételek**

- Minden olyan személy, aki legalább hat hónapja progresszív neuropszichiátriai rendellenességben szenved
- A rutinvizsgálatok nem utalnak más diagnózisra

- Nincs kórtörténeti előzmény hipofízishormonokkal vagy emberi agyvelőszövetrel való érintkezésről
- Nincs bizonyíték a fertőző szivacsos agyvelőbántalom genetikai formájára

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi öt tünet közül legalább négy:

- Korai pszichiátriai tünetek ⁽⁵⁾
- Tartós fájdalmas szenzoros tünetek ⁽⁶⁾
- A végtagok mozgási zavara (ataxia)
- Myoclonus, vitustánc (chorea) vagy az izomtónus rendellenessége
- Elbutulás (dementia)

Diagnosztikai kritériumok

Az esetmegerősítés diagnosztikai kritériumai:

- Neuropatológiai megerősítés: szivacszerű elváltozás és extenzív prionfehérje-felhalmozódás feltűnő lerakódásokkal a cerebrumban és a cerebellumban

A valószínűsíthető vagy gyanús esetek diagnosztikai kritériumai:

- Az EEG a betegség korai stádiumában nem mutatja ki a sporadikus CJD ⁽⁷⁾ tipikus megjelenését ⁽⁸⁾
- Az agy MRI vizsgálata a köztiagy/thalamus magjában (pulvinar) mindkét oldalon erős jelet mutat
- Pozitív eredményű tonsilla biopszia ⁽⁹⁾

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre való fertőzéssel (pl. vérátömlesztés)

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek az előfeltételek

ÉS

- teljesülnek a klinikai kritériumok

ÉS

- negatív EEG sporadikus CJD-re ⁽⁸⁾

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek az előfeltételek

ÉS

- teljesülnek a klinikai kritériumok

ÉS

- negatív EEG sporadikus CJD-re ⁽⁸⁾

ÉS

⁽⁵⁾ Depresszió, szorongás, apátia, visszahúzódás, téveszmék.

⁽⁶⁾ Ebbe beletartozik a valódi fájdalom és/vagy érzékszavar.

⁽⁷⁾ A Creutzfeldt-Jakob betegség sporadikus változatának tipikus megjelenése az EEG-n generalizált, periodikusan megjelenő komplexeket mutat, másodpercenként körülbelül egyet. Ezek a Creutzfeldt-Jakob betegség variánsának későbbi stádiumaiban időnként láthatók.

⁽⁸⁾ A Creutzfeldt-Jakob betegség sporadikus változatának tipikus megjelenése az EEG-n generalizált, periodikusan megjelenő komplexeket mutat, másodpercenként körülbelül egyet. Ezek a Creutzfeldt-Jakob betegség variánsának későbbi stádiumaiban időnként láthatók.

⁽⁹⁾ A tonsilla biopszia nem javasolt rutineljárásként vagy olyan esetekben, amikor az EEG a sporadikus Creutzfeldt-Jakob betegségre tipikus jelet mutat, ugyanakkor hasznos lehet olyan gyanús esetekben, amikor a klinikai jellemzők a Creutzfeldt-Jakob betegség variánsára mutatnak, és az MRI nem mutat magas pulvináris jelet.

- az agy pozitív eredményű MRI vizsgálata

VAGY

Minden olyan személy, akire teljesülnek az előfeltételek

ÉS

- pozitív eredményű tonsilla biopszia

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek az előfeltételek

ÉS

- az esetmegerősítéshez szükséges diagnosztikai kritériumok teljesülnek

CRYPTOSPORIDIOSIS

(*Cryptosporidium* spp.)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

- Hasmenés
- Hasi fájdalom

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- *Cryptosporidium* peték kimutatása a székletben
- A *Cryptosporidium* kimutatása a bélnedvben vagy a vékonybélből vett szövettani mintában
- *Cryptosporidium* nukleinsav kimutatása a székletben
- *Cryptosporidium* antigén kimutatása a székletben

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi öt epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Emberről emberre való terjedés
- Közös forrással való érintkezés
- Állatról emberre való terjedés
- Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés
- Környezeti expozíció

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

TOROKGYÍK (DIFTÉRIA)

*(Corynebacterium diphtheriae és Corynebacterium ulcerans)***Klinikai kritériumok**

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi klinikai formák legalább egyike:

Légzőszervi diftéria:

Lázzal járó felső légúti megbetegedés ÉS az alábbi két tünet legalább egyike:

- Álhártyás torokgyulladás (krupp)
- VAGY
- Álhártyásodás az alábbi három terület legalább egyikén:
 - Mandula
 - Garat
 - Orr

Nazális diftéria:

- Egyik vagy mindkét orrlyukból származó orrváladék kezdetben tiszta, majd véres

Bőrdiftéria:

- Bőrelváltozások

Diftéria más területeken:

- Kötőhártya vagy nyálkahártya elváltozása

Laboratóriumi kritériumok

- Toxintermelő *C. diphtheriae* vagy *C. ulcerans* izolálása klinikai mintából

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

Minden olyan személy, akire teljesülnek a légzőszervi diftéria klinikai kritériumai

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a diftéria klinikai kritériumai és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

ECHINOCOCCOSIS

*(Echinococcus spp.)***Klinikai kritériumok**

Megfigyelési célokra nem relevánsak

Diagnosztikai kritériumok

Az alábbi öt feltétel legalább egyike:

- Az *Echinococcus multilocularis* vagy *granulosus*szal összevethető hisztopatológia vagy parazitológia (pl. a protoscolex közvetlen képi megjelenítése cisztafolyadékban)

- *Echinococcus granulosus* ciszták patognomikus makroszkopikus morfológiájának kimutatása sebészeti mintákban
- Képalkotó eljárásokkal (pl. CT, szonográfia, MRI) kimutatott ÉS szerológiai vizsgálattal igazolt tipikus szervi elváltozások
- *Echinococcus* spp.-val szembeni specifikus szérum antitestek nagy szenzitivitású szerológiai vizsgálattal kimutatva, ÉS nagy specificitású szerológiai vizsgálattal megerősítve
- Az *Echinococcus multilocularis* vagy *granulosus* nukleinsav kimutatása klinikai mintában

Epidemiológiai kritériumok

n.a.

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

n.a.

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a diganosztikai kritériumok

ESCHERICHIA COLI FERTŐZÉST ELŐIDÉZŐ SHIGA/VERO TOXIN (STEC/VTEC)

Klinikai kritériumok

STEC/VTEC hasmenés

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

- Hasmenés
- hasi fájdalom

HUS (aemolitikus uraemiás szindróma)

Bármely személy, akinél akut veseelégtelenség áll fenn és jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

- Microangiopathiás haemolitikus anaemia
- Thrombocytopenia

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- Shigatoxint/verotoxint (STEC/VTEC) termelő *E. coli* izolálása
- *Stx1* vagy *stx2* gén(ek) nukleinsavának kimutatása
- Szabad shigatoxinok kimutatása.

Kizárólag a HUS esetében a következő használható fel az STEC/VTEC megerősítésére szolgáló laboratóriumi kritériumként:

- *E. coli* szerocsoportok specifikus antitest-reakciója

Lehetőség szerint el kell végezni az izolálást és a további, szerotípus, fágtípus, *eae* gének és az *stx1/stx2* altípusai szerinti meghatározást

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi öt epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Emberről emberre való terjedés
- Közös forrással való érintkezés
- Állatról emberre való terjedés

- Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés
- Környezeti expozíció

Esetek osztályozása

A. STEC-vel összefüggő HUS gyanús esete

Minden olyan személy, akire teljesülnek a HUS klinikai kritériumai

B. STEC/VTEC valószínűsíthető esete

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok, fennáll az epidemiológiai kapcsolat, vagy laboratóriumiilag megerősített eset klinikai kritériumok nélkül

C. STEC/VTEC megerősített esete

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

GIARDIASIS

(*Giardia lamblia*)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi négy tünet legalább egyike:

- Hasmenés
- Hasi fájdalom
- Felfúvódás
- Felszívódási zavar jelei (pl. zsírszéket, súlyvesztés)

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- *Giardia lamblia* ciszták vagy trophozoiták kimutatása a székletben, a nyombélnedvben vagy a vékonybélből vett biopszia szövetmintájában.
- *Giardia lamblia* antigén kimutatása a székletben.

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi négy epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés
- Emberről emberre való terjedés
- Közös forrással való érintkezés
- Környezeti expozíció

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

GONORRHOEA

*(Neisseria gonorrhoeae)***Klinikai kritériumok**

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi nyolc tünet legalább egyike:

- Húgycsőgyulladás
- Akut petevezeték-gyulladás
- Krónikus nőgyógyászati gyulladások
- Méhnyakgyulladás
- Mellékhere-gyulladás
- Végbélgyulladás
- Torokgyulladás
- Ízületi gyulladás

VAGY

Minden olyan újszülött, akinek kötőhártya-gyulladása van

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- A *Neisseria gonorrhoeae* baktérium izolálása klinikai mintából
- A *Neisseria gonorrhoeae* nukleinsav kimutatása klinikai mintában
- *Neisseria gonorrhoeae* kimutatása klinikai mintán végzett nem amplifikációs nukleinsav-vizsgálattal
- Sejtben belüli gram-negatív diplococcusok mikroszkópos kimutatása férfitől származó, húgycsőből vett mintán

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel (szexuális érintkezés vagy vertikális fertőzés)

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

INVAZÍV HAEMOPHILUS MENINGITIS BETEGSÉG

*(Haemophilus influenzae)***Klinikai kritériumok**

Megfigyelési célokra nem relevánsak

Laboratóriumi kritériumok

Az esetdefiníció laboratóriumi kritériumai

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- *Haemophilus influenzae* izolálása normálisan steril közegből
- A *Haemophilus influenzae* nukleinsav kimutatása normálisan steril közegből

Lehetőség szerint el kell végezni az izolátumok tipizálását

Epidemiológiai kapcsolat

n.a.

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

n.a.

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

HEPATITIS A

(hepatitis A-vírus)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél enyhe általános tünetek jelentkeznek (pl. fáradtság, hasi fájdalom, étvágytalanság, időszakos émelygés és hányás)

ÉS

Az alábbi három tünet legalább egyike:

- Láz
- Sárgaság
- A szérumban magas az aminotranszferáz enzim szintje

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- Hepatitis A nukleinsav kimutatása vérsavóban és székletben
- Hepatitis A-vírussal szembeni specifikus antitest-reakció
- Hepatitis A-vírus antigén kimutatása székletben

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- Emberről emberre való terjedés
- Közös forrással való érintkezés
- Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés
- Környezeti expozíció

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

HEPATITIS B, AKUT

*(hepatitis B-vírus)***Klinikai kritériumok**

Minden olyan személy, akinél jelentkeznek az általános tünetek (pl. fáradtság, hasi fájdalom, étvágytalanság, időszakos émelygés és hányás)

ÉS

Az alábbi három tünet legalább egyike:

- Láz
- Sárgaság
- Emelkedett szérum aminotranszferáz-szint

Laboratóriumi kritériumok

A Hepatitis B-vírus core IgM osztályba tartozó antigénnel szembeni specifikus antitest-reakció

A laboratóriumi eredményeket a vakcinázási státus szerint kell értelmezni

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel (pl. szexuális érintkezés, vertikális fertőzés vagy vérátömlesztés)

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

HEPATITIS C

*(hepatitis C-vírus)***Klinikai kritériumok**

Megfigyelési célokra nem relevánsak

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- Hepatitis C-vírus nukleinsavának kimutatása a vérsavóban
- Egy különböző antitestvizsgálattal megerősített, a hepatitis C-vírussal szembeni specifikus antitest-reakció

Epidemiológiai kritériumok

n.a.

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

n.a.

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

INFLUENZA

(influenzavírus)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi klinikai formák legalább egyike:

Influenzaszerű megbetegedés (ILI)

- A tünetek hirtelen megjelenése
- ÉS
- Az alábbi négy szisztematikus tünet legalább egyike:
 - Láz vagy lázas állapot
 - Rossz közérzet
 - Fejfájás
 - Izomfájdalom
- ÉS
- Az alábbi három légzőszervi tünet legalább egyike:
 - Köhögés
 - Torokfájás
 - Légszomj

Akut légzőszervi fertőzés (ARI)

- A tünetek hirtelen megjelenése
- ÉS
- Az alábbi négy légzőszervi tünet legalább egyike:
 - Köhögés
 - Torokfájás
 - Légszomj
 - Nátha
- ÉS
- Orvosi szakvélemény, mely szerint a betegséget fertőzés okozta

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- Az influenzavírus izolálása klinikai mintából
- Az influenzavírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában
- Az influenzavírus antigén kimutatása DFA-vizsgálattal (direkt fluoreszcens antitestvizsgálat) klinikai mintán
- Influenzával szembeni specifikus antitest-reakció

Lehetőség szerint el kell végezni az influenzaizolátumok altipizálását

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok (ILI vagy ARI)

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok (ILI vagy ARI) és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai (ILI vagy ARI) és laboratóriumi kritériumok

LEGIONÁRIUS BETEGSÉG

(*Legionella* spp.)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél tüdőgyulladás jelentkezik

Laboratóriumi kritériumok

— Az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

Az alábbi három tünet legalább egyike:

- A *Legionella* spp. izolálása légúti váladékból vagy normálisan steril közegből
- A *Legionella pneumophila* antigén kimutatása vizeletben
- A *Legionella pneumophila* 1-es szerocsoporttal szembeni specifikus antitest-reakció

— A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériuma

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- A *Legionella pneumophila* antigén kimutatása légzőszervi váladékból vagy tüdőszövetből pl. direkt fluoreszcens antitestvizsgálattal (DFA), monoklonális reagensek használatával
- A *Legionella* spp. nukleinsav kimutatása klinikai mintában
- A nem 1-es szerocsoportba tartozó *Legionella pneumophila*-val vagy más *Legionella* spp.-vel szembeni specifikus antitest-reakció
- Az 1-es szerocsoportba tartozó *L. pneumophila*, más szerocsoportok vagy más *Legionella* fajok: egyetlen magas titer érték specifikus szérumban

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Környezeti expozíció
- Ugyanazon közös forrással való érintkezés

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a klinikai kritériumok ÉS legalább egy laboratóriumi vizsgálat valószínűsíthető esetre utalva pozitív eredményű VAGY fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek az esetmegerősítés klinikai és laboratóriumi kritériumai

LEPTOSPIROSIS

*(Leptospira interrogans)***Klinikai kritériumok**

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi tünet:

— Láz

VAGY

Az alábbi tizenegy tünet legalább egyike:

- Hidegrázás
- Fejfájás
- Izomfájdalom
- Kötőhártya-bevérzés
- Bőrvérzés és nyálkahártya-vérzés
- Kiütések
- Sárgaság
- Szívizomgyulladás
- Agyhártyagyulladás
- Veseelégtelenség
- Légzőszervi tünetek, pl. vérköpés

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- A *Leptospira interrogans* izolálása klinikai mintából
- A *Leptospira interrogans* nukleinsav kimutatása klinikai mintában
- A *Leptospira interrogans* kimutatása klinikai mintában immunfluoreszcens módszerrel
- *Leptospira interrogans*-szal szembeni specifikus antitest-reakció

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi három epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Állatról emberre való terjedés
- Környezeti expozíció
- Közös forrással való érintkezés

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

LISTERIOSIS

*(Listeria monocytogenes)***Klinikai kritériumok**

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi három kritérium legalább egyike:

- Újszülött listeriózisa a következő formában:
 - Halvaszületés
 - VAGY
 - Az első hónap során az alábbi öt tünet közül legalább egy megléte:
 - Granulomatosis infantiseptica
 - Agyhártyagyulladás vagy meningoencephalitis
 - Vérmérgezés
 - Nehézlégzés
 - Elváltozások a bőrön, a nyálkahártyán vagy a kötőhártyán
- Terhesség alatti listeriosis az alábbi három tünet legalább egyikének megléte alapján:
 - Vetélés, halva születés, koraszülés
 - Láz
 - Influenzaszerű tünetek
- A listeriosis egyéb formái az alábbi négy tünet legalább egyikének megléte alapján:
 - Láz
 - Agyhártyagyulladás vagy meningoencephalitis
 - Vérmérgezés
 - Lokalizált fertőzések, például ízületi gyulladás, szívbelhártya-gyulladás, tályogok

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- *Listeria monocytogenes* izolálása normálisan steril közegből
- *Listeria monocytogenes* izolálása normálisan nem steril közegből magzatnál, halvaszületett csecsemőnél, újszülöttnél vagy a szülést követő 24 órán belül az anyánál

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi három epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Közös forrással való érintkezés
- Emberről emberre való terjedés (vertikális terjedés)
- Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

További információk

Lappangási időszak: 3-70 nap, rendszerint 21 nap

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

VAGY

Minden olyan anya, akinek magzatánál, halva született csecsemőjénél vagy újszülöttjénél a listeriosis-fertőzést laboratóriumiilag megerősítették.

MALÁRIA

(*Plasmodium spp.*)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél láz lép fel VAGY kórtörténetében szerepel láz

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- Malária paraziták kimutatása vérkenetben fénymikroszkóppal
- *Plasmodium* nukleinsav kimutatása a székletben
- *Plasmodium* antigén kimutatása

Lehetőség szerint el kell végezni a *Plasmodium spp.* elkülönítését

Epidemiológiai kritériumok

n.a.

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

n.a.

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

KANYARÓ

(*Kanyaróvírus*)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél láz jelentkezik

ÉS

- Makulopapuláris bőrkiütések

ÉS az alábbi három tünet legalább egyike:

- Köhögés
- Nátha
- Kötőhártya-gyulladás

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- A kanyaróvírus izolálása klinikai mintából
- A kanyaróvírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában

- Kanyaróvírussal szembeni specifikus antitest-reakció, amely a vérsavóban vagy nyálban az akut fertőzést jellemzi
- A kanyaróvírus antigén kimutatása DFA-val klinikai mintában, kanyaróspecifikus monoklonális antitesteket felhasználva

A laboratóriumi eredményeket a vakcinázási státus szerint kell értelmezni. Amennyiben az oltás a közelmúltban történt, a vad vírusra vonatkozóan kell vizsgálatot végezni

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

INVAZÍV MENINGOCOCCUS

(*Neisseria meningitidis*)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi öt tünet legalább egyike:

- Láz
- Meningeális tünetek
- Bőrvérzéses kiütés
- Szeptikus sokk
- Szeptikus arthritis

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- A *Neisseria meningitidis* izolálása normálisan steril közegből, beleértve a mikrosérüléseket (purpura) is
- A *Neisseria meningitidis* nukleinsav kimutatása normálisan steril közegből, beleértve a mikrosérüléseket (purpura) is
- A *Neisseria meningitidis* antigén kimutatása gerincvelő-folyadékban
- Gram negatív festett diplococcus kimutatása gerincvelő-folyadékban

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

MUMPSZ

(Mumpszvírus)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi tünet:

— Láz

ÉS

Az alábbi három tünet közül legalább kettő:

— Fültőmirigy vagy más nyálmirigy hirtelen megjelenő duzzanata

— Heregyulladás

— Agyhártyagyulladás

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

— A mumpszvírus izolálása klinikai mintából

— Mumpszvírus nukleinsav kimutatása

— Mumpszvírussal szembeni specifikus antitest-reakció, amely jellemző a vérsavóban vagy nyálban az akut fertőzésre

A laboratóriumi eredményeket a vakcinázási státus szerint kell értelmezni

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan, a közelmúltban be nem oltott személy, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

A közelmúltban történt oltás esetén: Minden olyan személy, akinél a mumpsz vad vírustörzsét mutatták ki

SZAMÁRKÖHÖGÉS (PERTUSSIS)

(Bordetella pertussis)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél már legalább két hete fennáll a köhögés

ÉS

az alábbi három tünet legalább egyike:

— Köhögési rohamok

— Húzó belégzés (inspirációs stridor)

— Köhögést követő hányás

VAGY

Minden olyan személy, akinél az orvos számarköhögést diagnosztizált

VAGY

Apnoés epizódok csecsemőknél

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- A *Bordetella pertussis* izolálása klinikai mintából
- A *Bordetella pertussis* nukleinsav kimutatása klinikai mintában
- *Bordetella pertussis*-szal szembeni specifikus antitest-reakció

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

PESTIS

(*Yersinia pestis*)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi klinikai formák legalább egyike:

Bubópestis:

- Láz
- ÉS
- Fájdalmas nyirokcsomó-gyulladás hirtelen megjelenése

Szeptikus pestis:

- Láz

Tüdőpestis:

- Láz
- ÉS

Az alábbi három tünet legalább egyike:

- Köhögés
- Mellkasi fájdalom
- Vértörpés

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- A *Yersinia pestis* izolálása klinikai mintából
- A *Yersinia pestis* nukleinsav kimutatása klinikai mintában (F1 antigén)
- *Yersinia pestis* F1-antigénnel szembeni specifikus antitest-reakció

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi négy epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Emberről emberre való terjedés
- Állatról emberre való terjedés
- Laboratóriumi expozíció (ahol lehetséges a pestissel történő expozíció)
- Közös forrással való érintkezés

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

INVAZÍV PNEUMOCOCCUS BETEGSÉGEK

(*Streptococcus pneumoniae*)

Klinikai kritériumok

Megfigyelési célokra nem relevánsak

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- A *Streptococcus pneumoniae* izolálása normálisan steril közegből
- A *Streptococcus pneumoniae* nukleinsav kimutatása normálisan steril közegben
- A *Streptococcus pneumoniae* antigénjének kimutatása normálisan steril közegben

Epidemiológiai kritériumok

n.a.

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

n.a.

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

GYERMEKBÉNULÁS

(*Poliovírus*)

Klinikai kritériumok

Minden, 15 évnél fiatalabb személy, akinél heveny, petyhüdt bénulás jelentkezik

VAGY

Minden olyan személy, akinél orvosi diagnózis alapján a gyermekbénulás gyanúja merül fel

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- Poliovírus izolálása és intratipikus megkülönböztetés – vad poliovírus
- Vakcinából származó poliovírus (a vakcinából származó poliovírus esetében legalább 85 %-os egyezés a VP1 szakasz nukleotida-szakaszának vakcinavírusával)
- Sabin-féle poliovírus: WHO által engedélyezett, gyermekbénulással foglalkozó laboratórium által végzett intratípusos megkülönböztetés (a vakcinából származó poliovírus esetében 1–15 % különbségű szekvenciakülönbség ugyanazon szerotípus vakcinavírusával összehasonlítva)

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Emberről emberre való terjedés
- Tartózkodás olyan területen, ahol a gyermekbénulás jelen van vagy ahol a poliovírus gyanítottan vagy bizonyítottan jelen van

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

Q-LÁZ

(*Coxiella burnetii*)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi három tünet legalább egyike:

- Láz
- Tüdőgyulladás
- Hepatitis

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- *Coxiella burnetii* izolálása a klinikai mintából
- A *Coxiella burnetii* nukleinsav kimutatása klinikai mintában
- A *Coxiella burnetii*-vel szembeni specifikus antitest-reakció (IgG vagy IgM 2. szakasza)

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Közös forrással való érintkezés
- Állatról emberre való terjedés

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

VESZETTSÉG

(Veszetésgvírus)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél akut agyvelőgyulladás (encephalomyelitis) lép fel

ÉS

Az alábbi hét tünet közül legalább kettő:

- Állat okozta harapás helyén szenzoros változások
- Parézis vagy paralízis
- Garatizmok görcsei
- Hydrophobia
- Delírium
- Görcsroham
- Szorongás

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- A Lyssa-vírus izolálása klinikai mintából
- A Lyssa-vírus nukleinsavának kimutatása klinikai mintában (pl. nyál vagy agyszövet)
- Vírus antigének kimutatása DFA-val klinikai mintában
- Lyssa-vírussal szembeni specifikus antitest-reakció vírusneutralizációs próbával vérsavóban vagy gerincvelői folyadékban

A laboratóriumi eredményeket a vakcinázási vagy immunizációs státus szerint kell értelmezni

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi három epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Állatról emberre való terjedés (olyan állat, amelynél a betegség gyaníthatóan vagy bizonyítottan fennáll)
- Közös forrással való érintkezés (ugyanaz az állat)
- Emberről emberre való terjedés (pl. szervátültetés)

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

RÓZSAHIMLŐ (RUBEOLA)

*(Rubeolavírus)***Klinikai kritériumok**

Minden olyan személy, akin makulopapuláris bőrkiütések jelennek meg

ÉS

Az alábbi öt tünet legalább egyike:

- Tarkótáji nyirokcsomó-duzzanat
- Nyakszirt alatti nyirokcsomó-duzzanat
- Poszt-aurikuláris nyirokcsomó-duzzanat
- Ízületi fájdalom
- Ízületi gyulladás

Laboratóriumi kritériumok

- Az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- A rubeolavírus izolálása klinikai mintából
- A rubeolavírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában
- A rubeolavírussal szembeni specifikus antitest-reakció vérsavóban vagy nyálban
- A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumai
- Rubeolavírussal szembeni specifikus antitest-reakció ⁽¹⁰⁾

A laboratóriumi eredményeket a vakcinázási státus szerint kell értelmezni

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a klinikai kritériumok és az alábbi két kritérium legalább egyike:

- Epidemiológiai kapcsolat
- A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumai

C. Megerősített eset

Minden olyan, a közelmúltban be nem oltott személy, akire teljesülnek az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

Ha a személyt a közelmúltban beoltották, olyan személy, akinél kimutatták a rubeola vad vírustörzsét

⁽¹⁰⁾ Ha terhesség során rubeola gyanúja áll fenn, szükséges az IgM-re pozitív eredményt adó rubeola- vizsgálatot végezni (pl. rubeola-specifikus IgG-aviditás vizsgálata, amely alacsony aviditást mutat). Bizonyos esetekben, mint például megerősített rubeolajárvány esetében a rubeolavírus IgM-kimutatása bizonyító erejűnek tekinthető akkor is, ahol nem áll fenn terhesség.

VELESZÜLETETT RUBEOLA

*(a veleszületett rubeola-szindrómával együtt)***Klinikai kritériumok***Veleszületett (kongenitális) rubeolafertőzés*Klinikai kritérium nem határozható meg *veleszületett (kongenitális) rubeolafertőzésnél**Veleszületett (kongenitális) rubeola szindróma*

Minden egy évnél fiatalabb csecsemő vagy minden halvaszületett csecsemő, akire teljesülnek az alábbiak:

— az (A) kategória feltételei közül legalább kettő

VAGY

— Egy feltétel az (A) és egy a (B) kategóriában

(A)

— Szürkehályog

— Kongenitális zöldhályog

— Kongenitális szívbetegség

— Halláskárosodás

— Pigmentretinopátia

(B)

— Purpura

— Lépmegnagyobbodás

— Kisfejség (mikrocefália)

— Fejlődési visszamaradottság

— Meningo-encephalitis

— A csont radiolucens elváltozása

— Sárgaság, amely a születést követő 24 órán belül jelentkezik

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

— A rubeolavírus izolálása klinikai mintából

— A rubeolavírus nukleinsavának kimutatása

— Rubeolavírussal szembeni specifikus antitest-reakció (IgM)

— a rubeola IgG antitest perzisztálása 6-12 hónapos kor között (legalább két minta ugyanakkora rubeolára specifikus IgG-koncentrációval)

A laboratóriumi eredményeket a vakcinázási státus szerint kell értelmezni

Epidemiológiai kritériumok

Minden olyan újszülött vagy halvaszületett csecsemő, akinek anyjánál laboratóriumiilag megerősítve emberről emberre való vertikális fertőzéssel átadott rubeolafertőzést diagnosztizáltak

A veleszületett rubeola osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan halvaszületett vagy újszülött csecsemő, akit nem vizsgáltak VAGY akinél a vizsgálat negatív eredménnyel zárult és az alábbi két feltétel legalább egyike teljesül:

— epidemiológiai kapcsolat ÉS a kongenitális rubeolával kapcsolatos klinikai kritériumok közül legalább egy az A kategóriából

- a kongenitális rubeola kritériumai teljesülnek

C. Megerősített eset

Minden olyan halvaszületett csecsemő, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

VAGY

Minden olyan csecsemő, akinél teljesülnek a laboratóriumi kritériumok ÉS teljesül az alábbi két feltétel legalább egyike:

- epidemiológiai kapcsolat
- a kongenitális rubeola klinikai kritériumai közül legalább egy az A kategóriából

Azt az újszülöttet, akinél pozitív laboratóriumi kritériumokat állapítanak meg, de az anya terhesség alatti kórtörténetében nem szerepel rubeola és nem teljesülnek az A kategória klinikai kritériumai, rubeolás megbetegedésként jelentik be.

SALMONELLOSIS

(*Salmonella* spp. az *S. Typhi* és *S. Paratyphi* kivételével)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi négy tünet legalább egyike.

- Hasmenés
- Láz
- Hasi fájdalom
- Hányás

Laboratóriumi kritériumok

- A *Salmonella* (az *S. typhi* és *S. paratyphi* kivételével) izolálása székletből vagy vízből

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi öt epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Emberről emberre való terjedés
- Közös forrással való érintkezés
- Állatról emberre való terjedés
- Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés
- Környezeti expozíció

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

SÚLYOS AKUT RESPIRATORIKUS SZINDRÓMA (SARS)

(SARS koronavírus, SARS-CoV)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél láz lép fel vagy kórtörténetében szerepel láz

ÉS

Az alábbi három tünet legalább egyike:

- Köhögés
- Légzési nehézség
- Légszomj

ÉS

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- Tüdőgyulladás röntgennel kimutatva
- Akut légzési nehézség szindróma röntgennel kimutatva
- Tüdőgyulladás megállapítása boncolás során
- Akut légzési nehézség szindróma megállapítása boncolás során

ÉS

Nincs olyan alternatív diagnózis, amellyel teljes mértékben magyarázható a betegség

Laboratóriumi kritériumok

- Az esetmegeerősítés laboratóriumi kritériumai

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- A vírus izolálása sejtenyésztésben bármely klinikai mintából és a SARS koronavírus azonosítása pl. RT-PCR módszerrel
- SARS koronavírus nukleinsav kimutatása az alábbi háromból legalább egyben:
 - Legalább két különböző klinikai minta (pl. nazeopharingeális tamponminta és széklet)
 - Ugyanazon klinikai minta, amelyet legalább két alkalommal gyűjtöttek be a betegség folyamán (pl. egymás utáni nazeopharingeális mintavétel)
 - Két különböző próba vagy megismételt RT-PCR próba, minden vizsgálat alkalmával az eredeti klinikai mintából származó új RNS-mintát használva
- SARS koronavírusszal szembeni specifikus antitest-reakció az alábbi két módszer valamelyikével:
 - ELISA- vagy IFA-módszerrel szerokonverzió akut vagy lábadozó szakasz folyamán a vérsavóban párhuzamosan vizsgálva
 - Négyszeres vagy magasabb emelkedés az antitest titerben az akut és a lábadozó szakaszban a vérsavóban párhuzamosan vizsgálva
- A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériuma

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- Egyetlen pozitív eredményű antitestvizsgálat a SARS koronavírus tekintetében
- Pozitív PCR-eredmény a SARS koronavírus tekintetében egyetlen klinikai mintán és próbával

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- Minden olyan személy, akire teljesül az alábbi három feltétel legalább egyike:
 - Foglalkozása során fokozottan ki van téve a SARS koronavírusszal való fertőzés kockázatának (pl. élő SARS koronavírusszal, ahhoz hasonló vírusokkal dolgozó vagy SARS koronavírusszal fertőzött klinikai minták tárolásával laboratóriumban dolgozó alkalmazottak; olyan személy, aki érintkezik olyan vadon élő vagy egyéb állatokkal, amelyeket a SARS koronavírus vírus hordozójának tekintenek, azok szervezetéből kiválasztott anyagokkal vagy azok székletével stb.)
 - Szoros kapcsolat ⁽¹⁾ egy vagy több olyan személlyel, akinél megerősítették a SARS-vírusfertőzést vagy vizsgálat alatt áll e tekintetben
 - Olyan területen utazott vagy tartózkodott, ahol SARS-kitörést jelentettek

⁽¹⁾ Szoros kapcsolat olyan személlyel áll fenn, aki SARS-beteget ápol, egy háztartásban lakott vele, vagy közvetlen kapcsolatba került légzőszervi váladékokkal, testnedvekkel és/vagy a beteg szervezete által kiválasztott anyagokkal (pl. széklet).

- Két vagy több egészségügyi dolgozó ⁽¹²⁾ a SARS klinikai tüneteivel ugyanazon egészségügyi egységen belül, ha a betegségek egymást követően 10 napon belül jelentkeznek
- Két vagy több személy (egészségügyi dolgozók és/vagy betegek és/vagy látogatók) a SARS klinikai tüneteivel, ha a betegség ugyanazon 10 napos időtartamon belül jelentkezik, és epidemiológiailag kapcsolódik az egészségügyi létesítményhez

A járványkitörések közötti esetek osztályozása

Az esetek osztályozását alkalmazni kell abban az esetben is, ha a betegség nem érintett országban vagy területen jelentkezik.

A. Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok, fennáll az epidemiológiai kapcsolat ÉS teljesülnek a valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumai

C. Nemzeti szinten megerősített eset

Minden olyan személy, akinél teljesülnek az esetmegerősítés klinikai és laboratóriumi kritériumai, és a vizsgálatot nemzeti referencialaboratóriumban végezték

D. Megerősített eset

Minden olyan személy, akinél teljesülnek az esetmegerősítés klinikai és laboratóriumi kritériumai, és a vizsgálatot az Egészségügyi Világszervezet (WHO) SARS-vírust vizsgáló referencialaboratóriumi egyikében végezték

Esetek osztályozása a betegség kitörése során

Olyan országban/területen előforduló kitörés során kell alkalmazni, ahol legalább egy személy esetében laboratóriumi megerősítették a betegséget a WHO SARS-vírust vizsgáló referencialaboratóriumi egyikében

A. Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat nemzeti szinten megerősített vagy megerősített esettel

C. Nemzeti szinten megerősített eset

Minden olyan személy, akinél teljesülnek az esetmegerősítés klinikai és laboratóriumi kritériumai, és a vizsgálatot nemzeti referencialaboratóriumban végezték

D. Megerősített eset

Az alábbi három eset egyike:

- Minden olyan személy, akinél teljesülnek az esetmegerősítés klinikai és laboratóriumi kritériumai, és a vizsgálatot az Egészségügyi Világszervezet SARS vírust vizsgáló referencialaboratóriuma egyikében végezték
- Minden nemzetileg megerősített eset, amely epidemiológiailag kapcsolódik a fertőzési láncához, ahol legalább egy esetet függetlenül megerősített a WHO SARS-vírust vizsgáló referencialaboratóriuma
- Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és a valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumai, epidemiológiailag kapcsolódva a fertőzési láncához, ahol legalább egy esetet függetlenül megerősített a WHO SARS-vírust vizsgáló referencialaboratóriuma

⁽¹²⁾ Ebben az összefüggésben az egészségügyi dolgozó minden kórházi dolgozót jelent. Az egészségügyi egység, amelyben a betegség előfordul, a helyi helyzet függvényében határozható meg. Az egység nagysága (kis méret esetén) teljes egészségügyi létesítménytől nagy kiemelt kórházak egyetlen osztályáig vagy kórterméig terjedhet.

VÉRHAS (SHIGELLOSIS)

*(Shigella spp.)***Klinikai kritériumok**

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi négy tünet legalább egyike:

- Hasmenés
- Láz
- Hányás
- Hasi fájdalom

Laboratóriumi kritériumok

- A *Shigella species* izolálása klinikai mintából

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi öt epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Emberről emberre való terjedés
- Közös forrással való érintkezés
- Állatról emberre való terjedés
- Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés
- Környezeti expozíció

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

HIMLŐ

*(Himlővírus)***Klinikai kritériumok**

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

- Láz

ÉS

Hólyagos vagy gennyes pattanásos kiütések, ugyanazon kifejlődési szakaszban, centrifugális terjedéssel

- Atipikus megjelenési formák az alábbi négy tünet legalább egyikének megléte alapján:
 - Vérző bőrelváltozások
 - Lapos, bársonyos tapintású bőrelváltozások, amelyekből nem fejlődik ki hólyag
 - Variola sine eruptione
 - Enyhébb típus

Laboratóriumi kritériumok

- Az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

Az alábbi két laboratóriumi vizsgálat legalább egyike:

- Himlővírus (variola vírus) izolálása klinikai mintából, majd szekvenciálás (csak kijelölt P4 laboratóriumok)
- A variola vírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában, majd szekvenciálás

A laboratóriumi eredményeket a vakcinázási státus szerint kell értelmezni

- A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériuma
- Az orthopox vírus részecskék azonosítása EM módszerrel

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Emberről emberre való terjedés
- Laboratóriumi expozíció (ahol lehetséges a variola vírussal történő expozíció)

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és az alábbi két feltétel legalább egyike:

- Epidemiológiai kapcsolat megerősített emberi megbetegedéssel emberről emberre terjedő fertőzés útján
- A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumainak teljesülése

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek az esetdefiníció megerősítésének laboratóriumi kritériumai

Járvány kitörése során: minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

SZIFILISZ

(*Treponema pallidum*)

Klinikai kritériumok

- Elsődleges szifilisz

Minden olyan személy, akinél egy vagy több (rendszerint fájdalommentes) fekély jelentkezik a genitális, a gáttájéki vagy a végbélnyílás környéki területeken, a szájon vagy a garat nyálkahártyáján vagy másutt extragenitálisan.

- Másodlagos szifilisz

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi három tünet legalább egyike:

- Széttért makulopapuláris bőrkiütések, gyakran a tenyéren és talpakon is
 - Generalizált nyirokcsomó-duzzanat
 - Condyloma lata
 - Enanthema (kiütés a nyálkahártyán)
 - Alopecia diffusa
- Korai látens szifilisz (kevesebb mint egy év)

Olyan tünetelőzmények, amelyek összevethetők a szifilisz korai szakaszának tüneteivel a megelőző 12 hónap során

- Kései látens szifilisz (több mint egy év)

Minden olyan személy, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok (specifikus szerológiai vizsgálatok)

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy laboratóriumi vizsgálat legalább egyike:

- *Treponema pallidum* kimutatása bőrelváltozások váladékaiban vagy szövetekben sötétlátóteres mikroszkópos vizsgálattal
- *Treponema pallidum* kimutatása bőrelváltozások váladékaiban vagy szövetekben DFA-vizsgálattal
- *Treponema pallidum* kimutatása bőrelváltozások váladékaiban vagy szövetekben PCR-vizsgálattal
- *Treponema pallidum* antitestek kimutatása szűrővizsgálatokkal (TPHA, TPPA vagy EIA) ÉS emellett Tp-IgM antitestek kimutatása (IgM-ELISA, IgM immunoblot vagy 19S-IgM-FTA-abs vizsgálattal), melyet második IgM próba erősít meg

Epidemiológiai kritériumok

- Elsődleges/másodlagos szifilisz
Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel (szexuális érintkezés)
- Korai látens szifilisz (kevesebb mint egy év)
Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel (szexuális érintkezés) az előző 12 hónap során

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

SZIFILISZ, VELESZÜLETETT ÉS ÚJSZÜLÖTTKORI

(*Treponema pallidum*)

Klinikai kritériumok

Minden olyan kétévesnél fiatalabb kisgyermek, akinél jelentkezik az alábbi tíz tünet legalább egyike:

- Hepatosplenomegalia
- Bőr-nyálkahártya-elváltozások
- Condyloma lata
- Makacs nátha
- Sárgaság
- Pseudo-paralysis (periostitis és osteochondritis miatt)
- Központi idegrendszer érintettsége
- Anaemia
- Nephrosisos tünetek
- Alultápláltság

Laboratóriumi kritériumok

- Az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- A *Treponema pallidum* kimutatása sötétlátóteres mikroszkópos vizsgálattal a köldökzsinórban, a placentában, orrváladékban vagy bőrelváltozás szöveteiben

- A *Treponema pallidum* kimutatása DFA-TP vizsgálattal a köldökszínórban, a placentában, orrváladékban vagy bőrelváltozás szöveteiben
 - *Treponema pallidum* kimutatása – specifikus IgM (FTA-abs, EIA)
- ÉS reaktív nem treponemális vizsgálat (VDRL, RPR) a gyermek vérsavójában
- A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériuma
- Az alábbi három tünet legalább egyike:
- Reaktív VDRL-CSF vizsgálati eredmények
 - Reaktív nem treponemális és treponemális szerológiai vizsgálatok az anya vérsavójában
 - A csecsemő nem treponemális antitest titerje négyszeres vagy magasabb, mint az anya vérsavójában kimutatott antitest titer

Epidemiológiai kritériumok

Minden olyan kisgyermek, akinél fennáll az epidemiológiai kapcsolat emberről emberre való terjedéssel (vertikális terjedés)

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan csecsemő vagy gyermek, akinél teljesülnek a klinikai feltételek és teljesül az alábbi két feltétel legalább egyike:

- Epidemiológiai kapcsolat
- A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumainak teljesülése

C. Megerősített eset

Minden olyan csecsemő, akire teljesülnek az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

TETANUSZ

(*Clostridium tetani*)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akire teljesül az alábbi három feltétel közül legalább kettő:

- Elsősorban a rágóizmok és nyaki izmok fájdalmas izom-összehúzódása, az arcizmok görcséhez vezetve (amely trismus vagy risus sardonius néven ismert)
- A törzsizmok fájdalmas izom-összehúzódása
- Generalizált görcsök, gyakran opisthotonus

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- A *Clostridium tetani* izolálása fertőzött területről
- Tetanusztoxin kimutatása vérsavómintában

Epidemiológiai kritériumok

n.a.

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

VELESZÜLETETT TOXOPLAZMÓZIS

(*Toxoplasma gondii*)

Klinikai kritériumok

Megfigyelési célokra nem relevánsak

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- *T. gondii* kimutatása testszövetekben vagy testnedvekben
- *T. gondii* nukleinsav kimutatása klinikai mintában
- *T. gondii*-val szembeni specifikus antitest-reakció (IgM, IgG, IgA) újszülöttnél
- Állandó IgG *T. gondii* titer értékek csecsemőknél (12 hónapnál fiatalabb)

Epidemiológiai kritériumok

n.a.

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

n.a.

C. Megerősített eset

Minden olyan csecsemő, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

TRICHINELLOSIS

(*Trichinella* spp.)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi hat tünet közül legalább három:

- Láz
- Izomfájdalom és érzékenység
- Hasmenés
- Arcödéma
- Eosinophilia
- Szubkonjunktivális, szubungális és retinális bőrvérzések

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- *Trichinella* lárvák kimutatása izom-biopsziás szövetmintában
- *Trichinella*-val szembeni specifikus antitest-reakció (IFA-vizsgálat, ELISA vagy Western blot)

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Fertőzött étel-misszerrel (hússal) való érintkezés
- Közös forrással való érintkezés

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

TUBERKULÓZIS (TBC)

(*Mycobacterium tuberculosis complex*)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet:

- Olyan jelek, tünetek vagy radiológiai leletek, amelyek valamely terület aktív tuberkulózisára mutatnak
- ÉS
- a gyógyító orvos arra vonatkozó döntése, hogy a beteget teljes antituberkulotikus kezelésben részesíti

VAGY

Boncolás során feltárt eset, ahol a patológiai leletek aktív tuberkulózisra mutatnak, amely antituberkulotikus antibiotikus kezelést igényelt volna, ha a beteget halála előtt diagnosztizálták volna

Laboratóriumi kritériumok

- Az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- A *Mycobacterium tuberculosis* komplex (kivéve *Mycobacterium bovis* BCG) izolálása bármilyen klinikai mintából
- *Mycobacterium tuberculosis* komplex nukleinsav kimutatása klinikai mintában ÉS pozitív eredményű mikroszkópos vizsgálat saválló baktériumokra vagy ezzel egyenértékű fluoreszcens bacillusfestés vagy fénymikroszkópos vizsgálat

- A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériuma

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- mikroszkópos vizsgálat saválló baktériumokra vagy ezzel egyenértékű fluoreszcens bacillusfestés fénymikroszkópos vizsgálattal
- Az *M. tuberculosis* komplex nukleinsav kimutatása klinikai mintában
- A sarjdagánat hisztológiai megjelenése

Epidemiológiai kritériumok

n.a.

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a valószínűsíthető eset klinikai és laboratóriumi kritériumai

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek az esetmegerősítés klinikai és laboratóriumi kritériumai

TULARÉMIA

(*Francisella tularensis*)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi klinikai formák legalább egyike:

- *Ulceroglandular tularaemia*
 - Bőrön jelentkező fekély
 - ÉS
 - Helyi nyirokcsomó-duzzanat
- *Glandular tularaemia*
 - Megnagyobbodott és fájdalmas nyirokcsomók látható fekély nélkül
- *Oculoglandular tularaemia*
 - Kötőhártya-gyulladás
 - ÉS
 - Helyi nyirokcsomó-duzzanat
- *Oropharyngeal tularaemia*
 - Tarkótáji nyirokcsomó-duzzanat
 - ÉS
 - az alábbi három tünet legalább egyike:
 - Szájgyulladás (stomatitis)
 - Torokgyulladás
 - Tonsillitis (mandulagyulladás)
- *Intestinal tularaemia*
 - Az alábbi három tünet legalább egyike:
 - Hasi fájdalom
 - Hányás
 - Hasmenés
- *Pneumonic tularaemia*
 - Tüdőgyulladás
- *Typhoidal tularaemia*
 - Az alábbi két tünet legalább egyike:
 - Láz, korai lokalizálást lehetővé tevő jelek és tünetek nélkül
 - Vérmérgezés

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- *Francisella tularensis* elkülönítése a klinikai mintából
- A *Francisella tularensis* nukleinsav kimutatása klinikai mintában

- *Francisella tularensis*-szal szembeni specifikus antitest-reakció

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi három epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Közös forrással való érintkezés
- Állatról emberre való terjedés
- Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

TÍFUSZ/PARATÍFUSZ

(*Salmonella Typhi*/*Paratyphi*)

Klinikai kritériumok

Bármely személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

- Folyamatos láz
- Az alábbi négy tünet közül legalább kettő:
 - Fejfájás
 - Relatív bradycardia
 - Száraz köhögés
 - Hasmenés, székrekedés, rossz közérzet vagy hasi fájdalom

A paratífuszos láz tünetei megegyeznek a tífuszos láz tüneteivel, lefolyásuk azonban rendszerint enyhébb.

Laboratóriumi kritériumok

- A *Salmonella Typhi* vagy *Paratyphi* izolálása klinikai mintából

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi három epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Közös forrással való érintkezés
- Emberről emberre való terjedés
- Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

VÍRUSOS EREDETŰ VÉRZÉSES LÁZAS MEGBETEGEDÉS**Klinikai kritériumok**

Bármely személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

- Láz
- Vérzéses tünetek különféle formái, amelyek több szerv elégtelenségéhez vezetnek

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- A specifikus vírus izolálása klinikai mintából
- A specifikus vírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában és genotipizálás

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- Utazás az elmúlt 21 nap folyamán olyan területre, ahol vírusos eredetű vérzésszerű lázas megbetegedés fordult vagy fordulhatott elő
- az elmúlt 21 nap során expozíció vírusos eredetű vérzésszerű lázas megbetegedésben szenvedő megerősített esetnek, ahol a betegség az elmúlt 6 hónap folyamán kezdődött

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

NYUGAT-NÍLUSI LÁZ

(Nyugat-níluszi lázvírussal fertőzés)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél láz jelentkezik

VAGY

Az alábbi két tünet legalább egyike:

- Agyvelőgyulladás
- Agyhártyagyulladás

Laboratóriumi kritériumok

- Az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- a nyugat-níluszi lázvírus izolálása vérből vagy gerincvelői folyadékból
- nyugat-níluszi lázvírus nukleinsav (RNS vagy DNS) kimutatása vérből vagy gerincvelői folyadékból
- a nyugat-níluszi lázvírussal szembeni specifikus antitest-reakció (IgM) gerincvelői folyadékban

- nyugat-nílusi lázvírus IgM magas titere ÉS a nyugat-nílusi lázvírus IgG kimutatása ÉS megerősítés semlegesítéssel
- A valószínűsíthető eset laboratóriumi vizsgálata
- Nyugat-nílusi lázvírussal szembeni specifikus antitest-reakció vérsavóban
- A laboratóriumi eredményeket a flavivírus vakcinázási státusa szerint kell értelmezni

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Állatról emberre való terjedés (olyan területen való tartózkodás, látogatás vagy szúnyogcsípéseknek való érintkezés, ahol a nyugat-nílusi lázvírus járványszerűen jelen van lovakban vagy madarakban)
- Emberről emberre való terjedés (vertikális terjedés, vérátömlesztés, transzplantáció)

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a klinikai feltételek ÉS teljesül az alábbi két feltétel legalább egyike:

- epidemiológiai kapcsolat
- a valószínűsíthető eset laboratóriumi vizsgálata

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

SÁRGALÁZ

(Sárgalázvírus)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél láz jelentkezik

ÉS

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- Sárgaság
- Generalizált vérzés

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi öt feltétel legalább egyike:

- A sárgalázvírus izolálása klinikai mintából
- A sárgalázvírus nukleinsavának kimutatása
- Sárgaláz vírusa antigénjének kimutatása
- Sárgalázzal szembeni specifikus antitest-reakció
- A máj post mortem kórszövettanán tipikus elváltozások kimutatása

A laboratóriumi eredményeket a flavivírus vakcinázási státusa szerint kell értelmezni

Epidemiológiai kritériumok

Utazás az elmúlt 1 hét folyamán olyan területre, ahol sárgaláz fordult vagy fordulhatott elő

Esetek osztályozása

A. Gyanús eset

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

Ha a személyt a közelmúltban beoltották, olyan személy, akinél kimutatták a sárgaláz vad vírustörzsét

YERSINIOSIS

(*Yersinia enterocolitica*, *Yersinia pseudotuberculosis*)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi öt tünet legalább egyike:

- Láz
- Hasmenés
- Hányás
- Hasi fájdalom (pseudo-appendicitis)
- Görcsös székelési inger

Laboratóriumi kritériumok

- A humán patogén *Yersinia enterocolitica* vagy *Yersinia pseudotuberculosis* izolálása klinikai mintából

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi négy epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- Emberről emberre való terjedés
- Közös forrással való érintkezés
- Állatról emberre való terjedés
- Fertőzött élelmiszerrel való érintkezés

Esetek osztályozása**A. Gyanús eset**

n.a.

B. Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C. Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok
