

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2728/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1981

che modifica, per quanto riguarda la loro applicazione per varietà di tabacco della produzione comunitaria, i regolamenti (CEE) n. 1727/70, (CEE) n. 1728/70, (CEE) n. 2603/71, (CEE) n. 638/74 e (CEE) n. 410/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 73,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 5, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 10, e l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1697/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo al finanziamento delle spese d'intervento nel settore del tabacco greggio (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 330/74 (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1534/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che fissa, per il raccolto 1981, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli nonché le qualità di riferimento (4), ha introdotto l'elenco delle varietà di tabacco coltivate in Grecia e la definizione delle loro qualità di riferimento; che occorre dunque adattare in conformità i regolamenti le cui disposizioni si riferiscono alle diverse varietà e qualità di riferimento dei tabacchi, in particolare i regolamenti seguenti:

— (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 290/81 (6),

— (CEE) n. 2603/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 290/81,

— (CEE) n. 638/74 della Commissione, del 20 marzo 1974, che fissa il limite di tolleranza per le perdite di quantità dovute alla conservazione del tabacco greggio all'intervento (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 1979/79 (9),

— (CEE) n. 410/76 della Commissione, del 23 febbraio 1976, che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 290/81;

considerando che, con l'allegato I dell'atto di adesione della Grecia, è stata introdotta nel regolamento (CEE) n. 1728/70 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 290/81, una tabella di maggiorazioni e riduzioni per le varietà coltivate in Grecia; che una valutazione approfondita della gamma di qualità dei tabacchi ellenici e l'introduzione, con il regolamento (CEE) n. 1534/81, della classificazione delle varietà di tali tabacchi inducono tuttavia a modificare detta tabella;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 327/71 del Consiglio (12) prevede, per il tabacco in foglia acquistato dagli organismi d'intervento, la conclusione di contratti di prima trasformazione e di condizionamento mediante licitazione privata; che i contratti possono essere aggiudicati soltanto alle offerte più favorevoli, purché queste non superino un importo che deve essere fissato per ciascuna varietà;

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 8.

(3) GU n. L 37 del 9. 2. 1974, pag. 5.

(4) GU n. L 156 del 15. 6. 1981, pag. 1.

(5) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 5.

(6) GU n. L 32 del 4. 2. 1981, pag. 9.

(7) GU n. L 269 dell'8. 12. 1971, pag. 11.

(8) GU n. L 77 del 22. 3. 1974, pag. 30.

(9) GU n. L 228 dell'8. 9. 1979, pag. 23.

(10) GU n. L 50 del 26. 2. 1976, pag. 11.

(11) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 18.

(12) GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 3.

considerando che tali importi sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2603/71; che, dopo l'ultima attualizzazione degli importi, gli elementi di calcolo si sono notevolmente modificati per talune varietà; che occorre pertanto attualizzare nuovamente detti importi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1727/70 è modificato come segue:

1. L'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
3. L'allegato IV è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 1728/70 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

1. L'allegato I è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
2. L'allegato II è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

*Articolo 3*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2603/71 è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.

*Articolo 4*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 638/74 è sostituito dall'allegato VII del presente regolamento.

*Articolo 5*

Il regolamento (CEE) n. 410/76 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la prima volta al tabacco del raccolto 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1727/70 è modificato come segue:

I. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. BADISCHER GEUDERTHEIMER».

II. Il testo del punto 10 è sostituito dal seguente:

«10. a) KENTUCKY e ibridi derivati; b) MORO DI CORI; c) SALENTO

Grado A: foglie di ampia paginatura, di giusta maturità, di tessuto sostanzioso ed elastico, ben curate e conservate, di colore marrone, senza difetto di integrità e di buona combustibilità.

Grado B: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetto di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità e di buona combustibilità <sup>(1)</sup>.

Grado C: foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero o grossolano, con difetti di conservazione, di colore marrone disforme, con difetti di integrità anche accentuati».

III. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 11 è sostituita dalla seguente:

«11. a) FORCHHEIMER HAVANNA II c); b) NOSTRANO DEL BRENTA; c) RESISTENTE 142; d) GOJANO».

IV. Sono aggiunte le rubriche seguenti:

«17. BASMA

Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità.

Qualità III: foglie mature, con qualche lieve difetto d'integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al giallo-verde, al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità.

Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, con pronunciati difetti di integrità, danneggiate da malattie o da insetti, provviste di aroma leggero, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III

foglie mature, con qualche lieve difetto d'integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al giallo-verde, al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Qualità di riferimento.

## 18. KATERINI e varietà simili

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone foliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità.
- Qualità III: foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone foliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, di sostanza media, mediamente elastiche e brillanti e di ottima combustibilità.
- Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura, provenienti da tutte le corone foliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, con pronunciati difetti d'integrità e danni causati da malattie, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone foliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III

foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone foliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, di sostanza media, mediamente elastiche e brillanti e di ottima combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III <sup>(1)</sup>

## 19. KABA KOULAK classico

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone foliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.
- Qualità III: foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone foliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo al giallo-verde o al rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.
- Qualità IV: foglie mature e sufficientemente integre, con evidenti difetti di cura, visibilmente danneggiate, provenienti da tutte le corone foliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone foliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III

foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone foliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo al giallo-verde o al rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Qualità di riferimento.

20. a) KABA KOULAK non classico  
b) ELASSONA, MYRODATA SMYRNE, TRAPEZOUS e PHI 1

Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per l'Elassona e il Phi 1 e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per l'Elassona e il Phi 1 e 20 cm per il Myrodata Smyrne, di colore giallo-verde o marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Qualità IV: foglie mature e sufficientemente integre, con evidenti difetti di cura e visibilmente danneggiate, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.

Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per l'Elassona e il Phi 1 e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 47% della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per l'Elassona e il Phi 1 e a 20 cm per il Myrodata Smyrne, di colore giallo-verde o marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 53% della qualità I/III <sup>(1)</sup>

## 21. MYRODATA AGRINION

Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore giallo, giallo-verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Qualità IV: foglie sufficientemente mature e integre, con evidenti difetti di cura e visibilmente danneggiate da malattie, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.

Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 47% della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore giallo, giallo-verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 53% della qualità I/III <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Qualità di riferimento.

## 22. ZICHNOMYRODATA

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.
- Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, giallo-verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.
- Qualità IV: foglie mature e sufficientemente integre, con evidenti difetti di cura e visibilmente danneggiate da malattie, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, giallo-verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III <sup>(1)</sup>

## 23. TSEBELIA

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima, lunghe fino a 35 cm, di colore rosso-giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di media sostanza, di tessuto gentile e di ottima combustibilità.
- Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo chiaro, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, di grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile e di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità.
- Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, con pronunciati difetti d'integrità e visibilmente danneggiate da malattie, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima, lunghe fino a 35 cm, di colore rosso-giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di media sostanza, di tessuto gentile e di ottima combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo chiaro, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, di grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile e di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Qualità di riferimento.

## 24. MAVRA

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso-giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità.
- Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo-verde (limone), rossastro o marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità.
- Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, con pronunciati difetti di integrità, visibilmente danneggiate da malattie, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso-giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo-verde (limone), rossastro o marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III <sup>(1)</sup>

## 25. BURLEY GR

- Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, integre, sane, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal marroncino al marroncino rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità <sup>(1)</sup>.
- Qualità B: foglie mature e sufficientemente sviluppate con qualche leggero difetto di cura, sufficientemente integre, leggermente danneggiate, provenienti per lo più dalle corone fogliari più basse, di colore marrone a tonalità variabili, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile e di ottima combustibilità.
- Qualità C: foglie mature ma non completamente sviluppate (grossolane), in parte spezzate, visibilmente danneggiate da malattie, indipendentemente dalla paginatura, dalla corona fogliare e dal colore, con pronunciati difetti di cura (non mature, bruciate), ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

## 26. VIRGINIA GR

- Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, sane, integre, ben curate, di colore uniforme dal giallo limone all'arancio medio, sostanzioso, di tessuto gentile e di buona combustibilità, provenienti essenzialmente dalle corone mediane <sup>(1)</sup>.
- Qualità B: foglie mature e sviluppate, sufficientemente integre, leggermente danneggiate da malattie, con qualche leggero difetto di cura, di colore dal giallo limone all'arancio o al rosso chiaro con leggera tonalità verdastra, di buona combustibilità, provenienti per lo più dalle corone fogliari più basse.
- Qualità C: foglie mature ma non completamente sviluppate, sufficientemente integre, visibilmente danneggiate, indipendentemente dalla paginatura e dalle corone fogliari, con evidenti difetti di cura, di colore screziato (dal giallo al marrone o al cinerino verdastro), che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento».

<sup>(1)</sup> Qualità di riferimento.

## ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1727/70 è modificato come segue:

I. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. BADISCHER GEUDERTHEIMER».

II. Il testo del punto 10. I. è sostituito dal seguente:

«10. a) KENTUCKY e ibridi derivati; b) MORO DI CORI; c) SALENTO

I. Tabacco del raccolto del 1980 e degli anni successivi:

- Grado A: foglie di ampia paginatura, di giusta maturità, di tessuto sostanzioso ed elastico, ben curate e conservate, di colore marrone, senza difetto di integrità e di buona combustibilità.
- Grado B: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetto di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità e di buona combustibilità <sup>(1)</sup>.
- Grado C: foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero o grossolano, con difetti di conservazione, di colore marrone disforme, con difetti di integrità anche accentuati».

III. La menzione della varietà a fronte del numero progressivo 11 è sostituita dalla seguente:

«11. a) FORCHHEIMER HAVANNA II c); b) NOSTRANO DEL BRENTA; c) RESISTENTE 142; d) GOJANO».

IV. Sono aggiunte le rubriche seguenti:

«17. BASMA

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità.
- Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura e qualche traccia di malattia, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità.
- Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, con pronunciati difetti d'integrità, di aroma leggero, danneggiate da malattie o da insetti, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità.

Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura e qualche traccia di malattia, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità.

Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 55 % della qualità I/III <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Qualità di riferimento.



## 18. KATERINI e varietà simili

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità.
- Qualità III: foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e di cura e con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità.
- Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, con pronunciati difetti di integrità e danni causati da malattie, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità.

Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III

foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e di cura e con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III <sup>(1)</sup>

## 19. KABA KOULAK classico

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.
- Qualità III: foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo al rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.
- Qualità IV: foglie mature e sufficientemente integre, con evidenti difetti di cura e visibilmente danneggiate, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore biondo verde, verde o marrone, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III

foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo al rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Qualità di riferimento.

20. a) KABA KOULAK non classico  
 b) ELASSONA, MYRODATA SMYRNE, TRAPEZOUS e PHI 1

Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per l'Elassona e il Phi 1 e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana relativamente aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per l'Elassona e il Phi 1 e a 20 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo al marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Qualità IV: foglie mature e sufficientemente integre, con evidenti difetti di cura e visibilmente danneggiate, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per l'Elassona e il Phi 1 e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana relativamente aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 47 % della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per l'Elassona e il Phi 1 e a 20 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo al marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III <sup>(1)</sup>

#### 21. MYRODATA AGRINION

Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Qualità IV: foglie sufficientemente mature ed integre, con evidenti difetti di cura, visibilmente danneggiate da malattie, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Qualità I/III: foglie, mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 47% della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore dal giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Qualità di riferimento.

## 22. ZICHNOMYRODATA

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.
- Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.
- Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura e visibilmente danneggiate da malattie, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III <sup>(1)</sup>

## 23. TSEBELIA

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari, salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore rosso-giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità.
- Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile e di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità.
- Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, con pronunciati difetti d'integrità e visibilmente danneggiate da malattie, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore rosso-giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità.

Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, di grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile, di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Qualità di riferimento.

## 24. MAVRA

Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari, salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso-giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, mediamente elastiche e di buona combustibilità.

Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallastro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità.

Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, con pronunciati difetti d'integrità e visibilmente danneggiate da malattie, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.

Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso-giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallastro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III <sup>(1)</sup>

## 25. BURLEY GR

Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, integre, sane, ben curate, provenienti dalla corone fogliari mediane, di colore uniforme dal marroncino al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità <sup>(1)</sup>.

Qualità B: foglie mature e sufficientemente sviluppate, con qualche leggero difetto di cura, sufficientemente integre, leggermente danneggiate, provenienti per lo più dalle corone fogliari più basse, di colore marroncino a tonalità variabili, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile e di ottima combustibilità.

Qualità C: foglie mature ma non completamente sviluppate (grossolane), in parte spezzate, visibilmente danneggiate da malattie, indipendentemente dalla paginatura, dalla corona fogliare e dal colore, con evidenti difetti di cura, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.

## 26. VIRGINIA GR

Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, sane, integre, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal giallo limone all'arancio medio, di tessuto gentile e di buona combustibilità <sup>(1)</sup>.

Qualità B: foglie mature e sviluppate, provenienti per lo più dalle corone fogliari più basse, sufficientemente integre, leggermente danneggiate da malattie, con qualche difetto di cura, di colore screziato (dal giallo al limone, all'arancio o al rosso chiaro con leggera tonalità verdastra) e di buona combustibilità.

Qualità C: foglie mature ma non completamente sviluppate, sufficientemente integre, visibilmente danneggiate, indipendentemente dalla paginatura e dalla corona fogliare, con evidenti difetti di cura, di colore screziato (dal giallo al marroncino o al verde chiaro), ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento».

<sup>(1)</sup> Qualità di riferimento.

## ALLEGATO III

L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1727/70 è modificato come segue:

I. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Badischer Geudertheimer».

II. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 11 è sostituita della seguente:

«11.	a) Forchheimer Havanna II c)	}	26%	16%
	b) Nostrano del Brenta			
	c) Resistente 142			
	d) Gojano».			

III. Sono aggiunte le rubriche seguenti:

Numero progressivo	Varietà	Umidità	
		Tabacco in foglia	Tabacco in colli
17	Basma	17%	13%
18	Katerini e varietà simili	16%	13%
19	Kaba Koulak classico	17%	13%
20	a) Kaba Koulak non classico b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous e PHI 1	17%	13%
21	Myrodata Agrinion		
22	Zichnomyrodata	17%	13%
23	Tsebelia	14%	13%
24	Mavra	14%	13%
25	Burley GR	22%	13%
26	Virginia GR	19%	13%

## ALLEGATO IV

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1728/70 è modificato come segue:

I. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Badischer Geudertheimer».

II. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 11 è sostituita dalla seguente:

«11. a) Forchheimer Havanna II c)  
b) Nostrano del Brenta  
c) Resistente 142.  
d) Gojano».

III. Sono aggiunte le rubriche seguenti:

Numero progressivo	Varietà	Grado	Classe I	Classe II	Classe III
17	Basma	I/III	112	100 <sup>(1)</sup>	
		I/II	139	124	
		III	91	81	
		IV	34	30	
18	Katerini e varietà simili	I/III	100 <sup>(1)</sup>		
		I/II	124		
		III	81		
		IV	30		
19	Kaba Koulak classico	I/III	100 <sup>(1)</sup>		
		I/II	112		
		III	89		
		IV	30		
20	a) Kaba Koulak non classico b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous e PHI 1	I/III	100 <sup>(1)</sup>	109	
		I/II	112	122	
		III	89	97	
		IV	30	33	
21	Myrodata Agrinion	I/III	100 <sup>(1)</sup>		
22	Zichnomyrodata	I/II	112		
		III	89		
		IV	30		
23	Tsebelia	I/III	128	115	100 <sup>(1)</sup>
		I/II	159	143	124
		III	104	93	81
		IV	38	35	30
24	Mavra	I/III	100 <sup>(1)</sup>	128	
		I/II	124	159	
		III	81	104	
		IV	30	38	
25	Burley GR	A	104	100 <sup>(1)</sup>	
		B	68	65	
		C	50	48	
26	Virginia GR	A	100 <sup>(1)</sup>		
		B	65		
		C	50		

<sup>(1)</sup> Qualità di riferimento.

## ALLEGATO V

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1728/70 è modificato come segue:

I. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Badischer Geudertheimer».

II. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 11 è sostituita dalla seguente:

«11. a) Forchheimer Havanna II c)  
b) Nostrano del Brenta  
c) Resistente 142  
d) Gojano».

III. Sono aggiunte le rubriche seguenti:

Numero progressivo	Varietà	Grado	Classe I	Classe II	Classe III
17	Basma	I/III	112	100 <sup>(1)</sup>	
		I/II	139	124	
		III	91	81	
		IV	34	30	
18	Katerini e varietà simili	I/III	100 <sup>(1)</sup>		
		I/II	124		
		III	81		
		IV	30		
19	Kaba Koulak classico	I/III	100 <sup>(1)</sup>		
		I/II	112		
		III	89		
		IV	30		
20	a) Kaba Koulak non classico b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous e PHI 1	I/III	100 <sup>(1)</sup>	109	
		I/II	112	122	
		III	89	97	
		IV	30	33	
21	Myrodata Agrinion	I/III	100 <sup>(1)</sup>		
22	Zichnomyrodata	I/II	112		
		III	89		
		IV	30		
23	Tsebelia	I/III	128	115	100 <sup>(1)</sup>
		I/II	159	143	124
		III	104	93	81
		IV	38	35	30
24	Mavra	I/III	100 <sup>(1)</sup>	128	
		I/II	124	159	
		III	81	104	
		IV	30	38	
25	Burley GR	A	104	100 <sup>(1)</sup>	
		B	68	65	
		C	50	48	
26	Virginia GR	A	100 <sup>(1)</sup>		
		B	65		
		C	50		

<sup>(1)</sup> Qualità di riferimento.

## ALLEGATO VI

Importo di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 327/71

Numero progressivo	Varietà	Importo in ECU/ kg di tabacco in foglia
1	Badischer Geudertheimer	0,684
2	Badischer Burley E	0,682
3	Virgin D	0,641
4	a) Paraguay e suoi ibridi b) Dragon vert e suoi ibridi Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	0,510
5	Nijkerk	0,410
6	a) Misionero e suoi ibridi b) Rio Grande e suoi ibridi	0,511
7	Bright	0,692
8	Burley I	0,644
9	Maryland	0,644
10	a) Kentucky e suoi ibridi b) Moro di Cori c) Salento	0,627
11	a) Forchheimer Havanna II c) b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	0,684
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà simili	0,474
13	Xanti-Yakà	1,088
14	a) Perustitza b) Samsun	0,741
15	Erzegovina e varietà simili	0,677
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	8,000
17	Basma	0,986
18	Katerini e varietà simili	1,006
19	Kaba Koulak classico	0,908
20	a) Kaba Koulak non classico b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous e PHI 1	0,908
21	Myrodata Agrinion	0,908
22	Zichnomyrodata	0,908
23	Tsebelia	0,908
24	Mavra	0,908
25	Burley GR	0,501
26	Virginia GR	0,692



## ALLEGATO VII

## LIMITI DI TOLLERANZE IN PERCENTUALE DI PESO NETTO

## I. Tabacco comprato in foglie dall'organismo d'intervento

Varietà	Nell'anno di acquisto
Dark, air-cured (1, 4, 5, 6, 11, 12)	8 %
Fire-cured (10)	8 %
Tabacchi speciali (10)	8 %
Light, air-cured (2, 8, 9, 25)	5 %
Flue-cured (3, 7, 26)	5 %
Sun-cured (13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)	8 %

## II. Tabacco comprato in colli dall'organismo d'intervento

Varietà	Nell'anno di acquisto	Negli anni successivi
Dark, air-cured (1, 4, 5, 6, 11, 12)	1,5 %	0,7 %
Fire-cured (10)	1,5 %	0,7 %
Tabacchi speciali (16)	1,5 %	0,7 %
Light, air-cured (2, 8, 9, 25)	1,0 %	0,6 %
Flue-cured (3, 7, 26)	1,0 %	0,8 %
Sun-cured (13, 14, 15)	1,0 %	0,6 %
(17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)	2,0 %	1,0 %

## ALLEGATO VIII

L'allegato del regolamento (CEE) n. 410/76 è modificato come segue:

I. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Badischer Geudertheimer».

II. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 11 è sostituita dalla seguente:

«11.	a) Forchheimer Havanna II c)	}	26 %
	b) Nostrano del Brenta		
	c) Resistente 142		
	d) Gojano».		

III. Sono aggiunte le rubriche seguenti:

Numero d'ordine	Varietà	Perdite massime di peso (in percentuale di peso netto) di tabacco in foglia <sup>(1)</sup>	
17	Basma	13,7	
18	Katerini e varietà simili	17,6	
19	Kaba Koulak classico	14,9	
20	a) Kaba Koulak non classico b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous e PHI 1	}	14,9
21	Myrodata Agrinion		
22	Zichnomyrodata	14,9	
23	Tsebelia	14,9	
24	Mavra	14,9	
25	Burley GR	24,4	
26	Virginia GR	14,0	

<sup>(1)</sup> Questi tassi sono maggiorati di 4 punti per i tabacchi che hanno subito operazioni di battitura.