

REGOLAMENTO (CEE) N. 1505/85 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1985

che fissa, per il raccolto 1985, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, nonché le qualità di riferimento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽⁴⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, nel fissare i prezzi nel settore del tabacco greggio, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha, in particolare, lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento del tabacco in foglia devono essere fissati secondo i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 727/70, per promuovere l'orientamento della produzione, in particolare nel senso della riconversione delle colture verso le varietà più richieste e più competitive;

considerando che è opportuno fissare, anche per il raccolto 1985, prezzi d'intervento derivati per le varietà che, prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati o, per le varietà coltivate in Grecia, prima dell'adesione, beneficiavano di una garanzia di prezzo nella fase del tabacco in colli, nonché per le varietà principalmente coltivate in Germania, al fine di tener conto degli usi commerciali vigenti in tale paese;

considerando che il premio concesso agli acquirenti di tabacco comunitario deve consentire loro di pagare ai produttori di tabacco in foglia un prezzo che raggiunga il livello del prezzo di obiettivo, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e del livello dei prezzi risultante dal gioco dell'offerta e della domanda sul mercato comunitario;

considerando che i prezzi di cui sopra e l'importo del premio devono essere fissati per ciascuna varietà in rapporto ad una qualità di riferimento definita in modo da consentire la valutazione più obiettiva possibile della qualità del tabacco; che è opportuno, per il raccolto 1985, utilizzare le definizioni delle qualità di riferimento adottate con regolamento (CEE) n. 1029/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per il raccolto 1984, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, nonché le qualità di riferimento⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, dell'atto di adesione del 1979, i prezzi d'obiettivo da applicare in Grecia sono fissati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 727/70 e vengono aumentati, in quattro tappe, dell'incidenza della diminuzione degli aiuti nazionali che la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere in forma decrescente per il tabacco, in applicazione dell'articolo 69 di detto atto; che il quarto aumento deve aver luogo per il quinto raccolto successivo all'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1985, le qualità di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 727/70 di ciascuna varietà di tabacco in foglia prodotta nella Comunità sono quelle stabilite nell'allegato I.

Articolo 2

Per il raccolto 1985, le qualità di riferimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 727/70, di ciascuna varietà di tabacco in colli prodotta nella Comunità per le quali è fissato un prezzo d'intervento derivato sono quelle stabilite nell'allegato II.

Articolo 3

Per il raccolto 1985 i prezzi d'obiettivo e d'intervento e gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglia di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento sono fissati nell'allegato III.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 27.

(3) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 42.

(4) GU n. C 94 del 15. 4. 1985.

(5) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 19.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIGNORILE

ALLEGATO I

Tabacco in foglia: varietà e rispettive qualità di riferimento per il raccolto 1985

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
1	Badischer Geudertheimer	<p>Hauptgut (Leaves) di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo a tonalità scura, di lunghezza uniforme</p> <p>Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso</p> <p>Umidità: 26 %</p>
2	Badischer Burley E.	<p>Hauptgut (Leaves) di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo-rosso; bruno rossastro al bruno chiaro, di lunghezza uniforme</p> <p>Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso</p> <p>Umidità: 25 %</p>
3	Virgin D	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo-rosso; sono ammesse differenze di colorazione, come il brunastro o il giallo verdognolo, con una tolleranza di un terzo della superficie della foglia</p> <p>Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso</p> <p>Umidità: 19 %</p>
4	<p>a) Paraguay e ibridi derivati</p> <p>b) Dragon Vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre</p>	<p>Foglie mediane (Leaves) di classe 2</p> <p>Classe 2: foglie sane con leggeri difetti di colorazione, di natura di tessuto, di maturità, ma di combustibilità soddisfacente</p> <p>Allestimento: foglie cernite, a manocchi o a foglie sciolte orientate</p> <p>Umidità: 27 %</p>
5	Nijkerk	<p>Foglie apicali (Tips) di classe 2</p> <p>Classe 2: — sia foglie di seconda lunghezza (inferiore o uguale a 45 cm), con tessuto molto gommoso, sostanzioso, integro, resistente ed elastico, con nervature poco accentuate, di buona maturazione, di colorazione da marrone a marrone scuro, di tonalità vivace</p> <p>— sia foglie di prima lunghezza (di oltre 45 cm), con tessuto ancora gommoso, sostanzioso, ancora integro, resistente, con nervature più o meno accentuate, di varia colorazione (ad esclusione del verde bottiglia)</p> <p>Allestimento: tabacco cernito, o manocchi o a foglie sciolte orientate</p> <p>Umidità: 27 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
6	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	Foglie di seconda qualità Seconda qualità: foglie di oltre 45 cm di lunghezza, di tessuto non grossolano, di colorazione chiara leggermente giallastra, di tonalità vivace o abbastanza vivace, sufficientemente resistente e abbastanza integro, di discreta combustibilità Allestimento: tabacco cernito, a manocchi o a foglie sciolte orientate Umidità: 27 %
7	Bright	Foglie di grado A Grado A: foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni Allestimento: in balle provvisorie di 30/40 kg Umidità: 16 %
8	Burley I	Foglie di grado A Grado A: foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace Allestimento: in balle provvisorie di 30/40 kg o in fascicoli di 25/30 foglie Umidità: 19 %
9	Maryland	Foglie di grado A Grado A: foglie di maturità sufficiente, anche con leggero difetto di cura, con vaghe sfumature verdastre, tessuto di media consistenza, costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colorazione marrone rossastra piuttosto vivace Allestimento: in balle provvisorie di 30/40 kg o in fascicoli di 25/30 foglie Umidità: 19 %
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	Foglie di grado B Grado B: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità, di buona combustibilità Allestimento: in fascicoli di 25/30 foglie Umidità: 23 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Foglie di grado B Grado B: foglie con tessuto consistente o leggero, sane, senza difetto di essiccazione, di colore bruno-verdognolo, con difetti di integrità Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso Umidità: 26 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà simili	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità Allestimento: in fascicoli di 25/30 foglie Umidità: 24 %
13	Xanti-Yakà	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale ellittica, a costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm Allestimento: in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di «ghirlande» di foglie di 30/40 kg Umidità: 17 %
14	a) Perustitza b) Samsun	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun), costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), con difetti accentuati di integrità ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità La lunghezza delle foglie mediane non supera i 25 cm Allestimento: in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di «ghirlande» di foglie di 30/40 kg Umidità: 17 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento						
15	Erzegovina e varietà simili	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole mediamente accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità</p> <p>La lunghezza delle foglie mediane non supera i 35 cm.</p> <p>Allestimento: in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di «ghirlande» di foglie di 30/40 kg</p> <p>Umidità: 17 %</p>						
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie mediane inferiori suddivise per lunghezza secondo le proporzioni seguenti:</p> <table data-bbox="1092 1231 1911 1380"> <tr> <td>1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)</td> <td>60 %</td> </tr> <tr> <td>2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)</td> <td>35 %</td> </tr> <tr> <td>3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)</td> <td>5 %</td> </tr> </table> <p>foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fino, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto ed aroma tipici, idonee per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25 % di foglie non integre</p> <p>Allestimento: in fascicoli</p> <p>Umidità: 22 %</p>	1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)	60 %	2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)	35 %	3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)	5 %
1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)	60 %							
2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)	35 %							
3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)	5 %							
17	Basmas	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature, con qualche lieve difetto d'integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al giallo verde, al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 15/25 kg costituite di manocchi di foglie spianate in due ranghi. (Si noti che nei distretti di Astakos e Chrysoupolis la presentazione si effettua secondo il metodo «armathodema»)</p> <p>Umidità: 17 %</p>						

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
18	Katerini e varietà simili	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, di sostanza media, mediamente elastiche e brillanti e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: le filze sono generalmente raccolte secondo il metodo «Baski» prima dell'imballaggio</p> <p>Presentazione in balle di 25/35 kg secondo il metodo tradizionale «Kaloup»</p> <p>Umidità: 16 %</p>
19	a) Kaba Koulak classico b) Elassona	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per l'Ellassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per l'Ellassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo al giallo-verde o al rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 15/30 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo tradizionale «armathodema»</p> <p>Umidità: 17 %</p>
20	a) Kaba Koulak non classico b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi I	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per il Phi I e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
20 (segue)	a) Kaba Koulak non classico b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi I	<p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per il Phi I e a 20 cm per il Myrodata Smyrne, di colore giallo-verde o marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 25/35 kg, condizionate secondo il metodo tradizionale «armathodema» ovvero di 35/50 kg secondo il metodo «Kaloup»</p> <p>Umidità: 17 %</p>
21	Myrodata Agrinion	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore giallo, giallo-verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 15/30 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo tradizionale «armathodema»</p> <p>Umidità: 15 %</p>
22	Zichnomyrodata	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, giallo-verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 15/30 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo tradizionale «armathodema»</p> <p>Umidità: 17 %</p>
23	Tsebelia	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima, lunghe fino a 35 cm, di colore rosso-giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di media sostanza, di tessuto gentile e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
23 (segue)	Tsebelia	<p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo chiaro, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, di grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile, di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 30/40 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo «armathodema»</p> <p>Umidità: 14 %</p>
24	Mavra	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo-verde (limone), rossastro o marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 30/50 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo «armathodema»</p> <p>Umidità: 14 %</p>
25	Burley GR	<p>Foglie della qualità A</p> <p>Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, integre, sane, ben curate, provenienti dalle corone fogliari medie, di colore uniforme dal marroncino al marroncino rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 40 kg, condizionate in due ranghi senza spago (foglia sciolta) secondo il metodo «armathodema»</p> <p>Umidità: 22 %</p>
26	Virginia GR	<p>Foglie della qualità A</p> <p>Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, sane, integre, ben curate, colore uniforme dal giallo limone all'arancio medio, sostanziose, di tessuto gentile e di buona combustibilità, provenienti essenzialmente dalle corone medie</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 30/40 kg, condizionate in due ranghi senza spago (foglia sciolta) secondo il metodo «armathodema»</p> <p>Umidità: 19 %</p>

ALLEGATO II

Tabacco in colli: varietà e rispettive qualità di riferimento per il raccolto 1985

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
1	Badischer Geudertheimer	<p>Hauptgut (Leaves) di classe I</p> <p>Classe I: foglie mature, sane, intatte, di colore dal tenue giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale</p> <p>Allestimento: in balle, casse o cartoni di 75/200 kg circa o in botti di 225/450 kg circa</p> <p>Umidità: 16 %</p>
2	Badischer Burley E	<p>Hauptgut (Leaves) di classe I</p> <p>Classe I: foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno chiaro, bruno rossastro al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale</p> <p>Allestimento: in balle o casse di 75/175 kg circa o in botti di 225/450 kg circa</p> <p>Umidità: 15 %</p>
3	Virgin D	<p>Foglie di classe I</p> <p>Classe I: foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo, giallo-rosso al giallo brunastro e fermentazione normale</p> <p>Allestimento: in balle o casse di 75/175 kg circa o in botti di 225/450 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>
7	Bright	<p>Foglie di grado A</p> <p>Grado A: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni</p> <p>Allestimento: botti di 280/450 kg circa o in cartoni di 150/210 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>
8	Burley I	<p>Foglie di grado A</p> <p>Grado A: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace</p> <p>Allestimento: botti di 280/450 kg circa o in cartoni di 150/210 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
9	Maryland	<p>Foglie di grado A</p> <p>Grado A: foglie di sufficiente maturazione, con qualche lieve difetto di cura ed anche con sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone rossiccio più o meno vivace</p> <p>Allestimento: botti di 280/450 kg circa o in cartoni di 150/210 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità, di buona combustibilità</p> <p>Allestimento: botti di 280/450 kg circa o balle di 170/200 kg circa</p> <p>Umidità: 16 %</p>
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie con tessuto consistente o leggero, sane, senza difetto di essiccazione, di colore bruno-verdognolo, con difetti di integrità</p> <p>Allestimento: in balle, casse o cartoni di 75/200 kg circa o in botti di 225/450 kg circa</p> <p>Umidità: 16 %</p>
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà simili	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie sufficientemente mature, di tessuto sostanzioso od anche grossolano e magro con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità</p> <p>Allestimento: balle di 120 kg circa o botti di 330 kg circa</p> <p>Umidità: 16 %</p>
13	Xanti-Yakà	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale-ellittica, costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità</p> <p>La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm</p> <p>Allestimento: balle di 18/50 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento						
14	a) Perustitza b) Samsun	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun), con costole poco accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, che possono presentare alcuni difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), con accentuati difetti di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità</p> <p>La lunghezza delle foglie mediane non supera i 25 cm</p> <p>Allestimento: balle di 18/50 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>						
15	Erzegovina e varietà simili	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole mediamente accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con accentuati difetti di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità</p> <p>La lunghezza delle foglie mediane non supera i 35 cm</p> <p>Allestimento: balle di 18/50 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>						
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie mediane inferiori suddivise per lunghezza secondo le proporzioni seguenti:</p> <table data-bbox="1123 2169 1938 2316"> <tr> <td>1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)</td> <td>60 %</td> </tr> <tr> <td>2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)</td> <td>35 %</td> </tr> <tr> <td>3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)</td> <td>5 %</td> </tr> </table> <p>foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, senza difetti di integrità, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto ed aroma tipici, idonee per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25 % di foglie non integre</p> <p>Allestimento: in balle di 70/90 kg circa o in cartoni di 180/210 kg circa</p> <p>Umidità: 16 %</p>	1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)	60 %	2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)	35 %	3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)	5 %
1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)	60 %							
2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)	35 %							
3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)	5 %							

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
17	Basma	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura e qualche traccia di malattia, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di circa 30 kg dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>
18	Katerini e varietà simili	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e di cura e con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>
19	a) Kaba Koulak classico b) Ellassona	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per l'Ellassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per l'Ellassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo al rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
20	a) Kaba Koulak non classico b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi 1	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per il Phi 1 e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana relativamente aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per il Phi 1 e a 20 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo al marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>
21	Myrodata Agrinion	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie, mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore dal giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 14 %</p>
22	Zichnomyrodata	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
23	Tsebelia	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore rosso giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, di grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile, di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>
24	Mavra	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso-giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità.</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallastro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>
25	Burley GR	<p>Foglie della qualità A</p> <p>Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, integre, sane, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal marroncino al marroncino rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Allestimento: in balle di 100 kg o in casse di 200 kg o in botti di 240/280 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>
26	Virginia GR	<p>Foglie della qualità A</p> <p>Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, sane, integre, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal giallo limone all'arancio medio, di tessuto gentile e di buona combustibilità</p> <p>Allestimento: in balle di 100 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>

ALLEGATO III

Prezzi d'obiettivo, prezzi d'intervento e premi per i tabacchi in foglia del raccolto 1985

Prezzi d'intervento derivati per i tabacchi in colli del raccolto 1985

(ECU/kg)

Numero d'ordine	Varietà	Prezzi di obiettivo	Prezzi di intervento	Importo del premio	Prezzi di intervento derivati
1	Badischer Geudertheimer	3,721	3,163	2,587	4,725
2	Badischer Burley E	4,604	3,913	2,905	5,518
3	Virgin D	4,491	3,817	2,733	5,052
4	a) Paraguay e suoi ibridi b) Dragon Vert e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appel terre	3,472	2,951	2,402	-
5	Nijkerk	3,428	2,914	2,177	-
6	a) Misionero e suoi ibridi b) Rio Grande e suoi ibridi	3,195	2,716	2,205	-
7	Bright	3,951	3,358	2,298	4,650
8	Burley I	2,906	2,470	1,621	3,621
9	Maryland	3,313	2,816	1,802	4,014
10	a) Kentucky e suoi ibridi b) Moro di Cori c) Salento	2,741	2,330	1,730	3,294
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	3,330	2,831	2,299	4,261
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà simili	1,798	1,528	1,298	2,336
13	Xanti-Yakà	3,609	3,068	2,658	4,866
14	a) Perustitza b) Samsun	3,417	2,904	2,530 2,463	4,250 4,274
15	Erzegovina e varietà simili	3,070	2,610	2,279	3,833
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	16,246	13,809	9,813	21,113
17	Basmas	5,913	5,026	2,869	6,747
18	Katerini e varietà simili	4,925	4,186	2,552	6,050
19	a) Kaba Koulak classico b) Elassona	4,366	3,711	2,256	5,253
20	a) Kaba Koulak non classico b) Myrodata Smyrna, Trapezous e Phi 1	3,357	2,853	1,577	4,290
21	Myrodata Agrinion	4,340	3,689	2,279	5,162
22	Zichnomyrodata	4,509	3,833	2,403	5,390
23	Tsebelia	3,931	3,341	3,123	4,838
24	Mavra	3,837	3,261	2,553	4,748
25	Burley GR	2,297	1,952	0,972	3,084
26	Virginia GR	3,387	2,879	1,732	4,065