

**REGOLAMENTO (CEE) N. 841/92 DELLA COMMISSIONE**

del 2 aprile 1992

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 1727/70, (CEE) n. 1728/70, (CEE) n. 2603/71, (CEE) n. 410/76, (CEE) n. 2501/87 e (CEE) n. 2468/72 per quanto riguarda alcune varietà di tabacco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 5, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 10 e l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1738/91 del Consiglio<sup>(4)</sup> prevede, tra l'altro, di completare la denominazione della varietà n. 1 Badischer Geudertheimer aggiungendovi gli ibridi Pereg e Korso, di aggiungere alla varietà n. 2 Badischer Burley E i termini « e ibridi derivati » e alla varietà n. 3 Virgin D i termini « e ibridi derivati », per tener conto dell'unificazione tedesca; che è opportuno modificare gli allegati dei regolamenti le cui disposizioni si riferiscono alle denominazioni e alle caratteristiche delle diverse varietà di tabacco, segnatamente i regolamenti:

- (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 838/91<sup>(6)</sup>;
- (CEE) n. 1728/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 838/91;
- (CEE) n. 2603/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 838/91;
- (CEE) n. 410/76 della Commissione, del 23 febbraio 1976, che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 838/91;

— (CEE) n. 2501/87 della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa le caratteristiche di ciascuna delle varietà di tabacco della produzione comunitaria<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 838/91;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2468/72 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3349/87<sup>(12)</sup>, sono elencati i centri di raccolta e i centri di trasformazione e di ammasso; che, tenuto conto dell'unificazione tedesca, è opportuno adattare tale allegato alla nuova situazione creatasi, modificando in conseguenza detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Negli allegati I, II, IV e V del regolamento (CEE) n. 1727/70, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1728/70, nonché nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2603/71 e del regolamento (CEE) n. 410/76, i termini che designano le varietà classificate con i numeri d'ordine 1, 2 e 3 sono sostituiti dai termini seguenti:

1. Badischer Geudertheimer, Pereg e Korso.
2. Badischer Burley E e ibridi derivati.
3. Virginia D e ibridi derivati.

*Articolo 2*

Le descrizioni delle varietà classificate con i numeri d'ordine 1, 2 e 3 che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2501/87 sono sostituite dalle descrizioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2468/72 è aggiunto negli elenchi dei centri di raccolta e centri di trasformazione e di ammasso della Germania il seguente centro: « 4371 Glauzig ».

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la prima volta al tabacco del raccolto 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 18.

<sup>(8)</sup> GU n. L 269 dell'8. 12. 1971, pag. 11.

<sup>(9)</sup> GU n. L 50 del 26. 2. 1976, pag. 11.

<sup>(10)</sup> GU n. L 237 del 20. 8. 1987, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU n. L 267 del 28. 11. 1972, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1992.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## Varietà n. 1: Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

1. *Caratteristiche specifiche*

## 1.1. Genetiche :

- a) Badischer Geudertheimer : varietà di origine tedesca, derivata dopo una lunga serie di generazioni, dalle cosiddette « Landrasen », selezione per la conservazione delle caratteristiche, sementi certificate od ottenute da sementi certificate
- b) Pereg : tipo Geudertheimer, resistente alla peronospera, incrocio con Bel, selezione per la conservazione delle caratteristiche, sementi certificate od ottenute da sementi certificate
- c) Korso : tipo Geudertheimer, resistente alla peronospera e al virus Y, incrocio con Bel, selezione per la conservazione delle caratteristiche, sementi certificate od ottenute da sementi certificate

## 1.2. Botaniche e morfologiche :

- a) Badischer Geudertheimer : in condizioni normali di coltivazione, pianta a fusto alto, circa 170 cm, che fornisce in media 15-20 foglie utili, a inserzione obliqua, a una distanza media di 10-11 cm. Portamento delle foglie eretto con la parte superiore del lembo ricadente. Grandi foglie ovali o ellittiche di colore da verde a verde carico, lievemente brillante. Varietà a maturazione precoce in condizioni normali di coltivazione
- b) Pereg : pianta a fusto alto, 160-180 cm, che fornisce in media 17-20 foglie utili, a inserzione semieretta. Portamento delle foglie eretto, con l'apice da inclinato a pendente. Foglie oblunghe o allungate di colore verde, dalla superficie pressoché liscia. Varietà semiprecoce
- c) Korso : pianta a fusto alto, circa 170 cm, che fornisce in media 15-18 foglie utili. Foglie lunghe o di media larghezza, di colore verde a tonalità media, dalla superficie opaca. Portamento delle foglie obliquo. Varietà precoce

## 1.3. Esigenze pedoclimatiche :

Predilige i terreni di medio impasto, tendenti al leggero, profondi, irrigui, situati in zone di media altitudine, con umidità dell'aria media

2. *Condizioni di produzione*

## 2.1. Compattezza :

Densità media 29 000-38 000 piante/ha

## 2.2. Cimatura :

Manuale o meccanica, in piena fioritura, con eventuale controllo dei germogli

## 2.3. Raccolta :

In foglie, per corona fogliare

## 2.4. Resa :

In condizioni normali di coltivazione, da 2 500 a 3 000 kg/ha in media per zona

## 2.5. Cura :

All'aria, in essiccatoi per l'« aircuring »

## 2.6. Presentazione e cernita :

Tabacco cernito per corona fogliare (foglie basilari, mediane inferiori, mediane superiori e apicali), ripartito in un massimo di tre classi di qualità; presentato in manocchi, in balle provvisorie od altri imballaggi, con o senza legatura esterna

## Varietà n. 2: Badischer Burley E e ibridi derivati

1. *Caratteristiche specifiche*

## 1.1. Genetiche :

- a) Badischer Burley : tipo Burley riuscito, reincrocio di White-Burley e di Geudertheimer doppio. Selezione per la conservazione delle caratteristiche, sementi certificate od ottenute da sementi certificate
- b) Bursanica, Zerlina e Dreta : tipi Burley, resistenti alla peronospera, incrocio con Bel 61/10. Selezione per la conservazione delle caratteristiche, sementi certificate od ottenute da sementi certificate
- c) BB16F : incrocio B21 Bel e White-Burley

- 1.2. Botaniche e morfologiche :
- a) Badischer Burley : in condizioni normali di coltivazione, pianta a fusto alto, circa 180 cm, che fornisce in media 15-20 foglie utili. Inserzione delle foglie basilari e mediane inferiori : orizzontale ; delle foglie apicali : eretta, con una distanza media di 10 cm. Foglie grandi di forma ovale ampia, di colore da verde chiaro a verde giallastro. Fioritura mediamente precoce e maturazione precoce molto scaglionata per le corone superiori in condizioni normali di coltivazione
  - b) Bursanica, Zerlina e Dreta : in condizioni normali di coltivazione, pianta a fusto molto alto, circa 190 cm, fornisce in media 17-22 foglie utili. Inserzione delle foglie basilari e mediane inferiori : orizzontale ; delle foglie superiori : eretta. Foglie grandi di forma ovale o ovale-ampia, di colore da verde chiaro a giallo verdastro, da rugose a molto rugose. Fioritura e maturazione da media a tardiva
  - c) BB16F : in condizioni normali di coltivazione, pianta a fusto conico, alta circa 160 cm, fornisce 15-18 foglie utili. Foglie di forma semiellittica a ellittica, di colore da verde chiaro a giallo chiaro a maturazione. Infiorescenza di tipo esagonale con fiori di colore rosa
- 1.3. Esigenze pedoclimatiche : Predilige i suoli sabbiosi e limosi, sufficientemente irrigui ; umidità dell'aria : media

## 2. Condizioni di produzione

- 2.1. Compattezza : Badischer Burley E, Bursanica, Zerlina e Dreta : in media 29 000-35 000 piante/ha  
BB16F : in media 28 000-32 000 piante/ha
- 2.2. Cimatura : Manuale o meccanica, in piena fioritura, con eventuale controllo dei germogli
- 2.3. Raccolta : In foglie, per corona fogliare, o piante intere
- 2.4. Resa : In condizioni normali di coltivazione, in media 2 200-3 300 kg/ha
- 2.5. Cura : Ad aria, in essiccatoi adatti per l'«aircuring»
- 2.6. Presentazione e cernita : Tabacco cernito per corone fogliari (foglie basilari, mediane inferiori, mediane superiori e apicali), ripartito in un massimo di tre classi di qualità ; presentazione in manocchi, balle provvisorie o altro imballaggio, con o senza legatura esterna

### Varietà n. 3 : Virginia D

#### 1. Caratteristiche specifiche

- 1.1. Genetiche : Varietà di Virginia, coltivata dalla metà degli anni '50. Selezione effettuata a partire da Virginia americano, resistente al virus Y e al marciume radicale. Selezione per la conservazione delle caratteristiche, sementi certificate od ottenute da sementi certificate
- 1.2. Botaniche e morfologiche : In condizioni normali di coltivazione, pianta a fusto alto, circa 180 cm, fornisce in media 14-20 foglie utili ; foglie a portamento eretto. Dimensione delle foglie da media a grande, di forma lunga o ovale ampia con nervature molto accentuate, di colore da verde chiaro a verde. Fioritura e maturazione mediamente precoci
- 1.3. Esigenze pedoclimatiche : Predilige i terreni leggeri, da sabbiosi a limosi che si riscaldano rapidamente e sufficientemente irrigui

#### 2. Condizioni di produzione

- 2.1. Compattezza : a) In media 29 000-35 000 piante/ha  
b) In media da 18 000 a 22 000 piante/ha su terreni molto sabbiosi e molto filtranti
- 2.2. Cimatura : Di norma nessuna cimatura o cimatura tardiva con controllo dei germogli

- 
- 2.3. Raccolta : Raccolta in foglie, in base alla maturazione e per corona fogliare
- 2.4. Resa : In condizioni normali di coltivazione 1 600-2 400 kg/ha per zona
- 2.5. Cura : A fuoco indiretto in forni speciali (bulks) adatti alla tecnica del « fluecuring »
- 2.6. Presentazione e cernita : Tabacco cernito per corona fogliare (foglie basilari, mediane inferiori, mediane superiori e apicali), suddiviso in un massimo di tre classi di qualità; presentato in manocchi, balle provvisorie o altro imballaggio, con o senza legatura esterna
-