Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

REGOLAMENTO (CE) N. 2036/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2005

relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13)

Modificato da:

<u>B</u>

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
<u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1018/2012 della Commissione del 5 novembre 2012	L 307	56	7.11.2012
► <u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione del 14 dicembre 2012	L 347	12	15.12.2012
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione del 7 giugno 2017	L 145	7	8.6.2017
► <u>M4</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione del 8 giugno 2017	L 166	1	29.6.2017

▼<u>B</u>

REGOLAMENTO (CE) N. 2036/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2005

relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quali additivi nell'alimentazione animale, dei preparati appartenenti al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato I, alle condizioni ivi specificate.

▼ M4

▼<u>B</u>

Articolo 3

È autorizzato l'impiego per quattro anni, quali additivi nell'alimentazione animale, dei preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato III, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Alter dimensioni	Fine del periodo di	
					UFC per kg di alimento completo		Altre disposizioni	autorizzazione	
Microrganismi									
E 1703	Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079	Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> contenente almeno: 2 × 10 ¹⁰ UFC/g di additivo	Scrofe	_	1 × 10 ⁹	<u>M1</u> — ◀	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiacela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	A tempo indeterminato	
E 1712	Pediococcus acidi- lactici CNCM MA 18/5M	Preparato di <i>Pediococcus acidi-</i> <i>lactici</i> contenente almeno 1 × 10 ¹⁰ UFC/g di additivo	Suini da in- grasso	_	1 × 10 ⁹	<u>M1</u> — ◀	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiacela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	A tempo indeterminato	
_									

	Numero CE o	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o	Età	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del
	numero			categoria di animali	massima	Unità di attività per mento compl	vità per kg di ali-		autorizzazione
	Enzimi								
▼ <u>M2</u>									
▼ <u>B</u>									
_	37	Endo-1,4-beta-xi- lanasi EC 3.2.1.8 Subtilisina	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e di subtilisina prodotto dal <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107), avente un'attività minima di:	Anatre	_	endo-1,4-beta-xi- lanasi: 2 500 U subtilisina:	_ 	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della pre- miscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	4.1.2010
		EC 3.4.21.62	endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U (²)/g			800 U	Dose raccomandata per kg di alimento per an completo:		
			subtilisina: 1 600 U (³)/g					endo-1,4-beta-xilanasi: 2 500 U	
								subtilisina: 800 U	
								3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti ad esempio oltre il 65 % di frumento.	
	59	Endo-1,4-beta-xi- lanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xylanasi prodotto dal <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glucanasi e alfa-amilasi prodotto dal <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Anatre	_	endo-1,4-beta-xi- lanasi: 300 U	_	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della pre- miscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	4.1.2010
		Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	(DSM 9553), subtilisina prodotto dal <i>Bacillus</i> subtilis (ATCC 2107), poligalatturonasi prodotto dall' <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94)			endo-1,3(4)-beta- glucanasi: 150 U	_	2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo:	
			avente un'attività minima di:			150 0		endo-1,4-beta-xilanasi: 300 U	
		Subtilisina EC 3.4.21.62	endo-1,4-beta-xilanasi: 300 U (²)/g			subtilisina:	_	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U	
			endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U (4)/g			4 000 U		subtilisina: 4 000 U	
		Alfa-amilasi EC 3.2.1.1	Subtilisina: 4 000 U (³)/g			alfa-amilasi:	_	alfa-amilasi: 400 U	
			Alfa-amilasi: 400 U (5)/g			400 U		poligalatturonasi: 25 U.	
		Poligalatturonasi EC 3.2.1.15 Poligalatturonasi: 25 U (⁶)/g				poligalatturonasi: 25 U	_	 Da utilizzare in alimenti composti ricchi di poli- saccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto ara- binoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di granturco. 	

Numero CE o numero	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo Unità di attività per mento compl	_	· Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
			Galline ovaiole	_	endo-1,4-beta-xi- lanasi: 225 U endo-1,3(4)-beta- glucanasi: 112 U subtilisina: 3 000 U alfa-amilasi: 300 U poligalatturonasi: 18 U	_ _ _ _	 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 225 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 112 U subtilisina: 3 000 U alfa-amilasi: 300 U poligalatturonasi: 18 U. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di granturco. 	4.1.2010

<u>M2</u> ———

⁽²⁾ TU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire dalla pula di avena al minuto, con pH 5,3 e a 50 °C.

^{(3) 1} U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalenti tirosina) da un substrato di caseina al minuto, con pH 7,5 e a 40 °C.

^{(4) 1} U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) dal beta-glucano dell'orzo al minuto, con pH 5,0 e a 30 °C.

^{(3) 1} U è il quantitativo di enzima che idrolizza 1 micromole di legami glicosidici a partire da un sostrato di polimero amilaceo reticolato, insolubile in acqua, al minuto, con pH 6,5 e a 37 °C.

^{(6) 1} U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di materiale riduttore (equivalenti acido galatturonico), a partire da un substrato poli D-galatturonico al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.