

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 329

45° anno

31 dicembre 2002

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I Comunicazioni

Commissione

2002/C 329/01

Elenco degli additivi autorizzati nell'alimentazione degli animali pubblicato in applicazione dell'articolo 9t, lettera b), della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾ 1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Prezzo: 26 EUR

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Elenco degli additivi autorizzati nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾ pubblicato in applicazione dell'articolo 9t, lettera b), della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(2002/C 329/CE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

INDICE

INTRODUZIONE	2
CAPITOLO I: elenco degli additivi associati ad un responsabile dell'immissione in circolazione e autorizzati per un periodo di 10 anni	3
CAPITOLO II: elenco degli additivi associati al responsabile dell'immissione in circolazione cui è concessa un'autorizzazione a titolo provvisorio per una durata massima di quattro anni o di cinque anni per gli additivi che sono oggetto di un'autorizzazione provvisoria anteriormente al 1° aprile 1998	14
CAPITOLO III: elenco di altri additivi autorizzati per un periodo illimitato	17
CAPITOLO IV: elenco di altri additivi autorizzati a titolo provvisorio per un periodo non superiore a quattro o cinque anni nel caso di additivi che siano stati oggetto di un'autorizzazione provvisoria prima del 1° aprile 1998	57
ALLEGATO I: elenco di taluni additivi autorizzati appartenenti ai gruppi degli antibiotici, dei cocciostatici e dei fattori di crescita sottoposti a un periodo di revisione nell'ambito dell'articolo 9g della direttiva 70/524/CEE e inseriti nell'allegato I prima del 1° gennaio 1988	135
ALLEGATO II: elenco dei riferimenti negli atti comunitari che hanno modificato l'elenco degli additivi autorizzati a partire dall'ultimo consolidamento degli allegati alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio nella direttiva 91/248/CEE della Commissione	139

INTRODUZIONE

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 9t, lettera b), della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽²⁾, la Commissione pubblica ogni anno l'elenco degli additivi autorizzati sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie «C», suddiviso nel modo seguente:

- capitolo I: elenco degli additivi associati ad un responsabile dell'immissione in circolazione e autorizzati per un periodo di 10 anni,
- capitolo II: elenco degli additivi associati ad un responsabile dell'immissione in circolazione e autorizzati a titolo provvisorio per un periodo non superiore a quattro o cinque anni nel caso di additivi che siano stati oggetto di un'autorizzazione provvisoria prima del 1° aprile 1998,
- capitolo III: elenco di altri additivi autorizzati per un periodo illimitato,
- capitolo IV: elenco di altri additivi autorizzati a titolo provvisorio per un periodo non superiore a quattro o cinque anni nel caso di additivi che siano stati oggetto di un'autorizzazione provvisoria prima del 1° aprile 1998.

Nell'allegato I è riportato l'elenco di taluni additivi che appartengono ai gruppi degli «antibiotici», dei «coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose» e dei «fattori di crescita» che sono stati autorizzati prima del 1° gennaio 1988 e sono attualmente sottoposti a un periodo di revisione nell'ambito dell'articolo 9g della direttiva 70/524/CEE.

Nell'allegato II è riportato un elenco dei riferimenti di tutti gli atti comunitario che hanno modificato l'elenco degli additivi autorizzati a partire dall'ultimo consolidamento degli allegati alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio nella direttiva 91/248/CEE della Commissione ⁽³⁾.

CAPITOLO I: ELENCO DEGLI ADDITIVI ASSOCIATI AD UN RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE E AUTORIZZATI PER UN PERIODO DI 10 ANNI

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			
Antibiotici									
E 712	Intervet International bv	Flavofosfolipol 80 g/kg (Flavomycin 80) Flavofosfolipol 40 g/kg (Flavomycin 40)	Composizione dell'additivo: Flavofosfolipol: ≥ 80 g attività/kg Diossido di silicio: 50-150 g/kg Carbonato di calcio: 0-400 g/kg Flavofosfolipol: ≥ 40 g attività/kg Diossido di silicio 20-120 g/kg Carbonato di calcio 200-750 g/kg Principio attivo: Flavofosfolipol, Numero CAS: 11015-37-5, (moenomicina A: C ₆₉ H ₁₀₈ N ₅ O ₃₄ P), fosfoglicolipide prodotto per fermentazione di <i>Streptomyces ghanaensis</i> (DSM 12218). Composizione di fattori antibiotici: Moenomicina A: 40 %-80 %, Moenomicina A _{1/2} : 0-20 %, Moenomicina C ₁ : 0-20 %, Moenomicina C ₃ : 5 %-25 %, Moenomicina C ₄ : 0-15 %.	Conigli	—	2	4	—	30.9.2009

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			
E 716	Intervet International bv	Salinomicina sodica 120 g/kg (Salocin 120 microgranulato)	Composizione dell'additivo: Salinomicina sodica: ≥ 120 g/kg Diossido di silicio: 10-100 g/kg Carbonato di calcio: 350-700 g/kg Principio attivo: Salinomicina sodica, C ₄₂ H ₆₉ O ₁₁ Na, Numero CAS: 53003-10-4, sale sodico di un acido polietere monocarbossilico prodotto per fermentazione di <i>Streptomyces albus</i> (DSM 12217). Impurezze associate: < 42 mg di elaiofilina/kg di salinomicina sodica. < 40 g di 17-epi-20-desossi-salinomicina/kg di salinomicina sodica.	Suinetti	4 mesi	30	60	Indicare nelle istruzioni d'uso: «Pericoloso per gli equidi». «Alimento contenente uno ionoforo: l'uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad esempio tiamulin) può essere controindicato.».	30.9.2009
			Suini da ingrasso	6 mesi	15	30	Indicare nelle istruzioni d'uso: «Pericoloso per gli equidi». «Alimento contenente uno ionoforo: l'uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad esempio tiamulin) può essere controindicato.».	30.9.2009	

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			
E 717	Eli Lilly and Company Ltd	Avilamicina 200 g/kg (Maxus G200, Maxus 200) Avilamycin 100 g/kg (Maxus G100, Maxus 100)	Composizione dell'additivo: Avilamicina 200 g/kg Olio di soia o olio minerale: 5-30 g/kg Farina di tegumenti di soia qb a 1 kg Avilamicina 100 g/kg Olio di soia o olio minerale: 5-30 g/kg Farina di tegumenti di soia qb a 1 kg	Suinetti	4 mesi	20	40	—	30.9.2009
			Principio attivo: Avilamicina, $C_{57-62}H_{82-90}Cl_{1-2}O_{31-32}$, Numero CAS dell'avilamicina A: 69787-79-7, Numero CAS dell'avilamicina B: 73240-30-9, miscela di oligosaccaridi del gruppo delle ortosomicine prodotte da <i>Streptomyces viridochromogenes</i> (NRRL 2860), in forma di granulato. Composizione di fattori: Avilamicina A: ≥ 60 %. Avilamicina B: ≤ 18 %. Avilamicine A+B: ≥ 70 %. Altre avilamicine singole: ≤ 6 %.	Suini da ingrasso	6 mesi	10	20	—	30.9.2009
			Polli da ingrasso	—	2,5	10	—	30.9.2009	

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose									
E 758	Alpharma AS	Cloridrato di robenidina 66 g/kg (Cycostat 66 G)	Composizione dell'additivo: Robenidine hydrochloride: 66 g/kg Lignosolfonato: 40 g/kg Solfato di calcio diidrato: 894 g/kg Principio attivo: Cloridrato di robenidina, C ₁₅ H ₁₃ Cl ₂ N ₅ · HCl, cloridrato di 1,3-bis[(p-clorobenzilidene) amino]guanidina, Numero CAS: 25875-50-7, Impurezze associate: N,N',N''-Tris[(p-Cl-benzilidene)amino]guanidina: ≤ 1 % Bis-[4-Cl-benzilidene]idrazina: ≤ 1 %.	Conigli da riproduzione	—	50	66	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione.	30.9.2009

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			
E 763	Alpharma AS	Lasalocid A sodium 15 g/100g (Avatec 15 % cc)	Composizione dell'additivo: Lasalocid A sodico: 15 g/100 g Farina di tutolo di granturco: 80,95 g/100 g Lecitina: 2 g/100 g Olio di soia: 2 g/100 g Ossido ferrico: 0,05 g/100 g Principio attivo: Lasalocid A sodico, C ₃₄ H ₅₃ O ₈ Na, Numero CAS: 25999-20-6, sale sodico di 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etil-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etil-5-idrossi-6-metiltetraidro-2H-piran2-yl]-tetraidro-3-metil-2-furil]-4-idrossi-3,5-dimetil-6-oxonil]-2,3-acido cresotico, prodotto da <i>Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis</i> (ATCC 31180) Impurezze associate: Lasalocid sodico B-E: ≤ 10 %	Tacchini	12 settimane	90	125	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni d'uso: «Alimento contenente uno ionoforo: l'uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose può essere controindicato».	30.9.2009

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			
E 764	Intervet International bv	Bromidrato di alofuginone 6 g/kg (Stenorol)	Composizione dell'additivo: Bromidrato di alofuginone: 6 g/kg Gelatina: 13,2 g/kg Amido: 19,2 g/kg Zucchero: 21,6 g/kg Carbonato di calcio: 940 g/kg Principio attivo: Bromidrato di alofuginone, C ₁₆ H ₁₇ BrClN ₃ O ₃ ·HBr DL-trans-7-bromo-6-cloro-3-(3-(3-idrossi-2-piperidil)acetoni)-4(3H)-chinazolinone bromidrato, Numero CAS: 64924-67-0. Impurezze associate: Isomero cis di alofuginone: < 1,5 %	Pollastre destinate alla produzione di uova	16 settimane	2	3	—	30.9.2009

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			
E 766	Intervet International bv	Salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120)	Composizione dell'additivo: Salinomicina sodica ≥ 120 g/kg Diossido di silicio 10-100 g/kg Carbonato di calcio 350-700 g/kg Principio attivo: Salinomicina sodica, C ₄₂ H ₆₉ O ₁₁ Na, Numero CAS: 53003-10-4, sale sodico di un acido polietere monocarbossilico prodotto per fermentazione di <i>Streptomyces albus</i> (DSM 12217) Impurezze associate: < 42 mg elaiofilina/kg Salinomicina sodica. < 40 g 17-epi-20-desossi-salinomicina/kg di salinomicina sodica.	Conigli da ingrasso	—	20	25	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni d'uso: «Pericoloso per gli equidi». «Alimento contenente uno ionoforo: l'uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad esempio tiamulin) può essere controindicato».	31.5.2011

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			
E 769	Solvay Pharmaceuticals BV	Nifursol 50 g/100 g (Salfuride 50DF)	Composizione dell'additivo: Nifursol: 50 g/100 g Olio di soia: 34 g/100 g Amido di granturco qb a 100 g Principio attivo: Nifursol, C ₁₂ H ₇ N ₅ O ₉ , 3,5-dinitro-N'-(5-nitrofurfurilidene) saliciloidrazide, Numero CAS 16915-70-1. Purezza: ≥ 98,5 % su una base anidra. Impurezze associate: 3,5 Idrazide dell'acido dinitrosalicilico: ≤ 0,5 % 5-Nitro-2-furfuralazine: ≤ 0,5 %.	Tacchini	—	50	75	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione. Quantità massima di polvere emessa durante le manipolazioni, determinata secondo il metodo Stauber Heubach ⁽⁴⁾ : 0,1 µg di nifursol.	30.9.2009

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			
E 770	Alpharma AS	Maduramicina ammonio alfa 1 g/100g (Cygro 1 %)	Composizione dell'additivo: Maduramicina ammonio alfa: 1 g/100 g Alcool benzilico: 5 g/100 g Graniglie di pannocchia di granturco qb a 100 g Principio attivo: Maduramicina ammonio alfa,	Polli da ingrasso	—	5	5	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni d'uso: «Pericoloso per gli equidi». «Alimento contenente uno ionoforo: l'uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad esempio tiamulin) può essere controindicato».	30.9.2009
			C ₄₇ H ₈₃ O ₁₇ N, Numero CAS: 84878-61-5, sale ammonico di un acido polietere monocarbossilico prodotto da <i>Actinomadura yumaensis</i> (ATCC 31585) (NRRL 12515). Impurezze associate: Maduramicina ammonio beta: < 10 %.	Tacchini	16 settimane	5	5	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni d'uso: «Pericoloso per gli equidi». «Alimento contenente uno ionoforo: l'uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad esempio tiamulin) può essere controindicato».	15.12.2011

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			
E 771	Janssen Animal Health B.V.B.A	Diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix)	Composizione dell'additivo: Diclazuril: 0,5 g/100 g Farina di soia: 99,25 g/100 g Polividone K 30: 0,2 g/100 g Idrossido di sodio: 0,0538 g/100 g	Polli da ingrasso	—	1	1	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione.	30.9.2009
		Diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix)	Diclazuril: 0,2 g/100 g Farina di soia: 39,7 g/100 g Polividone K 30: 0,08 g/100 g Idrossido di sodio: 0,0215 g/100 g Farinetta di frumento: 60 g/100 g Principio attivo: Diclazuril, C ₁₇ H ₉ Cl ₃ N ₄ O ₂ , (±)-4-clorofenil[2,6-dicloro-4-(2,3,4,5-tetraidro-3,5-dioxo-1,2,4-triazina-2-yl)fenil]acetonitrile, Numero CAS: 101831-37-2, Impurezze associate: Composto di degradazione (R064318): ≤ 0,2 % Altre impurezze (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5 % singolarmente Impurezze totali: ≤ 1,5 %.	Tacchini da ingrasso	12 settimane	1	1	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione.	28.2.2011

[illegible]

CAPITOLO II: ELENCO DEGLI ADDITIVI ASSOCIATI AL RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE CUI È CONCESSA UN'AUTORIZZAZIONE A TITOLO PROVVISORIO PER UNA DURATA MASSIMA DI QUATTRO ANNI O DI CINQUE ANNI PER GLI ADDITIVI CHE SONO OGGETTO DI UN'AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ANTERIORMENTE AL 1° APRILE 1998

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			

Antibiotici

33	Eli Lilly and Company Ltd	Avilamicina 200 g/kg (Maxus G200, Maxus 200) Avilamicina: 100 g attività/kg (Maxus G100, Maxus 100)	Composizione dell'additivo: Avilamicina: 200 g attività/kg Olio di soia o olio minerale: 5-30 g/kg Farina di tegumenti di soia qb a 1 kg Avilamicina: 100 g attività/kg Olio di soia o olio minerale: 5-30 g/kg Farina di tegumenti di soia qb a 1 kg Principio attivo: Avilamicina, $C_{57-62}H_{82-90}Cl_{1-2}O_{31-32}$ Numero CAS dell'avilamicina A: 69787-79-7, numero CAS dell'avilamicina B: 73240-30-9, miscela di oligosaccaridi del gruppo delle ortosomicine prodotte da <i>Streptomyces viridochromogenes</i> (NRRL 2860), in forma di granulato. Composizione di fattori: Avilamicina A: ≥ 60 %. Avilamicina B: ≤ 18 %. Avilamicine A+B: ≥ 70 %. Altre avilamicine singole: ≤ 6 %.	Tacchini	—	5	10	—	14.12.2002 ^(a)
----	---------------------------	---	--	----------	---	---	----	---	---------------------------

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose									
27	Janssen Animal Health B.V.B.A	Diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) Diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix)	Composizione dell'additivo: Diclazuril: 0,5 g/100 g Farina di soia: 99,25 g/100 g Polividone K 30: 0,2 g/100 g Idrossido di sodio: 0,0538 g/100 g Diclazuril: 0,2 g/100 g Farina di soia: 39,7 g/100 g Polividone K 30: 0,08 g/100 g Idrossido di sodio: 0,0215 g/100 g Farinetta di frumento: 60 g/100 g Principio attivo: Diclazuril, C₁₇H₉Cl₃N₄O₂, (±)-4-clorofenil[2,6-dicloro-4-(2,3,4,5-tetraidro-3,5-dioxi-1,2,4-triazina-2-yl)fenil]acetonitrile, Numero CAS: 101831-37-2, Impurezze associate: Composto di degradazione (R064318): ≤ 0,2 % Altre impurezze (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5 % singolarmente Impurezze totali: ≤ 1,5 %	Pollastre destinate alla produzione di uova	16 settimane	1	1	—	14.12.2002 ^(a)

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			

Fattori di crescita

1	Norsk Hydro Ltd	Potassio diformiato (Formi TM LHS)	Composizione dell'additivo: Potassio diformiato, solido 98 g/100 g, Silicato 1,5 g/100 g, Acqua 0,5 g/100 g Principio attivo: Potassio diformiato, solido $\text{KH}(\text{COOH})_2$ Numero CAS 20642-05-1	Suinetti	2 mesi	6 000	6 000	—	30.6.2005 ⁽⁹⁾
				Suini da ingrasso	—	6 000	6 000	—	30.6.2005 ⁽⁹⁾

CAPITOLO III: ELENCO DI ALTRI ADDITIVI AUTORIZZATI PER UN PERIODO ILLIMITATO

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
Sostanze antiossidanti								
E 300	Acido L-ascorbico	C ₆ H ₈ O ₆	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 301	L-ascorbato di sodio	C ₆ H ₇ O ₆ Na	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 302	L-ascorbato di calcio	C ₁₂ H ₁₄ O ₁₂ Ca · 2H ₂ O	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 303	Acido diacetil-5,6-L-ascorbico	C ₁₀ H ₁₂ O ₈	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 304	Acido palmitoil-6-L-ascorbico	C ₂₂ H ₃₈ O ₇	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 306	Estratti d'origine naturale ricchi in tocoferolo	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 307	Alfa-tocoferolo di sintesi	C ₂₉ H ₅₀ O ₂	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 308	Gamma-tocoferolo di sintesi	C ₂₈ H ₄₈ O ₂	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 309	Delta-tocoferolo di sintesi	C ₂₇ H ₄₆ O ₂	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 310	Gallato di propile	C ₁₀ H ₁₂ O ₅	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	100: da soli o con E 311 o E 312	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 311	Gallato d'ottile	C ₁₅ H ₂₂ O ₅	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	100: da soli o con E 310 o E 312	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 312	Gallato di dodecile	C ₁₉ H ₃₀ O ₅	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	100: da soli o con E 310 o E 311	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 320	Butilidrossianisolo (BHA)	C ₁₁ H ₁₆ O ₂	Tutte le specie o categorie di animali ad eccezione dei cani	—	—	150: da soli o con E 321 e/o E 324	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Cani	—	—	150: da soli o con E 321	La miscela di etossichina e BHA e/o BHT è ammessa a condizione che la sua concentrazione totale non superi 150 mg/kg di alimento completo.	A tempo indeterminato
E 321	Butilidrossitoluene (BHT)	C ₁₅ H ₂₄ O	Tutte le specie o categorie di animali ad eccezione dei cani	—	—	150: da soli o con E 320 e/o E 324	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Cani	—	—	150: da soli o con E 320	La miscela di etossichina e BHA e/o BHT è ammessa a condizione che la sua concentrazione totale non superi 150 mg/kg di alimento completo.	A tempo indeterminato
E 324	Etossichina	C ₁₄ H ₁₉ ON	Tutte le specie o categorie di animali ad eccezione dei cani	—	—	150: da soli o con E 320 e/o E 321	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Cani	—	—	100	La miscela di etossichina e BHA e/o BHT è ammessa a condizione che la sua concentrazione totale non superi 150 mg/kg di alimento completo.	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			

Sostanze aromatizzanti e aperitive

	1. Tutti i prodotti naturali e i prodotti sintetici corrispondenti	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	—	A tempo indeterminato
	2. Sostanze artificiali:							
E 954 (i)	Saccarina	C ₇ H ₅ NO ₃ S	Suinetti	4 mesi	—	150	—	A tempo indeterminato
E 954 (ii)	Saccarinato di calcio	C ₇ H ₃ NCaO ₃ S	Suinetti	4 mesi	—	150	—	A tempo indeterminato
E 954 (iii)	Saccarinato di sodio	C ₇ H ₄ NNaO ₃ S	Suinetti	4 mesi	—	150	—	A tempo indeterminato
E 959	Neoesperidina diidrocalcone	C ₂₈ H ₃₆ O ₁₅	Suinetti	4 mesi	—	35	—	A tempo indeterminato
			Cani	—	—	35	—	A tempo indeterminato
			Vitelli	—	—	30	—	A tempo indeterminato
			Ovini	—	—	30	—	A tempo indeterminato

Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

E 322	Lecitine	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 400	Acido alginico	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 401	Alginato di sodio	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 402	Alginato di potassio	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 403	Alginato di ammonio	—	Tutte le specie o categorie di animali ad eccezione dei pesci da acquario	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 404	Alginato di calcio	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 405	Alginato di propan-1,2-diolo (Alginato di propilene-glicole)	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 406	Agar-agar	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 407	Carragenina	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 410	Farina di semi di carrube (Gomma di carruba)	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 411	Farina di semi di tamarindo	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 412	Gomma di guar	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 413	Tragacante	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 414	Gomma arabica	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 415	Gomma di xantano	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 418	Gomma di gellano	Politetrasaccaride contenente glucosio, acido glucuronico e ramnosio (2:1:1) prodotto da <i>Pseudomonas elodea</i> (ATCC 31466)	Cani	—	—	—	Alimenti con umidità superiore al 20 %	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	Alimenti con umidità superiore al 20 %	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 420	Sorbitolo	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 421	Mannitolo	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 422	Glicerolo	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 432	Monolaurato di poliossietilene (20) sorbitano	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	5 000 (isolatamente o con altri polisorbati)	Solo negli alimenti per allattamento	A tempo indeterminato
E 433	Monooleato di poliossietilene (20) sorbitano	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	5 000 (isolatamente o con altri polisorbati)	Solo negli alimenti per allattamento	A tempo indeterminato
E 434	Monopalmitato di poliossietilene (20) sorbitano	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	5 000 (isolatamente o con altri polisorbati)	Solo negli alimenti per allattamento	A tempo indeterminato
E 435	Monostearato di poliossietilene (20) sorbitano	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	5 000 (isolatamente o con altri polisorbati)	Solo negli alimenti per allattamento	A tempo indeterminato
E 436	Tristearato di poliossietilene (20) sorbitano	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	5 000 (isolatamente o con altri polisorbati)	Solo negli alimenti per allattamento	A tempo indeterminato
E 440	Pectine	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 450b (i)	Trifosfato di pentasodio	—	Cani	—	—	5 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	5 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 460	Cellulosa microcristallina	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 460 (ii)	Cellulosa in polvere	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 461	Metilcellulosa	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 462	Etilcellulosa	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 463	Idrossi-propil-cellulosa	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 464	Idrossi-propil-metilcellulosa	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 465	Metil-etil-cellulosa	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 466	Carbossimetilcellulosa (sale sodico dell'etere carbossimetilico della cellulosa)	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 470	Sali di sodio, di potassio o di calcio degli acidi grassi alimentari, soli o in miscela, ottenuti da materie grasse commestibili e da acidi grassi alimentari distillati	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 471	Mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 472	Mono e digliceridi di acidi grassi alimentari esterificati con gli acidi: a) acetico b) lattico c) citrico d) tartarico e) mono e diacetiltartarico	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 473	Sucresteri degli acidi grassi (esteri del saccarosio e degli acidi grassi alimentari)	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 474	Sucrogliceridi (miscela di sucresteri e di mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari)	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi alimentari non polimerizzati	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 477	Monoesteri del propilenglicol (1,2-propandiolo) e degli acidi grassi alimentari, soli o in miscela con diesteri	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 480	Acido stearoil-2-lattico	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 481	Stearoil-2-lattilato di sodio	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 482	Stearoil-2-lattilato di calcio	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 483	Tartrato di stearile	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 484	Ricinoleato di glicerina polietilene-glicole	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 486	Destrani	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 487	Esteri polietilene-glicoli di acidi grassi dell'olio di soia	—	Vitelli	—	—	6 000	Solo negli alimenti per allattamento	A tempo indeterminato
E 488	Esteri gliceropolietilene-glicoli di acidi grassi del sego	—	Vitelli	—	—	5 000	Solo negli alimenti per allattamento	A tempo indeterminato
E 489	Eteri del poliglicerolo con alcoli ottenuti per riduzione degli acidi oleico e palmitico	—	Vitelli	—	—	5 000	Solo negli alimenti per allattamento	A tempo indeterminato
E 490	1,2-Propandiolo	—	Vacche da latte	—	—	12 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Bovini da ingrasso	—	—	36 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Vitelli	—	—	36 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Agnelli	—	—	36 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Capretti	—	—	36 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Suini	—	—	36 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Pollame	—	—	36 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 491	Monostearato di sorbitano	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 492	Tristearato di sorbitano	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 493	Monolaurato di sorbitano	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 494	Monooleato di sorbitano	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 495	Monopalmitato di sorbitano	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 496	Polietilenglicol 6000	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	300	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 497	Polimeri del poliossipropilen-poliossietilene (M.W. 6 800-9 000)	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	50	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 498	Esteri parziali di poliglicerolo di acidi grassi di ricino policondensati	—	Cani	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 499	Gomma cassia	—	Cani	—	—	17 600	Alimenti con umidità superiore al 20 %	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	17 600	Alimenti con umidità superiore al 20 %	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
Coloranti compresi i pigmenti								
1. Carotenoidi e xantofille								
E 160c	Capsantina	C ₄₀ H ₅₆ O ₃	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—	A tempo indeterminato
E 160e	Beta-apo-8'-carotenale	C ₃₀ H ₄₀ O	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—	A tempo indeterminato
E 160f	Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenoico	C ₃₂ H ₄₄ O ₂	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—	A tempo indeterminato
E 161b	Luteina	C ₄₀ H ₅₆ O ₂	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—	A tempo indeterminato
E 161c	Criptoxantina	C ₄₀ H ₅₆ O	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 161g	Cantaxantina	C ₄₀ H ₅₂ O ₂	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—	A tempo indeterminato
			Salmoni e trote	—	—	80	Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall'età di 6 mesi. La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condizione che non superi la concentrazione di 100 mg/kg nell'alimento completo.	A tempo indeterminato
			Cani, gatti e pesci ornamentali	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 161h	Zeaxantina	C ₄₀ H ₅₆ O ₂	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—	A tempo indeterminato
E 161i	Citranaxantina	C ₃₃ H ₄₄ O	Galline ovaiole	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—	A tempo indeterminato
E 161j	Astaxantina	C ₄₀ H ₅₂ O ₄	Salmoni e trote	—	—	100	Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall'età di 6 mesi. La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condizione che non superi la concentrazione di 100 mg/kg nell'alimento completo.	A tempo indeterminato
			Pesci ornamentali	—	—	—	—	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
2. <i>Altri coloranti:</i>								
E 102	Tartrazina	C ₁₆ H ₉ N ₄ O ₉ S ₂ Na ₃	Pesci ornamentali	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 110	Giallo arancio FCF	C ₁₆ H ₁₀ N ₂ O ₇ S ₂ Na ₂	Pesci ornamentali	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 124	Ponceau 4 R	C ₂₀ H ₁₁ N ₂ O ₁₀ S ₃ Na ₃	Pesci ornamentali	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 127	Eritrosina	C ₂₀ H ₆ I ₄ O ₅ Na ₂ H ₂ O	Pesci ornamentali	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 131	Blu patentato V	Sale calcico dell'acido disolfonico dell'anidride dell'm-idrossitetra-etildiamino trifetil-carbinolo	Tutte le specie o categorie di animali ad eccezione dei cani e dei gatti	—	—	—	Consentito negli alimenti per gli animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari; ii) cereali o farine di manioca denaturati; o iii) altre materie di base denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione.	A tempo indeterminato
			Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 132	Indigotina	C ₁₆ H ₈ N ₂ O ₈ S ₂ Na ₂	Pesci ornamentali	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 141	Complesso rame-clorofilla	—	Pesci ornamentali	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 142	Verde acido brillante BS (verde lissamina)	Sale sodico dell'acido 4,4'-bis(dimetil-amino) difenilmetilene-2-naftolo-3,6-disulfonico	Tutte le specie o categorie di animali ad eccezione dei cani, dei gatti e dei pesci ornamentali	—	—	—	Consentito negli alimenti per gli animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari; ii) cereali o farine di manioca denaturati; o iii) altre materie di base denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione.	A tempo indeterminato
			Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Pesci ornamentali	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 153	Carbone vegetale	C	Pesci ornamentali	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 160 B	Bixina	C ₂₅ H ₃₀ O ₄	Pesci ornamentali	—	—	—	—	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 172	Ossido ferrico, rosso	Fe ₂ O ₃	Pesci ornamentali	—	—	—	—	A tempo indeterminato
	3. <i>Sostanze coloranti autorizzate dalle regolamentazioni comunitarie per colorare i prodotti alimentari, diverse da Blu patentato V e Verde acido brillante BS</i>	—	Tutte le specie o categorie di animali ad eccezione dei cani e dei gatti	—	—	—	Consentito negli alimenti per gli animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari; o ii) altre materie di base, ad eccezione dei cereali o delle farine di manioca, denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione.	A tempo indeterminato
			Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato

Conservanti

E 200	Acido sorbico	C ₆ H ₈ O ₂	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 201	Sorbato di sodio	C ₆ H ₇ O ₂ Na	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 202	Sorbato di potassio	C ₆ H ₇ O ₂ K	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 203	Sorbato di calcio	C ₁₂ H ₁₄ O ₄ Ca	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 214	4-idrossibenzoato di etile	C ₉ H ₁₀ O ₃	Animali da compagnia	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 215	Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di etile	C ₉ H ₉ O ₃ Na	Animali da compagnia	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 216	4-idrossibenzoato di propile	C ₁₀ H ₁₂ O ₃	Animali da compagnia	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 217	Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di propile	C ₁₀ H ₁₁ O ₃ Na	Animali da compagnia	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 218	4-idrossibenzoato di metile	C ₈ H ₈ O ₃	Animali da compagnia	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 219	Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di metile	C ₈ H ₇ O ₃ Na	Animali da compagnia	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 222	Bisolfito di sodio	NaHSO ₃	Cani	—	—	Isolatamente o in miscela con E 223: 500 espressi come SO ₂	Tutti gli alimenti per animali ad eccezione delle carni e dei pesci non trasformati	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	Isolatamente o in miscela con E 223: 500 espressi come SO ₂	Tutti gli alimenti per animali ad eccezione delle carni e dei pesci non trasformati	A tempo indeterminato
E 223	Metabisolfito di sodio	Na ₂ S ₂ O ₅	Cani	—	—	Isolatamente o in miscela con E 222: 500 espressi come SO ₂	Tutti gli alimenti per animali ad eccezione delle carni e dei pesci non trasformati	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	Isolatamente o in miscela con E 222: 500 espressi come SO ₂	Tutti gli alimenti per animali ad eccezione delle carni e dei pesci non trasformati	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 236	Acido formico	CH ₂ O ₂	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Le modalità d'uso devono recare la seguente indicazione: «È vietato l'impiego dell'acido formico, solo o quando rappresenta oltre il 50 % in peso della miscela con altri acidi, per la conservazione acida aerobica dei cereali grezzi umidi aventi un tenore di umidità superiore al 15 %».	A tempo indeterminato
E 237	Formiato di sodio	CHO ₂ Na	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 238	Formiato di calcio	C ₂ H ₂ O ₄ Ca	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 240	Formaldeide	CH ₂ O	Suini	6 mesi	—	—	Unicamente latte scremato: tenore massimo 600 mg/kg	A tempo indeterminato
			Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Unicamente per l'insilaggio	A tempo indeterminato
E 250	Nitrito di sodio	NaNO ₂	Cani	—	—	100	Alimenti con umidità superiore al 20 %	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	100	Alimenti con umidità superiore al 20 %	A tempo indeterminato
E 260	Acido acetico	C ₂ H ₄ O ₂	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 261	Acetato di potassio	C ₂ H ₃ O ₂ K	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 262	Diacetato di sodio	C ₄ H ₇ O ₄ Na	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 263	Acetato di calcio	C ₄ H ₆ O ₄ Ca	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 270	Acido lattico	C ₃ H ₆ O ₃	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 280	Acido propionico	C ₃ H ₆ O ₂	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 281	Propionato di sodio	C ₃ H ₅ O ₂ Na	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 282	Propionato di calcio	C ₆ H ₁₀ O ₄ Ca	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 283	Propionato di potassio	C ₃ H ₅ O ₂ K	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 284	Propionato di ammonio	C ₃ H ₉ O ₂ N	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 285	Acido metilpropionico	C ₄ H ₈ O ₂	Ruminanti all'inizio della ruminazione	—	1 000	4 000	—	A tempo indeterminato
E 295	Formiato di ammonio	CH ₅ O ₂ N	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 296	Acido DL-malico	C ₄ H ₆ O ₅	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 297	Acido fumarico	C ₄ H ₄ O ₄	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 325	Lattato di sodio	C ₃ H ₅ O ₃ Na	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 326	Lattato di potassio	C ₃ H ₅ O ₃ K	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 327	Lattato di calcio	C ₆ H ₁₀ O ₆ Ca	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 330	Acido citrico	C ₆ H ₈ O ₇	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 331	Citrati di sodio	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 332	Citrati di potassio	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 333	Citrati di calcio	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 334	Acido L-tartarico	C ₄ H ₆ O ₆	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 335	L-Tartrati di sodio	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 336	L-Tartrati di potassio	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 337	L-Tartrato doppio di sodio e di potassio	C ₄ H ₄ O ₆ KNa . 4H ₂ O	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 338	Acido ortofosforico	H ₃ PO ₄	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 490	1,2-Propandiolo	C ₃ H ₈ O ₂	Cani	—	—	53 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 507	Acido cloridrico	HCl	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Unicamente per l'insilaggio	A tempo indeterminato
E 513	Acido solforico	H ₂ SO ₄	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Unicamente per l'insilaggio	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo iu/kg di alimento completo o della razione giornaliera	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
-------	----------	------------------------------	---------------------------------------	-------------	---	--------------------	------------------------------------

Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite

E 672	1. Vitamina A	—	Polli da ingrasso	—	13 500	Tutti gli alimenti per animali tranne quelli destinati ad animali giovani	A tempo indeterminato
			Anatre da ingrasso	—	13 500	Tutti gli alimenti per animali tranne quelli destinati ad animali giovani	A tempo indeterminato
			Tacchini da ingrasso	—	13 500	Tutti gli alimenti per animali tranne quelli destinati ad animali giovani	A tempo indeterminato
			Agnelli da ingrasso	—	13 500	Tutti gli alimenti per animali tranne quelli destinati ad animali giovani	A tempo indeterminato
			Suini da ingrasso	—	13 500	Tutti gli alimenti per animali tranne quelli destinati ad animali giovani	A tempo indeterminato
			Bovini da ingrasso	—	13 500	Tutti gli alimenti per animali tranne quelli destinati ad animali giovani	A tempo indeterminato
			Vitelli da ingrasso	—	25 000	Solo negli alimenti per allattamento	A tempo indeterminato
			Altre specie o categorie di animali	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 670	2. Vitamina D Vitamina D ₂	—	Suini	—	2 000	Somministrazione simultanea di vitamina D ₃ vietata	A tempo indeterminato
			Suinetti	—	10 000	Solo negli alimenti per allattamento Somministrazione simultanea di vitamina D ₃ vietata	A tempo indeterminato
			Bovini	—	4 000	Somministrazione simultanea di vitamina D ₃ vietata	A tempo indeterminato
			Ovini	—	4 000	Somministrazione simultanea di vitamina D ₃ vietata	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo iu/kg di alimento completo o della razione giornaliera	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
			Vitelli	—	10 000	Solo negli alimenti per allattamento Somministrazione simultanea di vitamina D ₃ vietata	A tempo indeterminato
			Equidi	—	4 000	Somministrazione simultanea di vitamina D ₃ vietata	A tempo indeterminato
			Altre specie o categorie di animali ad eccezione del pollame e dei pesci	—	2 000	Somministrazione simultanea di vitamina D ₃ vietata	A tempo indeterminato
E 671	Vitamina D ₃	—	Suini	—	2 000	Somministrazione simultanea di vitamina D ₂ vietata	A tempo indeterminato
			Suinetti	—	10 000	Solo negli alimenti per allattamento Somministrazione simultanea di vitamina D ₂ vietata	A tempo indeterminato
			Bovini	—	4 000	Somministrazione simultanea di vitamina D ₂ vietata	A tempo indeterminato
			Ovini	—	4 000	Somministrazione simultanea di vitamina D ₂ vietata	A tempo indeterminato
			Vitelli	—	10 000	Solo negli alimenti per allattamento Somministrazione simultanea di vitamina D ₂ vietata	A tempo indeterminato
			Equidi	—	4 000	Somministrazione simultanea di vitamina D ₂ vietata	A tempo indeterminato
			Polli da ingrasso	—	5 000	Somministrazione simultanea di vitamina D ₂ vietata	A tempo indeterminato
			Tacchini	—	5 000	Somministrazione simultanea di vitamina D ₂ vietata	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo iu/kg di alimento completo o della razione giornaliera	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
			Altro pollame	—	3 000	Somministrazione simultanea di vitamina D ₂ vietata	A tempo indeterminato
			Pesce	—	3 000	Somministrazione simultanea di vitamina D ₂ vietata	A tempo indeterminato
			Altre specie o categorie di animali	—	2 000	Somministrazione simultanea di vitamina D ₂ vietata	A tempo indeterminato
	3. Tutte le sostanze del gruppo, ad eccezione delle vitamine A e D	—	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato

N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
-------	----------	----------	-----------------	--	--------------------	------------------------------------

Oligoelementi

E 1	Ferro — Fe	Carbonato ferroso	FeCO ₃	1 250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Cloruro ferroso, tetraidrato	FeCl ₂ · 4H ₂ O	1 250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Cloruro ferrico, esaidrato	FeCl ₃ · 6H ₂ O	1 250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Citrato ferroso, esaidrato	Fe ₃ (C ₆ H ₅ O ₇) ₂ · 6H ₂ O	1 250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Fumarato ferroso	FeC ₄ H ₂ O ₄	1 250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Lattato ferroso, triidrato	Fe(C ₃ H ₅ O ₃) ₂ · 3H ₂ O	1 250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Ossido ferrico	Fe ₂ O ₃	1 250 (in totale)	—	A tempo indeterminato

N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
		Solfato ferroso, monoidrato	$\text{FeSO}_4\text{H}_2\text{O}$	1 250 (in totale)	Consentito: i) nel latte scremato in polvere denaturato e negli alimenti composti fabbricati a partire dal latte scremato in polvere sottoposto a denaturazione: — rispetto delle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 368/77 e (CE) n. 443/77 della Commissione, — indicazione, sull'etichetta, sull'imballaggio o sul recipiente del latte scremato in polvere denaturato, del quantitativo di ferro aggiunto, espresso come elemento; ii) negli alimenti composti diversi da quelli di cui al punto i).	A tempo indeterminato
		Solfato ferroso, eptaidrato	$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	1 250 (in totale)	Consentito: i) nel latte scremato in polvere denaturato e negli alimenti composti fabbricati a partire dal latte scremato in polvere sottoposto a denaturazione: — rispetto delle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 368/77 e (CE) n. 443/77 della Commissione, — indicazione, sull'etichetta, sull'imballaggio o sul recipiente del latte scremato in polvere denaturato, del quantitativo di ferro aggiunto, espresso come elemento; ii) negli alimenti composti diversi da quelli di cui al punto i).	A tempo indeterminato

N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
		Chelato ferroso di aminoacidi, idrato	$\text{Fe}(x)_{1-3} \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (x = anione di qualsiasi aminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare non superiore a 1 500	1 250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
E 2	Iodio — I	Iodato di calcio, esaidrato	$\text{Ca}(\text{IO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	Equidi: 4 (in totale) Pesce: 20 (in totale) Altre specie o categorie di animali: 10 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Iodato di calcio, anidro	$\text{Ca}(\text{IO}_3)_2$	Equidi: 4 (in totale) Pesce: 20 (in totale) Altre specie o categorie di animali: 10 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Ioduro di sodio	Nal	Equidi: 4 (in totale) Pesce: 20 (in totale) Altre specie o categorie di animali: 10 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Ioduro di potassio	KI	Equidi: 4 (in totale) Pesce: 20 (in totale) Altre specie o categorie di animali: 10 (in totale)	—	A tempo indeterminato
E 3	Cobalto — Co	Acetato di cobalto, tetraidrato	$\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	10 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Carbonato basico di cobalto, monoidrato	$2\text{CoCO}_3 \cdot 3\text{Co}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	10 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Cloruro di cobalto, esaidrato	$\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	10 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Solfato di cobalto, eptaidrato	$\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	10 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Solfato di cobalto, monoidrato	$\text{CoSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	10 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Nitrato di cobalto, esaidrato	$\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	10 (in totale)	—	A tempo indeterminato

N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
E 4	Rame — Cu	Acetato di rame, monoidrato	$\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Suini da ingrasso: — negli Stati membri in cui la densità media della popolazione suina è pari o superiore a 175 capi per 100 ha di superficie agricola utilizzata — fino a 16 settimane: 175 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Carbonato basico di rame, monoidrato	$\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	— dalla 17 ^a settimana alla macellazione: 35 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Cloruro rameico, diidrato	$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	— negli Stati membri in cui la densità media della popolazione suina è inferiore a 175 capi per 100 ha di superficie agricola utilizzata: — fino a 16 settimane: 175 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Metionato di rame	$\text{Cu}(\text{C}_5\text{H}_{10}\text{NO}_2\text{S})_2$	— dalla 17 ^a settimana a 6 mesi: 100 (in totale) — da 6 mesi alla macellazione: 35 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Ossido rameico	CuO	Suini da produzione: 35 (in totale) Vitelli: — alimenti per allattamento 30 (in totale) — altri alimenti completi: 50 (in totale) Ovini: 15 (in totale) Altre specie o categorie di animali: 35 (in totale).	—	A tempo indeterminato
		Solfato rameico, pentaidrato	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$			

N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
		Solfato rameico, monoidrato	$\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Suini da ingrasso: — negli Stati membri in cui la densità media della popolazione suina è pari o superiore a 175 capi per 100 ha di superficie agricola utilizzata: — fino a 16 settimane: 175 (in totale) — dalla 17^a settimana alla macellazione: 35 (in totale) — negli Stati membri in cui la densità media della popolazione suina è inferiore a 175 capi per 100 ha di superficie agricola utilizzata: — fino a 16 settimane: 175 (in totale) — dalla 17^a settimana a 6 mesi: 100 (in totale) — da 6 mesi alla macellazione: 35 (in totale) Suini da produzione: 35 (in totale) Ovini: 15 (in totale). Altre specie o categorie di animali ad eccezione dei vitelli: 35 (in totale)	Latte scremato in polvere denaturato ed alimenti composti fabbricati a partire dal latte scremato in polvere sottoposto a: — rispetto delle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 368/77 e (CE) n. 443/77 della Commissione, — indicazione, sull'etichetta, sull'imballaggio o sul recipiente del latte scremato in polvere denaturato, del quantitativo di rame aggiunto, espresso come elemento.	A tempo indeterminato
		Solfato rameico, pentaidrato	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$			

N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
		Chelato rameico di amminoacidi, idrato	$\text{Cu (x)}_{1-3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1 500.	Suini da ingrasso: — negli Stati membri in cui la densità media della popolazione suina è pari o superiore a 175 capi per 100 ha di superficie agricola utilizzata: — fino a 16 settimane: 175 (in totale) — dalla 17^a settimana alla macellazione: 35 (in totale) — negli Stati membri in cui la densità media della popolazione suina è inferiore a 175 capi per 100 ha di superficie agricola utilizzata: — fino a 16 settimane: 175 (in totale) — dalla 17^a settimana a 6 mesi: 100 (in totale) — da 6 mesi alla macellazione: 35 (in totale) Suini da produzione: 35 (in totale) Altre specie o categorie di animali, ad esclusione di vitelli prima dell'inizio della ruminazione e di ovini: 35 (in totale)	Una quantità massima di 20 mg/kg di rame nell'alimento completo può provenire da chelato rameico di amminoacidi, idrato	A tempo indeterminato

N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
E 5	Manganese — Mn	Carbonato manganoso	MnCO_3	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Cloruro manganoso, tetraidrato	$\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Fosfato acido di manganese, triidrato	$\text{MnHPO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Ossido manganoso	MnO	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Ossido manganico	Mn_2O_3	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Solfato manganoso, tetraidrato	$\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Solfato manganoso, monoidrato	$\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Chelato di manganese di amminoacidi, idrato	$\text{Mn (x)}_{1-3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1 500.	250 (in totale)	Una quantità massima di 40 mg/kg di manganese nell'alimento completo può provenire da chelato di manganese di amminoacidi, idrato	A tempo indeterminato

N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
E 6	Zinco — Zn	Lattato di zinco, triidrato	$\text{Zn}(\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Acetato di zinco, diidrato	$\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Carbonato di zinco	ZnCO_3	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Cloruro di zinco, monoidrato	$\text{ZnCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Ossido di zinco	ZnO	250 (in totale)	Tenore massimo di piombo: 600 mg/kg	A tempo indeterminato
		Solfato di zinco, eptaidrato	$\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Solfato di zinco, monoidrato	$\text{ZnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Chelato di zinco di aminoacidi, idrato	$\text{Zn}(\text{x})_{1-3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (x = anione di qualsiasi aminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1 500.	250 (in totale)	Una quantità massima di 80 mg/kg di zinco nell'alimento completo può provenire da chelato di zinco di aminoacidi, idrato	A tempo indeterminato
E 7	Molibdeno — Mo	Molibdato di ammonio	$(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	2,5 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Molibdato di sodio	$\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	2,5 (in totale)	—	A tempo indeterminato
E 8	Selenio — Se	Selenito di sodio	Na_2SeO_3	0,5 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Seleniato di sodio	Na_2SeO_4	0,5 (in totale)	—	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti								
E 330	Acido citrico	C ₆ H ₈ O ₇	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali. Rispetto delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera g)	A tempo indeterminato
E 470	Stearati di sodio, di potassio e di calcio	C ₁₈ H ₃₅ O ₂ Na C ₁₈ H ₃₅ O ₂ K C ₃₆ H ₇₀ O ₄ Ca Tenore massimo in diossine: ⁽⁵⁾	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 516	Solfato di calcio diidrato	CaSO ₄ · 2H ₂ O Tenore massimo in diossine: ⁽⁵⁾	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	30 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 551a	Acido silicico precipitato ed essiccato	— Tenore massimo in diossine: ⁽⁵⁾	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 551b	Silice colloidale	— Tenore massimo in diossine: ⁽⁵⁾	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 551c	<i>Kieselgur</i> (terra di diatomee purificate)	— Tenore massimo in diossine: ⁽⁵⁾	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 552	Silicato di calcio sintetico	— Tenore massimo in diossine: ⁽⁵⁾	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 554	Silicato di sodio e di alluminio, sintetico	— Tenore massimo in diossine: ⁽⁵⁾	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 558	Bentonite-Montmorillonite	— Tenore massimo in diossine: ⁽⁵⁾	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	20 000	Tutti gli alimenti per animali. La miscela con additivi dei gruppi degli «antibiotici», «fattori di crescita», «coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» è vietata tranne per quanto riguarda i seguenti: monensinsodio, narasin, lasalocid-sodio, flavofosfolipol, salinomicina sodica, nicarbazina e robenidina. Indicazione sull'etichetta del nome specifico dell'additivo.	A tempo indeterminato
E 559	Argilla caolinitica esente da amianto	Miscela naturale di minerali contenente almeno il 65 % di silicati complessi di alluminio idratati con presenza determinante di caolino Tenore massimo in diossine: 500 pg OMS-PCCD/F-TEQ/kg ⁽⁶⁾	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 560	Miscela naturale di stearati e clorite	Miscela naturale di steatite e clorite esente da amianto con una purezza minima dell'85 %	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 561	Vermiculite	Silicato naturale di magnesio, di alluminio e di ferro, espanso mediante riscaldamento, esente da amianto Tenore massimo in fluoro: 0,3 % Tenore massimo in diossine: ⁽⁵⁾	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 562	Sepiolite	Silicato di magnesio idratato di origine sedimentaria contenente almeno il 60 % di sepiolite e il 30 % al massimo di montmorillonite, esente da amianto	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	20 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 563	Argilla sepiolitica	Silicato di magnesio idratato di origine sedimentaria contenente almeno il 40 % di sepiolite e il 25 % di illite, esente da amianto	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	20 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 565	Lignosolfati	— Tenore massimo in diossine: ⁽⁵⁾	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 566	Natrolite-fonolite	Miscela naturale di silicati di alluminio, idrosilicati alcalini, alcalino-terrosi e di alluminio, natrolite (43-46,5 %) e feldspato Tenore massimo in diossine: ⁽⁵⁾	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	25 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 598	Aluminati di calcio sintetico	Miscele di aluminati di calcio con un tenore da 35 a 51 % di Al ₂ O ₃ Tenore massimo in molibdeno: 20 mg/kg Tenore massimo in diossine: ⁽⁵⁾	Pollame	—	—	20 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Conigli	—	—	20 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Suini	—	—	20 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Vacche da latte	—	—	8 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Bovini da ingrasso	—	—	8 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Vitelli	—	—	8 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Agnelli	—	—	8 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Capretti	—	—	8 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 599	Perlite	Silicato naturale di sodio e di alluminio, espanso per riscaldamento, esente da amianto Tenore massimo in diossine: ⁽⁵⁾	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	—	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato

Regolatori dell'acidità

E 170	Carbonato di calcio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
296	Acidi DL- e L-malico	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
—	Diidrogenoortofosfato di ammonio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
—	Idrogenoortofosfato di diammonio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 339 (i)	Diidrogenoortofosfato di sodio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 339 (ii)	Idrogenoortofosfato di disodio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 339 (iii)	Ortofosfato trisodico	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 340 (i)	Diidrogenoortofosfato di potassio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 340 (ii)	Idrogenoortofosfato di dipotassio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 340 (iii)	Ortofosfato tripotassico	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 341 (i)	Tetraidrodiorotofosfato di calcio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 341 (ii)	Idrogenoortofosfato di calcio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 350 (i)	Malato di sodio (sale dell'acido DL-malico o dell'acido L-malico)	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 450a (i)	Diidrogenodifosfato di disodio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 450a (iii)	Difosfato di tetrasodio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 450a (iv)	Difosfato di tetrapotassio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 450b (i)	Trifosfato di pentasodio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 450b (ii)	Trifosfato di pentapotassio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 500 (i)	Carbonato di sodio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 500 (ii)	Carbonato acido di sodio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 500 (iii)	Sesquicarbonato di sodio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 501 (ii)	Carbonato acido di potassio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 503 (i)	Carbonato di ammonio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 503 (ii)	Bicarbonato di ammonio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 507	Acido cloridrico	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 510	Cloruro di ammonio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 513	Acido solforico	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
E 524	Idrossido di sodio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 525	Idrossido di potassio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 526	Idrossido di calcio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 529	Ossido di calcio	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
E 540	Difosfato dicalcico	—	Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
Enzimi								
E 1600	3-fitasi CE 3.1.3.8	Preparato di 3-fitasi prodotto dall' <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94) avente un'attività minima di: in forma solida: 5 000 FTU (²)/g in forma liquida: 5 000 FTU/ml	Suinetti	2 mesi	500 FTU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500 FTU. 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,23 % di fosforo legato alla fitina.	A tempo indeterminato
			Suini da ingrasso	—	280 FTU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 400-500 FTU. 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,23 % di fosforo legato alla fitina.	A tempo indeterminato
			Scrofe	—	500 FTU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500 FTU. 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,36 % di fosforo legato alla fitina.	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Polli da ingrasso	—	375 FTU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500-700 FTU. 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,23 % di fosforo legato alla fitina.	A tempo indeterminato
			Galline ovaiole	—	250 FTU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 300-400 FTU. 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,23 % di fosforo legato alla fitina.	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di alimento completo			

Microorganismi

E 1700	<i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749) <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750) (In un rapporto di 1/1)	Miscela di <i>Bacillus licheniformis</i> e <i>Bacillus subtilis</i> contenente un minimo di 3,2 x 10 ⁹ CFU/g dell'additivo (1,6 x 10 ⁹ CFU/g di ciascun batterio)	Suinetti	2 mesi	1,28 x 10 ⁹	3,2 x 10 ⁹	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	A tempo indeterminato
--------	--	---	----------	--------	------------------------	-----------------------	---	-----------------------

N. (ovvero N. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			

Leganti di radionuclidi

1. Leganti di cesio radioattivo (^{137}Cs e ^{134}Cs)

1.1.	Esacianoferrato (II) di ammonio ferrico (III)	$\text{NH}_4\text{Fe(III)[Fe(II)(CN)}_6]$	Ruminanti (domestici e selvatici)	—	50	500	Indicare nelle istruzioni d'uso: «Solo per aree geografiche limitate in caso di contaminazione da radionuclidi». «La quantità di esacianoferrato (II) di ammonio ferrico (III) nella razione giornaliera deve essere compresa tra 10 mg e 150 mg per 10 kg di peso animale».	A tempo indeterminato
			Vitelli prima dell'inizio della ruminazione	—	50	500	Indicare nelle istruzioni d'uso: «Solo per aree geografiche limitate in caso di contaminazione da radionuclidi». «La quantità di esacianoferrato (II) di ammonio ferrico (III) nella razione giornaliera deve essere compresa tra 10 mg e 150 mg per 10 kg di peso animale».	A tempo indeterminato
			Agnelli prima dell'inizio della ruminazione	—	50	500	Indicare nelle istruzioni d'uso: «Solo per aree geografiche limitate in caso di contaminazione da radionuclidi». «La quantità di esacianoferrato (II) di ammonio ferrico (III) nella razione giornaliera deve essere compresa tra 10 mg e 150 mg per 10 kg di peso animale».	A tempo indeterminato

N. (ovvero N. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
			Capretti prima dell'inizio della ruminazione	—	50	500	Indicare nelle istruzioni d'uso: «Solo per aree geografiche limitate in caso di contaminazione da radionuclidi». «La quantità di esacioferrato (II) di ammonio ferrico (III) nella razione giornaliera deve essere compresa tra 10 mg e 150 mg per 10 kg di peso animale».	A tempo indeterminato
			Suini (domestici e selvatici)	—	50	500	Indicare nelle istruzioni d'uso: «Solo per aree geografiche limitate in caso di contaminazione da radionuclidi». «La quantità di esacioferrato (II) di ammonio ferrico (III) nella razione giornaliera deve essere compresa tra 10 mg e 150 mg per 10 kg di peso animale».	A tempo indeterminato

CAPITOLO IV: ELENCO DI ALTRI ADDITIVI AUTORIZZATI A TITOLO PROVVISORIO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A QUATTRO O CINQUE ANNI NEL CASO DI ADDITIVI CHE SIANO STATI OGGETTO DI UN'AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA PRIMA DEL 1° APRILE 1998

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			

Coloranti compresi pigmenti

1. Carotenoidi e xantofille

E 160a	Beta-carotene	C ₄₀ H ₅₆	Canarini	—	—	—	—	14.12.2003 (*)
E 161g	Cantaxantina	C ₄₀ H ₅₂ O ₂	Uccelli da compagnia e ornamentali	—	—	—	—	14.12.2003 (*)
12	<i>Phaffia rhodozyma</i> a forte tenore di astaxantina (ATCC 74219)	Biomassa concentrata del lievito <i>Phaffia rhodozyma</i> (ATCC 74219), inattivo, contenente almeno 4,0 g astaxantina per kilogrammo di additivo e con un tenore massimo di etossichina di 2 000 mg/kg.	Salmoni	—	—	100	Il tenore massimo riportato è espresso in astaxantina. Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall'età di 6 mesi.. La miscela dell'additivo con la cantaxantina è ammessa solo se la quantità totale di astaxantina e di cantaxantina non supera i 100 mg/kg di alimento completo. Dichiarare il tenore di etossichina.	14.12.2003 (*)
			Trote	—	—	100	Il tenore massimo riportato è espresso in astaxantina. Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall'età di 6 mesi. La miscela dell'additivo con la cantaxantina è ammessa solo se la quantità totale di astaxantina e di cantaxantina non supera i 100 mg/kg di alimento completo. Dichiarare il tenore di etossichina.	14.12.2003 (*)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
2. <i>Altri coloranti:</i>								
E 102	Tartrazina	C ₁₆ H ₉ N ₄ O ₉ S ₂ Na ₃	Uccelli ornamentali alimentati con cereali	—	—	150	—	30.9.2004 ^(P)
			Piccoli roditori	—	—	150	—	30.9.2004 ^(P)
E 110	Giallo tramonto FCF	C ₁₆ H ₁₀ N ₂ O ₇ S ₂ Na ₂	Uccelli ornamentali alimentati con cereali	—	—	150	—	30.9.2004 ^(P)
			Piccoli roditori	—	—	150	—	30.9.2004 ^(P)
E 131	Blu per alimenti V	Sale di calcio dell'acido disulfonico dell'anidride m-idrossitetraetildiammino trifenilcarbinolo	Uccelli ornamentali alimentati con cereali	—	—	150	—	30.9.2004 ^(P)
			Piccoli roditori	—	—	150	—	30.9.2004 ^(P)
E 141	Complesso rame-clorofilla	—	Uccelli ornamentali alimentati con cereali	—	—	150	—	30.9.2004 ^(P)
			Piccoli roditori	—	—	150	—	30.9.2004 ^(P)

N. (ovvero n. CE)	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
Oligoelementi						
E4	Rame — Cu	Solfato di rame-lisina	$\text{Cu}(\text{C}_6\text{H}_{13}\text{N}_2\text{O}_2)_2\cdot\text{SO}_4$	Suini da ingrasso: — negli Stati membri in cui la densità media della popolazione suina è pari o superiore a 175 capi per 100 ha di superficie agricola utilizzata: — fino a 16 settimane: 175 (totale) — negli Stati membri in cui la densità media della popolazione suina è inferiore a 175 capi per 100 ha di superficie agricola utilizzata: — fino a 16 settimane: 175 (totale)	Una quantità massima di 50 mg di rame per kg di alimento completo può provenire da solfato di rame-lisina	31.3.2004 ^(d)
				Suini da ingrasso: — negli Stati membri in cui la densità media della popolazione suina è pari o superiore a 175 capi per 100 ha di superficie agricola utilizzata: — dalla 17^a settimana sino alla macellazione: 35 (totale) — negli Stati membri in cui la densità media della popolazione suina è inferiore a 175 capi per 100 ha di superficie agricola utilizzata: — dalla 17^a settimana a 6 mesi: 100 (in totale) — da sei mesi alla macellazione: 35 (in totale) Suini da riproduzione: 35 (in totale) Altre specie o categorie di animali, ad esclusione dei vitelli prima dell'inizio della ruminazione e degli ovini: 35 (in totale)	Una quantità massima di 25 mg di rame per kg di alimento completo può provenire da solfato di rame-lisina	31.3.2004 ^(d)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti								
3	Clinoptilolite di origine vulcanica	Alluminosilicato d'idrato di calcio di origine vulcanica contenente un quantitativo minimo di 85 % di clinoptilolite e un massimo del 15 % feldspati, miche e argille esenti da fibre e da quarzo Tenore massimo di piombo: 80 mg/kg	Suini	—	—	20 000	Tutti gli alimenti per animali	21.4.2004 ^(e)
			Conigli	—	—	20 000	Tutti gli alimenti per animali	21.4.2004 ^(e)
			Volatili	—	—	20 000	Tutti gli alimenti per animali	21.4.2004 ^(e)
4	Clinoptilolite di origine sedimentaria	Alluminosilicato d'idrato di calcio di origine sedimentaria contenente un quantitativo minimo dell'80 % di clinoptilolite e un massimo del 20 % di minerali argillosi esenti da fibre e da quarzo. Tenore massimo di diossine: ^(f)	Suini da ingrasso	—	—	20 000	Tutti gli alimenti per animali	26.9.2004 ⁽ⁿ⁾
			Polli da ingrasso	—	—	20 000	Tutti gli alimenti per animali	26.9.2004 ⁽ⁿ⁾
			Tacchini da ingrasso	—	—	20 000	Tutti gli alimenti per animali	26.9.2004 ⁽ⁿ⁾
			Bovini	—	—	20 000	Tutti gli alimenti per animali	26.9.2004 ⁽ⁿ⁾
			Salmone	—	—	20 000	Tutti gli alimenti per animali	26.9.2004 ⁽ⁿ⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
Enzimi								
1	3-fitasi EC 3.1.3.8	Preparato di 3-fitasi prodotto dall' <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94) avente un'attività minima di fitasi di 5 000 FTU ⁽⁷⁾ /g per i preparati solidi e liquidi	Tacchini	—	125 FTU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 200-800 FTU 3. Da utilizzare negli alimenti composti con un tenore minimo di 0,3 % di fitato, come ad esempio il 20 % di frumento.	14.12.2003 ⁽⁹⁾
2	3-Fitasi EC 3.1.3.8	Preparato di 3-fitasi prodotto dall' <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10 289) avente un'attività minima di: Presentazione rivestita: 2 500 FYT ⁽⁷⁾ /g Liquido: 5 000 FYT/g	Suinetti	4 mesi	250 FYT	1 000 FYT	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500 FYT 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di fitati, contenenti ad esempio oltre il 40 % di cereali (granturco, orzo, avena, frumento, segala, tritcale), semi oleosi e leguminose.	30.6.2004 ⁽⁹⁾
			Suini da ingrasso	—	400 FYT	1 000 FYT	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500 FYT. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di fitati, contenenti ad esempio oltre il 40 % di cereali (granturco, orzo, avena, frumento, segala, tritcale), semi oleosi e leguminose.	30.6.2004 ⁽⁹⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Polli da ingrasso	—	200 FYT	1 000 FYT	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500 FYT 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di fitati, contenenti ad esempio oltre il 40 % di cereali (granturco, orzo, avena, frumento, segala, triticales), semi oleosi e leguminose.	30.6.2004 ^(f)
			Galline ovaiole	—	500 FYT	1 000 FYT	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 750 FYT. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di fitati, contenenti ad esempio oltre il 40 % di cereali (granturco, orzo, avena, frumento, segala, triticales), semi oleosi e leguminose.	30.6.2004 ^(g)
3	Alfa-galattosidasi EC 3.2.1.22	Preparato di alfa-galattosidasi prodotto da <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10 286) avente un'attività minima di: Liquido: 1 000 GALU ⁽⁸⁾ /g	Polli da ingrasso	—	300 GALU	1 000 GALU	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 450 GALU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di oligosaccaridi, contenenti ad esempio oltre il 25 % di farina di soia, pannelli di semi di cotone, piselli.	30.6.2004 ^(f)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
4	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94) avente un'attività minima di: Presentazione rivestita: 50 FBG ⁽⁹⁾ /g Liquido: 120 FBG/ml	Suinetti	4 mesi	25 FBG	40 FBG	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 25 FBG. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di orzo o granturco.	30.6.2004 ^(f)
			Polli da ingrasso	—	10 FBG	100 FBG	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 20 FBG. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di orzo.	1.4.2004 ^(f)
5	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10287) avente un'attività minima di: Presentazione rivestita: 1 000 FXU ⁽¹⁰⁾ /g Liquido: 650 FXU/ml	Polli da ingrasso	—	80 FXU	200 FXU	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 150 FXU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di frumento.	30.6.2004 ^(f)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Tacchini da ingrasso	—	225 FXU	600 FXU	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 225-600 FXU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di frumento.	30.6.2004 ^(f)
			Suinetti	4 mesi	200 FXU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 200 FXU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di frumento.	30.6.2004 ^(f)
6	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotti da <i>Humicola insolens</i> (DSM 10442) avente un'attività minima di: Confettato: 800 FXU ⁽¹¹⁾ /g 75 FBG ⁽⁹⁾ /g Microgranulato: 800 FXU/g 75 FBG/g Liquido: 550 FXU/ml 50 FBG/ml	Polli da ingrasso	—	200 FXU 19 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 400 FXU 38 FBG. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di orzo e/o avena, frumento.	30.6.2004 ^(f)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Suinetti	4 mesi	240 FXU 22 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 400 FXU 38 FBG. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di orzo e/o avena, frumento.	30.6.2004 ^(f)
			Suini da ingrasso	—	200 FXU 19 FBG	800 FXU 75 FBG	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 400 FXU 38 FBG. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di orzo e/o avena, frumento.	30.6.2004 ^(h)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
7	Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glu- canasi EC 3.2.1.4	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,4-beta-glucanasi pro- dotto da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94) avente un'attività minima di: Confettato: 36 000 FXU (¹²)/g 15 000 BGU (¹³)/g Liquido: 36 000 FXU/g 15 000 BGU/g	Polli da ingrasso	—	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 3 600-6 000 FXU 1 500-2 500 BGU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di orzo e il 20 % di frumento.	1.4.2004 (¹)
			Suinetti	4 mesi	6 000 FXU 2 500 BGU	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 6 000 FXU 2 500 BGU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento e il 30 % di orzo.	1.4.2004 (¹)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Tacchini da ingrasso	—	6 000 FXU 2 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 6 000-12 000 FXU 2 500-5 000 BGU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.	1.4.2004 ⁽¹⁾
			Galline ovaiole	—	12 000 FXU 5 000 BGU	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 12 000 FXU 5 000 BGU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 20 % frumento, il 10 % di orzo e il 20 % di semi di girasole.	1.4.2004 ⁽¹⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
		Preparato di endo-1,4-beta-gluca- nasi e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotti da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94) avente un'attività minima di: Solido: 36 000 FXU ⁽¹²⁾ /g 15 000 BGU ⁽¹³⁾ /g	Polli da ingrasso	—	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 3 600-6 000 FXU 1 500-2 500 BGU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 35 % di orzo e il 20 % di grano.	30.9.2004 ^(P)
			Suinetti	4 mesi	6 000 FXU 2 500 BGU	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 6 000 FXU 2 500 BGU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di orzo e il 30 % di frumento.	30.9.2004 ^(P)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Tacchini da ingrasso	—	6 000 FXU 2 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 6 000-12 000 FXU 2 500-5 000 BGU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.	30.9.2004 ^(P)
			Galline ovaiole	—	12 000 FXU 5 000 BGU	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 12 000 FXU 5 000 BGU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di frumento, il 10 % di orzo e il 20 % di semi di girasole.	30.9.2004 ^(P)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
8	Endo-1,4-beta-glu- canasi EC 3.2.1.4 Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-gluca- nasi e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotti da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94) avente un'attività minima di: Confettato: 10 000 BGU ⁽¹³⁾ /g 4 000 FXU ⁽¹²⁾ /g Liquido: 20 000 BGU/g 8 000 FXU/g	Polli da ingrasso	—	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 3 000-10 000 BGU 1 200-4 000 FXU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di orzo.	1.4.2004 ⁽¹⁾
			Suinetti	4 mesi	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 3 000-5 000 BGU 1 200-2 000 FXU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di orzo.	1.4.2004 ⁽¹⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Galline ovaiole	—	5 000 BGU 2 000 FXU	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 5 000 BGU 2 000 FXU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di orzo.	1.4.2004 ^(f)
		Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotti da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94) avente un'attività minima di: Solido: 20 000 BGU ⁽¹³⁾ /g 8 000 FXU ⁽¹²⁾ /g	Polli da ingrasso	—	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 3 000-10 000 BGU 1 200-4 000 FXU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di orzo.	30.9.2004 ^(p)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Suinetti	4 mesi	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 3 000-5 000 BGU 1 200-2 000 FXU 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di orzo.	30.9.2004 ^(P)
			Galline ovaiole	—	5 000 BGU 2 000 FXU	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 5 000 BGU 2 000 FXU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di orzo.	30.9.2004 ^(P)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
9	Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 270.95) avente un'attività minima di: Solido: 28 000 EXU ⁽¹⁴⁾ /g Liquido: 14 000 EXU/ml	Polli da ingrasso	—	1 400 EXU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 1 400 EXU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di frumento.	30.6.2004 ^(f)
			Galline ovaiole	—	2 400 EXU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 2 400-7 400 EXU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento e il 30 % di segale.	1.4.2004 ^(f)
			Tacchini da ingrasso	—	2 400 EXU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 2 400-5 600 EXU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento e il 30 % di segale.	1.4.2004 ^(f)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
10	Alfa-amilasi EC 3.2.1.1	Preparato di alfa-amilasi prodotto da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (CBS 360.94) avente un'attività minima di: Solido: 45 000 RAU (¹⁵)/g Liquido: 20 000 RAU/ml	Suinetti	4 mesi	1 800 RAU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 1 800 RAU. 3. Da utilizzare esclusivamente in alimenti composti per sistemi di alimentazione liquida e contenenti materie prime ricche di amido (ad esempio contenenti oltre il 35 % di frumento).	30.6.2004 ^(f)
			Suini da ingrasso	—	1 800 RAU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 1 800 RAU. 3. Da utilizzare esclusivamente in alimenti composti per sistemi di alimentazione liquida e contenenti materie prime ricche di amido (ad esempio contenenti oltre il 35 % di frumento).	30.6.2004 ^(f)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Scrofe	—	1 800 RAU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 1 800 RAU. 3. Da utilizzare esclusivamente in alimenti composti per sistemi di alimentazione liquida e contenenti materie prime ricche di amido (ad esempio contenenti oltre il 35 % di frumento).	30.6.2004 ^(f)
11	Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 74 252) con un'attività minima di: Liquido: Endo-1,4-beta-glucanasi: 8 000 U ⁽¹⁶⁾ /ml Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 18 000 U ⁽¹⁷⁾ /ml Endo-1,4-beta-xilanasi: 26 000 U ⁽¹⁸⁾ /ml	Polli da ingrasso	—	endo-1,4-beta-glucanasi: 400 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 900 U endo-1,4-beta-xilanasi: 1 300 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,4-beta-glucanasi: 400-1 600 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 900-3 600 U endo-1,4-beta-xilanasi: 1 300-5 200 U. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento o di orzo e il 10 % di segala.	30.6.2004 ^(f)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
		Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 74 252) con un'attività minima di: In granuli: Endo-1,4-beta-glucanasi: 8 000 U ⁽¹⁶⁾ /g Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 18 000 U ⁽¹⁷⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanasi: 26 000 U ⁽¹⁸⁾ /g	Polli da ingrasso	—	endo-1,4-beta-glucanasi: 400 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 900 U endo-1,4-beta-xylanasi: 1 300	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,4-beta-glucanasi: 400-1 600 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 900-3 600 U endo-1,4-beta-xilanasi: 1 300-5 200 U. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento o di orzo e il 10 % di segala.	31.5.2005 ⁽⁷⁾
		Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 74 252) con un'attività minima di: Liquido e in granuli: Endo-1,4-beta-glucanasi: 8 000 U ⁽¹⁶⁾ /ml o g Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 18 000 U ⁽¹⁷⁾ /ml o g Endo-1,4-beta-xilanasi: 26 000 U ⁽¹⁸⁾ /ml o g	Tacchini da ingrasso	—	endo-1,4-beta-glucanase: 400 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 900 U endo-1,4-beta-xylanasi: 1 300 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,4-beta-glucanasi: 400-800 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 900-1 800 U endo-1,4-beta-xilanasi: 1 300-2 600 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento	31.5.2005 ⁽⁷⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
12	Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotti da <i>Trichoderma viride</i> (FERM BP-4447) avente un'attività minima di: Endo-1,4-beta-glucanasi: 8 000 U ⁽¹⁶⁾ /g Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 18 000 U ⁽¹⁷⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanasi: 26 000 U ⁽¹⁸⁾ /g	Polli da ingrasso	—	endo-1,4-beta-glucanasi: 200 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 450 U endo-1,4-beta-xilanasi: 650 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,4-beta-glucanasi: 800-1 200 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 800-2 700 U endo-1,4-beta-xilanasi: 2 600-3 900 U. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di frumento e il 20 % di orzo e/o il 25 % di segala.	30.6.2004 ^(f)
			Galline ovaiole	—	endo-1,4-beta-glucanasi: 640 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 440 U endo-1,4-beta-xilanasi: 2 080 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,4-beta-glucanasi: 640-1 280 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 440-2 880 U endo-1,4-beta-xilanasi: 2 080-4 160 U. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 25 % di frumento e il 20 % di orzo e/o il 20 % di segala.	30.6.2004 ^(f)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Tacchini da ingrasso	—	endo-1,4-beta-glucanasi: 800 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 800 U endo-1,4-beta-xilanasi: 2 600 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,4-beta-glucanasi: 800-1 200 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 800-2 700 U endo-1,4-beta-xilanasi: 2 600-3 900 U. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di frumento e il 20 % di orzo.	30.6.2004 ^(f)
13	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotti da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 357.94) avente un'attività minima di: Polvere: 8 000 BGU ⁽¹⁹⁾ /g 11 000 EXU ⁽²⁰⁾ /g Granulato: 6 000 BGU/g 8 250 EXU/g Liquido: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Polli da ingrasso	—	100 BGU 130 EXU	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 100 BGU 130 EXU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento e il 30 % di orzo o il 20 % di segala.	30.6.2004 ^(f)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Galline ovaiole	—	600 BGU 800 EXU	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 600 BGU 800 EXU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento e il 30 % di orzo.	1.4.2004 (ϕ)
			Tacchini da ingrasso	—	600 BGU 800 EXU	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 600 BGU 800 EXU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento o oltre il 30 % di segale.	1.4.2004 (ϕ)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
14	Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 520.94) avente un'attività minima di: Solido: Endo-1,4-beta-xilanasi: 600 U ⁽²¹⁾ /g Liquido: Endo-1,4-beta-xilanasi: 300 U/ml	Polli da ingrasso	—	endo-1,4-beta-xilana- si: 300 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 300-600 U. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di frumento.	30.6.2004 ^(f)
15	Endo-1,3(4)-beta- glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glu- canasi prodotto da <i>Trichoderma</i> <i>viride</i> (CBS 517.94) avente un'atti- vità minima di: Solido: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 650 U ⁽²²⁾ /g Liquido: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 325 U/ml	Polli da ingrasso	—	Endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 325 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 325-650 U. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di orzo.	30.6.2004 ^(f)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
16	Endo-1,4-beta-glu- canasi EC 3.2.1.4	Preparato di endo-1,4-beta-gluca- nasi prodotto da <i>Trichoderma longi- brachiatum</i> (IMI SD 142) con un'at- tività minima di: Liquido: 2 000 CU ⁽²³⁾ /ml	Polli da ingrasso	—	250 CU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 500-1 000 CU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo.	30.6.2004 ^(f)
			Galline ovaiole	—	250 CU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 500-1 000 CU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo.	30.6.2004 ^(f)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Suinetti	4 mesi	250 CU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500-1 000 CU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo.	30.6.2004 ^(f)
			Suini da ingrasso	—	250 CU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500-1 000 CU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo.	30.6.2004 ^(f)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
		Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Trichoderma longibra- chiatum</i> (IMI SD 142) con un'atti- vità minima di: Solido: 2 000 CU ⁽²³⁾ /g	Polli da ingrasso	—	250 CU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 500-1 000 CU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo.	17.7.2004 ^(m)
			Galline ovaiole	—	250 CU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 500-1 000 CU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo.	17.7.2004 ^(m)
			Suinetti	4 mesi	250 CU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 500-1 000 CU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo.	17.7.2004 ^(m)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Suini da ingrasso	—	250 CU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500-1 000 CU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo.	17.7.2004 ^(m)
17	Endo-1,4-beta-xilanas EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanas prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135) con un'attività minima di: Liquido: 6 000 EPU ⁽²⁴⁾ /ml	Polli da ingrasso	—	750 EPU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 1 500-3 000 EPU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.	30.6.2004 ^(f)
			Galline ovaiole	—	750 EPU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 1 500-3 000 EPU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.	30.6.2004 ^(p)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Suinetti	4 mesi	750 EPU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 1 500-3 000 EPU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.	30.6.2004 ^(f)
			Suini da ingrasso	—	750 EPU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 1 500-3 000 EPU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.	30.6.2004 ^(f)
		Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135) con un'attività minima di: Solido: 6 000 EPU ⁽²⁴⁾ /g	Polli da ingrasso	—	750 EPU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 1 500-3 000 EPU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.	17.7.2004 ^(m)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Galline ovaiole	—	750 EPU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 1 500-3 000 EPU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.	17.7.2004 ^(m)
			Suinetti	4 mesi	750 EPU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 1 500-3 000 EPU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.	17.7.2004 ^(m)
			Suini da ingrasso	—	750 EPU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 1 500-3 000 EPU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.	17.7.2004 ^(m)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Tacchini da ingrasso	—	750 EPU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 1 500-3 000 EPU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 35 % di frumento.	17.7.2004 ^(m)
18	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Aspergillus niger</i> (MUCL 39199) avente un'attività minima di: Solido: 2 000 AGL ⁽²⁵⁾ /g Liquido: 500 AGL/ml	Polli da ingrasso	—	100 AGL	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 100 AGL. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo e il 20 % di frumento.	30.6.2004 ^(f)
19	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Aspergillus niger</i> (MUCL 39199) avente un'attività minima di: Solido: 1 500 AGL ⁽²⁵⁾ /g Liquido: 200 AGL/g	Polli da ingrasso	—	25 AGL	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 25-100 AGL. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di orzo.	30.6.2004 ^(f)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
20	Endo-1,4-beta-xilanas EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanas prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (MUCL 39203) avente un'attività minima di: Solido: 2 000 AXC ⁽²⁶⁾ /g Liquido: 500 AXC/ml	Polli da ingrasso	—	100 AXC	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 100 AXC. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento o segala.	30.6.2004 ^(f)
21	Endo-1,4-beta-xilanas EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanas prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (MUCL 39203) avente un'attività minima di: Solido: 1 500 AXC ⁽²⁶⁾ /g Liquido: 200 AXC/g	Polli da ingrasso	—	25 AXC	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 25-100 AXC. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di frumento.	30.6.2004 ^(f)
22	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CNCM MA 6-10 W) con un'attività minima di: Solido: 70 000 BGN ⁽²⁷⁾ /g Liquido: 14 000 BGN/ml	Polli da ingrasso	—	1 050 BGN	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 2 800 BGN. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di orzo.	30.6.2004 ^(f)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
23	Endo-1,4-beta-xilanas EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanas prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CNCM MA 6-10 W) con un'attività minima di: Solido: 70 000 IFP ⁽²⁸⁾ /g Liquido: 7 000 IFP/ml	Polli da ingrasso	—	1 050 IFP	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 1 400 IFP. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 56 % di frumento.	30.6.2004 ^(f)
			Tacchini da ingrasso	—	700 IFP	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 1 400 IFP. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.	28.2.2005 ^(g)
			Galline ovaiole	—	840 IFP	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 1 400 IFP. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.	28.2.2005 ^(g)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
24	Endo-1,4-beta-xilanas EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,4-beta-xilanas e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotti da <i>Aspergillus niger</i> (CNCM I-1517) avente un'attività minima di: 28 000 QXU ⁽²⁹⁾ /g 140 000 QGU ⁽³⁰⁾ /g	Polli da ingrasso	—	420 QXU 2 100 QGU	1 120 QXU 5 600 QGU	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 560 QXU 2 800 QGU 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento e il 30 % di orzo.	30.6.2004 ^(f)
25	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanas EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi e di endo-1,4-beta-xilanas prodotti da <i>Aspergillus niger</i> (NRRL 25541) avente un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 100 U ⁽³¹⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanas: 1 600 U ⁽³²⁾ /g	Polli da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 138 U endo-1,4-beta-xilanas: 200 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 138 U endo-1,4-beta-xilanas: 200 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di orzo o il 30 % di frumento e il 30 % di granturco.	30.6.2004 ^(f)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Galline ovaiole	—	endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 138 U endo-1,4-beta-xilana- si: 200 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 138 U endo-1,4-beta-xilanas: 200 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di orzo o il 30 % di frumento e il 30 % di granturco.	30.6.2004 ^(f)
26	Endo-1,3(4)-beta- glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glu- canasi prodotto da <i>Trichoderma ree- sei</i> (CBS 526.94) avente un'attività minima di: Solido: 350 000 BU ⁽³³⁾ /g Liquido: 50 000 BU/g	Polli da ingrasso	—	23 000 BU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 23 000-50 000 BU 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto glucani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di orzo o il 30 % di segale.	30.6.2004 ⁽ⁱ⁾
			Suinetti	4 mesi	26 000 BU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 26 000-35 000 BU 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto glucani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di frumento o orzo.	30.6.2004 ⁽ⁱ⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
27	Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta- glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 529.94) e di endo-1,3(4)-beta-glu- canasi prodotto da <i>Trichoderma ree- sei</i> (CBS 526.94) avente un'attività minima di: Solido: 200 000 BXU ⁽³⁴⁾ /g 200 000 BU ⁽³³⁾ /g Liquido: 30 000 BXU/g 30 000 BU/g	Polli da ingrasso	—	2 500 BXU 2 500 BU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 10 000 BXU 10 000 BU 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento o il 30 % di segale.	30.6.2004 ⁽ⁱ⁾
			Suinetti	2 mesi	7 500 BXU 7 500 BU	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 7 500-15 000 BXU 7 500-15 000 BU 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e glucani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di frumento.	28.2.2005 ⁽ⁱⁱ⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
28	3-Fitasi EC 3.1.3.8	Preparato di 3-fitasi prodotto da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 528.94) avente un'attività minima di: Solido: 5 000 PPU (³⁵)/g Liquido: 1 000 PPU/g	Suinetti	4 mesi	250 PPU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500-750 PPU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di fitati, contenenti ad esempio oltre il 50 % di cereali (granturco, orzo, frumento), tapioca, semi oleosi e leguminose.	30.6.2004 ⁽ⁱ⁾
			Suini da ingrasso	—	500 PPU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500-750 PPU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di fitati, contenenti ad esempio oltre il 50 % di cereali (granturco, orzo, frumento), tapioca, semi oleosi e leguminose.	30.6.2004 ⁽ⁱ⁾
			Polli da ingrasso	—	500 PPU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500-750 PPU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di fitati, contenenti ad esempio oltre lo 0,22 di fosforo legato con fitina.	28.2.2005 ^(q)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
29	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Geosmithia emersonii</i> (IMI SD 133) avente un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 5 500 U ⁽³⁶⁾ /g	Polli da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di orzo.	30.6.2004 ⁽⁸⁾
30	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotti da <i>Penicillium funiculosum</i> (IMI SD 101) avente un'attività minima di: Polvere: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 000 U ⁽³⁷⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 400 U ⁽³⁸⁾ /g Liquido: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U/ml Endo-1,4-beta-xilanasi: 350 U/ml	Polli da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di orzo o il 60 % di frumento.	30.6.2004 ⁽⁸⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Tacchini da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glu- canase: 100 U endo-1,4-beta-xilana- si: 70 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasì: 70 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di frumento.	28.2.2005 ⁽⁹⁾
			Galline ovaiole	—	endo-1,3(4)-beta-glu- canase: 100 U endo-1,4-beta-xilana- si: 70 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasì: 70 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di orzo o il 30 % di frumento.	28.2.2005 ⁽⁹⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Suini da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glu- canase: 100 U endo-1,4-beta-xilana- si: 70 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanas- i: 70 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di orzo o il 60 % di frumento.	28.2.2005 ⁽⁹⁾
31	Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanas- i prodotto da <i>Trichoderma longibra- chiatum</i> (CBS 614.94) avente un'at- tività minima di: Solido: 300 EU ⁽³⁹⁾ /g Liquido: 1 000 EU/g	Polli da ingrasso	—	600 EU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 600 EU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di frumento.	30.6.2004 ⁽⁸⁾
			Galline ovaiole	—	300 EU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: 600 EU. 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di frumento.	30.6.2004 ⁽⁸⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
32	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) avente un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 200 U ⁽²²⁾ /ml	Polli da ingrasso	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di orzo.	30.6.2004 ^(h)
		Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) avente un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 200 U ⁽²²⁾ /ml	Suinetti	4 mesi	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 55 % di orzo.	30.6.2004 ^(h)
		Suini da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 70 % di orzo.	30.6.2004 ^(h)	

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
33	Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Trichoderma longibra- chiatum</i> (ATCC 2105) avente un'at- tività minima di: Polvere: Endo-1,4-beta-xilanasi: 2 000 U ⁽⁴⁰⁾ /g Liquido: Endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U/ ml	Polli da ingrasso	—	endo-1,4-beta-xilana- si: 500 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 500-2 500 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 55 % di frumento o il 60 % di segale.	30.6.2004 ^(h)
			Galline ovaiole	—	endo-1,4-beta-xilana- si: 2 000 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 2 000 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 35 % di frumento.	30.6.2004 ^(h)
			Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Trichoderma longibra- chiatum</i> (ATCC 2105) avente un'at- tività minima di: Polvere: Endo-1,4-beta-xilanasi: 4 000 U ⁽⁴⁰⁾ /g Liquido: Endo-1,4-beta-xilanasi: 10 000 U/ml	Suinetti	4 mesi	endo-1,4-beta-xilana- si: 5 000 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 45 % di frumento.

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
		Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Trichoderma longibra- chiatum</i> (ATCC 2105) avente un'at- tività minima di: Polvere: Endo-1,4-beta-xilanasi: 4 000 U ⁽⁴⁰⁾ /g Liquido: Endo-1,4-beta-xilanasi: 8 000 U/ml	Suini da ingrasso	—	endo-1,4-beta-xilana- si: 4 000 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 4 000 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 35 % di frumento.	30.6.2004 ^(h)
34	Endo-1,3(4)-beta- glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8 Alfa-amilasi EC 3.2.1.1	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glu- canasi e endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Aspergillus niger</i> (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotti da <i>Aspergillus oryzae</i> (ATCC 66222) con un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 275 U ⁽³¹⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U ⁽³²⁾ /g Alfa-amilasi: 3 100 U ⁽⁴¹⁾ /g	Suinetti	4 mesi	endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 165 U endo-1,4-beta-xilana- si: 240 U alfa-amilasi: 1 860 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 165 U endo-1,4-beta-xilanasi: 240 U alfa-amilasi: 1 860 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisacca- ridi amilacei e non amilacei (soprat- tutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 45 % di orzo e il 10 % di frumento o il 10 % di granturco.	26.7.2004 ⁽ⁱ⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
35	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanas EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) e endo-1,4-beta-xilanas prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) avente un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 80 U ⁽²²⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanas: 180 U ⁽⁴⁰⁾ /g	Galline ovaiole	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 80 U endo-1,4-beta-xilanas: 180 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 80 U endo-1,4-beta-xilanas: 180 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinosilani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di orzo.	26.7.2004 ⁽ⁱ⁾
36	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanas EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) e endo-1,4-beta-xilanas prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135) avente un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 300 U ⁽²²⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanas: 300 U ⁽⁴⁰⁾ /g	Polli da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 300 U endo-1,4-beta-xilanas: 300 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 300 U endo-1,4-beta-xilanas: 300 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinosilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo.	26.7.2004 ⁽ⁱ⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Galline ovaiole	—	endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 300 U endo-1,4-beta-xilana- si: 300 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 300 U endo-1,4-beta-xilanas: 300 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 35 % di orzo.	26.7.2004 ⁽ⁱ⁾
37	Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8 Subtilisina EC 3.4.21.62	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Trichoderma longibra- chiatum</i> (ATCC 2105) e subtilisina prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107), avente un'attività minima di: Endo-1,4-beta-xilanasi: 2 500 U ⁽⁴⁰⁾ /g Subtilisina: 800 U ⁽⁴²⁾ /g	Polli da ingrasso	—	endo-1,4-beta-xilana- si: 500 U subtilisina: 160 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 500-2 500 U subtilisina: 160-800 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti ad esempio oltre il 65 % di frumento.	26.7.2004 ⁽ⁱ⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Tacchini	—	endo-1,4-beta-xilana- si: 825 U subtilisina: 265 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,4-beta-xilanasì: 825-2 500 U subtilisina: 265-800 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti ad esempio oltre il 45 % di frumento.	26.7.2004 (j)
38	Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8 Subtilisina EC 3.4.21.62	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasì prodotto da <i>Trichoderma longibra- chiatum</i> (ATCC 2105) e subtilisina prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107), avente un'attività minima di: Endo-1,4-beta-xilanasì: 5 000 U ⁽⁴⁰⁾ /g Subtilisina: 500 U ⁽⁴²⁾ /g	Suinetti	4 mesi	endo-1,4-beta-xilana- si: 5 000 U subtilisina: 500 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,4-beta-xilanasì: 5 000 U subtilisina: 500 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.	26.7.2004 (j)
39	Endo-1,3(4)-beta- glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glu- canasi prodotto da <i>Trichoderma lon- gibrachiatum</i> (ATCC 2106) e endo- 1,4-beta-xilanasì prodotto da <i>Tri- choderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) avente un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U ⁽²²⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanasì: 400 U ⁽⁴⁰⁾ /g	Suini da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 400 U endo-1,4-beta-xilana- si: 400 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U endo-1,4-beta-xilanasì: 400 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 65 % di orzo.	26.7.2004 (j)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
40	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanas EC 3.2.1.8 Subtilisina EC 3.4.21.62	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endo-1,4-beta xilanas prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e subtilisina prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107) avente un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U ⁽²²⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanas: 300 U ⁽⁴⁰⁾ /g Subtilisina: 800 U ⁽⁴²⁾ /g	Polli da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 30 U endo-1,4-beta-xilanas: 90 U subtilisina: 240 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 30-100 U endo-1,4-beta-xilanas: 90-300 U subtilisina: 240-800 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti ad esempio oltre il 60 % di orzo.	26.7.2004 ⁽¹⁾
41	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanas EC 3.2.1.8 Subtilisina EC 3.4.21.62	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endo-1,4-beta xilanas prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e subtilisina prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107) avente un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U ⁽²²⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanas: 2 500 U ⁽⁴⁰⁾ /g Subtilisina: 800 U ⁽⁴²⁾ /g	Polli da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 25 U endo-1,4-beta-xilanas: 625 U subtilisina: 200 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 25-100 U endo-1,4-beta-xilanas: 625-2 500 U subtilisina: 200-800 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento e il 10 % di orzo.	26.7.2004 ⁽¹⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Galline ovaiole	—	endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 100 U endo-1,4-beta-xilana- si: 2 500 U subtilisina: 800 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasì: 2 500 U subtilisina: 800 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti ad esempio oltre il 50 % di frumento e il 25 % di orzo.	26.7.2004 ⁽ⁱ⁾
42	Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasì prodotto da <i>Trichoderma longibra- chiatum</i> (IMI SD 135) con un'atti- vità minima di: Solido: Endo-1,4-beta-xilanasì: 4 000 U ⁽⁴⁰⁾ /g Caratteristiche del preparato auto- rizzato: Endo-1,4-beta-xilanasì: 1,99 % Frumento: 97,7 % Propionato di calcio: 0,3 % Lecitina: 0,01 %	Suinetti	4 mesi	endo-1,4-beta-xilana- si: 4 000 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,4-beta-xilanasì: 4 000 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di frumento.	26.7.2004 ⁽ⁱ⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Suini da ingrasso	—	endo-1,4-beta-xilanas- si: 4 000 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,4-beta-xilanas- si: 4 000 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di frumento.	17.7.2004 ^(m)
43	Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta- glucanasi EC 3.2.1.6 Alfa-amilasi: EC 3.2.1.1	Preparato di endo-1,4-beta-xilanas- si prodotto da <i>Trichoderma longibra- chiatum</i> (IMI SD 135), endo-1,3(4)- beta-glucanasi prodotto da <i>Tricho- derma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) e alfa-amilasi <i>Bacillus amylo- liquefaciens</i> (DSM 9553) con un'at- tività minima di: Endo-1,4-beta-xilanas- si: 3 975 U ⁽⁴⁰⁾ /g Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 125 U ⁽²²⁾ /g Alfa-amilasi: 1 000 U ⁽⁴³⁾ /g	Suinetti	4 mesi	endo-1,4-beta-xilanas- si: 3 975 U endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 125 U alfa-amilasi: 1 000 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,4-beta-xilanas- si: 3 975 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 125 U alfa-amilasi: 1 000 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisacca- ridi amilacei e non amilacei (soprat- tutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento, il 20 % di orzo e il 20 % di segale.	6.1.2004 ^(k)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
44	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilana- nasi EC 3.2.1.8 Alfa-amilasi: EC 3.2.1.1	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glu- canasi prodotto da <i>Trichoderma lon- gibrachiatum</i> (ATCC 2106), endo- 1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Tri- choderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e alfa-amilasi prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) avente un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U ⁽²²⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U ⁽⁴⁰⁾ /g Alfa-amilasi: 1 000 U ⁽⁴³⁾ /g	Suinetti	4 mesi	endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 250 U endo-1,4-beta-xilana- si: 400 U alfa-amilasi: 1 000 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U alfa-amilasi: 1 000 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisacca- ridi amilacei e non amilacei (soprat- tutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di orzo.	6.1.2004 ^(k)
45	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8 Alfa-amilasi: EC 3.2.1.1	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glu- canasi prodotto da <i>Trichoderma lon- gibrachiatum</i> (ATCC 2106) e endo- 1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Tri- choderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135) e alfa-amilasi prodotto da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) con un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U ⁽²²⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U ⁽⁴⁰⁾ /g Alfa-amilasi: 1 000 U ⁽⁴³⁾ /g	Suinetti	4 mesi	endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 250 U endo-1,4-beta-xilana- si: 400 U alfa-amilasi: 1 000 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U alfa-amilasi: 1 000 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisacca- ridi amilacei e non amilacei (soprat- tutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 35 % di orzo.	6.1.2004 ^(k)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
46	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilana- nasi EC 3.2.1.8 Poligalatturonasi EC 3.2.1.15	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glu- canasi prodotto da <i>Trichoderma lon- gibrachiatum</i> (ATCC 2106) e endo- 1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Tri- choderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135) e poligalatturonasi prodotto da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), con un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U ⁽²²⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U ⁽⁴⁰⁾ /g Poligalatturonasi: 50 U ⁽⁴⁴⁾ /g	Suini da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 400 U endo-1,4-beta-xilana- si: 400 U poligalattu-ronasi: 50 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U poligalatturonasi: 50 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisacca- ridi amilacei e non amilacei (soprat- tutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo.	6.1.2004 ^(k)
47	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8 Alfa-amilasi: EC 3.2.1.1 Poligalatturonasi EC 3.2.1.15	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glu- canasi prodotto da <i>Trichoderma lon- gibrachiatum</i> (ATCC 2106), endo- 1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Tri- choderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135), alfa-amilasi prodotto da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), poligalatturonasi prodotto da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), con un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U ⁽²²⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanasi: 4 000 U ⁽⁴⁰⁾ /g Alfa-amilasi: 1 000 U ⁽⁴³⁾ /g Poligalatturonasi: 25 U ⁽⁴⁴⁾ /g	Suinetti	4 mesi	endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 150 U endo-1,4-beta-xilana- si: 4 000 U alfa-amilasi: 1 000 U poligalatturonasi: 25 U	— — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U endo-1,4-beta-xilanasi: 4 000 U alfa-amilasi: 1 000 U poligalatturonasi: 25 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisacca- ridi amilacei e non amilacei (soprat- tutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di orzo e il 35 % di frumento	6.1.2004 ^(k)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
48	Alfa-amilasi: EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di alfa-amilasi e endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), con un'attività minima di: Confettato: Alfa-amilasi: 200 KNU ⁽⁴⁵⁾ /g Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 350 FBG ⁽⁹⁾ /g Liquido: Alfa-amilasi: 130 KNU/ ml Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 225 FBG/ml	Polli da ingrasso	—	10 KNU 17 FBG	40 KNU 70 FBG	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 20 KNU 35 FBG 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo.	1.4.2004 ⁽¹⁾
			Tacchini da ingrasso	—	40 KNU 70 FBG	80 KNU 140 FBG	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 40 KNU 70 FBG 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo.	1.4.2004 ⁽¹⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
49	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilana- nasi EC 3.2.1.8 Alfa-amilasi: EC 3.2.1.1 Bacillolysin EC 3.4.24.28 Poligalatturonasi EC 3.2.1.15	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glu- canasi prodotto da <i>Trichoderma lon- gibrachiatum</i> (ATCC 2106), endo- 1,4-beta-xilanasì prodotto da <i>Tri- choderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135), alfa-amilasi prodotto da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), bacillolisina prodotto da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554) e poligalatturonasi prodotto da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), con un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U ⁽²²⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanasì: 1 500 U ⁽⁴⁰⁾ /g Alfa-amilasi: 500 U ⁽⁴³⁾ /g Bacillolisina: 800 U ⁽⁴²⁾ /g Poligalatturonasi: 50 U ⁽⁴⁴⁾ /g	Polli da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 150 U endo-1,4-beta-xilana- si: 1 500 U alfa-amilasi: 500 U bacillolisina: 800 U poligalattu- ronasi: 50 U	— — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U endo-1,4-beta-xilanasì: 1 500 U alfa-amilasi: 500 U bacillolisina: 800 U poligalatturonasi: 50 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento.	17.7.2004 ^(m)
			Galline ovaiole	—	endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 150 U endo-1,4-beta-xilana- si: 1 500 U alfa-amilasi: 500 U bacillolisina: 800 U poligalattu- ronasi: 50 U	— — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U endo-1,4-beta-xilanasì: 1 500 U alfa-amilasi: 500 U bacillolisina: 800 U poligalatturonasi: 50 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento.	17.7.2004 ^(m)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
50	6-fitasi EC 3.1.3.26	Preparato di 6-fitasi prodotto <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 11857) avente un'attività minima di: Confettato: 2 500 FYT ⁽⁴⁶⁾ /g Liquido: 5 000 FYT/g	Polli da ingrasso	—	250 FYT	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500-1 000 FYT 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina.	17.7.2004 ^(m)
			Galline ovaiole	—	250 FYT	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500-1 000 FYT 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina.	17.7.2004 ^(m)
			Tacchini da ingrasso	—	250 FYT	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500-1 000 FYT 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina.	17.7.2004 ^(m)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Suinetti	2 mesi	500 FYT	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500-1 000 FYT 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina.	17.7.2004 ^(m)
			Suini da ingrasso	—	500 FYT	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500-1 000 FYT 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina.	17.7.2004 ^(m)
51	Endo-1,4-beta-xilanas EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanas prodotto da <i>Bacillus subtilis</i> (LMG-S 15136) avente un'attività minima di: 100 IU ⁽⁴⁷⁾ /g	Polli da ingrasso	—	10 IU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 10 IU 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.	17.7.2004 ^(m)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Suinetti	2 mesi	10 IU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 10 IU 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.	31.5.2005 ⁽⁷⁾
52	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 Alfa-amilasi: EC 3.2.1.1	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94) e alfa-amilasi prodotto da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), con un'attività minima di: Liquido: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 10 000 U ⁽⁴⁸⁾ /ml Endo-1,4-beta-glucanasi: 120 000 U ⁽⁴⁹⁾ /ml Alfa-amilasi: 400 U ⁽⁵⁰⁾ /ml	Polli da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 000 U endo-1,4-beta-glucanasi: 12 000 U alfa-amilasi: 40 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 000-2 000 U endo-1,4-beta-glucanasi: 12 000-24 000 U alfa-amilasi: 40-80 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di frumento, il 15 % di sorgo e il 5 % di granturco.	17.7.2004 ^(m)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
53	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 Alfa-amilasi: EC 3.2.1.1 Bacillolisina EC 3.4.24.28 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), alpha-amilasi prodotto da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), bacillolisina prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da <i>Trichoderma viride</i> (NIBH FERM BP 4842) avente un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 350 U ⁽⁴⁸⁾ /g Endo-1,4-beta-glucanasi: 4 000 U ⁽⁴⁹⁾ /g Alfa-amilasi: 400 U ⁽⁵¹⁾ /g Bacillolisina: 450 U ⁽⁵²⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanasi: 20 000 U ⁽⁵³⁾ /g	Suinetti	2 mesi	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 350 U endo-1,4-beta-glucanasi: 4 000 U alfa-amilasi: 400 U bacillolisina: 450 U endo-1,4-beta-xilanasi: 20 000 U	— — — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 350 U endo-1,4-beta-glucanasi: 4 000 U alfa-amilasi: 400 U bacillolisina: 450 U endo-1,4-beta-xilanasi: 20 000 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 25 % di orzo e il 20 % di granturco.	23.11.2004 ⁽⁶⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Polli da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 175 U endo-1,4-beta-glucanasi: 2 000 U alfa-amilasi: 200 U bacillolisina: 225 U endo-1,4-beta-xilanas: 10 000 U	— — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 175-2 350 U endo-1,4-beta-glucanasi: 2 000-4 000 U alfa-amilasi: 200-400 U bacillolisina: 225-450 U endo-1,4-beta-xilanas: 10 000-20 000 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 45 % di frumento.	23.11.2004 ⁽⁹⁾
54	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 Alfa-amilasi: EC 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-xilanas EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotto da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), e endo-1,4-beta-xilanas prodotta da <i>Trichoderma viride</i> (NIBH FERM BP 4842) avente un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 10 000 U ⁽⁴⁸⁾ /g Endo-1,4-beta-glucanasi: 120 000 U ⁽⁴⁹⁾ /g Alfa-amilasi: 400 U ⁽⁵¹⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanas: 210 000 U ⁽⁵³⁾ /g	Polli da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 000 U Endo-1,4-beta-glucanasi: 12 000 U alfa-amilasi: 40 U endo-1,4-beta-xilanas: 21 000 U	— — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 000-2 000 U Endo-1,4-beta-glucanasi: 12 000-24 000 U alfa-amilasi: 40-80 U endo-1,4-beta-xilanas: 21 000-42 000 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 45 % di frumento.	23.11.2004 ⁽⁹⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Tacchini da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U endo-1,4-beta-glucanasi: 6 000 U alfa-amilasi: 20 U endo-1,4-beta-xilanas: 10 500 U	— — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500-1 500 U Endo-1,4-beta-glucanasi: 6 000-18 000 U alfa-amilasi: 20-60 U endo-1,4-beta-xilanas: 10 500-31 500 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento	13.10.2005 ^(f)
55	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 Alfa-amilasi: EC 3.2.1.1 Bacillolisina EC 3.4.24.28	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotto da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), e bacillolisina prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554) avente un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 3 000 U ⁽⁴⁸⁾ /g Endo-1,4-beta-glucanasi: 5 000 U ⁽⁴⁹⁾ /g Alfa-amilasi: 540 U ⁽⁵¹⁾ /g Bacillolisina: 450 U ⁽⁵²⁾ /g	Suinetti	2 mesi	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 500 U endo-1,4-beta-glucanasi: 2 500 U alfa-amilasi: 270 U bacillolisina: 225 U	— — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 500-3 000 U Endo-1,4-beta-glucanasi: 2 500-5 000 U alfa-amilasi: 270-540 U bacillolisina: 225-450 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei contenenti ad esempio oltre il 35 % di frumento e il 15 % di orzo.	23.11.2004 ^(g)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Suini da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 1 500 U endo-1,4-beta-gluca- nasi: 2 500 U alfa-amilasi: 270 U bacillolisina: 225 U	— — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 500-3 000 U endo-1,4-beta-glucanasi: 2 500-5 000 U alfa-amilasi: 270-540 U bacillolisina: 225-450 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi amilacei e non amilacei contenenti ad esempio oltre il 50 % di orzo.	23.11.2004 (*)
			Polli da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 1 500 U endo-1,4-beta-gluca- nasi: 2 500 U alfa-amilasi: 270 U bacillolisina: 225 U	— — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 500-3 000 U endo-1,4-beta-glucanasi: 2 500-5 000 U alfa-amilasi: 270-540 U bacillolisina: 225-450 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi amilacei e non amilacei contenenti ad esempio oltre il 50 % di granturco o il 50 % di fru- mento.	23.11.2004 (*)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Galline ovaiole	—	endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 1 500 U endo-1,4-beta-gluca- nasi: 2 500 U alfa-amilasi: 270 U bacillolisina: 225 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 500-3 000 U endo-1,4-beta-glucanasi: 2 500-5 000 U alfa-amilasi: 270-540 U bacillolisina: 225-450 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi amilacei e non amilacei contenenti ad esempio oltre il 40 % di granturco o il 10 % di segala.	23.11.2004 ⁽⁹⁾
56	Endo-1,3(4)-beta- glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glu- canasi EC 3.2.1.4 Alfa-amilasi: EC 3.2.1.1 Bacillolisina EC 3.4.24.28	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glu- canasi prodotto da <i>Aspergillus acu- leatus</i> (CBS 589.94), endo-1,4-beta- glucanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), alpha-amilasi prodotto da <i>Bacillus amyoliquefaciens</i> (DSM 9553), e bacillolisina prodotta da <i>Bacillus amyoliquefaciens</i> (DSM 9554) avente un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 6 000 U ⁽⁴⁸⁾ /g Endo-1,4-beta-glucanasi: 3 500 U ⁽⁴⁹⁾ /g Alfa-amilasi: 1 400 U ⁽⁵¹⁾ /g Bacillolisina: 450 U ⁽⁵²⁾ /g	Polli da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 6 000 U endo-1,4-beta-gluca- nasi: 3 500 U alfa-amilasi: 1 400 U bacillolisina: 450 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 6 000 U endo-1,4-beta-glucanasi: 3 500 U alfa-amilasi: 1 400 U bacillolisina: 450 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo.	23.11.2004 ⁽⁹⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
57	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 Alfa-amilasi: EC 3.2.1.1 Bacillolisina EC 3.4.24.28	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), alpha-amilasi prodotto da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), e bacillolisina prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554) avente un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 3 000 U ⁽⁴⁸⁾ /g Endo-1,4-beta-glucanasi: 9 000 U ⁽⁴⁹⁾ /g Alfa-amilasi: 540 U ⁽⁵¹⁾ /g Bacillolisina: 450 U ⁽⁵²⁾ /g	Polli da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 3 000 U endo-1,4-beta-glucanasi: 9 000 U alfa-amilasi: 540 U bacillolisina: 450 U	— — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 3 000 U endo-1,4-beta-glucanasi: 9 000 U alfa-amilasi: 540 U bacillolisina: 450 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto cellulosa ed emicellulosa), contenenti ad esempio oltre il 20 % di farina di girasole e il 10 % di farina di soia.	23.11.2004 ^(°)
58	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 Alfa-amilasi: EC 3.2.1.1 Bacillolisina EC 3.4.24.28	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), alpha-amilasi prodotto da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), e bacillolisina prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554) avente un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 350 U ⁽⁴⁸⁾ /g Endo-1,4-beta-glucanasi: 5 000 U ⁽⁴⁹⁾ /g Alfa-amilasi: 400 U ⁽⁵¹⁾ /g Bacillolisina: 5 000 U ⁽⁵²⁾ /g	Suinetti	2 mesi	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 350 U endo-1,4-beta-glucanasi: 5 000 U alfa-amilasi: 400 U bacillolisina: 5 000 U	— — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 350 U endo-1,4-beta-glucanasi: 5 000 U alfa-amilasi: 400 U bacillolisina: 5 000 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di orzo.	23.11.2004 ^(°)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
59	Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta- glucanasi EC 3.2.1.6 Subtilisina EC 3.4.21.62 Alfa-amilasi: EC 3.2.1.1 Poligalatturonasi EC 3.2.1.15	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Trichoderma longibra- chiatum</i> (ATCC 2105), endo-1,3(4)- beta-glucanasi e alfa-amilasi pro- dotto da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), subtilisina prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107), poligalatturonasi prodotta by <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94) avente un'attività minima di: Endo-1,4-beta-xilanasi: 300 U ⁽⁴⁰⁾ /g Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U ⁽²²⁾ /g Subtilisina: 4 000 U ⁽⁴²⁾ /g Alfa-amilasi: 400 U ⁽⁴³⁾ /g Poligalatturonasi: 25 U ⁽⁴⁴⁾ /g	Polli da ingrasso	—	endo-1,4-beta-xilana- si: 300 U endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 150 U subtilisina: 4 000 U alfa-amilasi: 400 U poligalatturonasi: 25 U	— — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 300 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U subtilisina: 4 000 U alfa-amilasi: 400 U polygalacturonase: 25 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di granturco.	28.2.2005 ⁽⁹⁾
60	Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta- glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Trichoderma longibra- chiatum</i> (ATCC 2105), endo-1,3(4)- beta-glucanasi prodotto da <i>Tricho- derma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) avente un'attività minima di: Endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U ⁽⁴⁰⁾ /ml Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 50 U ⁽²²⁾ /ml	Polli da ingrasso	—	endo-1,4-beta-xilana- si: 500 U endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 5 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 500-2 500 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 5-25 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo o il 55 % di frumento.	28.2.2005 ⁽⁹⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
61	Endo-1,4-beta-xila- nasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta- glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Trichoderma longibra- chiatum</i> (ATCC 2105), endo-1,3(4)- beta-glucanasi prodotto da <i>Tricho- derma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) avente un'attività minima di: In polvere: Endo-1,4-beta-xilanasi: 17 000 BXU ⁽³⁴⁾ /g Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 11 000 BU ⁽³³⁾ /g Liquido: Endo-1,4-beta-xilanasi: 22 000 BXU/ml Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 15 000 BU/ml	Polli da ingrasso	—	endo-1,4-beta-xilana- si: 17 000 BXU endo-1,3(4)-beta-glu- canasi: 11 000 BU	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la tempe- ratura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di ali- mento completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 17 000 BXU endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 11 000 BU 3. Da utilizzare in alimenti composti ric- chi di polisaccaridi non amilacei (so- prattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo o il 55 % di frumento.	28.2.2005 ⁽⁹⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			

Microrganismi

1	<i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> NCIMB 40112/CNCM I-1012	Preparato di <i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> contenente almeno: 1×10^{10} CFU/g di additivo	Polli da ingrasso	—	$0,2 \times 10^9$	1×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere utilizzato in alimenti composti contenenti i coccidiostatici autorizzati seguenti: Monensin sodico, Lasolacid sodico, Salinomycin sodica, Decochinato, Robenidina, Narasina, Alofuginone.	1.3.2002 ^(b)
			Galline ovaiole	—	$0,2 \times 10^9$	1×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	1.3.2002 ^(b)
			Vitelli	6 mesi	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	1.3.2002 ^(b)
			Bovini da ingrasso	—	$0,2 \times 10^9$	$0,2 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. La quantità di <i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> nella razione giornaliera non deve essere superiore a $1,0 \times 10^9$ CFU per 100 kg di peso animale. Aggiungere $0,2 \times 10^9$ CFU ogni 100 kg supplementari di peso animale.	1.3.2002 ^(b)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
			Coniglie da riproduzione	—	0,1 × 10 ⁹	5 × 10 ⁹	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere utilizzato in alimenti composti contenenti i coccidiostatici seguenti: Robenidina.	1.3.2002 ^(h)
			Conigli da ingrasso	—	0,1 × 10 ⁹	5 × 10 ⁹	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere utilizzato in alimenti composti contenenti i coccidiostatici seguenti: Robenidina, Salinomicina sodica.	1.3.2002 ^(h)
3	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC Sc 47	Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> contenente almeno: 5 × 10 ⁹ CFU/g di additivo	Conigli da ingrasso	—	2,5 × 10 ⁹		Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato in alimenti composti contenenti i coccidiostatici autorizzati seguenti: meticlorpindolo.	30.6.2004 ^(f)
			Scrofe	—	5 × 10 ⁹	2,5 × 10 ¹⁰	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	30.6.2004 ^(f)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
			Suinetti	4 mesi	5×10^9	$2,5 \times 10^{10}$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	30.6.2004 ^(f)
			Vacche da latte	—	4×10^8	2×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. La quantità di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> nella razione giornaliera non deve essere superiore a $5,6 \times 10^9$ CFU per 100 kg di peso animale. Aggiungere $8,75 \times 10^9$ CFU ogni 100 kg supplementari di peso animale.	31.5.2005 ^(f)
5	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 493.94	Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> contenente almeno: 1×10^8 CFU/g di additivo	Vitelli	6 mesi	2×10^8	2×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	30.6.2004 ^(f)
			Bovini da ingrasso	—	$1,7 \times 10^8$	$1,7 \times 10^8$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. La quantità di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> nella razione giornaliera non deve essere superiore a $7,5 \times 10^8$ CFU per 100 kg di peso animale. Aggiungere 1×10^8 CFU ogni 100 kg supplementari di peso animale.	30.6.2004 ^(g)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
			Vacche da latte	—	5×10^7	$3,5 \times 10^8$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. La quantità di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> nella razione giornaliera non deve essere superiore a $1,2 \times 10^9$ CFU per 100 kg di peso animale. Aggiungere $1,7 \times 10^8$ CFU ogni 100 kg supplementari di peso animale.	31.5.2005 ⁽⁷⁾
6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079	Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> contenente almeno: 2×10^{10} CFU/g di additivo	Scrofe	—	2×10^9	1×10^{10}	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	30.6.2004 ⁽⁷⁾
			Suinetti	4 mesi	6×10^9	3×10^{10}	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	30.6.2004 ⁽⁷⁾
7	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077	Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> contenente almeno: 2×10^{10} CFU/g di additivo	Vacche da latte	—	$5,5 \times 10^8$	$2,1 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. La quantità di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> nella razione giornaliera non deve essere superiore a $8,4 \times 10^9$ CFU per 100 kg di peso animale. Aggiungere $1,8 \times 10^9$ CFU ogni 100 kg supplementari di peso animale.	30.6.2004 ⁽⁷⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
			Bovini da ingrasso	—	1×10^9	$1,5 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. La quantità di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> nella razione giornaliera non deve essere superiore a $4,6 \times 10^9$ CFU per 100 kg di peso animale. Aggiungere 2×10^9 CFU ogni 100 kg supplementari di peso animale.	30.6.2004 ^(f)
8	<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 53519 <i>Enterococcus faecium</i> ATCC 55593 [nel rapporto 1/1]	Miscela di: <i>Enterococcus faecium</i> incapsulato ATCC 53519 e <i>Enterococcus faecium</i> incapsulato ATCC 55593 contenente un minimo di 2×10^8 CFU/g di additivo (cioè un minimo di 1×10^8 CFU/g di ciascun batterio)	Polli da ingrasso	—	1×10^8	1×10^8	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: amprolium, decochinato, alofuginone, lasalocid sodico, maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina, nicarbazina, narasina/nicarbazina, salinomycin sodica.	30.6.2004 ^(f)
9	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M	Preparato de <i>Pediococcus acidilactici</i> contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo	Polli da ingrasso	—	1×10^9	1×10^{10}	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: amprolium, meticlorpindolo, decochinato, alofuginone, narasina, salinomycin sodica, nicarbazina, maduramicina ammonio, diclazuril.	30.6.2004 ^(g)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
			Suinetti	4 mesi	1×10^9	1×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	30.6.2004 ⁽⁸⁾
			Suini da ingrasso	—	1×10^9	1×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	30.6.2004 ⁽⁸⁾
10	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 10415	Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno: Microincapsulato: $1,0 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo $1,75 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo	Polli da ingrasso	—	$0,3 \times 10^9$	$2,8 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato in alimenti composti contenenti i coccidiostatici autorizzati seguenti: amprolium, amprolium/ etopabato, diclazuril, alofuginone, maduramicina ammonio, meticlorpindolo, meticlorpindolo/ metilbenzoquato, monensin sodico, robenidina, salinomicina sodica.	30.6.2004 ⁽⁸⁾
			Suini da ingrasso	—	$0,35 \times 10^9$	$1,5 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	30.6.2004 ⁽⁸⁾
			Scrofe	—	$0,2 \times 10^9$	$1,25 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	30.6.2004 ⁽⁸⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
			Bovini da ingrasso	—	0,25 × 10 ⁹	0,6 × 10 ⁹	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. La quantità di <i>Enterococcus faecium</i> nella razione giornaliera non deve essere superiore a 1 × 10 ⁹ CFU per 100 kg di peso animale. Aggiungere 1 × 10 ⁹ CFU ogni 100 kg supplementari di peso animale.	30.6.2004 ⁽⁸⁾
		Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno: Microincapsulato: 1,0 × 10 ¹⁰ CFU/g di additivo 1,75 × 10 ¹⁰ CFU/g di additivo e Granulato: 3,5 × 10 ¹⁰ CFU/g di additivo	Suinetti	4 mesi	0,3 × 10 ⁹	1,4 × 10 ⁹	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Il granulato dovrà essere utilizzato esclusivamente in succedanei del latte.	30.6.2004 ⁽⁸⁾
			Vitelli	6 mesi	0,35 × 10 ⁹	6,6 × 10 ⁹	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Il granulato dovrà essere utilizzato esclusivamente in succedanei del latte.	30.6.2004 ⁽⁸⁾
11	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 5464	Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno: 5 × 10 ¹⁰ CFU/g di additivo	Suinetti	4 mesi	0,5 × 10 ⁹	1 × 10 ⁹	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	30.6.2004 ⁽⁸⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
			Polli da ingrasso	—	0,5 × 10 ⁹	1 × 10 ⁹	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: amprolium, diclazuril, alofuginone, monensin-sodico, meticlorpindolo/metilbenzoquato, nicarbazin.	1.4.2004 ^(f)
			Vitelli	4 mesi	0,5 × 10 ⁹	1 × 10 ⁹	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	1.4.2004 ^(f)
12	<i>Lactobacillus farciminis</i> CNCM MA 67/4R	Preparato di <i>Lactobacillus farciminis</i> contenente almeno: 1 × 10 ⁹ CFU/g di additivo	Suinetti	4 mesi	1 × 10 ⁹	1 × 10 ¹⁰	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	30.6.2004 ^(h)
13	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10 663/ NCIMB 10 415	Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno: Polvere e granulato: 3,5 × 10 ¹⁰ CFU/g di additivo Confettato: 2,0 × 10 ¹⁰ CFU/g di additivo Liquido: 1 × 10 ¹⁰ CFU/ml di additivo	Suinetti	4 mesi	1 × 10 ⁹	1 × 10 ¹⁰	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	30.6.2004 ^(h)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
			Vitelli	6 mesi	1×10^9	1×10^{10}	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	26.7.2004 ⁽ⁱ⁾
			Polli da ingrasso	—	1×10^9	1×10^{10}	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: amprolium, amprolium-etopabato, decochinato, diclazuril, alofuginone, lasalocid sodico, maduramicina ammonio, meticlorpindolo/ metilbenzoquato, monensin sodico, narasina, nicarbazina, robenidina, salinomycin sodica.	26.7.2004 ⁽ⁱ⁾
14	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39 885	Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> contenente almeno: Polvere, granulato e perle: 1×10^9 CFU/g di additivo	Suinetti	4 mesi	3×10^9	3×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	30.6.2004 ^(h)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
			Bovini da ingrasso	—	9×10^9	9×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. La quantità di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> nella razione giornaliera non deve essere superiore a $1,6 \times 10^{10}$ CFU per 100 kg di peso animale. Aggiungere $3,2 \times 10^9$ CFU ogni 100 kg supplementari di peso animale.	30.6.2004 ^(h)
15	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 11181	Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno: Polvere: 4×10^{11} CFU/g di additivo Confettato: 5×10^{10} CFU/g di additivo	Vitelli	6 mesi	5×10^8	2×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	6.1.2004 ^(k)
			Suinetti	4 mesi	5×10^8	2×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	6.1.2004 ^(k)
16	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 7134 <i>Lactobacillus rhamnosus</i> DSM 7133	Miscela di: <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno: 7×10^9 CFU/g e di <i>Lactobacillus rhamnosus</i> contenente almeno: 3×10^9 CFU/g	Vitelli	6 mesi	1×10^9	6×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	6.1.2004 ^(k)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
			Suinetti	4 mesi	1×10^9	5×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	6.1.2004 ^(k)
17	<i>Lactobacillus casei</i> NCIMB 30096 <i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 30098	Miscela di <i>Lactobacillus casei</i> e <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno: <i>Lactobacillus casei</i> 2×10^9 CFU/g e: <i>Enterococcus faecium</i> 6×10^9 CFU/g	Vitelli	6 mesi	<i>Lactobacillus casei</i> $0,5 \times 10^9$ <i>Enterococcus faecium</i> $1,5 \times 10^9$	<i>Lactobacillus casei</i> 1×10^9 <i>Enterococcus faecium</i> 3×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	1.4.2004 ^(l)
18	<i>Enterococcus faecium</i> CECT 4515	Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo	Suinetti	4 mesi	1×10^9	1×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	1.4.2004 ^(l)
			Vitelli	6 mesi	1×10^9	1×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	1.4.2004 ^(l)
19	<i>Streptococcus infantarius</i> CNCM I-841 <i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM I-840	Miscela di: <i>Streptococcus infantarius</i> e <i>Lactobacillus plantarum</i> contenente almeno: <i>Streptococcus infantarius</i> $0,5 \times 10^9$ CFU/g e: <i>Lactobacillus plantarum</i> 2×10^9 CFU/g	Vitelli	6 mesi	<i>Streptococcus infantarius</i> : 1×10^9 <i>Lactobacillus plantarum</i> : $0,5 \times 10^9$	<i>Streptococcus infantarius</i> : 1×10^9 <i>Lactobacillus plantarum</i> : $0,5 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	17.7.2004 ^(m)

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
20	<i>Bacillus licheniformis</i> DSM 5749 <i>Bacillus subtilis</i> DSM 5750 (Nel rapporto 1/1)	Miscela di <i>Bacillus licheniformis</i> e <i>Bacillus subtilis</i> contenente almeno: 3,2 × 10 ⁹ CFU/g additivo (1,6 × 10 ⁹ CFU/g di ciascun batterio)	Scrofe	15 gg prima del parto e durante l'allattamento	0,96 × 10 ⁹	1,92 × 10 ⁹	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	23.11.2004 ⁽⁹⁾
			Suini da ingrasso	—	0,48 × 10 ⁹	1,28 × 10 ⁹	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	23.11.2004 ⁽⁹⁾
			Polli da ingrasso	—	3,2 × 10 ⁹	3,2 × 10 ⁹	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati:amprolium-etopabato, diclazuril, alofuginone, meticlorpindolo/ metilbenzoquato, monensin sodico, nicarbazina, robenidina, salinomicina sodica.	23.11.2004 ⁽⁹⁾

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
			Tacchini da ingrasso	—	1,28 × 10 ⁹	3,2 × 10 ⁹	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: amprolium-etopabato, diclazuril, alofuginone, meticlorpindolo/ metilbenzoquato, monensin sodico, nicarbazina, robenidina, salinomicina sodica.	23.11.2004 ⁽⁹⁾
			Vitelli	6 mesi	1,28 × 10 ⁹	1,6 × 10 ⁹	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	28.2.2005 ⁽⁹⁾
21	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 3530	Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno: 2,5 × 10 ⁹ CFU/g	Vitelli	6 mesi	1 × 10 ⁹	1 × 10 ⁹	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	28.2.2005 ⁽⁹⁾

^(a) Prima autorizzazione: direttiva 97/72/CE della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 55).

^(b) Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione (GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4).

^(c) Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 639/1999 della Commissione (GU L 82 del 26.3.1999, pag. 6).

^(d) Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 1245/1999 della Commissione (GU L 150 del 17.6.1999, pag. 15).

^(e) Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15).

^(f) Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 21).

^(g) Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56).

^(h) Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 2374/98 della Commissione (GU L 295 del 4.11.1998, pag. 3).

⁽ⁱ⁾ Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17).

^(j) Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33).

^(k) Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 654/2000 della Commissione (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 26).

^(l) Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione (GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15).

^(m) Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 1887/2000 della Commissione (GU L 227 del 7.9.2000, pag. 13).

⁽ⁿ⁾ Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 2437/2000 della Commissione (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 28).

^(o) Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 2697/2000 della Commissione (GU L 319 del 16.12.2000, pag. 1).

^(p) Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione (GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3).

^(q) Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione (GU L 130 del 12.5.2001, pag. 25).

^(r) Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 1334/2001 della Commissione (GU L 180 del 3.7.2001, pag. 18).

^(s) Prima autorizzazione: regolamento (CE) n. 2013/2001 della Commissione (GU L 272 del 13.10.2001, pag. 24).

^(t) Situazione al 15 novembre 2001.

^(u) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

^(v) GU L 124 del 18.5.1991, pag. 1.

^(w) Riferimento bibliografico: Fresenius Z. Anal Chem (1984) 318: 522-524, Springer-Verlag 1984.

- (⁵) Qualora non sia stato fissato, se del caso, un tenore massimo specifico sulla scorta di dati sufficienti relativi alla presenza di diossine, a decorrere dal 15 ottobre 2000 si applica il tenore massimo di 500 pg OMS-PCDD/F-TEQ/kg.
- (⁶) Il tenore in diossine è dato dalla somma di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e di policlorodibenzofurani (PCDF), espresso in equivalenti tossici dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), applicando i TEQ-OMS (equivalenti tossici, 1997).
- (⁷) 1 FTU/1 FYT è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di fosfato inorganico, al minuto, a partire dal fitato di sodio con pH 5,5 e a 37 °C.
- (⁸) 1 GALU è il quantitativo di enzima che idrolizza 1 micromole di p-nitrofenil-alfa-galattopiranoside al minuto, con pH 5,0 e a 37 °C.
- (⁹) 1 FBG è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) a partire da orzo beta-glucano, al minuto con pH 5,0 e a 30 °C.
- (¹⁰) 1 FXU è il quantitativo di enzima che libera 7,8 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da azo-grano arabinosilani, al minuto con pH 6,0 e a 50 °C.
- (¹¹) 1 FXU è il quantitativo di enzima che libera 3,1 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da azo-grano arabinosilano, al minuto, con pH 6,0 e a 50 °C.
- (¹²) 1 FXU è il quantitativo di enzima che libera 0,15 micromoli di xilosio a partire da xilano azzurrino-reticolato, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.
- (¹³) 1 BGU è il quantitativo di enzima che libera 0,15 micromoli di glucosio a partire da beta-glucano azzurrino-reticolato, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.
- (¹⁴) 1 EXU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da arabinosilano, al minuto, con pH 3,5 e a 55 °C.
- (¹⁵) 1 RAU è il quantitativo di enzima che trasforma un mg di amido solubile in un prodotto con capacità di assorbimento pari a un colore di riferimento a 620 nm, dopo reazione in presenza di iodio, al minuto, con pH 6,6 e a 30 °C.
- (¹⁶) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,1 micromoli di glucosio a partire da carbossimetilcellulosa, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.
- (¹⁷) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,1 micromoli di glucosio a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.
- (¹⁸) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,1 micromoli di glucosio a partire da xilano di avena e di farro, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.
- (¹⁹) 1 BGU è il quantitativo di enzima che libera 0,278 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 3,5 e a 40 °C.
- (²⁰) 1 EXU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da arabinosilano di frumento, al minuto, con pH 3,5 e a 55 °C.
- (²¹) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di xilosio, a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 5,3 e a 50 °C.
- (²²) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 30 °C.
- (²³) 1 CU è il quantitativo di enzima che libera 0,128 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.
- (²⁴) 1 EPU è il quantitativo di enzima che libera 0,0083 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da xilano di farro e di avena, al minuto, con pH 4,7 e a 30 °C.
- (²⁵) 1 AGL è il quantitativo di enzima che libera 5,55 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 4,6 e a 30 °C.
- (²⁶) 1 AXC è il quantitativo di enzima che libera 17,2 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da xilano di avena, al minuto, con pH 4,7 e a 30 °C.
- (²⁷) 1 BGN è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 4,8 e a 50 °C.
- (²⁸) 1 IFP è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di avena, al minuto, con pH 4,8 e a 50 °C.
- (²⁹) 1 QGU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di avena, al minuto, con pH 5,1 e a 50 °C.
- (³⁰) 1 QGU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 4,8 e a 50 °C.
- (³¹) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di avena, al minuto, con pH 4,0 e a 30 °C.
- (³²) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di avena, al minuto, con pH 4,0 e a 30 °C.
- (³³) 1 BU è il quantitativo di enzima che libera 0,06 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 4,8 e a 50 °C.
- (³⁴) 1 BXU è il quantitativo di enzima che libera 0,06 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 5,3 e a 50 °C.
- (³⁵) 1 PPU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico a partire da fitato di sodio, al minuto, con pH 5 e a 37 °C.
- (³⁶) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 2,78 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 50 °C.
- (³⁷) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 5,55 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da beta-glucano di betulla, al minuto, con pH 5,5 e a 50 °C.
- (³⁸) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 4,00 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di avena, al minuto, pH 4,5 e a 40 °C.
- (³⁹) 1 EU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di avena al minuto, con pH 5,3 e a 50 °C.
- (⁴⁰) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di frumento, al minuto, con pH 4,0 e a 30 °C.
- (⁴¹) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di composto fenolico (equivalenti tirosina), a partire da substrato di caseina, al minuto, con pH 7,5 e a 40 °C.
- (⁴²) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di amido solubile in acqua, al minuto, con pH 6,5 e a 37 °C.
- (⁴³) 1 U è il quantitativo di enzima che idrolizza 1 micromole di legami di glucosio a partire da un substrato di polimero amilaceo reticolato, non solubile in acqua, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.
- (⁴⁴) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di materiale riduttore (equivalenti acido galatturonico), a partire da substrato poli D-galatturonico, al minuto, con pH 5,6 e a 37 °C.
- (⁴⁵) 1 KNU è il quantitativo di enzima che libera 672 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da amido solubile, al minuto, con pH 5,6 e a 37 °C.
- (⁴⁶) 1 FYT è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico, al minuto, a partire da fitato di sodio, con pH 5,5 e a 37 °C.
- (⁴⁷) 1 IU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.
- (⁴⁸) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 7,5 e a 30 °C.
- (⁴⁹) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da carbossimetilcellulosa, al minuto, con pH 4,8 e a 50 °C.
- (⁵⁰) 1 U è il quantitativo di enzima che idrolizza 1 micromole di glucosio a partire da un polimero amilaceo reticolato, al minuto, con pH 7,5 e a 37 °C.
- (⁵¹) 1 U è il quantitativo di enzima che idrolizza 1 micromole di legami di glucosio a partire da un substrato di polimero amilaceo reticolato non solubile in acqua, al minuto, con pH 7,5 e a 37 °C.
- (⁵²) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di azocaseina solubile in acido trichloroacetico al minuto, con pH 7,5 e a 37 °C.
- (⁵³) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0067 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 5,3 e a 50 °C.

ALLEGATO I

ELENCO DI TALUNI ADDITIVI AUTORIZZATI APPARTENENTI AI GRUPPI DEGLI ANTIBIOTICI, DEI COCCIDIOSTATICI E DEI FATTORI DI CRESCITA SOTTOPOSTI A UN PERIODO DI REVISIONE NELL'AMBITO DELL'ARTICOLO 9 G DELLA DIRETTIVA 70/524/CEE E INSERITI NELL'ALLEGATO I PRIMA DEL 1° GENNAIO 1988

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			
Antibiotici									
E 712		Flavofosfolipol	C ₇₀ H ₁₂₄ O ₄₀ N ₆ P	Galline ovaiole	—	2	5	—	30.9.2003
				Tacchini	26 settimane	1	20	—	30.9.2003
				Polli da ingrasso	16 settimane	1	20	—	30.9.2003
				Suinetti	3 mesi	10	25	Solo negli alimenti per allattamento	30.9.2003
				Suini	6 mesi	1	20	—	30.9.2003
				Vitelli	6 mesi	6	16	—	30.9.2003
					6 mesi	8	16	Solo negli alimenti per allattamento	30.9.2003
	Bovini da ingrasso	—	2	10	Indicare nelle istruzioni d'uso: «Il quantitativo di flavofosfolipol nella razione giornaliera non deve superare i 40 mg per 100 kg di peso animale e 1,5 mg per ogni 10 kg aggiuntivi di peso animale».	30.9.2003			
E 714		Monensin sodico	C ₃₆ H ₆₁ O ₁₁ Na (sale sodico di un acido polietere monocarbossilico prodotto a partire da <i>Streptomyces cinnamonensis</i>)	Bovini da ingrasso	—	10	40	Indicare nelle istruzioni d'uso: «Il quantitativo di monensin sodico nella razione giornaliera non deve superare i 140 mg per 100 kg di peso animale e 6 mg per ogni 10 kg aggiuntivi di peso animale». «Pericoloso per gli equidi». «Alimento contenente uno ionoforo: l'uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad esempio tiamulin) può essere controindicato».	30.9.2003

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose									
E 756		Decochinato	3-etossicarbonil-4-idrossi-6-decilossi-7-etossiquinolina	Polli da ingrasso	—	20	40	Somministrazione vietata almeno 3 giorni prima della macellazione	30.9.2003
E 757		Monensin sodico	C ₃₆ H ₆₁ O ₁₁ Na (sale sodico di un acido polietere monocarbossilico prodotto a partire da <i>Streptomyces cinnamonensis</i>)	Polli da ingrasso	—	100	125	Somministrazione vietata almeno 3 giorni prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni d'uso: «Pericoloso per gli equidi». «Alimento contenente uno ionoforo: l'uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad esempio tiamulin) può essere controindicato».	30.9.2003
				Pollastre destinate alla produzione di uova	16 settimane	100	120	Indicare nelle istruzioni d'uso: «Pericoloso per gli equidi». «Alimento contenente uno ionoforo: l'uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad esempio tiamulin) può essere controindicato».	30.9.2003
				Tacchini	16 settimane	90	100	Somministrazione vietata almeno 3 giorni prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni d'uso: «Pericoloso per gli equidi». «Alimento contenente uno ionoforo: l'uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad esempio tiamulin) può essere controindicato».	30.9.2003
E 758		Robenidina	Cloridrato di 1,3-bis[(4-clorobenzilidene)amino]guanidina	Polli da ingrasso	—	30	36	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione	30.9.2003
				Tacchini	—	30	36	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione	30.9.2003
				Conigli da ingrasso	—	50	66	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione	30.9.2003

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			
E 763		Lasalocid sodico	C ₃₄ H ₅₃ O ₈ Na (sale sodico di un acido polietere monocarbossilico prodotto a partire da <i>Streptomyces lasaliensis</i>)	Polli da ingrasso	—	75	125	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni d'uso: «Alimento contenente uno ionoforo: l'uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose può essere controindicato».	30.9.2003
				Pollastre destinate alla produzione di uova	16 settimane	75	125	Indicare nelle istruzioni d'uso: «Alimento contenente uno ionoforo: l'uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose può essere controindicato».	30.9.2003
E 764		Alofuginone	DL-trans-7-bromo-6-cloro-3-(3-(3-idrossi-2-piperidi)acetoni) chinazolin-4(3H)-one bromidrato	Polli da ingrasso	—	2	3	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione	30.9.2003
				Tacchini	12 settimane	2	3	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione	30.9.2003
E 765		Narasin	C ₄₃ H ₇₂ O ₁₁ (acido polietere monocarbossilico prodotto a partire da <i>Streptomyces aureofaciens</i>)	Polli da ingrasso	—	60	70	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni d'uso: «Pericoloso per gli equidi». «Alimento contenente uno ionoforo: l'uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad esempio tiamulin) può essere controindicato».	30.9.2003

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			
E 766		Salinomicina sodica	C ₄₂ H ₆₉ O ₁₁ Na (sale sodico di un acido polietere monocarbossilico prodotto a partire da <i>Streptomyces albus</i>) Tenore di elaiofilina: inferiore a 42 mg per kg di salinomicina sodica Tenore di 17-epi-20-deossi-salinomicina: inferiore a 40 g per kg di salinomicina sodica	Polli da ingrasso	—	50	70	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione Indicare nelle istruzioni d'uso: «Pericoloso per gli equidi». «Alimento contenente uno ionoforo: l'uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad esempio tiamulin) può essere controindicato».	30.9.2003
Fattori di crescita									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ALLEGATO II

ELENCO DEI RIFERIMENTI NEGLI ATTI COMUNITARI CHE HANNO MODIFICATO L'ELENCO DEGLI ADDITIVI AUTORIZZATI A PARTIRE DALL'ULTIMO CONSOLIDAMENTO DEGLI ALLEGATI ALLA DIRETTIVA 70/524/CEE DEL CONSIGLIO NELLA DIRETTIVA 91/248/CEE DELLA COMMISSIONE ⁽⁵⁴⁾

1. ELENCO DELLE VARIE DIRETTIVE

Dir. 91/249/CEE	Direttiva 91/249/CEE della Commissione, del 19 aprile 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 124 del 18.5.1991, pag. 43
Dir. 91/336/CEE	Direttiva 91/336/CEE della Commissione, del 10 giugno 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 185 dell'11.7.1991, pag. 31
Dir. 91/508/CEE	Direttiva 91/508/CEE della Commissione, del 9 settembre 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 271 del 27.9.1991, pag. 67
Dir. 91/620/CEE	Direttiva 91/620/CEE della Commissione, del 22 novembre 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 334 del 5.12.1991, pag. 62
Dir. 92/64/CEE	Direttiva 92/64/CEE della Commissione, del 13 luglio 1992, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 221 del 6.8.1992, pag. 51
Dir. 92/99/CEE	Direttiva 92/99/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 350 dell'1.12.1992, pag. 83
Dir. 92/113/CEE	Direttiva 92/113/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1992, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione animale	GU L 16 del 25.1.1993, pag. 2
Dir. 93/27/CEE	Direttiva 93/27/CEE della Commissione, del 4 giugno 1993, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 179 del 22.7.1993, pag. 5
Dir. 93/55/CEE	Direttiva 93/55/CEE della Commissione, del 25 giugno 1993, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 206 del 18.8.1993, pag. 11
Dir. 93/107/CE	Direttiva 93/107/CE della Commissione, del 26 novembre 1993, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 299 del 4.12.1993, pag. 44
Dir. 94/17/CE	Direttiva 94/17/CE della Commissione, del 22 aprile 1994, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 105 del 26.4.1994, pag. 19
Dir. 94/41/CE	Direttiva 94/41/CE della Commissione, del 18 luglio 1994, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 209 del 12.8.1994, pag. 18

⁽⁵⁴⁾ GU L 124 del 18.5.1991, pag. 1.

Dir. 94/50/CE	Direttiva 94/50/CE della Commissione, del 31 ottobre 1994, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 297 del 18.11.1994, pag. 27
Dir. 94/77/CE	Direttiva 94/77/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 350 del 31.12.1994, pag. 113
Dir. 95/37/CE	Direttiva 95/37/CE della Commissione, del 18 luglio 1995, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 172 del 22.7.1995, pag. 21
Dir. 95/55/CE	Direttiva 95/55/CE della Commissione, del 31 ottobre 1995, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 263 del 4.11.1995, pag. 18
Dir. 96/7/CE	Direttiva 96/7/CE della Commissione, del 21 febbraio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 45
Dir. 96/66/CE	Direttiva 96/66/CE della Commissione, del 14 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 272 del 25.10.1996, pag. 32
Dir. 97/6/CE	Direttiva 97/6/CE della Commissione, del 30 gennaio 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 35 del 5.2.1997, pag. 11
Dir. 97/72/CE	Direttiva 97/72/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 351 del 23.12.1997, pag. 55
Dir. 98/19/CE	Direttiva 98/19/CE della Commissione, del 18 marzo 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39

2. ELENCO DEI VARI REGOLAMENTI

Reg. 1436/98	Regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione, del 3 luglio 1998, che autorizza alcuni additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15
Reg. 2316/98	Regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione, del 26 ottobre 1998, che concerne l'autorizzazione di nuovi additivi e modifica le condizioni di autorizzazione per alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali	GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4
Reg. 2374/98	Regolamento (CE) n. 2374/98 della Commissione, del 3 novembre 1998, che autorizza nuovi additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 295 del 4.11.1998, pag. 3
Reg. 2785/98	Regolamento (CE) n. 2785/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alla modifica della validità delle autorizzazioni degli additivi di cui all'articolo 9, lettera E, paragrafo 3, della direttiva 70/524/CEE del Consiglio	GU L 347 del 23.12.1998, pag. 21
Reg. 2786/98	Regolamento (CE) n. 2786/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alla modifica della validità delle autorizzazioni degli additivi di cui all'articolo 9, lettera I, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE del Consiglio	GU L 347 del 23.12.1998, pag. 25
Reg. 2788/98	Regolamento (CE) n. 2788/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, in ordine alla revoca dell'autorizzazione di taluni fattori di crescita	GU L 347 del 23.12.1998, pag. 31

Reg. 2821/98	Regolamento (CE) n. 2821/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, in ordine alla revoca dell'autorizzazione di taluni antibiotici	GU L 351 del 29.12.1998, pag. 4
Reg. 45/1999	Regolamento (CE) n. 45/1999 della Commissione, dell'11 gennaio 1999, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali in ordine al ritiro dell'autorizzazione di taluni coccidiostatici e di altre sostanze medicamentose	GU L 6 del 12.1.1999, pag. 3
Reg. 639/1999	Regolamento (CE) n. 639/1999 della Commissione, del 25 marzo 1999, che concerne l'autorizzazione di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali	GU L 82 del 26.3.1999, pag. 6
Reg. 866/1999	Regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione, del 26 aprile 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 108 del 27.4.1999, pag. 21
Reg. 1245/1999	Regolamento (CE) n. 1245/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, riguardante l'autorizzazione di nuovi additivi negli alimenti per animali	GU L 150 del 17.6.1999, pag. 15
Reg. 1411/1999	Regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione, del 29 giugno 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56
Reg. 1594/1999	Regolamento (CE) n. 1594/1999 della Commissione, del 20 luglio 1999, relativo alla modifica delle condizioni di autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali	GU L 188 del 21.7.1999, pag. 35
Reg. 1636/1999	Regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione, del 26 luglio 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17
Reg. 2293/1999	Regolamento (CE) n. 2293/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che proroga le autorizzazioni provvisorie di taluni additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 284 del 6.11.1999, pag. 1.
Reg. 2430/1999	Regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione, del 16 novembre 1999, che associa l'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo «coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose» nell'alimentazione degli animali alle persone responsabili della loro immissione in circolazione	GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3
Reg. 2439/1999	Regolamento (CE) n. 2439/1999 della Commissione, del 17 novembre 1999, concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli «agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti» nell'alimentazione degli animali	GU L 297 del 18.11.1999, pag. 8.
Reg. 2562/1999	Regolamento (CE) n. 2562/1999 della Commissione, del 3 dicembre 1999, che associa l'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo «Antibiotici» nell'alimentazione degli animali alle persone responsabili della loro immissione in circolazione	GU L 310 del 4.12.1999, pag. 11.
Reg. 2690/1999	Regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33
Reg. 654/2000	Regolamento (CE) n. 654/2000 della Commissione, del 29 marzo 2000, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi, nuovi impieghi di additivi e nuovi preparati di additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 79 del 30.3.2000, pag. 26

Reg. 739/2000	Regolamento (CE) n. 739/2000 della Commissione, del 7 aprile 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2439/1999 concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli animali	GU L 87 dell'8.4.2000, pag. 14
Reg. 1353/2000	Regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione, del 26 giugno 2000, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo e l'autorizzazione temporanea di nuovi additivi, nuovi impieghi di additivi e nuovi preparati nell'alimentazione degli animali	GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15
Reg. 1887/2000	Regolamento (CE) n. 1887/2000 della Commissione, del 6 settembre 2000, concernente l'autorizzazione temporanea di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali	GU L 227 del 7.9.2000, pag. 13
Reg. 2437/2000	Regolamento (CE) n. 2437/2000 della Commissione, del 3 novembre 2000, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo e l'autorizzazione temporanea di nuovi additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 280 del 4.11.2000, pag. 28
Reg. 418/2001	Regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione, del 1° marzo 2001, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3
Reg. 937/2001	Regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione, dell'11 maggio 2001, concernente l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi, la nuova preparazione di additivi, la proroga delle autorizzazioni provvisorie e l'autorizzazione decennale relativa a un additivo per mangimi	GU L 130 del 12.5.2001, pag. 25
Reg. 1334/2001	Regolamento (CE) n. 1334/2001 della Commissione, del 2 luglio 2001, concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali	GU L 180 del 3.7.2001, pag. 18
Reg. 2013/2001	Regolamento (CE) n. 2013/2001 della Commissione, del 12 ottobre 2001, relativo all'autorizzazione provvisoria per l'uso di un nuovo additivo e all'autorizzazione permanente di un additivo nei prodotti alimentari	GU L 272 del 13.10.2001, pag. 24
Reg. 2200/2001	Regolamento (CE) n. 2200/2001 della Commissione, del 17 ottobre 2001, relativo all'autorizzazione provvisoria di additivi nell'alimentazione degli animali	GU L 299 del 15.11.2001, pag. 1
Reg. 2205/2001	Regolamento (CE) n. 2205/2001 della Commissione, del 14 novembre 2001, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di taluni additivi	GU L 297 del 15.11.2001, pag. 3