

REGLAMENTAI

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/423

2019 m. kovo 13 d.

kuriuo biocidinių produktų grupei „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo ⁽¹⁾, ypač į jo 44 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

- (1) 2015 m. rugpjūčio 27 d. bendrovė „SCC GmbH“ bendrovės „Novadan ApS“ vardu pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalį pateikė paraišką suteikti biocidinių produktų grupei „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan“ (toliau – biocidinių produktų grupė) (produktai priskiriami 3-io tipo produktams, kaip apibrėžta to reglamento V priede) autorizacijos liudijimą. Danijos kompetentinga institucija sutiko įvertinti tą paraišką, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalyje. Paraiška buvo užregistruota Biocidinių produktų registre bylos numeriu BC-YV019394–00;
- (2) biocidinių produktų grupėje yra jodo, įskaitant polivinilpirolidonjodą, kaip veikliosios medžiagos, kuri yra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašą. Atsižvelgdama į šiai veikliajai medžiagai būdingas savybes ir į Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 ⁽²⁾ nustatytus mokslinius endokrininės sistemos ardumų savybių nustatymo kriterijus, Komisija apsvarstys būtinybę peržiūrėti jodo, įskaitant polivinilpirolidonjodą, patvirtinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 15 straipsnį. Priklausomai nuo tos peržiūros rezultatų, Komisija svarstys, ar produktų, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, Sąjungos autorizacijos liudijimai turi būti peržiūrėti pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 48 straipsnį;
- (3) 2018 m. balandžio 11 d. vertinančioji kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 1 dalį pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) vertinimo ataskaitą bei jos atlikto vertinimo išvadas;
- (4) 2018 m. spalio 31 d. Agentūra pateikė Komisijai savo nuomonę ⁽³⁾, įskaitant biocidinių produktų grupės charakteristikų santraukos projektą, ir galutinę biocidinių produktų grupės vertinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 3 dalį. Nuomonėje padaryta išvada, kad ši biocidinių produktų grupė atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies s punkte nustatytą biocidinių produktų grupės apibrėžtį, kad jai gali būti suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas pagal to reglamento 42 straipsnio 1 dalį ir kad, jei laikomasi produkto charakteristikų santraukos projekto, biocidinių produktų grupė atitinka to reglamento 19 straipsnio 1 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas;
- (5) 2019 m. sausio 17 d. Agentūra pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 4 dalį pateikė Komisijai biocidinio produkto charakteristikų santraukos projektą visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;
- (6) Komisija pritaria Agentūros nuomonei ir mano, kad yra tinkama suteikti Sąjungos autorizacijos liudijimą biocidinių produktų grupei;

⁽¹⁾ OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

⁽²⁾ 2017 m. rugsėjo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2100, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardumų savybių nustatymo kriterijai (OL L 301, 2017 11 17, p. 1).

⁽³⁾ ECHA opinion of 6 July 2018 on the Union authorisation of „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan“ (ECHA/BPC/215/2018).

(7) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sąjungos autorizacijos liudijimas suteikiamas bendrovei „Novadan ApS“ biocidinių produktų grupei „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan“, kurios autorizacijos liudijimo numeris yra EU-0019757–0000.

Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2019 m. balandžio 7 d. iki 2029 m. kovo 31 d.

Sąjungos autorizacijos liudijimas suteikiamas pagal priede pateiktą biocidinio produkto charakteristikų santrauką.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER

PRIEDAS

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

Teat disinfectants biocidal product family of Novadan

PT 03 – Veterinarinė higiena (dezinfekcijos priemonės)

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0019757–0000

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris: EU-0019757–0000

I DALIS

PIRMAS INFORMACIJOS LYGMUO

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Grupės pavadinimas

Pavadinimas	Novadan spenių dezinfekantų biocidinių produktų grupė
-------------	---

1.2. Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)	PT 03 - Veterinarinė higiena
----------------------	------------------------------

1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Novadan ApS
	Adresas	Platinvej 21, 6000 Kolding, Danija
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0019757–0000	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	EU-0019757–0000	
Autorizacijos liudijimo data	2019 m. balandžio 7 d.	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2029 m. kovo 31 d.	

1.4. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Novadan ApS
Gamintojo adresas	Platinvej 21, 6000 Kolding Danija
Gamybos vieta	Platinvej 21, 6000 Kolding Danija

1.5. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Polivinilpirolidonjodas
Gamintojo pavadinimas	Marcus Research Laboratory, Inc.
Gamintojo adresas	Delmar Blvd., 63103–1789 Saint Louis, Missouri Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	Delmar Blvd., 63103–1789 Saint Louis, Missouri Jungtinės Amerikos Valstijos

Veiklioji medžiaga	Jodas
Gamintojo pavadinimas	Cosayach Nitratos S.A.
Gamintojo adresas	Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Čilė
Gamybos vieta	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Čilė
Veiklioji medžiaga	Jodas
Gamintojo pavadinimas	ACF Minera S.A.
Gamintojo adresas	San Martin No 499, 1100000 Iquique Čilė
Gamybos vieta	Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Čilė
Veiklioji medžiaga	Jodas
Gamintojo pavadinimas	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Gamintojo adresas	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Čilė
Gamybos vieta	Nueva Victoria gamykla, 5090000 Pedro de Valdivia gamykla Čilė

2. PRODUKTO GRUPĖS SUDĖTIS IR FORMULIACIJA

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Polivinilpirolidonjodas		Veiklioji medžiaga	25655–41–8		0,714	3,57
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,15	0,75

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)	SL - Vandenyje tirpūs koncentratas AL - Bet koks kitas skystis EW - Aliejinė emulsija vandenyje
-------------------	---

II DALIS

ANTRAS INFORMACIJOS LYGMUO – PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA (-OS)

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 1

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto charakteristikų metasantraukos 1 identifikatorius

Identifikatorius	meta-SPC 1
------------------	------------

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-1
---------	-----

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT 03 - Veterinarinė higiena
----------------------	------------------------------

2. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 SUDĖTIS

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 1**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Polivinilpirolidonjodas		Veiklioji medžiaga	25655-41-8		3,57	3,57
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,75	0,75

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje 1 nurodyto mišinio tipas (-ai)**

Formuliacia (-os)	SL - Vandenyje tirpūs koncentratas
-------------------	------------------------------------

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos	Gali ėsdinti metalus. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Pavojingumo frazės	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti tik originalioje pakuotėje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. turinį išpilti (išmesti) į vietos/regiono/nacionalinių/tarptautinių taisyklių. talpyklą išpilti (išmesti) į vietos/regiono/nacionalinių/tarptautinių taisyklių.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS

4.1. **Naudokite aprašymą****Lentelė 1. Naudojimas # 1 – mirkymas rankiniu būdu po melžimo (koncentratas)**

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės

Naudojimo sritis	vida VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	mirkymas rankiniu būdu (koncentratas) Pripildyti indą atskiestu koncentratu ir ant viršaus užsukti mirkymo puodelį. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinę popierinę servetėlę arba audiniu. Po melžimo, suspausti indą ir kiekvieną spenį pamerkti į mirkymo puodelį, įsitikinant, kad dezinfekavimo skystis apsemia spenį per visą jo ilgį. Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu paspaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei mirkymo puodelį vandeniu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	atskiedimą 20 % Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. - Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2. Naudokite aprašymą

Lentelė 2. Naudojimas # 2 –purškimas po melžimo rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu (koncentratas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Purškimas rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu (koncentratas) Pripildyti indą atskiestu koncentratu ir ant viršaus užsukti mechaninį purkštuvą. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinę popierinę servetėlę arba audiniu. Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo priemone, naudojant mechaninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasidengia dezinfekavimo priemone. Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu paspaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei purkštuvą vandeniu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	atskiedimą 20 % Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. - Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dezinfekuojant rankinio purškimo būdu, būtina mūvėti pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).

4.2.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3. Naudokite aprašymą

Lentelė 3. Naudojimas # 3 – purškimas po melžimo rankiniu būdu, elektroniniu purkštuvu (koncentratas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Purškimas rankiniu būdu, elektroniniu purkštuvu (koncentratas) Atidaryti indą, kuriame yra atskiestas koncentratas, ir į jį įstatyti elektroninio purkštuvu siurbimo vamzdelį. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinę popierinę servetėlę arba audiniu. Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo priemone, naudojant elektroninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasidengia dezinfekavimo priemone. Jei reikia, pakeisti tuščią indą nauju. Po dezinfekavimo įstatyti purkštuvu siurbimo vamzdelį į kibirą su vandeniu ir praskalauti purkštuvą purškiant vandenį.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	atskiedimą 20 % Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. - Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dezinfekuojant rankinio purškimo būdu, būtina mūvėti pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).

4.3.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginę arba netiesioginę poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4. Naudokite aprašymą

Lentelė 4. Naudojimas # 4 – mirkymas automatinio būdu po melžimo (koncentratas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	mirkymas automatinio būdu (koncentratas) Atidaryti indą, kuriame yra atskiestas koncentratas, ir į jį įstatyti automatinės mirkymo sistemos siurbimo vamzdelį. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinę popierinę servetėlę arba audiniu. Po melžimo, išjungus vakuumą, į kolektorių išvirkščiamas spenių dezinfekuojamasis skystis. Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami apie 2–4 ml skysčio. Nuėmus melžiklius, visos automatinės spenių mirkymo sistemos linijos kruopščiai išskalaujamos vandeniu ir prapučiamos aukšto slėgio oro srove. Paskutiniame valymo etape po kiekvieno bandos melžimo, linijos yra dezinfekuojamos (pvz., priemone, kurios sudėtyje yra chloro) ir dar kartą prapučiamos aukšto slėgio oro srove. Po tokios procedūros melžimo sistema yra parengta kitam melžimui. Visas procesas yra automatizuotas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	atskiedimą 20 % Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. - Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5. Naudokite aprašymą

Lentelė 5. Naudojimas # 5 – purškimas po melžimo automatinio būdu naudojant melžimo robotą (koncentratas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	purškimas automatinio būdu naudojant robotą (koncentratas) Atidaryti indą, kuriame yra atskiestas koncentratas, ir į jį įstatyti melžimo roboto siurbimo vamzdelį. Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus melžimo procedūrą, 2–4 ml dezinfekavimo priemonės automatiškai užpurškiama ant spenių. Purkštuvą skalaujamas automatiškai.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	atskiedimą 20 % Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. - Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

5. BENDRIEJI ⁽¹⁾ PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Atskiesti koncentratą perpilant arba pumpuojant. Pripildyti indą atskiestu koncentratu ir ant viršaus užsukti mirkymo puodelį. Koncentratą reikia atskiesti santykiu 1:4. Koncentruotame produkte meta-SPC 1 yra 0,89 % bendro jodo, jis yra skiedžiamas santykiu 1:4, kad būtų gautas darbinis tirpalas, kuriame yra 0,178 % bendro jodo. Tai atitinka 20 % atskiedimą.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Produktus prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Siekiant užtikrinti reikiamą priemonės poveikio laiką, reikia pasirūpinti, kad produktas nebūtų pašalintas po naudojimo. Po melžimo, panaudojus produktą ant spenių būtina, kad galvijai pastovėtų bent penkias minutes.

5.2. **Rizikos valdymo priemonės**

Jei dezinfekuoti reikia prieš ir po melžimo, prieš melžimą skirtai dezinfekcijai reikia naudoti kitą priemonę, kurios sudėtyje nėra jodo.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra: Išnešti nukentėjusįjį asmenį iš užterštos aplinkos.

Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir laikyti jį padėtyje, leidžiančioje laisvai kvėpuoti. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.

Patekus ant odos: nuplauti vandeniu. Nusivilkti užterštus drabužius ir nuslauti batus. Pasireiškus bet kokiai odos reakcijai arba diskomfortui kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant praskalauti vandeniu (mažiausiai 15 minučių). Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.

Prarijus: pasireiškus simptomams ir (arba) į burną patekus dideliu produkto kiekiui, nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų gydymo specialistą. Neduoti gerti skysčių ir neskatinti vėmimo, jeigu nukentėjusysis neteko sąmonės; netekusį sąmonės asmenį patogiai paguldyti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Prireikus medicininės pagalbos, su savimi turėti dezinfekavimo priemonės talpą arba etiketę.

Ekologinių avarijų likvidavimo priemonės

Neleisti medžiagai patekti į nutekamuosius vamzdžius, kanalizaciją ar vandentakius.

Informuoti atitinkamas institucijas, jeigu produktas užteršė aplinką (pateko į kanalizaciją, vandentakius, dirvožemį ar orą).

Supilti pylimus siekiant surinkti didesnę išsiliejusios medžiagos kiekį.

Išsiliejusią medžiagą absorbuoti inertiška medžiaga, tada supilti į tinkamą uždara talpą, kad būtų galima pašalinti laikantis taikomų reikalavimų.

Išsiliejusios medžiagos negalima pilti atgal į originalią talpyklą.

⁽¹⁾ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudotojui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 1.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Utilizavimo būdas: nepanaudotus produkto likučius ir pakuotę utilizuoti pagal vietos taisykles. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima išpilti į nuotekų kanalizaciją arba srutų laikymo vietoje, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įrenginius.

Tuščias talpas reikia išskalauti dideliu kiekiu vandens ir utilizuoti kartu su įprastomis arba gamybinėmis atliekomis.

Panaudotos spenių šluostymui popierinės servetėlės ir rankšluosčiai šalinami kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.

Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingos atliekos

Pakuotė nėra klasifikuojama kaip pavojingos atliekos

Europos atliekų katalogo (EWC) atliekų kodas: EWC: 0706 riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos

Kita informacija: tvarkant atliekas turi būti atsižvelgta į atsargumo priemones, taikomas produkto naudojimui. Atliekų kodas taikomas produkto likučiams gryna forma.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Paminėta SDL: laikyti originalioje talpykloje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nepermatomose talpyklose. Laikyti atskirai nuo maisto, pašarų, trąšų ir kitų jautrių medžiagų. Laikyti aukštesnėje nei užšalimo temperatūroje.

Laikymo temperatūra: 0–30 °C

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6. KITA INFORMACIJA

meta-SPC 1 pH ribos: 4–5

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 1**7.1. Kiekvieno atskiuro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Nova Dip IO Dip Udder Des 1:4 Jod Ewodip Jodopax vet Fova Dip 1:4 Tehotippi				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0019757–0001 1–1				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Polivinilpirolidonjodas		Veiklioji medžiaga	25655–41–8		3,57
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,75

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 2**1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA****1.1. Produkto charakteristikų metasantraukos 2 identifikatorius**

Identifikatorius	meta-SPC 2
------------------	------------

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

Numeris	1–2
---------	-----

1.3. Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)	PT 03 - Veterinarinė higiena
----------------------	------------------------------

2. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 SUDĖTIS

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 2

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Polivinilpirolidonjodas		Veiklioji medžiaga	25655–41–8		1,0	1,42
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,21	0,298

2.2. Produkto charakteristikų metasantraukoje 2 nurodyto mišinio tipas (-ai)

Formuliacia (-os)	AL - Bet koks kitas skystis
-------------------	-----------------------------

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Pavojingumo frazės	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. turinį išpilti (išmesti) į vietos/regiono/nacionalinių/tarptautinių taisyklių. talpyklą išpilti (išmesti) į vietos/regiono/nacionalinių/tarptautinių taisyklių.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS

4.1. Naudokite aprašymą

Lentelė 6. Naudojimas # 1 – mirkymas po melžimo (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)	mirkymas rankiniu būdu (paruoštas naudoti produktas) Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mirkymo puodelį. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinę popierinę servetėlę arba audiniu. Po melžimo, suspausti indą ir kiekvieną spenį pamerkti į mirkymo puodelį, įsitikinant, kad dezinfekavimo skystis apsemia spenį per visą jo ilgį. Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu paspaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei mirkymo puodelį vandeniu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. – Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginę arba netiesioginę poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 7. Naudojimas # 2 – mirkymas automatinio būdu po melžimo (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buvolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)	mirkymas automatinio būdu (paruoštas naudoti produktas) Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti automatinės mirkymo sistemos siurbimo vamzdelį. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinė popierine servetėle arba audiniu. Po melžimo, išjungus vakuumą, į kolektorių išvirkščiamas spenių dezinfekuojamasis skystis. Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami apie 2–4 ml skysčio. Nuėmus melžiklius, visos automatinės spenių mirkymo sistemos linijos kruopščiai išskalaujamos vandeniu ir prapučiamos aukšto slėgio oro srove. Paskutiniame valymo etape po kiekvieno bandos melžimo, linijos yra dezinfekuojamos (pvz., priemone, kurios sudėtyje yra chloro) ir dar kartą prapučiamos aukšto slėgio oro srove. Po tokios procedūros melžimo sistema yra parengta kitam melžimui. Visas procesas yra automatizuotas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. - 0 (paruoštas naudoti produktas) Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

5. BENDRIEJI (*) PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1. Naudojimo instrukcijos

Produktus prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Siekiant užtikrinti reikiamą priemonės poveikio laiką, pasirūpinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas po naudojimo. Po melžimo, panaudojus produktą ant spenių būtina, kad galvijai pastovėtų bent penkias minutes.

(*) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudotojui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 2.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei dezinfekuoti reikia prieš ir po melžimo, prieš melžimą skirtai dezinfekcijai reikia naudoti kitą priemonę, kurios sudėtyje nėra jodo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra: Išnešti nukentėjusįjį asmenį iš užterštos aplinkos.

Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir laikyti jį padėtyje, leidžiančioje laisvai kvėpuoti. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.

Patekus ant odos: nuplauti vandeniu. Nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus. Pasireiškus bet kokiai odos reakcijai arba diskomfortui kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant praskalauti vandeniu (mažiausiai 15 minučių). Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.

Prarijus: pasireiškus simptomams ir (arba) į burną patekus dideliu produkto kiekiui, nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų gydymo specialistą. Neduoti gerti skysčių ir neskatinti vėmimo, jeigu nukentėjusysis neteko sąmonės; netekusį sąmonės asmenį patogiai paguldyti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Prireikus medicininės pagalbos, su savimi turėti dezinfekavimo priemonės talpą arba etiketę.

Ekologinių avarijų likvidavimo priemonės

Neleisti medžiagai patekti į nutekamuosius vamzdžius, kanalizaciją ar vandentakius.

Informuoti atitinkamas institucijas, jeigu produktas užteršė aplinką (pateko į kanalizaciją, vandentakius, dirvožemį ar orą).

Supilti pylimus siekiant surinkti didesnę išsiliejusios medžiagos kiekį.

Išsiliejusią medžiagą absorbuoti inertiška medžiaga, tada supilti į tinkamą uždarą talpą, kad būtų galima pašalinti laikantis taikomų reikalavimų.

Išsiliejusios medžiagos negalima pilti atgal į originalią talpyklą.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Utilizavimo būdas: nepanaudotus produkto likučius ir pakuotę utilizuoti pagal vietos taisykles. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima išpilti į nuotekų kanalizaciją arba srutų laikymo vietoje, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įrenginius.

Tuščias talpas reikia išskalauti dideliu kiekiu vandens ir utilizuoti kartu su įprastomis arba gamybinėmis atliekomis.

Panaudotos spenių šluostymui popierinės servetėlės ir rankšluosčiai šalinami kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.

Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingos atliekos

Pakuotė nėra klasifikuojama kaip pavojingos atliekos

Europos atliekų katalogo (EWC) atliekų kodas: EWC: 0706 riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos

Kita informacija: tvarkant atliekas turi būti atsižvelgta į atsargumo priemones, taikomas produkto naudojimui. Atliekų kodas taikomas produkto likučiams gryna forma.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Paminėta SDL: laikyti originalioje talpykloje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nepermatomose talpyklose. Laikyti atskirai nuo maisto, pašarų, trąšų ir kitų jautrių medžiagų. Laikyti aukštesnėje nei užšalimo temperatūroje.

Laikymo temperatūra: 0–30 °C

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6. KITA INFORMACIJA

meta-SPC 2 pH ribos: 4–5

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 2

7.1. Kiekvieno atskiuro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas	Jopo Film IO Super Dip Barrera Dip				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0019757-0002 1-2				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Polivinilpirolidonjodas		Veiklioji medžiaga	25655-41-8		1,42
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,298

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 3

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto charakteristikų metasantraukos 3 identifikatorius

Identifikatorius	meta-SPC 3
------------------	------------

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

Numeris	1-3
---------	-----

1.3. Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)	PT 03 - Veterinarinė higiena
----------------------	------------------------------

2. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 SUDĖTIS

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 3

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Polivinilpirolidonjodas		Veiklioji medžiaga	25655-41-8		0,82	0,99
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,172	0,208

2.2. Produkto charakteristikų metasantraukoje 3 nurodyto mišinio tipas (-ai)

Formuliacia (-os)	AL - Bet koks kitas skystis
-------------------	-----------------------------

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos	Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Pavojingumo frazės	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS

4.1. Naudokite aprašymą

Lentelė 8. Naudojimas # 1 – mirkymas rankiniu būdu po melžimo (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	mirkymas rankiniu būdu (paruoštas naudoti produktas) Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mirkymo puodelį. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinė popierine servetėle arba audiniu. Po melžimo, suspausti indą ir kiekvieną spenį pamerkti į mirkymo puodelį, įsitikinant, kad dezinfekavimo skystis apsemia spenį per visą jo ilgį. Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu paspaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei mirkymo puodelį vandeniu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

4.1.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2. Naudokite aprašymą

Lentelė 9. Naudojimas # 2 – mirkymas automatinio būdu po melžimo (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	mirkymas automatinio būdu (paruoštas naudoti produktas) Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti automatinės mirkymo sistemos siurbimo vamzdelį. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinėmis popierinėmis servetėlėmis arba audiniu. Po melžimo, išjungus vakuumą, į kolektorių išvirkščiamas spenių dezinfekuojamasis skystis. Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami apie 2–4 ml skysčio. Nuėmus melžiklius, visos automatinės spenių mirkymo sistemos linijos kruopščiai išskalaujamos vandeniu ir prapūčiamos aukšto slėgio oro srove. Paskutiniame valymo etape po kiekvieno bandos melžimo, linijos yra dezinfekuojamos (pvz., priemone, kurios sudėtyje yra chloro) ir dar kartą prapūčiamos aukšto slėgio oro srove. Po tokios procedūros melžimo sistema yra parengta kitam melžimui. Visas procesas yra automatizuotas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo)
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

4.2.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

- 4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

- 4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

- 4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

5. BENDRIEJI ⁽³⁾ PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mirkymo puodelį.

Produktus prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių

Siekiant užtikrinti reikiamą priemonės poveikio laiką, reikia pasirūpinti, kad produktas nebūtų pašalintas po naudojimo. Po melžimo, panaudojus produktą ant spenių būtina, kad galvijai pastovėtų bent penkias minutes.

5.2. **Rizikos valdymo priemonės**

Jei dezinfekuoti reikia prieš ir po melžimo, prieš melžimą skirtai dezinfekcijai reikia naudoti kitą priemonę, kurios sudėtyje nėra jodo.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra: Išnešti nukentėjusįjį asmenį iš užterštos aplinkos.

Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir laikyti jį padėtyje, leidžiančioje laisvai kvėpuoti. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.

Patekus ant odos: nuplauti vandeniu. Nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus. Pasireiškus bet kokiai odos reakcijai arba diskomfortui kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant praskalauti vandeniu (mažiausiai 15 minučių). Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.

Prarijus: pasireiškus simptomams ir (arba) į burną patekus dideliu produkto kiekiui, nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų gydymo specialistą. Neduoti gerti skysčių ir neskatinti vėmimo, jeigu nukentėjusysis neteko sąmonės; netekusį sąmonės asmenį patogiai paguldyti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Prireikus medicininės pagalbos, su savimi turėti dezinfekavimo priemonės talpą arba etiketę.

Ekologinių avarijų likvidavimo priemonės

Neleisti medžiagai patekti į nutekamuosius vamzdžius, kanalizaciją ar vandentakius.

Informuoti atitinkamas institucijas, jeigu produktas užteršė aplinką (pateko į kanalizaciją, vandentakius, dirvožemį ar orą).

Supilti pylimus siekiant surinkti didesnę išsiliejusios medžiagos kiekį.

Išsiliejusią medžiagą absorbuoti inertiška medžiaga, tada supilti į tinkamą uždara talpą, kad būtų galima pašalinti laikantis taikomų reikalavimų.

Išsiliejusios medžiagos negalima pilti atgal į originalią talpyklą.

⁽³⁾ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudotojui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 3.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Utilizavimo būdas: nepanaudotus produkto likučius ir pakuotę utilizuoti pagal vietos taisykles. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima išpilti į nuotekų kanalizaciją arba srutų laikymo vietoje, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įrenginius.

Tuščias talpas reikia išskalauti dideliu kiekiu vandens ir utilizuoti kartu su įprastomis arba gamybinėmis atliekomis.

Panaudotos spenių šluostymui popierinės servetėlės ir rankšluosčiai šalinami kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.

Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingos atliekos

Pakuotė nėra klasifikuojama kaip pavojingos atliekos

Europos atliekų katalogo (EWC) atliekų kodas: EWC: 0706 riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos

Kita informacija: tvarkant atliekas turi būti atsižvelgta į atsargumo priemones, taikomas produkto naudojimui. Atliekų kodas taikomas produkto likučiams gryna forma.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Paminėta SDL: laikyti originalioje talpykloje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nepermatomose talpyklose. Laikyti atskirai nuo maisto, pašarų, trąšų ir kitų jautrių medžiagų. Laikyti aukštesnėje nei užšalimo temperatūroje.

Laikymo temperatūra: 0–30 °C

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6. KITA INFORMACIJA

meta-SPC 3 pH ribos: 4–5

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 3

7.1. Kiekvieno atskiuro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas	Nova Dip Barriere IO Multi Dip				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0019757–0003 1–3				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Polivinilpirolidonjodas		Veiklioji medžiaga	25655–41–8		0,82
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,172

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 4

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 4 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto charakteristikų metasantraukos 4 identifikatorius

Identifikatorius	meta-SPC 4
------------------	------------

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

Numeris	1–4
---------	-----

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT 03 - Veterinarinė higiena
----------------------	------------------------------

2. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 4 SUDĖTIS

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 4**

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Polivinilpirolidonjodas		Veiklioji medžiaga	25655–41–8		0.714	0.99
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0.15	0.208

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje 4 nurodyto mišinio tipas (-ai)**

Formuliacia (-os)	AL - Bet koks kitas skystis
-------------------	-----------------------------

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 4 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos	Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Pavojingumo frazės	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 4 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS

4.1. **Naudokite aprašymą****Lentelė 10. Naudojimas # 1 – mirkymas rankiniu būdu po melžimo (paruoštas naudoti produktas)**

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buvolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	mirkymas rankiniu būdu (paruoštas naudoti produktas) Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mirkymo puodelį. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinė popierine servetėle arba audiniu. Po melžimo, suspausti indą ir kiekvieną spenį pamerkinti į mirkymo puodelį, įsitikinant, kad dezinfekavimo skystis apsemia spenį per visą jo ilgį. Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu paspaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei mirkymo puodelį vandeniu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. - Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginę arba netiesioginę poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 11. Naudojimas # 2 – purškimas po melžimo rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buvolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Purškimas rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu (paruoštas naudoti produktas) Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mechaninį purkštuvą. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinė popierine servetėle arba audiniu. Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo priemone, naudojant mechaninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasidengia dezinfekavimo priemone. Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu paspaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei purkštuvą vandeniu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Dezinfekuojant rankinio purškimo būdu, būtina mūvėti pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 12. Naudojimas # 3 – purškimas po melžimo rankiniu būdu, elektroniniu purkštuvu (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buvolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Purškimas rankiniu būdu, elektroniniu purkštuvu (paruoštas naudoti produktas) Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti elektroninio purkštovo siurbimo vamzdelį. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinė popierine servetėle arba audiniu. Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo priemone, naudojant elektroninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasidengia dezinfekavimo priemone. Jei reikia, pakeisti tuščią indą nauju. Po dezinfekavimo įstatyti purkštovo siurbimo vamzdelį į kibirą su vandeniu ir praskalauti purkštuvą purškiant vandenį.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Dezinfekuojant rankinio purškimo būdu, būtina mūvėti pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 13. Naudojimas # 4 – mirkymas automatiškai būdu po melžimo (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)	mirkymas automatinio būdu (paruoštas naudoti produktas) Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti automatinės mirkymo sistemos siurbimo vamzdelį. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinė popierine servetėle arba audiniu. Po melžimo, išjungus vakuumą, į kolektorių išvirkščiamas spenių dezinfekuojamasis skystis. Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami apie 2–4 ml skysčio. Nuėmus melžiklius, visos automatinės spenių mirkymo sistemos linijos kruopščiai išskalaujamos vandeniu ir prapučiamos aukšto slėgio oro srove. Paskutiniame valymo etape po kiekvieno bandos melžimo, linijos yra dezinfekuojamos (pvz., priemone, kurios sudėtyje yra chloro) ir dar kartą prapučiamos aukšto slėgio oro srove. Po tokios procedūros melžimo sistema yra parengta kitam melžimui. Visas procesas yra automatizuotas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5. Naudokite aprašymą

Lentelė 14. Naudojimas # 5 – purškimas po melžimo automatinio būdu naudojant melžimo robotą (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	purškimas automatinio būdu naudojant robotą (paruoštas naudoti produktas) Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti melžimo roboto siurbimo vamzdelį. Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus melžimo procedūrą, 2–4 ml dezinfekavimo priemonės automatiškai užpurškiama ant spenių. Purkštuvas skalaujamas automatiškai.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

5. BENDRIEJI (*) PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 4 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1. Naudojimo instrukcijos

Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mirkymo puodelį.

Produktus prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Siekiant užtikrinti reikiamą priemonės poveikio laiką, reikia pasirūpinti, kad produktas nebūtų pašalintas po naudojimo. Po melžimo, panaudojus produktą ant spenių būtina, kad galvijai pastovėtų bent penkias minutes.

(*) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuojamam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 4.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei dezinfekuoti reikia prieš ir po melžimo, prieš melžimą skirtai dezinfekcijai reikia naudoti kitą priemonę, kurios sudėtyje nėra jodo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra: Išnešti nukentėjusįjį asmenį iš užterštos aplinkos.

Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir laikyti jį padėtyje, leidžiančioje laisvai kvėpuoti. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.

Patekus ant odos: nuplauti vandeniu. Nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus. Pasireiškus bet kokiai odos reakcijai arba diskomfortui kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant praskalauti vandeniu (mažiausiai 15 minučių). Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.

Prarijus: pasireiškus simptomams ir (arba) į burną patekus dideliu produkto kiekiui, nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų gydymo specialistą. Neduoti gerti skysčių ir neskatinti vėmimo, jeigu nukentėjusysis neteko sąmonės; netekusį sąmonės asmenį patogiai paguldyti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Prireikus medicininės pagalbos, su savimi turėti dezinfekavimo priemonės talpą arba etiketę.

Ekologinių avarijų likvidavimo priemonės

Neleisti medžiagai patekti į nutekamuosius vamzdžius, kanalizaciją ar vandentakius.

Informuoti atitinkamas institucijas, jeigu produktas užteršė aplinką (pateko į kanalizaciją, vandentakius, dirvožemį ar orą).

Supilti pylimus siekiant surinkti didesnę išsiliejusios medžiagos kiekį.

Išsiliejusią medžiagą absorbuoti inertiška medžiaga, tada supilti į tinkamą uždarą talpą, kad būtų galima pašalinti laikantis taikomų reikalavimų.

Išsiliejusios medžiagos negalima pilti atgal į originalią talpyklą.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Utilizavimo būdas: nepanaudotus produkto likučius ir pakuotę utilizuoti pagal vietos taisykles. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima išpilti į nuotekų kanalizaciją arba srutų laikymo vietoje, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įrenginius.

Tuščias talpas reikia išskalauti dideliu kiekiu vandens ir utilizuoti kartu su įprastomis arba gamybinėmis atliekomis.

Panaudotos spenių šluostymui popierinės servetėlės ir rankšluosčiai šalinami kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.

Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingos atliekos

Pakuotė nėra klasifikuojama kaip pavojingos atliekos

Europos atliekų katalogo (EWC) atliekų kodas: EWC: 0706 riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos

Kita informacija: tvarkant atliekas turi būti atsižvelgta į atsargumo priemones, taikomas produkto naudojimui. Atliekų kodas taikomas produkto likučiams gryna forma.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Paminėta SDL: laikyti originalioje talpykloje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nepermatomose talpyklose. Laikyti atskirai nuo maisto, pašarų, trąšų ir kitų jautrių medžiagų. Laikyti aukštesnėje nei užšalimo temperatūroje.

Laikymo temperatūra: 0–30 °C

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6. KITA INFORMACIJA

meta-SPC 4 pH ribos: 4–5

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 4

7.1. Kiekvieno atskiuro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas	Jopo Spray IO Spray Barrera Spray Agro Teat Spray Nova Dip paruošta naudoti priemonė				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0019757-0004 1–4				
Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Polivinilpirolidonjodas		Veiklioji medžiaga	25655-41-8		0,714
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,15

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 5

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 5 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto charakteristikų metasantraukos 5 identifikatorius

Identifikatorius	meta-SPC 5
------------------	------------

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

Numeris	1–5
---------	-----

1.3. Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)	PT 03 - Veterinarinė higiena
----------------------	------------------------------

2. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 5 SUDĖTIS

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 5

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Polivinilpirolidonjodas		Veiklioji medžiaga	25655-41-8		1,0	1,46
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,21	0,307

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje 5 nurodyto mišinio tipas (-ai)**

Formuliacia (-os)	AL - Bet koks kitas skystis
-------------------	-----------------------------

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 5 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS**

Pavojingumo kategorijos	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Pavojingumo frazės	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. turinį išpilti (išmesti) į vietos/regiono/nacionalinių/tarptautinių taisyklių. talpyklą išpilti (išmesti) į vietos/regiono/nacionalinių/tarptautinių taisyklių.

4. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 5 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS**4.1. **Naudokite aprašymą****Lentelė 15. Naudojimas # 1 – mirkymas rankiniu būdu po melžimo (paruoštas naudoti produktas)**

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buvulių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	mirkymas rankiniu būdu (paruoštas naudoti produktas) Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mirkymo puodelį. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinė popierine servetėle arba audiniu. Po melžimo, suspausti indą ir kiekvieną spenį pamerkti į mirkymo puodelį, įsitikinant, kad dezinfekavimo skystis apsemia spenį per visą jo ilgį. Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu paspaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei mirkymo puodelį vandeniu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 16. Naudojimas # 2 – purškimas po melžimo rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Purškimas rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu (paruoštas naudoti produktas) Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mechaninį purkštuvą. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinė popierine servetėle arba audiniu. Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo priemone, naudojant mechaninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasidengia dezinfekavimo priemone. Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu paspaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei purkštuvą vandeniu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 17. Naudojimas # 3 – purškimas po melžimo rankiniu būdu, elektroniniu purkštuvu (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Purškimas rankiniu būdu, elektroniniu purkštuvu (paruoštas naudoti produktas) Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti elektroninio purkštuvu siurbimo vamzdelį. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinę popierinę servetėlę arba audiniu. Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo priemone, naudojant elektroninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasidengia dezinfekavimo priemone. Jei reikia, pakeisti tuščią indą nauju. Po dezinfekavimo įstatyti purkštuvu siurbimo vamzdelį į kibirą su vandeniu ir praskalauti purkštuvą purškiant vandenį.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Dezinfekuojant rankinio purškimo būdu, būtina mūvėti pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 18. Naudojimas # 4 – mirkymas automatinio būdu po melžimo (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	mirkymas automatinio būdu (paruoštas naudoti produktas) Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti automatinės mirkymo sistemos siurbimo vamzdelį. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinė popierine servetėle arba audiniu. Po melžimo, išjungus vakuumą, į kolektorių išvirkščiamas spenių dezinfekuojamasis skystis. Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami apie 2–4 ml skysčio. Nuėmus melžiklius, visos automatinės spenių mirkymo sistemos linijos kruopščiai išskalaujamos vandeniu ir prapučiamos aukšto slėgio oro srove. Paskutiniame valymo etape po kiekvieno bandos melžimo, linijos yra dezinfekuojamos (pvz., priemone, kurios sudėtyje yra chloro) ir dar kartą prapučiamos aukšto slėgio oro srove. Po tokios procedūros melžimo sistema yra parengta kitam melžimui. Visas procesas yra automatizuotas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 19. Naudojimas # 5 – purškimas po melžimo automatinio būdu naudojant melžimo robotą (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	purškimas automatinio būdu naudojant robotą (paruoštas naudoti produktas) Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti melžimo roboto siurbimo vamzdelį. Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus melžimo procedūrą, 2–4 ml dezinfekavimo priemonės automatiškai užpurškiama ant spenių. Purkštuvą skalaujamas automatiškai.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

5. BENDRIEJI (*) PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 5 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1. Naudojimo instrukcijos

Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mirkymo puodelį.

Produktus prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Siekiant užtikrinti reikiamą priemonės poveikio laiką, reikia pasirūpinti, kad produktas nebūtų pašalintas po naudojimo. Po melžimo, panaudojus produktą ant spenių būtina, kad galvijai pastovėtų bent penkias minutes.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei dezinfekuoti reikia prieš ir po melžimo, prieš melžimą skirtai dezinfekcijai reikia naudoti kitą priemonę, kurios sudėtyje nėra jodo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra: Išnešti nukentėjusįjį asmenį iš užterštos aplinkos.

Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir laikyti jį padėtyje, leidžiančioje laisvai kvėpuoti. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.

Patekus ant odos: nuplauti vandeniu. Nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus. Pasireiškus bet kokiai odos reakcijai arba diskomfortui kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant praskalauti vandeniu (mažiausiai 15 minučių). Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.

Prarijus: pasireiškus simptomams ir (arba) į burną patekus dideliame produkto kiekiui, nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų gydymo specialistą. Neduoti gerti skysčių ir neskatinėti vėmimo, jeigu nukentėjusysis neteko sąmonės; netekusį sąmonės asmenį patogiai paguldyti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Prireikus medicininės pagalbos, su savimi turėti dezinfekavimo priemonės talpą arba etiketę.

Ekologinių avarijų likvidavimo priemonės

Neleisti medžiagai patekti į nutekamuosius vamzdžius, kanalizaciją ar vandentakius.

Informuoti atitinkamas institucijas, jeigu produktas užteršė aplinką (pateko į kanalizaciją, vandentakius, dirvožemį ar orą).

(*) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuojamam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 5.

Supilti pylimus siekiant surinkti didesnę išsiliejusios medžiagos kiekį.

Išsiliejusią medžiagą absorbuoti inertiška medžiaga, tada supilti į tinkamą uždarą talpą, kad būtų galima pašalinti laikantis taikomų reikalavimų.

Išsiliejusios medžiagos negalima pilti atgal į originalią talpyklą.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Utilizavimo būdas: nepanaudotus produkto likučius ir pakuotę utilizuoti pagal vietos taisykles. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima išpilti į nuotekų kanalizaciją arba srutų laikymo vietoje, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įrenginius.

Tuščias talpas reikia išskalauti dideliu kiekiu vandens ir utilizuoti kartu su įprastomis arba gamybinėmis atliekomis.

Panaudotos spenių šluostymui popierinės servetėlės ir rankšluosčiai šalinami kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.

Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingos atliekos

Pakuotė nėra klasifikuojama kaip pavojingos atliekos

Europos atliekų katalogo (EWC) atliekų kodas: EWC: 0706 riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos

Kita informacija: tvarkant atliekas turi būti atsižvelgta į atsargumo priemones, taikomas produkto naudojimui. Atliekų kodas taikomas produkto likučiams gryna forma.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Paminėta SDL: laikyti originalioje talpykloje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nepermatomose talpyklose. Laikyti atskirai nuo maisto, pašarų, trąšų ir kitų jautrių medžiagų. Laikyti aukštesnėje nei užšalimo temperatūroje.

Laikymo temperatūra: 0–30 °C

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6. KITA INFORMACIJA

meta-SPC 5 pH ribos: 4–5

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 5

7.1. Kiekvieno atskiuro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas	Nova Dip Spray 3000 IO Spray Plus PV-Plus 3000 Tehotippi Soft Plus F 6 Robo V				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0019757–0005 1–5				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Polivinilpirolidonjodas		Veiklioji medžiaga	25655–41–8		1,46
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,307

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 6**1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 6 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA****1.1. Produkto charakteristikų metasantraukos 6 identifikatorius**

Identifikatorius	meta-SPC 6
------------------	------------

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

Numeris	1–6
---------	-----

1.3. Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)	PT 03 - Veterinarinė higiena
----------------------	------------------------------

2. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 6 SUDĖTIS**2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 6**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Polivinilpirolidonjodas		Veiklioji medžiaga	25655–41–8		1,0	1,43
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,21	0,3

2.2. Produkto charakteristikų metasantraukoje 6 nurodyto mišinio tipas (-ai)

Formuliacia (-os)	EW - Aliejinė emulsija vandenyje
-------------------	----------------------------------

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 6 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Pavojingumo frazės	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. turinį išpilti (išmesti) į vietos/regiono/nacionalinių/tarptautinių taisyklių. talpyklą išpilti (išmesti) į vietos/regiono/nacionalinių/tarptautinių taisyklių.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 6 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS**4.1. Naudokite aprašymą****Lentelė 20. Naudojimas # 1 – mirkymas rankiniu būdu po melžimo (paruoštas naudoti produktas)**

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vida VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	mirkymas rankiniu būdu (paruoštas naudoti produktas) Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mirkymo puodelį. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinę popierinę servetėlę arba audiniu. Po melžimo, suspausti indą ir kiekvieną spenį pamerkinti į mirkymo puodelį, įsitikinant, kad dezinfekavimo skystis apsemina spenį per visą jo ilgį. Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu paspaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei mirkymo puodelį vandeniu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Specifinės rizikos mažinimo priemonės mirkant spenius rankiniu būdu po melžimo nėra būtinos. Žr. bendrąsias rizikos mažinimo priemones skirsnyje „bendrosios naudojimo taisyklės“.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginę arba netiesioginę poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 21. Naudojimas # 2 – purškimas po melžimo rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės

Naudojimo sritis	vida VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivolų, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Purškimas rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu (paruoštas naudoti produktas) Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mechaninį purkštuvą. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinėmis popierinėmis servetėlėmis arba audiniu. Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo priemone, naudojant mechaninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasidengia dezinfekavimo priemone. Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu paspaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei purkštuvą vandeniu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Dezinfekuojant rankinio purškimo būdu, būtina mūvėti pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginę arba netiesioginę poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 22. Naudojimas # 3 – purškimas po melžimo rankiniu būdu, elektroniniu purkštuvu (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės

Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Purškimas rankiniu būdu, elektroniniu purkštuvu (paruoštas naudoti produktas) Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti elektroninio purkštuvo siurbimo vamzdelį. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinėmis popierinėmis servetėlėmis arba audiniu. Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo priemone, naudojant elektroninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasidengia dezinfekavimo priemone. Jei reikia, pakeisti tuščią indą nauju. Po dezinfekavimo įstatyti purkštuvo siurbimo vamzdelį į kibirą su vandeniu ir praskalauti purkštuvą purškiant vandenį.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Dezinfekuojant rankinio purškimo būdu, būtina mūvėti pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginę arba netiesioginę poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 23. Naudojimas # 4 – mirkymas automatinio būdu po melžimo (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos Mielės

Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	mirkymas automatinio būdu (paruoštas naudoti produktas) Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti automatinės mirkymo sistemos siurbimo vamzdelį. Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinė popierine servetėle arba audiniu. Po melžimo, išjungus vakuumą, į kolektorių išvirkščiamas spenių dezinfekuojamasis skystis. Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami apie 2–4 ml skysčio. Nuėmus melžiklius, visos automatinės spenių mirkymo sistemos linijos kruopščiai išskalaujamos vandeniu ir prapučiamos aukšto slėgio oro srove. Paskutiniame valymo etape po kiekvieno bandos melžimo, linijos yra dezinfekuojamos (pvz., priemone, kurios sudėtyje yra chloro) ir dar kartą prapučiamos aukšto slėgio oro srove. Po tokios procedūros melžimo sistema yra parengta kitam melžimui. Visas procesas yra automatizuotas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. - Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5. Naudokite aprašymą

Lentelė 24. Naudojimas # 5 – purškimas po melžimo automatinio būdu naudojant melžimo robotą (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	purškimas automatinio būdu naudojant robotą (paruoštas naudoti produktas) Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti melžimo roboto siurbimo vamzdelį. Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus melžimo procedūrą, 2–4 ml dezinfekavimo priemonės automatiškai užpurškama ant spenių. Purkštuvas skalaujamas automatiškai.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vienam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l DTPE IBC konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

5. BENDRIEJI ⁽⁶⁾ PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 6 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1. Naudojimo instrukcijos

Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukite specialų puodelį.

⁽⁶⁾ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 6.

Produktus prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Siekiant užtikrinti reikiamą priemonės poveikio laiką, reikia pasirūpinti, kad produktas nebūtų pašalintas po naudojimo. Po melžimo, panaudojus produktą ant spenių būtina, kad galvijai pastovėtų bent penkias minutes.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei dezinfekuoti reikia prieš ir po melžimo, prieš melžimą skirtai dezinfekcijai reikia naudoti kitą priemonę, kurios sudėtyje nėra jodo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra: Išnešti nukentėjusįjį asmenį iš užterštos aplinkos.

Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir laikyti jį padėtyje, leidžiančioje laisvai kvėpuoti. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.

Patekus ant odos: nuplauti vandeniu. Nusivilkti užterštus drabužius ir nuslauti batus. Pasireiškus bet kokiai odos reakcijai arba diskomfortui kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant praskalauti vandeniu (mažiausiai 15 minučių). Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.

Prarijus: pasireiškus simptomams ir (arba) į burną patekus dideliu produkto kiekiui, nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų gydymo specialistą. Neduoti gerti skysčių ir neskatinti vėmimo, jeigu nukentėjusysis neteko sąmonės; netekusį sąmonės asmenį patogiai paguldyti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Prireikus medicininės pagalbos, su savimi turėti dezinfekavimo priemonės talpą arba etiketę.

Ekologinių avarijų likvidavimo priemonės

Neleisti medžiagai patekti į nutekamuosius vamzdžius, kanalizaciją ar vandentakius.

Informuoti atitinkamas institucijas, jeigu produktas užteršė aplinką (pateko į kanalizaciją, vandentakius, dirvožemį ar orą).

Supilti pylimus siekiant surinkti didesnę išsiliejusios medžiagos kiekį.

Išsiliejusią medžiagą absorbuoti inertiška medžiaga, tada supilti į tinkamą uždara talpą, kad būtų galima pašalinti laikantis taikomų reikalavimų.

Išsiliejusios medžiagos negalima pilti atgal į originalią talpyklą.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Utilizavimo būdas: nepanaudotus produkto likučius ir pakuotę utilizuoti pagal vietos taisykles. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima išpilti į nuotekų kanalizaciją arba srutų laikymo vietoje, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įrenginius.

Tuščias talpas reikia išskalauti dideliu kiekiu vandens ir utilizuoti kartu su įprastomis arba gamybinėmis atliekomis.

Panaudotos spenių šluostymui popierinės servetėlės ir rankšluosčiai šalinami kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.

Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingos atliekos

Pakuotė nėra klasifikuojama kaip pavojingos atliekos

Europos atliekų katalogo (EWC) atliekų kodas: EWC: 0706 riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos

Kita informacija: tvarkant atliekas turi būti atsižvelgta į atsargumo priemones, taikomas produkto naudojimui. Atliekų kodas taikomas produkto likučiams gryna forma.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Paminėta SDL: laikyti originalioje talpykloje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nepermatomose talpyklose. Laikyti atskirai nuo maisto, pašarų, trąšų ir kitų jautrių medžiagų. Laikyti aukštesnėje nei užšalimo temperatūroje.

Laikymo temperatūra: 0–30 °C

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6. KITA INFORMACIJA

meta-SPC 6 pH ribos: 4–5

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 6

7.1. Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas	Jopo Winterspray IO Winterspray Jodopax RTU Barrera W				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0019757-0006 1-6				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Polivinilpirolidonjodas		Veiklioji medžiaga	25655-41-8		1,43
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,3