

Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiuo dokumente pateikiamomis nuorodomis

► **B**

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/354

2020 m. kovo 4 d.

kuriuo nustatomas specialiojo pašaro numatytų paskirčių sąrašas ir panaikinama Direktyva 2008/38/EB

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 67, 2020 3 5, p. 1)

iš dalies keičiamas:

Oficialusis leidinys

	Nr.	puslapis	data
► M1	2024 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2024/2899	L 2899 1	2024 11 21

**KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/354****2020 m. kovo 4 d.****kuriuo nustatomas specialiojo pašaro numatytų paskirčių sąrašas ir panaikinama Direktyva 2008/38/EB****(Tekstas svarbus EEE)***1 straipsnis*

Specialusis pašaras, apibrėžtas Reglamentu (EB) Nr. 767/2009, gali būti parduodamas tik tuo atveju, jeigu:

- laikomasi šio reglamento priedo A dalyje nustatytų bendrųjų nuostatų dėl specialiojo pašaro ir
- jo numatyta paskirtis yra įtraukta į šio reglamento priedo B dalį ir yra laikomasi atitinkamo įrašo nuostatų.

2 straipsnis

Nukrypstant nuo 1 straipsnio, Direktyvos 2008/38/EB nuostatas atitinkantis specialusis pašaras, su sąlyga, kad iki 2021 m. kovo 25 d. Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2009 10 straipsnį pateikiama paraiška dėl direktyvoje nurodytos numatytos paskirties, gali būti toliau tiekiamas rinkai tol, kol Komisija nepriėmė sprendimo dėl atitinkamos paraiškos.

3 straipsnis

Specialusis pašaras, kuris buvo pagamintas ir paženklintas iki 2022 m. kovo 25 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2020 m. kovo 25 d. gali būti toliau tiekiamas rinkai ir naudojamas, kol pasibaigs turimos atsargos.

4 straipsnis

Direktyva 2008/38/EB panaikinama.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas 2020 m. gruodžio 25 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.



PRIEDAS

A DALIS

Bendrosios nuostatos dėl specialiojo pašaro

1. Jeigu yra daugiau nei viena pagrindinių maistinių savybių grupė, minima B dalies 2 skiltyje ir pažymėta „ir (arba)“, turinti tą pačią numatytą paskirtį, gamintojas, siekdamas B dalies 1 skiltyje įvardyto tikslo, gali pasirinkti kurią nors vieną iš pagrindinių maistinių savybių grupių arba jas abi. Su kiekvienu variantu susijusi informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis, pateikiama B dalies 4 skiltyje.
2. Jeigu B dalies 2 skiltyje minimos pagrindinės maistinės savybės rodiklis yra kiekybinis, taikomos Reglamento (EB) Nr. 767/2009 17 straipsnio 2 dalies nuostatos ir to reglamento IV priede nustatyti leistini nuokrypiai. Jeigu tame priede atitinkamam ženklinimo rekvizitui nuokrypis nėra nustatytas, leidžiamas ± 15 % dydžio techninis nuokrypis.
3. Jeigu B dalies 2 arba 4 skiltyje yra minimas pašarų priedas, taikomos pašarų priedo (-ų) autorizacijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ⁽¹⁾ nuostatos, o jo (jų) naudojimas turi atitikti nurodytas pagrindines maistines savybes.
4. Jeigu B dalies 4 skiltyje reikia pateikti informaciją apie medžiagą, kurią leidžiama naudoti ir kaip pašarų priedą, ir kartu pateikiama frazė „iš viso“, bendras medžiagos kiekis nurodomas po tekstu, kurio pavadinimas yra „Analitinės sudedamosios dalys“.
5. Informacija, kurią reikia pateikti pagal B dalies 4 skiltį, turi būti kiekybinė, nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB ⁽²⁾ nuostatų.
6. B dalies 5 skiltyje nurodytas rekomenduotinas naudojimo laikas reiškia laiką, kuris paprastai turėtų būti skirtas naudojimui pagal paskirtį. Gamintojai, laikydamiesi nustatyto laikotarpio, gali nurodyti konkretesnį naudojimo laiką.
7. Jeigu specialusis pašaras yra skirtas daugiau nei vienai numatytai paskirčiai, turi būti paisoma visų B dalyje nurodytų susijusių įrašų.
8. Šeriant specialiaisiais pašarų papildais, tinkamo naudojimo instrukcijose privalu pateikti nurodymus, kaip subalansuoti paros davinį.
9. Jeigu specialusis pašaras yra skirtas individualiam naudojimui per virškinamąjį traktą kaip boliusas, tai turi būti nurodyta atitinkamam pašarui skirtoje skiltyje „Kitos nuostatos“. Tokio pašaro sudėtyje turi būti tik pašarinės žaliavos ir pašaro priedai įskaitant galimą dangą, jeigu atitinkamame įraše nenurodyta kitaip. Rekomenduojama, kad individualiam naudojimui skirtą pašarą skirtų veterinarijos gydytojas ar kitas kompetentingas asmuo.

⁽¹⁾ 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (OL L 268, 2003 10 18, p. 29).

⁽²⁾ 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004 4 30, p. 45).

▼B

10. Jeigu specialusis pašaras rinkai teikiamas kaip boliusas, tai yra arba kaip pašarinė žaliava, arba kaip individualiam junginių naudojimui skirti uždelsto atpalaidavimo formos (t. y. daugiau nei 24 val.) pašaro papildai, ženklinant tokį pašarą, jei taikytina, dėl kiekvieno pašaro priedo, kurio atveju yra nustatytas didžiausias kiekis visaverčiame pašare, nurodomas maksimalus nenutrūkstamo boliuso atpalaidavimo laikas ir atpalaidavimo paros norma. Pašarų ūkio subjektas, tiekiantis rinkai boliusus, turi turėti įrodymų, kad pašaro priedo kiekio paros norma virškinamajame trakte per visą šėrimo laikotarpį neviršys, jei taikytina, didžiausio pašaro priedo kiekio, nustatyto vienam kilogramui visaverčio pašaro (su uždelsto atpalaidavimo poveikiu). Tokie įrodymai turėtų būti įvertinti taikant metodiką, grindžiamą tarpusavio vertinimu, arba vidaus analizę.
11. Jeigu tam tikroms numatytoms paskirtims skirtų tam tikrų pašaro priedų koncentracija, kaip nurodyta 2 skiltyje, gali būti daugiau nei 100 kartų didesnė už atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiame pašare, tų pašaro priedų koncentracija neturi būti daugiau nei 500 kartų didesnė už nustatytą atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiame pašare, išskyrus tada, kai naudojami boliusai, kaip nurodyta 10 punkte. Įtraukus tokius pašarų papildus į gyvūnų mitybą bus užtikrinama, kad gyvūno suvartojamas jų kiekis atitiktų nustatytą didžiausią kiekį visaverčiame pašare.

B DALIS
Numatytų paskirčių sąrašas

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
10	Inkstų funkcijai palaikyti, esant lėtiniam inkstų nepakankamumui (1)	Kokybiški baltymai ir fosforas ≤ 5 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (2), o žali baltymai ≤ 220 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (2)	Šunys	— Baltymų šaltinis (-iai) — Kalcis — Fosforas — Kalis — Natris — Pagrindinių riebalų rūgščių (jei jų pridėta) kiekis	Iš pradžių iki 6 mėnesių (3)	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras. 2. Rekomenduojamas baltymų virškinamumas: ne mažiau kaip 85 %. 3. Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“ 4. Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“
		Sumažinta fosforo absorbcija, įtraukiant lantano karbonato oktahidratą	Suaugę šunys	— Baltymų šaltinis (-iai) — Kalcis — Fosforas — Kalis — Natris — Pagrindinių riebalų rūgščių (jei jų pridėta) kiekis — Lantano karbonato oktahidratas	Iš pradžių iki 6 mėnesių (3)	1. Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“ 2. Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“
		Kokybiški baltymai ir fosforas ≤ 6,5 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (2), o žali baltymai ≤ 320 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (2)	Katės	— Baltymų šaltinis (-iai) — Kalcis — Fosforas — Kalis — Natris — Pagrindinių riebalų rūgščių (jei jų pridėta) kiekis	Iš pradžių iki 6 mėnesių (3)	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras. 2. Rekomenduojamas baltymų virškinamumas: ne mažiau kaip 85 %. 3. Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
						4. Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“
		Sumažinta fosforo absorbcija, įtraukiant lantano karbonato oktahidratą	Suaugusios katės	— Baltymų šaltinis (-iai) — Kalcis — Fosforas — Kalis — Natris — Pagrindinių riebalų rūgščių (jei jų pridėta) kiekis — Lantano karbonato oktahidratas	Iš pradžių iki 6 mėnesių (3)	1. Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“ 2. Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“
		Didelis kaloringumas – daugiau nei 8,8 MJ/kg pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. Gera virškinamo ir gero skonio krakmolo šaltiniai. Ribotas baltymų kiekis: žali baltymai ≤ 106 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. Natrio kiekis: 2 g/100 kg kūno masės per dieną. Didelis eikozapentaeno bei dokozaheksaeno rūgščių kiekis ≥ 0,2 g/kg kūno masės ^{0,75} per dieną	Arklinių šeimos gyvūnai	— Baltymų ir energijos šaltinis (-iai) — Kalcis — Fosforas — Kalis — Magnis — Natris — Eikozapentaeno bei dokozaheksaeno rūgščių bendras kiekis	Iš pradžių iki šešių mėnesių. Ilgą laikotarpį arba kol išnyks problema	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip pašarų papildai 2. Etiketėje nurodyti: — „Prieš naudojant ar pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“ — Pašarų papildai neturėtų būti naudojami sergant hipernatremija ir hiperchloremija. — Pašarų papildai turėtų sudaryti bent 10–20 % dienos energijos kiekio (maždaug 0,05–0,1 MJ/kg kūno masės ^{0,75} per dieną). 3. Su daviniu gaunamas energijos kiekis turėtų būti > 0,62 MJ/kg kūno masės ^{0,75} per dieną.

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP ¹)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP ²)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
						4. Su daviniu gaunamas kalcis neturėtų viršyti 50 mg per dieną kg sausosios medžiagos. 5. Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“
11	Oksalatinių akmenų formavimuisi mažinti	Mažas kalcio kiekis, mažas vitamino D kiekis, šlapimą šarminančios savybės	Šunys ir katės	— Fosforas — Kalcis — Natris — Magnis — Kalis — Chloridai — Siera — Vitaminas D (iš viso) — Hidroksiprolinas — Šlapimą šarminančios medžiagos	Iki 6 mėnesių	Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“
12	Cukraus apykaitai reguliuoti (<i>Diabetes mellitus</i>)	Bendras cukrų kiekis (monodisacharidų ir disacharidų) ≤ 62 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 % ⁽²⁾	Šunys ir katės	— Angliavandenių šaltinis (-iai) — Angliavandenių apdorojimas (prireikus) — Krakmolas — Bendras cukrų kiekis — Fruktozė (jei jos pridėta) — Pagrindinių riebalų rūgščių (jei jų pridėta) kiekis — Trumpo ir vidutinio ilgio grandžių riebalų rūgščių (jei jų pridėta) šaltinis (-iai)	Iš pradžių iki 6 mėnesių	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras. 2. Etiketėje nurodyti: — „Mažas monosacharidų ir disacharidų kiekis.“ — „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
13	Sudedamųjų dalių ir maistinių medžiagų netoleravimui mažinti (4)	Pasirinktas baltymų šaltinis (-iai) ir ribotas jų skaičius ir (arba) hidrolizuoto proteino šaltinis (-iai), ir (arba) pasirinktas angliavandenių šaltinis (-iai)	Šunys ir katės	— Baltymų (jei jų pridėta) šaltiniai, įskaitant, kai reikia apdorotus. — Angliavandenių (jei jų pridėta) šaltinis (-iai), įskaitant, kai reikia apdorotus. — Pagrindinių riebalų rūgščių (jei jų pridėta) kiekis	Nuo 3 iki 8 savaičių: jei nebėra netoleravimo simptomų, iš pradžių šį pašarą galima naudoti ne ilgiau kaip vienus metus.	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras. 2. Pagrindinių baltymų šaltinių skaičių rekomenduojama apriboti iki 3. 3. Etiketėje nurodyti: — Jei taikytina, atitinkamas pagrindinių mitybos charakteristikų derinys. — „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“
14	Pūslės akmenų formavimuisi mažinti	Šlapimą šarminančios savybės ir žali baltymai ≤ 160 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 % (2), arba baltymai, pasirinkti dėl riboto cistino ir cisteino kiekio (pvz., kazeinas, žirnių baltymai, sojos baltymai), ir žali baltymai ≤ 220 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (2)	Šunys	— Sieros aminorūgštys (iš viso) — Baltymų šaltiniai — Natris — Kalis — Chloridai — Šlapimą šarminančios medžiagos (jei jų pridėta)	Iš pradžių iki 6 mėnesių	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras. 2. Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“ 3. Etiketėje nurodyti: — „Šlapimą šarminančios savybės ir mažas baltymų kiekis“ arba, kai taikytina, „Mažas pasirinktų baltymų kiekis“. — „Prieš naudojant arba norint pratęsti naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“ 4. Sprendimą priima veterinarijos gydytojas arba mitybos specialistas. Šarminančios savybės reiškia, kad mityba turėtų būti tokia, kad šlapimo pH vertė būtų ≥ 7.

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
15	Mitybos atstatymas, sveikimas (5)	Lengvai virškinamos sudedamosios dalys, kurių kaloringumas ≥ 3520 kcal, ir žali baltymai ≥ 250 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (2)	Šunys	— Lengvai virškinamų sudedamųjų dalių šaltiniai, įskaitant, kai reikia apdorotus — Kaloringumas	Iki mitybos atstatymo	1. Rekomenduojamas tikrasis virškinamumas: sausosios medžiagos ≥ 80 % arba organinės medžiagos ≥ 85 %. 2. Tais atvejais, kai pašaras sušeriamas pro vamzdelį, ant pakuotės, talpyklos ar etiketėje nurodoma: „Naudoti tik veterinarijos gydytojui prižiūrint.“ 3. Etiketėse galima nurodyti specifines aplinkybes, kuriomis skiriamas dietinis (-iai) pašaras (-ai). 4. Etiketėje nurodyti: „Didelis kaloringumas, didelė pagrindinių maistingųjų medžiagų ir lengvai virškinamų sudedamųjų dalių koncentracija.“
		Lengvai virškinamos sudedamosios dalys, kurių kaloringumas ≥ 3520 kcal, ir žali baltymai ≥ 270 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (2)	Katės			
16	Uratinų akmenų formavimuisi mažinti	Žali baltymai ≤ 130 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (2), arba žali baltymai ≤ 220 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (2), ir parinkti baltymų šaltiniai	Šunys	— Baltymų šaltinis (-iai)	Iki 6 mėnesių, tačiau jeigu nereguliuojamas šlapimo rūgšties metabolizmas, naudojamas visą gyvenimą	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras. 2. Renkantis baltymų šaltinį reikėtų atsižvelgti į baltymų kokybę ir purinų kiekį. Parinktų kokybiškų baltymų su nedideliu purinų kiekiu šaltinių pavyzdžiai: kiaušiniai, kazeinas, sojos baltymai ir kukurūzų glitimas. 3. Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“ 4. Etiketėje nurodyti: — „Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

▼B

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP ¹)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP ²)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
						— „Mažas baltymų kiekis“ arba, prireikus, „ribotas baltymų ir pasirinktų baltymų šaltinių kiekis“.
		Žali baltymai ≤ 317 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾	Katės			1. Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras. 2. Renkantis baltymų šaltinį reikėtų atsižvelgti į baltymų kokybę ir purinų kiekį. Parinktų kokybiškų baltymų su nedideliu purinų kiekiu šaltinių pavyzdžiai: kiaušiniai, kazeinas, sojos baltymai ir kukurūzų glitimas. 3. Etiketėje nurodyti: — „Prieš naudojant rekomenduojama pasi- tarti su veterinarijos gydytoju.“ — „Ribotas proteino kiekis.“ 4. Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“
17	Struvitiniam akmenims tirpinti ⁽⁶⁾	Šlapimą neprisotinančios struvitų savybės ⁽⁷⁾ ir (arba) šlapimą rūgštinančios savybės ⁽⁸⁾ ir magnis ≤ 1,8 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾	Šunys ir katės	— Fosforas — Kalcis — Natris — Magnis — Kalis — Chloridas — Siera	Nuo 5 iki 12 savaičių	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras. 2. Etiketėje nurodyti: — „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su vete- rinarijos gydytoju.“ — „Šlapimą neprisotinančios struvitų savybės ir (arba) šlapimą rūgštinančios savybės.“

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės ^(GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis ^(GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
						3. Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“ 4. Atitinkamoms kompetentingoms institucijoms paprašius pateikiama atitikties deklaracija, kuria patvirtinama, kad mityba turi neprisotinančių ir (arba) rūgštinančių savybių
18	Struvitinių akmenų pakartotiniam susiformavimui mažinti ⁽⁶⁾	Visavertis pašaras, turintis šlapimą neprisotinančių ⁽⁷⁾ arba metastabiliąją būseną užtikrinančių struvitų savybių ⁽⁹⁾ , ir (arba) dieta, turinti šlapimą rūgštinančių savybių ⁽⁸⁾ , ir magnis ≤ 1,8 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾	Šunys ir katės	— Fosforas — Kalcis — Natris — Magnis — Kalis — Chloridas — Siera	Iš pradžių iki 6 mėnesių	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras. 2. Etiketėje nurodyti: — „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“ — „Šlapimą neprisotinančios arba metastabiliąją būseną užtikrinančios struvitų savybės ir (arba) šlapimą rūgštinančios savybės.“ 3. Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“ 4. Atitinkamoms kompetentingoms institucijoms paprašius pateikiama atitikties deklaracija, kuria patvirtinama, kad dieta turi neprisotinančių arba metastabiliąją būseną užtikrinančių ir (arba) rūgštinančių savybių

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
19	Skiriama esant blogam virškinimui ⁽¹⁰⁾	Lengvai virškinamas racionas: Tikrasis virškinamumas: — mažai ląstelienos turintis pašaras (žalia ląsteliena ≤ 44 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾): žali baltymai ≥ 85 %; žali baltymai ≥ 90 % arba — ląsteliena praturtintas pašaras (žalia ląsteliena > 44 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾): žali baltymai ≥ 80 %; žali baltymai ≥ 80 %	Šunys ir katės	— Lengvai virškinamų sudedamųjų dalių šaltiniai, įskaitant, kai reikia apdorotus	Iš pradžių iki 12 savaičių, o jei yra lėtinis kasos nepakankamumas, visą gyvenimą	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras. 2. Etiketėje nurodyti: — „Lengvai virškinamas pašaras.“ — „Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“
20	Žarnyno absorbcijos sutrikimams mažinti	Lengvai virškinamas racionas: Tikrasis virškinamumas: — mažai ląstelienos turintis pašaras (žalia ląsteliena ≤ 44 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾): žali baltymai ≥ 85 %; žali baltymai ≥ 90 % arba — ląsteliena praturtintas pašaras (žalia ląsteliena > 44 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾): žali baltymai ≥ 80 %; žali baltymai ≥ 80 %	Šunys ir katės	— Lengvai virškinamų sudedamųjų dalių šaltiniai, įskaitant, kai reikia apdorotus — Natris — Kalis	Iki 12 savaičių	Etiketėje nurodyti: — „Lengvai virškinamas pašaras, kurio sudėtyje yra daugiau natrio ir kalio.“ — „Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės ^(GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis ^(GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
		ir natris $\geq 1,8$ g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾ , ir kalis ≥ 5 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾				
21	Ūmiams žarnyno absorbcijos sutri- kimams mažinti	Didesnis elektrolitų kiekis: — natris $\geq 1,8$ %; — kalis $\geq 0,6$ % ir lengvai virškinami angliavandeniai — ≥ 32 %	Šunys ir katės	— Natris — Kalis — Angliavandenių šaltinis (-iai)	1–7 dienos	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip pašarų papildai 2. Etiketėje nurodyti: — „Esant ūmiam viduriavimui ir gyjant po viduriavimo.“ — „Prieš naudojant rekomenduojama pasi- tarti su veterinarijos gydytoju.“ 3. Jei pašaras yra kietas, rekomenduojamas elektrolitų kiekis turėtų būti apskaičiuojamas pagal savanoriškai suvartojamą įprastą vandens paros dozę.
22	Lipidų metabo- lizmui skatinti sergant hiperlipidemija	Riebalai ⁽¹¹⁾ ≤ 110 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽¹²⁾	Šunys ir katės	— Žali riebalai	Iš pradžių iki 2 mėnesių	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras. 2. Etiketėje nurodyti: — „Prieš naudojant arba norint pratęsti naudojimo laiką rekomenduojama pasi- tarti su veterinarijos gydytoju.“ — „Mažas riebalų kiekis.“

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP ¹)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP ²)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
23	Kepenų funkcijai palaikyti, esant chroniškam kepenų nepakankamumui	Saikingas baltymų kiekis: šunims – žali baltymai ≤ 279 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾ ; katėms – žali baltymai ≤ 370 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾ , ir pasirinkti baltymų šaltiniai, ir rekomenduojamas su maistu gaunamų baltymų virškinamumas ≥ 85 %	Šunys ir katės	— Baltymų šaltinis (-iai) — Varis (iš viso) — Natris	Iš pradžių iki 4 mėnesių	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras. 2. Atsižvelgiant į lengvą virškinamumą pasirinktų baltymų šaltinių pavyzdžiai: pieno baltymai (išrūgų kazeinas, pienas, varškės sūris), kiti gyvūniniai baltymai (kiaušiniai, naminių paukščių mėsa) ir augaliniai baltymai (sojos). 3. Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“ 4. Etiketėje nurodyti: — „Saikingas pasirinktų ir lengvai virškinamų baltymų kiekis.“ — „Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“
		Nedidelis aukštos kokybės baltymų kiekis ir lengvai virškinami angliavandeniai	Arklinių šeimos gyvūnai	— Baltymai ir skaidulinių medžiagų šaltiniai — Lengvai virškinami angliavandeniai, įskaitant, kai reikia apdorotus — Metioninas — Cholinai — Riebalinės rūgšties n–3 (jei pridėta) kiekis	Iš pradžių iki šešių mėnesių	1. Etiketėje nurodyti: — „Prieš naudojant ar pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“ 2. Turėtų būti nustatytos gairės dėl pašaro naudojimo būdų, įskaitant ir dažną negausų šėrimą.
24	Širdies veiklos funkcijai palaikyti sergant lėtiniu širdies nepakankamumu	Ribotas vario kiekis: natrio $\leq 2,6$ g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾	Šunys ir katės	— Magnis — Kalis — Natris	Iš pradžių iki 6 mėnesių	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras. 2. Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės ^(GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis ^(GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
25	Antsvoriui sumažinti	Metabolizuojama energija < 3 060 kcal/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽¹³⁾ , arba metabolizuojama energija < 560 kcal/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 85 % ⁽¹³⁾	Šunys	— Kaloringumas	Kol pasiekiamas siektinas kūno svoris ir po to, jei reikia išlaikyti siektiną kūno svorį	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras. 2. Siekiant užtikrinti atitiktį būtiniausiems reikalavimams, reikėtų atitinkamai padidinti su pernelyg didelio kūno svorio mažinimo dieta gaunamų maistinių medžiagų kiekį, kad būtų kompensuojama ribota suvartojamos energijos paros dozė ⁽¹⁴⁾ 3. Etiketėje nurodyti: — „Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“ — „Prieš pradėdant dietą, katėms patariama taikyti pereinamąjį laikotarpį.“ — „Siekiant veiksmingai mažinti svorį arba užtikrinti idealų svorį, reikėtų neviršyti rekomenduojamos suvartojamos energijos paros dozės.“
		Metabolizuojama energija < 3 190 kcal/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽¹³⁾ , arba metabolizuojama energija < 580 kcal/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 85 % ⁽¹³⁾	Katės			
26	Odos funkcijai palaikyti, kai gyvūnas serga dermatoze ir gausiai šeriasi	Linolo rūgštis ≥ 12,3 g/kg ir eikozapentaeno bei dokozaheksaeno rūgščių bendras kiekis ≥ 2,9 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾	Šunys ir katės	— Linolo rūgštis — Eikozapentaeno bei dokozaheksaeno rūgščių bendras kiekis	Iš pradžių iki 2 mėnesių	Etiketėje nurodyti: — „Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“ — „Didelis linolo rūgšties (LA) kiekis ir eikozapentaeno (EPR) bei dokozaheksaeno rūgščių (DHR) bendras kiekis.“
		Linolo rūgštis ≥ 18,5 g/kg ir eikozapentaeno bei dokozaheksaeno rūgščių bendras kiekis ≥ 0,39 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾	Šunys			
		Linolo rūgštis ≥ 18,5 g/kg ir eikozapentaeno bei dokozaheksaeno rūgščių bendras kiekis ≥ 0,09 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾	Katės			

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
27	Sąnarių metabo- lizmui skatinti sergant osteoartritu	Omega-3 riebiųjų rūgščių bendras kiekis ≥ 29 g, o eikozapentaeno rūgštis $\geq 3,3$ g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾ , ir atitinkamas vitamino E kiekis	Šunys	— Omega-3 riebiosios rūgštys (iš viso) — Eikozapentaeno rūgštis (iš viso) — Vitaminas E (iš viso)	Iš pradžių iki 3 mėnesių	Etiketėje nurodyti: — „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterina- rijos gydytoju.“
		Omega-3 riebiųjų rūgščių bendras kiekis $\geq 10,6$ g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾ , ir dokoza- heksaeno rūgštis $\geq 2,5$ g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾ , ir didesnis metionino ir mangano kiekis; atitinkamas vitamino E kiekis.	Katės	— Omega-3 riebiosios rūgštys (iš viso) — Dokozaheksaeno rūgštis (iš viso) — Metioninas (iš viso) — Manganas (iš viso) — Vitaminas E (iš viso)		
28	Variui kepenyse mažinti	Ribotas vario kiekis: varis $\leq 8,8$ mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾	Šunys	Varis (iš viso)	Iš pradžių iki 6 mėnesių	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras. 2. Etiketėje nurodyti: — „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su vete- rinarijos gydytoju.“
29	Jodo kiekiui pašaruose mažinti sergant hipertiroze	Ribotas jodo kiekis: jodas $\leq 0,26$ mg/ kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % ⁽²⁾	Katės	Jodas (iš viso)	Iš pradžių iki 3 mėnesių	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras. 2. Etiketėje nurodyti: — „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su vete- rinarijos gydytoju.“

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP ¹)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP ²)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
30	Padėti stresinėse situacijose, slopinant susijusių elgseną	1–3 g tripsino/hidrolizuoto karvių pieno kazeino kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (2)	Šunys	Tripsinas/hidrolizuotas karvių pieno kazeinas	Iš pradžių iki 2 mėnesių	1. Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras. 2. Etiketėje nurodyti: — „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“
50	Padėti pasirengti rujai ir dauginimuisi	— Didelis seleno kiekis ir mažiausias vitamino E kiekis kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: kiaulėms – 50 mg, triušiams – 35 mg, šunims, katėms ir audinėms – 88 mg; mažiausias E vitamino kiekis vienam gyvūnui per dieną: avims – 100 mg, galvijams – 300 mg, arkliams – 1 100 mg; arba — didelis vitaminų A ir (arba) vitamino D kiekis (-iai) ir (arba) mažiausiai 300 mg beta karotino kiekis vienam gyvūnui per dieną. Pašaro papildo sudėtyje gali būti seleno ir vitaminų A bei D, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija nustatytą atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.	Žinduoliai	Kiekvieno pridėto mikroelemento ir vitamino pavadinimas ir bendras kiekis	— Karvės: 2 savaitės iki nėštumo pabaigos iki tol, kol patvirtinamas kitas nėštumas. — Paršavedės: 7 dienos iki 3-ios dienos po paršavimosi ir 7 dienos iki 3-ios dienos po kergimo. — Kitų žinduolių patelės: nuo paskutinio nėštumo etapo iki tol, kol patvirtinamas kitas nėštumas. — Patinai: dauginimosi laikotarpiais.	1. Leidžiama naudoti kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisavinamos formos geležies siekiant padidinti jos kaloringumą. 2. Pašaro tinkamo naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio kiekio visaverčiuose pašaruose. 3. Pašaro etiketėje nurodyti gaires dėl atvejų, kuriais tinka naudoti pašarą.

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
		— Didelis (-i) vitamino A ir (arba) vitamino D kiekis (-iai) arba — didelis seleno ir (arba) cinko kiekis, ir (arba) mažiausiai 40 mg/kg vitamino E kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %. Pašaro papildų sudėtyje gali būti seleno, cinko ir vitaminų A bei D, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija nustatytą atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.	Paukščiai	Kiekvieno pridėto mikroelemento ir vitamino pavadinimas ir bendras kiekis	— Patelėms: rujos metu — Patinams: dauginimosi laikotarpiams.	
51	Palaikyti kanopų, kojų ir odos regeneraciją	Didelis cinko kiekis. Pašaro papildų sudėtyje gali būti cinko, kurio kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija nustatytą atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.	Arkliai, atrajotojai ir kiaulės	— Cinkas (iš viso) — Metioninas (iš viso) — Biotinas (jei pridėta)	Iki 8 savaičių	1. Pašaro tinkamo naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio cinko kiekio visaverčiame pašare. 2. Leidžiama naudoti atrajotojams kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisavinamos formos geležies siekiant padidinti jos kaloringumą.
52	Mitybos disbalansui keičiant dietą mažinti	Mažiausias kiekis dietiniame pašare: — seleno: 0,1 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, ir (arba) — cinko: 15 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, ir (arba)	Atrajotojai Kiaulės Triušiai Naminiai paukščiai	Maistinių priedų pavadinimas ir, prireikus, bendras kiekis	Nuo 2 iki 15 dienų	1. Leidžiama naudoti atrajotojams ir kiaulėms kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisavinamos formos geležies siekiant padidinti jos kaloringumą. 2. Pašaro tinkamo naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio kiekio visaverčiuose pašaruose.

▼B

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės ^(GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis ^(GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
		— vario: avims 2 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %, o kitų rūšių gyvūnams 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, ir (arba) — vitamino A: 2 000 IU/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, ir (arba) — vitamino D: 400 IU/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, ir (arba) — vitamino E: naminiams paukščiams – 35 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, atrajotojams – 10 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, triušiams – 40 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, ir kiaulėms – 20 mg/kg visaverčio pašaro, kurių drėgnis yra 12 %. Pašaro papildų sudėtyje gali būti seleno, cinko ir vitaminų A bei D, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija nustatytą atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.				3. Pašaro etiketėje nurodyti gaires dėl atvejų, kuriais tinka naudoti pašarą.
53	Padėti nujunkyti	Mažiausias kiekis dietiniame pašare: — seleno: 0,1 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, ir (arba)	Žinduoliai	Maistinių priedų pavadinimas ir, prireikus, bendras kiekis	Iki 4 savaičių maždaug tuo metu, kai nujunkoma	1. Pašaro tinkamo naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio kiekio visaverčiuose pašaruose.

▼B

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP ¹)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP ²)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
		— cinko: 15 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, ir (arba) — vario: avims 2 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %, o kitų rūšių gyvūnams 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, ir (arba) — jodo: 0,2 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, ir (arba) — mangano: 20 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, ir (arba) — vitamino A: 1 500 IU/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, ir (arba) — vitamino D: 400 IU/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, ir (arba) — vitamino E: veršeliams – 100 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %, ėriukams, ožiukams ir paršeliams – 50 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. Pašaro papildo sudėtyje gali būti seleno, cinko, jodo, mangano ir vitaminų A bei D, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija nustatytą atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.				2. Pašaro etiketėje nurodyti gaires dėl atvejų, kuriais tinka naudoti pašarą.

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės ^(GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis ^(GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
54	Odos ir galūnių regeneracijai skatinti	— Mažiausias cinko junginių kiekis, gaunamas su dietiniu pašaru, yra 20 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, ir — didelis kiekis vario ir (arba) jodo, ir (arba) seleno, ir (arba) vitamino B6, ir (arba) vitamino E, ir (arba) vitamino A, ir (arba) metionino, ir (arba) cistino, ir (arba) atrajotojams mažiausiai 0,4 mg biotino/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. Pašaro papildas sudėtyje gali būti cinko, vario ir jodo ir vitaminų A bei D, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija nustatytą atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.	Žinduoliai ir naminiai paukščiai	Maistinių priedų pavadinimas ir, prireikus, bendras kiekis	— Iki 8 savaičių — Atrajotojams skirti pašarų papildai, kurių sudėtyje yra biotino: iki 6 mėnesių	1. Pašaro tinkamo naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio kiekio visaverčiuose pašaruose. 2. Pašaro etiketėje nurodyti gaires dėl atvejų, kuriais tinka naudoti pašarą.
55	Vandens ir elektrolitų pusiausvyrai stabilizuoti ir fiziologiniam virškinimui gerinti	— Vyrauja elektrolitai: natris, kalis ir chloridai — Buferinė talpa ⁽¹⁹⁾ skystųjų pašarų atveju: ne mažiau kaip 60 mmol viename litre paruošto gėrimo — Lengvai virškinami angliavandeniai	Veršeliai, paršeliai, ėriukai, ožiukai ir kumeliukai	— Natris — Kalis — Chloridai — Angliavandenių šaltinis (-iai) — Hidrokarbonatai ir (arba) citratai (jei pridėta)	Nuo 1 iki 7 dienų	1. Rekomenduojamas elektrolitų kiekis viename litre paruošto gėrimo: natris: 1,7–3,5 g kalis: 0,4–2 g chloridai: 1–2,8 g 2. Jei pašaras yra kietas, rekomenduojamas elektrolitų kiekis turėtų būti apskaičiuojamas pagal savanoriškai suvartojamą įprastą vandens paros dozę. 3. Etiketėje nurodyti: — „Esant virškinimo sutrikimo (viduriamo) rizikai ar jo metu arba sveikstant.“

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės ^(GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis ^(GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
						— „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“ 4. Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: — Rekomenduojamą normą paruošto gėrimo ir pieno, jei taikoma. — Hidrokarbonatų ir (arba) citratų atveju daugiau nei 40 mmol viename litre atrajotojams paruošto gėrimo: „Reikėtų vengti tuo pat metu girdyti pienu jauniklius, turinčius ketvirtą skrandžio skilvelį.“
56	Traukulių rizikai mažinti (<i>Hypomagnesemia</i>)	Didelis magnio kiekis, lengvai gaunami angliavandeniai, saikingas baltymų kiekis ir mažas vario kiekis	Atrajotojai	— Krakmolas — Cukrūs (iš viso) — Magnis — Natris — Kalis	Nuo 3 iki 10 savaičių intensyvaus žolės augimo laikotarpiu	1. Leidžiama naudoti kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisavinamos formos geležies siekiant padidinti jos kaloringumą. 2. Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodoma, kaip subalansuoti dienos davinį, į kurį įeitų skaidulinių medžiagų ir lengvai gaunamos energijos šaltiniai. 3. Jei tai pašaras avims, etiketėje nurodyti: „Ypač žindančioms avims.“
57	Acidozės rizikai mažinti	Mažas lengvai fermentuojamų angliavandenių kiekis ir jų didelė buferinė talpa	Atrajotojai	— Krakmolas — Cukrūs (iš viso)	Iki 2 mėnesių ⁽¹⁵⁾	1. Leidžiama naudoti kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisavinamos formos geležies siekiant padidinti jos kaloringumą.

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės ^(GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis ^(GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
						2. Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodoma, kaip subalansuoti dienos davinį, į kurį įeitų skaidulinių medžiagų ir lengvai fermentuojamų angliavandenių šaltiniai. 3. Jei tai pašaras pieninėms karvėms, etiketėje nurodyti: „Ypač pieningoms karvėms.“ 4. Jei tai pašaras mėsiniams atrajotojams, etiketėje nurodyti: „Ypač gausiai šeriamiems ⁽¹⁶⁾.“
58	Šlapimtakių akmenligės rizikai mažinti	Mažas fosforo, magnio kiekis ir šlapimą rūgštinančios savybės	Atrajotojai	— Kalcis — Fosforas — Natris — Magnis — Kalis — Chloridai — Siera — Šlapimą rūgštinančios medžiagos	Iki 6 savaičių	1. Etiketėje nurodyti: „Ypač gausiai šeriamiems jaunikliams.“ 2. Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“
59	Ilgalaikis ganomų gyvūnų aprūpinimas mikroelementais ir (arba) vitaminais	Didelis kiekis — mikroelementų ir (arba) — vitaminų, provitaminų ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagų. Pašarų papildų sudėtyje gali būti pašarų priedų, kurių koncentracija yra 100 kartų didesnė už atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiame pašare	Atrajotojai, turintys funkcinį priedą	— Kiekvieno pridėto mikroelemento, vitamino, provitamino ir panašaus poveikio tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos pavadinimas ir bendras kiekis. — Kiekvieno mikroelemento ir (arba) vitamino paros išskyrimo norma, jeigu naudojamas boliusas — Ilgiausias pastoviai atpalaiduojamo mikroelemento arba vitamino laikotarpis, jeigu naudojamas boliusas	Iki 12 mėnesių	1. Leidžiama naudoti kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisavinamos formos geležies siekiant padidinti jos kaloringumą. 2. Pašaro etiketėje nurodyti: — „Jeigu taikoma, vengtina tuo pačiu metu papildyti priedais, turinčiais nustatytą didžiausią kiekį, iš kitų šaltinių nei boliuso.“

▼B

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės ^(GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis ^(GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
						— „Prieš naudojant rekomenduojama pasi- tarti su veterinarijos gydytoju arba mitybos specialistu dėl: a) mikroelementų balanso dienos racione; b) bandos mikroelementų statuso.“

▼M1

60	Parezės ir subkli- nikinės hipokal- cemijos rizikai sumažinti	Nedidelis katijonų (anijonų) santykis Visam racionui: — minimalus rūgštėjimas duodant specialųjį pašarą: 100 mekv/kg sausosios medžiagos — tikslas: intervalas nuo neigiamų DCAD ⁽¹⁷⁾ verčių iki < 100 (mekv/kg sauso- sios medžiagos) DCAD verčių arba	Pieninės karvės	— Kalcis — Fosforas — Magnis — Natris — Kalis — Chloridai — Siera	3 savaites prieš veršiavimąsi tol, kol apsiveršiuos	Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Šėrimą nutraukti apsiveršiavus.“
		Ceolitai (natrio aliuminio silikatas): 250–500 g per dieną arba		Natrio aliuminio silikatas	3 savaites prieš veršiavimąsi tol, kol apsiveršiuos	Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: — „Pašarų kiekis turi būti ribojamas siekiant užtikrinti, kad nebūtų viršijama 500 g natrio aliuminio silikato dienos norma vienam gyvūnui.“ — Naudojimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 2 savaitės. — „Šėrimą nutraukti apsiveršiavus.“
		Šėrimas pašarinėmis žaliavomis, apsaugotomis nuo suirimo didžiajame skrandyje, kuriose netrūktų fitino rūgš- ties (> 6 %) ir kalcio (< 0,2 %), kad karvė per dieną gautų ne mažiau kaip 28 g ir ne daugiau kaip 32 g kalcio. arba		Kalcis	4 savaites prieš veršiavimąsi tol, kol apsiveršiuos	Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Šėrimą nutraukti apsiveršiavus.“

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
		Didelis kiekis kalcio lengvai pasisavi- namo kalcio šaltinių pavidalu: kalcio chloridas ir (arba) kalcio sulfatas, ir (arba) dikalcio fosfatas, ir (arba) kalcio karbonatas, ir (arba) kalcio propio- natas, ir (arba) kalcio formiatas, ir (arba) „bet kuris kitas panašaus poveikio kalcio šaltinis“ Kalcis iš vieno ar kelių minėtų šaltinių, kurio vienai karvei per dieną skiriama ne mažiau kaip 50 g; arba		— Kalcis — Kalcio šaltiniai	Nuo pirmųjų veršiavi- mosi požymių iki dviejų dienų po atsivedimo	— Leidžiama naudoti kaip boliusą. Boliuso sudėtyje, siekiant padidinti jo tankį, gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisa- vinamos formos geležies. — Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti, kiek kartų galima naudoti, ir laiką prieš apsiveršiavimą ir po apsiveršiavimo. — Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant reko- menduojama pasitarti su mitybos specialistu.“
		Kalcis duodamas pidolato forma, ne mažiau kaip 5,5 g vienai karvei per dieną arba		— Kalcis — Kalcio pidolatas	Nuo pirmųjų veršiavi- mosi požymių iki dviejų dienų po apsiveršiavimo	— Leidžiama naudoti kaip boliusą. Boliuso sudėtyje, siekiant padidinti jo tankį, gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisa- vinamos formos geležies. — Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant reko- menduojama pasitarti su mitybos specialistu.“
		Melsvalapės basovijos rupiniai, kurių atpalaiduojamo 1,25 dihidroksikolekal- ciferolio glikozido paros norma yra 38–46 µg arba		— Melsvalapės basovijos rupiniai — Sudėtyje 1,25 dihidroksiko- lecalciferolio glikozidas — Žalia ląsteliena — Magnis — Žali riebalai — Krakmolas — Vitaminas D ₃ (iš viso) kaip kolecalciferolis	Nuo dviejų dienų prieš veršiavimąsi arba pirmųjų veršiavi- mosi požymių iki dešimties dienų po apsiveršiavimo	— Leidžiama naudoti kaip boliusą. Boliuso sudėtyje, siekiant padidinti jo tankį, gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisa- vinamos formos geležies. — Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant reko- menduojama pasitarti su mitybos specialistu.“

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP ¹)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP ²)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
		Glikozilintas 1,25-dihidroksikolekalciferolis, gautas iš <i>Solanum glaucophyllum</i> ekstrakto, kurio atpalaiduojama glikozilinto 1,25-dihidroksikolekalciferolio paros norma sudaro 15–80 µg.	Pieninės karvės	— Glikozilintas 1,25-dihidroksikolekalciferolis, gautas iš <i>Solanum glaucophyllum</i> ekstrakto — Vitaminas D₃ (iš viso) kaip kolekalciferolis	Vienkartinis boliusas, kurio sudėtyje yra glikozilinto 1,25-dihidroksikolekalciferolio, gauto iš <i>Solanum glaucophyllum</i> ekstrakto, skiriamas per virškinamąjį traktą prieš veršiamąsi (nuo 9 dienų prieš veršiamąsi iki prieš pat apsiveršiuojant).	1. Glikozilintas 1,25-dihidroksikolekalciferolis, gautas iš <i>Solanum glaucophyllum</i> ekstrakto, skiriamas per virškinamąjį traktą vienkartinio boliuso pavidalu, per parą skiriant: — ne mažiau kaip 60 g kalcio vienai karvei per savaitę prieš veršiamąsi ir 84 g vienai karvei iki trečios laktacijos savaitės pabaigos; — ne mažiau kaip 18 g magnio vienai karvei per savaitę prieš veršiamąsi ir 26 g vienai karvei iki trečios laktacijos savaitės pabaigos. 2. Pašaro etiketėje nurodyti: „Boliusą leidžiama naudoti tik vieną kartą laikotarpiu prieš veršiamąsi (nuo 9 dienų prieš veršiamąsi iki prieš pat apsiveršiuojant). Kalcis ir magnis skiriami kasdien tokiais kiekiais: — ne mažiau kaip 60 g kalcio vienai karvei per savaitę prieš veršiamąsi ir 84 g vienai karvei iki trečios laktacijos savaitės pabaigos; — ne mažiau kaip 18 g magnio vienai karvei per savaitę prieš veršiamąsi ir 26 g vienai karvei iki trečios laktacijos savaitės pabaigos.“ Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju arba mitybos specialistu.

▼B

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP ¹)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP ²)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
61	Ketozės rizikai mažinti ⁽¹⁸⁾	— Mažiausias propan-1,2-diolio arba propilenglikolio kiekis: pieninėms karvėms – 250 g per dieną avims ir ožkoms – 50 g per dieną. - arba — mažiausias propionatų (kalcio arba natrio druskų) kiekis: pieninėms karvėms – 110 g per dieną avims ir ožkoms – 22 g per dieną. - arba — mažiausias bendras propan-1,2-diolio ir propionatų (natrio arba kalcio druskų) kiekis, su sąlyga, kad: — pieninėms karvėms skiriamas toks propan-1,2-diolio ir propionatų derinys: propionatai +0,44 x propan-1,2-diolis -1,2 diolis > 110 g per dieną; — avims ar ožkoms skiriamas toks propan-1,2-diolio ir propionatų derinys: propionatai +0,44 x propan-1,2-diolis -1,2 diolis > 22 g per dieną	Pieninės karvės, avys ir ožkos	— Propan-1,2-diolis, jei jo pridėta — Natrio arba kalcio druskų pavidalo propionatai, jei jų pridėta	Likus trims savaitėms iki pieninių karvių apsiveršiavimo ir šešias savaites po apsiveršiavimo Likus šešioms savaitėms iki avių ir ožkų atsivedimo ir praėjus trims savaitėms po atsivedimo	1. Leidžiama naudoti kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisavinamos formos geležies siekiant padidinti jos kaloringumą. 2. Etiketėje nurodyti: „Nėštumo pabaigoje skiriant kalcio ar natrio propionatų, būtina įvertinti mineralų balansą, atsižvelgiant į hipokalcemijos pavojų po atsivedimo.“
62	Stresinėms reakcijoms mažinti	— Didelis magnio kiekis ir (arba) — lengvai virškinamos sudedamosios dalys	Kiaulės	— Magnis — Lengvai virškinamos sudedamosios dalys, įskaitant, kai reikia, apdorotas — Riebalinės rūgštys n-3 (jei pridėta) kiekis	Nuo 1 iki 7 dienų	Turi būti nustatytos gairės dėl atvejų, kuriais tinka naudoti šį pašarą.
63	Vidurių užkietėjimo rizikai mažinti	Sudedamosios dalys, skatinančios žarnyno praeinamumą	Paršavedės	Sudedamosios dalys, skatinančios žarnyno praeinamumą	Nuo 10 iki 14 dienų iki apsiparšiavimo ir nuo 10 iki 14 dienų apsiparšėlius	

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP ¹)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP ²)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
64	Kompensuoti nepakankamą geležies kiekį po atsivedimo	Didelis geležies junginių kiekis leidžiamas pagal kategorijos „maistiniai priedai“ funkcinę grupę „mikroelementų junginiai“, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede. Pašaro papildas sudėtyje gali būti geležies, kurios kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija atitinkamą nustatytą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.	Žindomi paršeliai ir veršeliai	Geležis (iš viso)	Iki 3 savaičių po atsivedimo	Tinkamo naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio geležies kiekio visaverčiuose pašaruose.
65	Malabsorbcijai kompensuoti	Mažas prisotintų riebalų rūgščių kiekis ir didelis riebaluose tirpstančių vitaminų kiekis	Naminiai paukščiai, išskyrus žąsis ir balandžius	— Prisotintų riebalų rūgščių procento santykis su visu riebalų rūgščių kompleksu — Vitaminas E (iš viso) — Vitaminas D (iš viso) — Vitaminas E (iš viso) — Vitaminas K (iš viso)	Per pirmas 2 savaites po perėjimo	
66	Riebiųjų kepenų sindromo rizikai mažinti	Mažas kaloringumas ir didelis metabolizuojančios energijos, gaunamos iš lipidų, santykis, esant dideliame polineprisotintų riebalų rūgščių kiekiui	Vištos dedeklės	— Kaloringumas (skaičiuojama taikant EK nustatytą metodą) — Iš lipidų gaunamos metabolizuojančios energijos procentas — Polineprisotintų riebalų rūgščių kiekis	Iki 12 savaičių	
67	Padėti pasirengti sportinei veiklai ir atsigauti po jos	Didelis seleno kiekis ir mažiausiai 50 mg vitamino E kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis yra 12 %. Pašaro papildas sudėtyje gali būti seleno junginių, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija atitinkamą nustatytą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.	Arklinių šeimos gyvūnai	— Vitaminas E (iš viso) — Selenas (iš viso)	Iki 8 savaičių iki sportinės veiklos. Iki 4 savaičių po sportinės veiklos.	Pašaro tinkamo naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio seleno kiekio visaverčiame pašare.

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės ^(GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis ^(GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
68	Elektrolitų trūkumui orga- nizme kompen- suoti esant gausiam prakaitavimui	Sudėtyje privalo būti natrio chlorido ir turėtų būti kalio chlorido. Nedidelis magnio, kalcio ir fosforo kiekis. Kitų elektrolitų druskų įtraukti nebūtina.	Arklinių šeimos gyvūnai	— Natris — Chloridai — Kalis — Kalcis — Magnis — Fosforas	Nuo vienos iki trijų dienų po gausaus prakaitavimo.	1. Turi būti nustatytos gairės dėl atvejų, kuriais tinka naudoti pašarą. 2. Į tinkamo naudojimo instrukcijas turi būti įtrauktos naudojimo gairės, pagrįstos atlie- kamos veiklos trukme ir intensyvumu, atsiž- velgiant į pašaro paruošimą ir pateikimą. 3. Etiketėje nurodyti: — „Visada turi būti vandens.“ — Naudojant su vandeniu nesumaišytus elektrolitus (pvz., pašare ar švirkšte): „Vandens turi būti bent 20 minučių arba geriausia 1 valandą po naudojimo.“ 4. Be to, reikia pateikti stebėsenos gaires dėl vėlesnio vandens vartojimo, o pastebėjus, kad vandens suvartojama nepakankamai, reikėtų kreiptis į veterinarijos gydytoją. 5. Gali būti pateiktos ir rekomendacijos dėl vandens kiekio (litrais), kuris pateikiamas kartu su pašaru arba su sušvirkščiamais elektrolitais.
69	Energinių medžiagų apykaitai ir raumenų veiklai skatinti sergant rabdomiolize	Krakmolas ir cukrus turi sudaryti ne daugiau kaip 20 % energijos. Žali riebalai turi sudaryti daugiau kaip 20 % energijos. Mažiausiai 350 IU vitamino E kilo- grame visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %	Arklinių šeimos gyvūnai	— Krakmolas — Cukrus — Žali riebalai — Vitaminas E (iš viso)	Iš pradžių mažiausiai 3 mėnesius	1. Turi būti nustatytos gairės dėl atvejų, kuriais tinka naudoti pašarą. 2. Į tinkamo naudojimo instrukcijas turi būti įtrauktos gairės, kaip subalansuoti paros davinį ir atitinkamą dienos davinį.

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP ¹)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP ²)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
						3. Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“
70	Storosios žarnos chroniškiems virškinimo sutri- kimams kompensuoti	— Krakmolo kiekis, kad būtų < 1 g/kg kūno masės kartą pavalgius (< 0,5 g/kg kūno masės kartą pavalgius, jei viduriuojama). — Hidrotermiškai apdoroti grūdai, pvz., taikant ekstrudavimą, mikronizavimą, ekspandavimą ar dribsnių gaminimą, siekiant pagerinti krakmolo virškinimą plonajame žarnyne. — Papildomas vandenyje tirpių vitaminų kiekis ir tinkamas mineralų ir (arba) elektrolitų kiekis. — Papildomas aliejaus kiekis, jei nėra viduriavimo.	Arklinių šeimos gyvūnai	— Krakmolas — Žali riebalai	Ilgą laikotarpį arba kol išnyks problema	1. Turi būti nustatytos gairės dėl: — konkrečių atvejų, kuriais tinka naudoti pašarą, visų pirma, ar produktas gali būti skiriamas gyvūnams tuo metu, kai jie viduriuoja, ar ne; — maisto dydžio ir pašarų įsisavinimo. 2. Tinkamo naudojimo instrukcijose aprašomas galimas laipsniškas naudojimas, atsižvelgiant į aliejaus kiekį, ir pasiūlymai, kaip stebėti viduriavimą. 3. Etiketėje nurodomas naudotas grūdų perdirbimo būdas.
71	Plonosios žarnos funkcijos chro- niškam nepakan- kamumui kompensuoti	— Lengvai virškinamos skaidulinės medžiagos. — Aukštos kokybės baltymų šaltiniai ir lizinas > 4,3 % žalių baltymų. — Bendras cukraus ir krakmolo kiekis ne didesnis kaip 0,5 g/kg kūno masės kartą pavalgius. — Hidrotermiškai apdoroti grūdai, pvz., taikant ekstrudavimą, mikronizavimą, ekspandavimą ar dribsnių gaminimą, siekiant pagerinti krakmolo virškinimą prieš akląją žarną.	Arklinių šeimos gyvūnai	— Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos, įskaitant, kai reikia apdorotas — Bendras cukraus ir krakmolo kiekis — Baltymų šaltiniai	Ilgą laikotarpį arba kol išnyks problema	1. Turi būti nustatytos gairės dėl: — konkrečių atvejų, kuriais tinka naudoti pašarą; — maisto dydžio ir pašarų įsisavinimo. 2. Tinkamo naudojimo instrukcijose aprašomas galimas laipsniškas naudojimas, atsižvelgiant į aliejaus kiekį, ir pasiūlymai, kaip stebėti viduriavimą.

Įrašo eilės Nr.	Numatyta paskirtis	Pagrindinės maistinės savybės (GP1)	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis (GP2)	Rekomenduojamas laikas	Kitos nuostatos
	1	2	3	4	5	6
72	Fiziologiniam virškinimui stabilizuoti	Funkcinei grupei „žarnyno floros stabili- zatoriai“ priklausantys pašarų priedai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede, arba, kol nebaigta pakartotinio leidimo išdavimo procedūra, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnyje, grupei „mikroorganizmai“ priklausantys pašarų priedai	Gyvūnų rūšys, kurioms leista naudota žarnyno floros stabilizatorių arba mikro- organizmą	Žarnyno floros stabilizatoriaus arba mikroorganizmo pavadi- nimas ir pridėtas kiekis	Iki 4 savaičių	1. Etiketėje nurodyti: „Esant virškinimo sutrikimų rizikai, jų metu arba sveikstant.“ 2. Pašaro tinkamo naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio žarnyno floros stabili- zatoriaus arba mikroorganizmo kiekio visa- verčiuose pašaruose.

(GP1) Kad būtų galima kontroliuoti kiekybinius rodiklius, taikomi Reglamento (EB) Nr. 767/2009 IV priede nustatyti nuokrypiai.

(GP2) Ši informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis, naudojama kartu su Reglamente (EB) Nr. 767/2009 nustatytais bendraisiais ženklavimo reikalavimais.

(1) Gamintojas prirėikęs gali rekomenduoti šerti ir esant laikinam inkstų nepakankamumui.

(2) Mityba, kurią taikant sausosios medžiagos kaloringumas yra 4 000 kcal metabolizuojančios energijos viename kilograme, apskaičiuotas taikant FEDIAF mitybos gairėse pateiktą lygtį (<http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html>). Vertės patikslinamos, jei kaloringumas neatitinka 4 000 kcal metabolizuojančios energijos viename kilograme.

(3) Jeigu pašaras rekomenduojamas esant laikinam inkstų nepakankamumui, rekomenduojama šėrimo trukmė yra nuo dviejų iki keturių savaičių.

(4) Jeigu pašaras skirtas naudoti esant konkrečiam netoleravimui, nuoroda į konkretų netoleravimą gali būti pakeista žodžiais: „sudedamoji dalis ir maistinė medžiaga“.

(5) Kačių atveju galima pridėti frazė „Kačių kepenų lipidozė“.

(6) Kačių atveju galima pridėti frazė „kačių apatinių šlapimtakų susirgimai“ arba „kačių urologinis sindromas (F. U. S)“.

(7) Neprisotinamos savybės: šlapimas, susijęs su kristalų ir akmenų tirpimo savybėmis, ir (arba) su kristalų nusodinimo ir augimo prevencijos savybėmis.

(8) Šlapimo pH ≤ 6,5.

(9) Metastabiliąją būseną užtikrinamos savybės: šlapimas, susijęs su kristalų nusodinimo prevencijos savybėmis.

(10) Gali būti pridėta frazė „egzokrininis kasos nepakankamumas“.

(11) Paros davinytis turi atitikti visoms pagrindinėms riebalų rūgštims pagal FEDIAF mitybos gaires (<http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html>) taikomas būtiniausias rekomendacijas.

(12) Mityba, kurią taikant sausosios medžiagos kaloringumas yra 3 500 kcal metabolizuojančios energijos viename kilograme, apskaičiuotas taikant FEDIAF mitybos gairėse pateiktą lygtį (<http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html>). Vertės patikslinamos, jei kaloringumas neatitinka 3 500 kcal metabolizuojančios energijos viename kilograme.

(13) Metabolizuojanti energija viename kilograme apskaičiuojama taikant „FEDIAF (2019) Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs“ nurodytą lygtį.

(14) „FEDIAF (2019) Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs“.

(15) Jei pašaras skirtas pieninėms karvėms: „ne daugiau kaip du mėnesius nuo laktacijos pradžios“.

(16) Nurodyti konkrečią atrajotojų kategoriją.

(17) DCAD (mEq/kg sausosios medžiagos) = (Na + K) - (Cl + S).

(18) Terminas „ketozė“ gali būti pakeistas terminu „acetonemija“, o už ženklimą atsakingas asmuo gali taip pat rekomenduoti naudoti, kai gyvulys sveiksta po ketozės.

(19) Apskaičiuota taikant stipriųjų jonų skirtumo metodą (SID vertė): SID yra stipriųjų katijonų ir stipriųjų anijonų koncentracijų sumos skirtumas; [SID] = [mmol Na⁺/l] + [mmol K⁺/l] + [mmol Ca⁺⁺/l] + [mmol Mg⁺⁺/l] – [mmol Cl⁻/l] – [mmol kitų stipriųjų anijonų/l].

(20) DCAD (maistinis katijonų ir anijonų skirtumas, išreikštas mekv/kg sausosios medžiagos) = (Na + K) – (Cl + S).