

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 255/2005

(2005. gada 15. februāris)

par pastāvīgām atļaujām izmantot noteiktas barības piedevas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām⁽¹⁾, un jo īpaši tās 3. pantu un 9.d panta 1. punktu,ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām⁽²⁾, un jo īpaši tās 25. pantu,

tā kā:

(1) Regula (EK) Nr. 1831/2003 paredz atļauju piešķiršanu piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā Eiropas Savienībā.

(2) Regulas (EK) Nr. 1831/2003 25. pants nosaka pārejas pasākumus pieteikumiem par barības piedevu izmantošanas atļaujas saņemšanu, kas iesniegti saskaņā ar Direktīvu 70/524 pirms minētās regulas piemērošanas datuma.

(3) Pieteikumi par šīs regulas pielikumos minēto piedevu izmantošanas atļaujas saņemšanu iesniegti pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas datuma.

(4) Sākotnējie dalībvalstu komentāri par šiem pieteikumiem, kas publicēti saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 4. panta 4. punktu, tika nosūtīti Komisijai pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas datuma. Šādi pieteikumi tādēļ arī turpmāk aplūkojami saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 4. pantu.

(5) *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) mikroorganismu preparātu pirmo reizi uz laiku atļāva izmantot ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1411/1999⁽³⁾ gaļas liellopiem.(6) *Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415) mikroorganismu preparātu pirmo reizi uz laiku atļāva izmantot ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1636/1999⁽⁴⁾ teļiem.

(7) Tika iesniegti jauni dati, lai papildinātu pieteikumus šīs regulas I pielikumā minēto divu mikroorganismu preparātu izmantošanas atļaujai uz neierobežotu laiku. Novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie nosacījumi šādai atļaujai ir ievēroti.

(8) Ar *Aspergillus niger* (NRRL 25541) palīdzību iegūto fermentu preparātu no endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes pirmo reizi atļāva izmantot uz laiku ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1436/98⁽⁵⁾ dējējvistām.

(9) Tika iesniegti jauni dati, lai papildinātu pieteikumu šī fermentu preparāta izmantošanas atļaujai uz neierobežotu laiku.

(10) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 2004. gada 14. septembrī sniegusi atzinumu par šī preparāta iedarbīgumu, izmantojot to dējējvistām.

(11) Novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie nosacījumi šādai atļaujai ir ievēroti.

(12) Ar *Aspergillus oryzae* (DSM 11857) palīdzību iegūto fermentu preparātu 6-phytase pirmo reizi atļāva izmantot uz laiku ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1353/2000⁽⁶⁾ gaļas cāļiem, dējējvistām, gaļas tītariem, sivēniem un gaļas cūkām un ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 261/2003⁽⁷⁾ sivēnmātēm. Šī fermentu preparāta izmantošana uz neierobežotu laiku šīm dzīvnieku kategorijām tika atļauta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1465/2004⁽⁸⁾.⁽¹⁾ OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp. Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1800/2004 (OV L 317, 16.10.2004., 37. lpp.).⁽²⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.⁽³⁾ OV L 164, 30.6.1999., 56. lpp.⁽⁴⁾ OV L 194, 27.7.1999., 17. lpp.⁽⁵⁾ OV L 191, 7.7.1998., 15. lpp.⁽⁶⁾ OV L 155, 28.6.2000., 15. lpp.⁽⁷⁾ OV L 37, 13.2.2003., 12. lpp.⁽⁸⁾ OV L 270, 18.8.2004., 11. lpp.

- (13) Tika iesniegti jauni dati, lai papildinātu pieteikumu tā paša fermentu preparāta, kas iegūts ar *Aspergillus oryzae* pasugu DSM 14223, preparāta izmantošanas atļaujai uz neierobežotu laiku tām pašām dzīvnieku kategorijām.
- (14) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) sniegusi atzinumu par šī preparāta izmantošanu, ja tas iegūts ar *Aspergillus oryzae* pasugu DSM 14223, nevis pasugu DSM 11857, kurā secināts, ka šis preparāts nerada draudus cilvēku veselībai, norādītajām dzīvnieku kategorijām vai videi, ja tiek ievēroti šīs regulas II pielikumā minētie nosacījumi.
- (15) Novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie nosacījumi atļaujai bez laika ierobežojuma šādam preparātam ir ievēroti.
- (16) Ar *Aspergillus niger* (CBS 270.95) palīdzību iegūto fermentu preparātu no endo-1,4-beta-ksilanāzes pirmo reizi atļāva izmantot uz laiku ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1436/98 gaļas cāļiem un ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 654/2000 ⁽¹⁾.
- (17) Tika iesniegti jauni dati, lai papildinātu pieteikumu šī fermentu preparāta izmantošanas atļaujai uz neierobežotu laiku.
- (18) Novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie nosacījumi šādai atļaujai ir ievēroti.
- (19) Tādēļ jāatļauj uz neierobežotu laiku izmantot II pielikumā minētos šos trīs fermentu preparātus.
- (20) Šo pieteikumu novērtējums liecina, ka vajadzīgas noteiktas procedūras, lai aizsargātu darba ņēmējus no pielikumos norādīto piedevu iedarbības. Šāda aizsardzība jānodrošina, piemērojot Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā ⁽²⁾.
- (21) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprītes un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,
- IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preparātus, kas pieder pie mikroorganismu grupas, ir atļauts uz neierobežotu laiku izmantot par piedevām dzīvnieku uzturā, ievērojot I pielikumā paredzētos nosacījumus.

2. pants

Preparātus, kas pieder pie fermentu grupas, ir atļauts uz neierobežotu laiku izmantot par piedevām dzīvnieku uzturā, ievērojot II pielikumā paredzētos nosacījumus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. februārī

Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Markos KYPRIANOU

⁽¹⁾ OV L 79, 30.3.2000., 26. lpp.

⁽²⁾ OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.

I PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeņa	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieka suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					KVV/kg	kompleksās barības		
Mikroorganismi								
E 1701	<i>Bacillus cereus</i> var. <i>Toyo</i> NCIMB 40112/CNCM I-1012	<i>Bacillus cereus</i> var. <i>Toyo</i> preparāts, kas satur ne mazāk kā: 1×10^{10} KVV/g piedevas	Gaļas liellopi	—	$0,2 \times 10^9$	$0,2 \times 10^9$	Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums. <i>Bacillus cereus</i> var. <i>Toyo</i> daudzums ikdienas devā nedrīkst pārsniegt 1×10^9 KVV uz 100 kg ķermeņa masas. Katrēm papildus ķermeņa masas 100 kg jāpievieno $0,2 \times 10^9$ KVV.	Bez laika ierobežojuma
E 1707	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663/NCIMB 10415	<i>Enterococcus faecium</i> preparāts, kas satur ne mazāk kā: Pulveris un granulas: $3,5 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas Aplātā veidā: $2,0 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas Šķidrā veidā: 1×10^{10} KVV/ml piedevas	Teļi	6 mēneši	1×10^9	1×10^{10}	Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums.	Bez laika ierobežojuma

II PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeņa	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieka suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
Fermenti								
E 1601	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	Ar <i>Aspergillus niger</i> (NRRL 25541) iegūts preparāts no endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes ar šādu minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 100 U ⁽¹⁾ /g Endo-1,3(4)-beta-ksilanāze: 1 600 U ⁽²⁾ /g	Dējējvistas	—	endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 138 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 200 U	—	1. Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 138 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 200 U. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilānu un beta-glikānu), piemēram, jauktā uzturā, kas ietver labību (piem., miežus, kviešus, rudzus, tritikāli).	Bez laika ierobežojuma
E 1614 (i)	6-phytase EC 3.1.3.26	Ar <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 14223) iegūts preparāts 6-phytase ar šādu minimālo aktivitāti: Cietā veidā: 5 000 FYT ⁽²⁾ /g Šķidrā veidā: 20 000 FYT/ml	Gaļas cāļi	—	250 FYT	—	1. Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums. 2. Ieteicamā deva uz kilogramu kompleksās barības 500–1 000 FYT. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,25 % fosfora fitīna savienojumu.	Bez laika ierobežojuma

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieka suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs		Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					Aktivitātes vienības/kg kompleksās barības				
			Dējējvistas	—	300 FYT	—	—	1. Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums. 2. Ieteicamā deva uz kilogramu kompleksās barības: 450–1 000 FYT. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,25 % fosfora fitīna savienojumu.	Bez laika ierobežojuma
			Gaļas tītari	—	250 FYT	—	—	1. Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums. 2. Ieteicamā deva uz kilogramu kompleksās barības: 500–1 000 FYT. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,25 % fosfora fitīna savienojumu.	Bez laika ierobežojuma
			Sivēni	—	250 FYT	—	—	1. Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums. 2. Ieteicamā deva uz kilogramu kompleksās barības: 500–1 000 FYT. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,25 % fosfora fitīna savienojumu. 4. Izmantošanai no mātes atšķirtiem sivēniem, kuru svars nepārsniedz apmēram 35 kg.	Bez laika ierobežojuma

EK Nr.	Piedeņa	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieka suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					Aktivitātes vienības/kg kompleksās barības	Aktivitātes vienības/kg kompleksās barības		
			Gaļas cūkas	—	250 FYT	—	1. Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulācijas noturīgums. 2. Ieteicamā deva uz kilogramu kompleksās barības: 500–1 000 FYT. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,25 % fosfora fitīna savienojumu	Bez laika ierobežojuma
			Sivēnmātes	—	750 FYT	—	1. Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulācijas noturīgums. 2. Ieteicamā deva uz kilogramu kompleksās barības: 750–1 000 FYT. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,25 % fosfora fitīna savienojumu.	Bez laika ierobežojuma

EK Nr.	Piedeņa	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieka suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					Aktivitātes vienības/kg kompleksās barības	Aktivitātes vienības/kg kompleksās barības		
E 1618	Endo-1,4-beta-ksilānāze EC 3.2.1.8	Ar <i>Aspergillus niger</i> (CBS 270.95) iegūts preparāts no endo-1,4-beta-ksilānāzes ar šādu minimālo aktivitāti: Cietā veidā: 28 000 EXU ⁽⁴⁾ /g Šķidrā veidā: 14 000 EXU/ml	Galas cāļi	—	2 800 EXU	—	1. Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 2 800–5 600 EXU. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilānu), piemēram, kas satur vairāk par 50 % kviešu.	Bez laika ierobežojuma
			Galas tītari	—	5 600 EXU	—	1. Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 5 600 EXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilānu), piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu un 30 % rudzu.	Bez laika ierobežojuma

¹⁾ 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 4,0 un temperatūra 30 °C, minūtē no auzu beta-glikāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).

²⁾ 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 4,0 un temperatūra 30 °C, minūtē no auzu ksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).

³⁾ 1 FYT ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,5 un temperatūra 37 °C, minūtē no nātrija fitāta atbrīvo 1 mikromolu neorganiska fosfāta.

⁴⁾ 1 EXU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 3,5 un temperatūra 55 °C, minūtē no arabinoksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus)."

⁽¹⁾ 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 4,0 un temperatūra 30 °C, minūtē no auzu beta-glikāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).

⁽²⁾ 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 4,0 un temperatūra 30 °C, minūtē no auzu ksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).

⁽³⁾ 1 FYT ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,5 un temperatūra 37 °C, minūtē no nātrija fitāta atbrīvo 1 mikromolu neorganiska fosfāta.

⁽⁴⁾ 1 EXU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 3,5 un temperatūra 55 °C, minūtē no arabinoksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus)."