

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/403**(2019. gada 13. marts),****ar ko piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei *Deosan Activate BPF based on Iodine***

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 44. panta 5. punktu,

tā kā:

- (1) 2015. gada 7. jūlijā uzņēmums *Diversey Europe Operations B.V.* saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu iesniedza atļaujas pieteikumu par biocīdu saimi *Deosan Activate BPF based on Iodine* ("biocīdu saime"), kas pieder pie minētās regulas V pielikumā aprakstītā 3. produkta veida. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktā minēto Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde piekrita novērtēt pieteikumu. Pieteikums ar lietas numuru BC-JN018376-30 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.
- (2) Šīs saimes biocīdi kā aktīvo vielu satur jodu, kas iekļauts Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā. Komisija, ņemot vērā aktīvajai vielai raksturīgās īpašības un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 ⁽²⁾ izklāstītos endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanas zinātniskos kritērijus, apsvērs, vai nav nepieciešams saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 15. pantu pārskatīt joda, arī polivinilpirolidonjoda, apstiprinājumu. Atkarībā no šīs pārskatīšanas rezultātiem Komisija apsvērs, vai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 48. pantu nav jāpārskata Savienības atļaujas, kas piešķirtas minēto aktīvo vielu saturošiem biocīdiem.
- (3) 2017. gada 20. decembrī kompetentā novērtētājiestāde Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtēšanā gūtos secinājumus.
- (4) 2018. gada 6. jūlijā Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu ⁽³⁾, tostarp arī šīs biocīdu saimes biocīda raksturojuma kopsavilkuma ("BRK") projektu un biocīdu saimes novērtējuma galīgo ziņojumu. Atzinumā secināts, ka biocīdu saime atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta s) apakšpunktā dotajai biocīdu saimes definīcijai, ka tā ir tiesīga saņemt Savienības atļauju saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu un ka, ja vien tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, biocīdu saime atbilst minētās regulas 19. panta 1. un 6. punkta nosacījumiem.
- (5) 2018. gada 17. septembrī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu nosūtīja Komisijai BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās.
- (6) Komisija ir vienprātīgi ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi minētajai biocīdu saimei piešķirt Savienības atļauju.
- (7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

⁽¹⁾ OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.⁽²⁾ Komisijas 2017. gada 4. septembra Deleģētā regula (ES) 2017/2100, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 nosaka zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai (OV L 301, 17.11.2017., 1. lpp.).⁽³⁾ ECHA 2018. gada 6. jūlija atzinums par Savienības atļauju biocīdam *Deosan Activate BPF based on Iodine* (ECHA/BPC/207/2018).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzņēmumam *Diversey Europe Operations B.V.* attiecībā uz biocīdu saimi *Deosan Activate BPF based on Iodine* tiek piešķirta Savienības atļauja ar numuru EU-0019228-0000.

Savienības atļauja ir derīga no 2019. gada 3. aprīļa līdz 2029. gada 31. martam.

Savienības atļaujas nosacījums ir atbilstība pielikumā dotajam biocīda raksturojuma kopsavilkumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 13. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNKER

PIELIKUMS

Biocīda raksturojuma kopsavilkums biocīdu saimei

Deosan Activate BPF based on Iodine

3. produktu veids. Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)

Atļaujas numurs: EU-0019228-0000

Biocīdu reģistra(R4BP 3) vienuma atsaucē numurs: EU-0019228-0000

I DAĻA

PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS

1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Saimes nosaukums**

Nosaukums	Deosan Activate BPF based on Iodine
-----------	-------------------------------------

1.2. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
--------------------	---

1.3. **Atļaujas turētājs**

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	Diversey Europe Operations B.V.
	Adrese	Maarssebroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, Nīderlande
Atļaujas numurs	EU-0019228-0000	
Biocīdu reģistra (R4BP 3) atsaucē numurs	EU-0019228-0000	
Atļaujas piešķiršanas datums	2019. gada 3. aprīlis	
Atļaujas derīguma termiņš	2029. gada 31. marts	

1.4. **Biocīdu ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	Diversey Europe Operations B.V.
Ražotāja adrese	Maarssebroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Nīderlande
Ražotnes atrašanās vieta	Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Itālija Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrīde) Spānija Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Nīderlande Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton Apvienotā Karaliste Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Vācija

1.5. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	Jods
Ražotāja nosaukums	ACF Minera S.A.
Ražotāja adrese	San Martin No 499, 1100000 Iquique Čīle
Ražotnes atrašanās vieta	Lagunas mine, 118 0000 Pozo Almonte Čīle

Aktīvā viela	Jods
Ražotāja nosaukums	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Ražotāja adrese	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Čīle
Ražotnes atrašanās vieta	Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Čīle

Aktīvā viela	Jods
Ražotāja nosaukums	Cosayach Nitratos S.A.
Ražotāja adrese	Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Čīle
Ražotnes atrašanās vieta	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 118 0000 Pozo Almonte Čīle

Aktīvā viela	Jods
Ražotāja nosaukums	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
Ražotāja adrese	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Japāna
Ražotnes atrašanās vieta	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Japāna

Aktīvā viela	Jods
Ražotāja nosaukums	ISE Chemicals Corporation
Ražotāja adrese	3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Japāna
Ražotnes atrašanās vieta	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, 299-3201 Chiba Japāna

Aktīvā viela	Jods
Ražotāja nosaukums	Atacama Minerals SCM
Ražotāja adrese	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes, 8320000 Santiago Čīle
Ražotnes atrašanās vieta	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility, 3580000 Antofagasta Čīle

2. BIOČĪDU SAIMES SASTĀVS UN PREPARATĪVAIS VEIDS

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par saimes sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Jods		Aktīvā viela	7553-56-2	231-442-4	0,3	1,6

2.2. Preparatīvais veids(-i)

Preparatīvais veids	AL - Jebkurš cits šķidrums SL - Šķīstošs koncentrāts GW - Ūdenī šķīstošs gēls
---------------------	---

II DAĻA

OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS(-I)

META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS 1

1. META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 identifikators

Identifikators	Meta SPC 1 - Deosan Activate BPF - Koncentrāts
----------------	--

1.2. Atļaujas numura sufikss

Numurs	1-1
--------	-----

1.3. Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
--------------------	---

2. META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 1 SASTĀVS

2.1. Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Jods		Aktīvā viela	7553-56-2	231-442-4	1,35	1,6

2.2. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 preparatīvais veids(-i)

Preparatīvais veids	SL - Šķīstošs koncentrāts
---------------------	---------------------------

3. META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 1 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi	Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Atbrīvoties no satura saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem

4. META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 1 ATĻAUTAIS LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. Lietošanas apraksts

1 tabula. Lietošanas veids # 1 – Pirms slaukšanas dezinfekcija, manuāla iegremdēšana (koncentrāts)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekšelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla iegremdēšanas dezinfekcijas līdzeklī Dzīvnieku pupu dezinfekcijas līdzeklis tiešai lietošanai pirms laktācijas dzīvnieku slaukšanas. Tiek lietots tieši uz dzīvnieku pupiem pirms slaukšanas, izmantojot manuālas iegremdēšanas paņēmieni.
Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) Produktiem, kas satur 1,5 % joda: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju Trīs pirms slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.1.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Produktiem, kas satur 1,5 % joda, var rīkoties šādi: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju.

Lietojiet tieši uz dzīvnieku pupiem pirms slaukšanas, izmantojot manuālas iegremdēšanas paņēmieni.

Trīs pirms slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu.

Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.1.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.1.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.2. Lietošanas apraksts

2 tabula. Lietošanas veids # 2 – Pirms slaukšanas dezinfekcija, manuāla noklāšana ar putām (koncentrāts)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā tiks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekšelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla noklāšana ar putām Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pirms laktācijas dzīvnieku slaukšanas Tiek lietots uz dzīvnieku pupiem pirms slaukšanas, izmantojot manuālu noklāšanu ar putām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) Produktiem, kas satur 1,5 % joda: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju Trīs pirms slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu. Lietojiet maksimums 5 ml produkta, vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.2.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Produktiem, kas satur 1,5 % joda, var rīkoties šādi: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju.

Lietojiet tieši uz dzīvnieku pupiem pirms slaukšanas, izmantojot manuālu noklāšanu ar putām.

Trīs pirms slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu.

Lietojiet maksimums 5 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.2.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.2.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.2.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.3. Lietošanas apraksts

3 tabula. Lietošanas veids # 3 - Pirms slaukšanas dezinfekcija, manuāla apsmidzināšana (koncentrāts)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekšelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla apsmidzināšana Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pirms laktācijas dzīvnieku slaukšanas Tiek lietots uz dzīvnieku pupiem pirms slaukšanas, izmantojot manuālu apsmidzināšanu.
Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) Produktiem, kas satur 1,5 % joda. Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju. Trīs pirms slaukšanas lietošanas reizes katram dzīvniekam dienā Lietojiet maksimums 15 ml produkta vienam dzīvniekam vienā reizē
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.3.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Produktiem, kas satur 1,5 % joda, var rīkoties šādi: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju.

Lietojiet tieši uz dzīvnieku pupiem pirms slaukšanas, izmantojot manuālu apsmidzināšanu.

Trīs pirms slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu.

Lietojiet maksimums 15 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.3.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Rīkojoties ar produktu, lietojiet pret ķīmikālijām izturīgus aizsargcimdus (cimdu materiāls jānorāda atļaujas saņēmējam kopā ar informāciju par izstrādājumu)

4.3.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.3.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.3.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.4. Lietošanas apraksts

4 tabula. Lietošanas veids # 4 - Pēc slaukšanas dezinfekcija, manuāla iegremdēšana (koncentrāts)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekšelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla iegremdēšana dezinfekcijas līdzeklī Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas. Tiek lietots dzīvnieku pupu tiešai dezinficēšanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas.
Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) Produktiem, kas satur 1,5 % joda: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.4.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Tiek lietots dzīvnieku pupu tiešai dezinficēšanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas.

Produktiem, kas satur 1,5 % joda: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju.

Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu (kopā 5 lietošanas reizes)

Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.4.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.4.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.4.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.4.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.5. Lietošanas apraksts

5 tabula. Lietošanas veids # 5 - Pēc slaukšanas dezinfekcija, manuāla noklāšana ar putām (koncentrāts)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekšelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla noklāšana ar putām Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas Tiek lietots dzīvnieku pupu tiešai dezinficēšanai pēc slaukšanas, izmantojot manuālu noklāšanu ar putām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) Produktiem, kas satur 1,5 % joda: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes katram dzīvniekam, katru dienu. Lietojiet maksimums 5 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.5.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Lietojiet tieši uz dzīvnieku pupiem pēc slaukšanas, izmantojot manuālu noklāšanu ar putām.

Produktiem, kas satur 1,5 % joda, var rīkoties šādi: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju.

Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu.

Lietojiet maksimums 5 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.5.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.5.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.5.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.5.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.6. Lietošanas apraksts

6 tabula. Lietošanas veids # 6 - Pēc slaukšanas dezinfekcija, manuāla apsmidzināšana (koncentrāts)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla apsmidzināšana Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas Tiek lietots uz dzīvnieku pupiem pēc slaukšanas, izmantojot manuālas apsmidzināšanas paņēmieni.
Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) Produktiem, kas satur 1,5 % joda: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes katram dzīvniekam, katru dienu. Lietojiet maksimums 15 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.6.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Tiek lietots dzīvnieku pupiem pēc slaukšanas, izmantojot manuālas apsmidzināšanas paņēmieni.

Izstrādājumiem, kas satur 1,5 % joda: Izšķīdiniet vienu daļu izstrādājuma četrās daļās ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanā. Šī instrukcija jāpielāgo izstrādājumiem ar citu koncentrāciju.

Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes katram dzīvniekam, katru dienu.

Lietojiet maksimums 15 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.6.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (cimdu materiālu norāda atļaujas turētājs informācijā par produktu).

4.6.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.6.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.6.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.7. Lietošanas apraksts

7 tabula. Lietošanas veids # 7 Pēc slaukšanas dezinfekcija, automātiska apsmidzināšana (koncentrāts)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Automātiska apsmidzināšana Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas Tiek lietots uz dzīvnieku pupiem pēc slaukšanas, izmantojot automātisko apsmidzināšanu.
Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) Produktiem, kas satur 1,5 % joda: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju Piecas pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu. Nedrīkst apvienot ar pirms slaukšanas dezinfekciju. Lietojiet maksimums 15 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.7.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Tiek lietots dzīvnieku pupiem pēc slaukšanas, izmantojot automātiskās apsmidzināšanas paņēmieni.

Produktiem, kas satur 1,5 % joda: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju.

Piecas pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu. Nedrīkst apvienot ar pirms slaukšanas dezinfekciju.

Lietojiet maksimums 15 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.7.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.7.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.7.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.7.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.8. Lietošanas apraksts

8 tabula. Lietošanas veids # 8 Pēc slaukšanas dezinfekcija, pusautomātiska iegremdēšana (koncentrāts)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sāks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Pusautomātiska iegremdēšana Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tieši lietošanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas Tiek lietots tieši uz dzīvnieku pupiem pēc slaukšanas, izmantojot pusautomātiskas iegremdēšanas paņēmieni.
Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) Produktiem, kas satur 1,5 % joda: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju. Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu. Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.8.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Tiek lietots tieši uz dzīvnieku pupiem pēc slaukšanas, izmantojot pusautomātiskas iegremdēšanas paņēmieni.

Produktiem, kas satur 1,5 % joda: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju.

Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu.

Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.8.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.8.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.8.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.8.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.9. Lietošanas apraksts

9 tabula. Lietošanas veids # 9 - Pirms un pēc slaukšanas dezinfekcija, manuāla iegremdēšana (koncentrāts)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā tiks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla iegremdēšanas dezinfekcijas līdzekļi Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai laktācijas dzīvniekiem pirms un pēc slaukšanas. Tiek lietots tieši uz dzīvnieku pupiem pirms un pēc slaukšanas, izmantojot manuālas iegremdēšanas paņēmieni.
Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) Produktiem, kas satur 1,5 % joda: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju Trīs pirms un trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu (kopā līdz 5 reizēm). Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.9.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Produktiem, kas satur 1,5 % joda: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju.

Lietojiet tieši uz dzīvnieku pupiem pirms un pēc slaukšanas, izmantojot manuālas iegremdēšanas paņēmieni.

Trīs pirms un trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu (kopā līdz 5 reizēm).

Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.9.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.9.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.9.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.9.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.10. Lietošanas apraksts

10 tabula. Lietošanas veids # 10 - Pirms un pēc slaukšanas dezinfekcija, manuāla noklāšana ar putām (koncentrāts)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā tiks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekšelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla noklāšana ar putām Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai laktācijas dzīvniekiem pirms un pēc slaukšanas Tiek lietots uz dzīvnieku pupiem pirms un pēc slaukšanas, izmantojot manuālu noklāšanu ar putām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) Produktiem, kas satur 1,5 % joda: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju. Trīs pirms un trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu (kopā līdz 5 reizēm). Lietojiet maksimums 5 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.10.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Produktiem, kas satur 1,5 % joda: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju.

Lietojiet tieši dzīvnieku pupiem pirms un pēc slaukšanas, izmantojot manuālu noklāšanu ar putām.

Trīs pirms un trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu (kopā līdz 5 reizēm).

Lietojiet maksimums 5 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.10.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.10.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.10.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.10.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.11. Lietošanas apraksts

11 tabula. Lietošanas veids # 11 Pirms un pēc slaukšanas dezinfekcija, manuāla apsmidzināšana (koncentrāts)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla līdzekļa apsmidzināšana Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai laktācijas dzīvniekiem pirms un pēc slaukšanas Tiek lietots tieši uz dzīvnieku pupiem pirms un pēc slaukšanas, izmantojot manuālas apsmidzināšanas paņēmieni.
Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) Produktiem, kas satur 1,5 % joda: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju. Trīs pirms un trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu (kopā līdz 5 reizēm). Lietojiet maksimums 15 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.11.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Produktiem, kas satur 1,5 % joda: Izšķīdiniet vienu daļu produkta uz četrām daļām ūdens, lai iegūtu 0,3 % joda koncentrāciju lietošanai. Šī instrukcija jāpielāgo produktiem ar citu koncentrāciju.

Lietojiet tieši dzīvnieku pupiem pirms un pēc slaukšanas, izmantojot manuālas apsmidzināšanas paņēmieni.

Trīs pirms un trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu (kopā līdz 5 reizēm).

Lietojiet maksimums 15 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.11.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (cimdu materiālu norāda atļaujas turētājs informācijā par produktu).

Lietojot produktu, valkājiet piemērotus aizsargapavus (EN 13832).

Jāvalkā arī aizsardzības uzsvārcis (vismaz 6. tipa, EN 13034)

4.11.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.11.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

4.11.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

5. VISPĀRĪGAS NORĀDES ⁽¹⁾ PAR META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 1 LIETOŠANU

5.1. Lietošanas instrukcija

Produktam pirms lietošanas jāsasniedz temperatūra, kas augstāka par 20 °C.

Pirms slaukšanas:

Uzklājiet produktu katram pupam visā tā garumā.

Lai efektīvi lietotu produktu pret baktērijām un raugiem, tam jābūt saskarē ar ādu vismaz 30 sekundes.

Kad attiecīgais saskares laiks ir pagājis, rūpīgi notīriet produktu, izmantojot vienreiz lietojamu papīra dvieli/drānu, lai panāktu, ka pupi ir tīri un sausi.

Šķīduma koncentrācija: 3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w)

Pēc slaukšanas:

Pārklājiet ar produktu katru pupu visā tā garumā uzreiz pēc slaukšanas.

Lai nodrošinātu pietiekamu saskares laiku, sekojiet, lai produkts pēc tā lietošanas netiktu notīrīts (turiet govīs stāvus vismaz 5 minūtes)

Šķīduma koncentrācija: 3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w)

5.2. Riska samazināšanas pasākumi

Šo produktu var izmantot dezinfekcijai pirms un pēc slaukšanas, to kombinējot (kopā līdz 5 lietošanas reizēm dienā vienam dzīvniekam). Tomēr to nedrīkst lietot kombinācijā ar citiem jodu saturošiem produktiem.

Produkta iepildīšanai aprīkojumā ieteicams izmantot dozēšanas sūkni.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Ieelpošana: Parastas lietošanas laikā nav novērota nekāda iedarbība vai simptomi.

Saskare ar ādu: Parastas lietošanas laikā nav novērota nekāda iedarbība vai simptomi.

Saskare ar acīm: Parastas lietošanas laikā nav novērota nekāda iedarbība vai simptomi.

Norīšana: Parastas lietošanas laikā nav novērota nekāda iedarbība vai simptomi.

Pēc ieelpošanas: Izejiet svaigā gaisā; simptomu parādīšanās gadījumā vērsieties pie ārsta.

Pēc saskares ar ādu: Nekavējoties nomazgājiet skarto vietu ar ūdeni un ziepēm un kārtīgi noskalojiet.

Pēc saskares ar acīm: Vairākas minūtes skalojiet aci atvērtā stāvoklī zem tekoša ūdens (vismaz 15 minūtes).

Pēc norīšanas: Izskalojiet muti un pēc tam izdzeriet lielu daudzumu ūdens. Nekavējoties vērsieties pie ārsta.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

Stabilitāte un reaģētspēja:

Reaģētspēja: Parastos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos nav zināms neviens reaģētspējas izraisīts apdraudējums.

Ķīmiskā noturība: Izstrādājums ir stabils parastos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos.

Bīstamu reakciju iespējamība: Parastos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos nav konstatēta neviena bīstama reakcija.

Apstākļi, no kuriem jāizvairās: Parastos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos nav zināmi.

⁽¹⁾ Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

Bīstami sadalīšanas produkti: Parastos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos nav zināmi.

Apkārtējās vides aizsardzības norādījumi:

Uzstādiet aizsprostu, lai savāktu lielu izšļakstījušos izstrādājuma daudzumu.

Ierobežojiet un/vai absorbējiet izšļakstījušos izstrādājumus ar inerti materiālu un pēc tam ievietojiet piemērotā tvertnē.

Nepieļaujiet izstrādājuma ieplūšanu kanalizācijā, notekcaurulēs vai ūdenstecēs.

Savāciet izstrādājumu piemērotās noslēdzamās tvertnēs, lai to utilizētu.

Neiepildiet izlijušos materiālus atpakaļ oriģinālajā tvertnē.

5.4. Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Tukšās tvertnes pirms to utilizācijas jāizskalo trīs reizes

No papīra dvieļiem, kas lietoti dzīvnieku pupu nosusināšanai un izstrādājuma noņemšanai, jāatbrīvojas kā no parastiem sadzīves atkritumiem.

Neizgāziet neatšķaidītu izstrādājumu kanalizācijā.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Uzglabāt tikai oriģinālā noslēdzamā tvertnē

Aizsargāt pret sasalšanu

Neuzglabāt temperatūrā, kas pārsniedz 40 °C

Derīguma termiņš: 24 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Nav

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: INDIVIDUĀLI PRODUKTI META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMĀ 1

7.1. Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Deosan Activate Pre AG106 Deosan Activate Pre				
Atļaujas numurs	EU-0019228-0001 1-1				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Jods		Aktīvā viela	7553-56-2	231-442-4	1,5

7.2. Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Conc. Deosan Hitech concentrate Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. Iodine Concentrate				
Atļaujas numurs	EU-0019228-0002 1-1				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Jods		Aktīvā viela	7553-56-2	231-442-4	1,5

META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS 2

1. META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 2 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 identifikators**

Identifikators	Meta SPC 2 - Deosan Activate BPF – Lietošanai gatavs šķidrums
----------------	---

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-2
--------	-----

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
--------------------	---

2. META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 2 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Jods		Aktīvā viela	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2. **Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 preparatīvais veids(-i)**

Preparatīvais veids	AL - Jebkurš cits šķidrums
---------------------	----------------------------

3. META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 2 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi	Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Atbrīvoties no satura saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem

4. META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 2 ATĻAUTAIS LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas apraksts****12 tabula. Lietošanas veids # 1 - Pirms slaukšanas dezinfekcija, manuāla iegremdēšana (lietošanai gatavs šķidrums)**

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla iegremdēšana dezinfekcijas līdzeklī Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tieši lietošanai pirms laktācijas dzīvnieku slaukšanas Tiek lietots tieši dzīvnieku pupiem pirms slaukšanas, izmantojot manuālas iegremdēšanas metodi

Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) - Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas. Trīs pirms slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu. Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Tiek lietots tieši dzīvnieku pupiem pirms slaukšanas, izmantojot manuālas iegremdēšanas metodi.

Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas.

Trīs pirms slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu.

Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.2. **Lietošanas apraksts**

13 tabula. Lietošanas veids # 2 - Pirms slaukšanas dezinfekcija, manuāla noklāšanas ar putām (lietošanai gatavs šķīdums)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla noklāšana ar putām Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pirms laktācijas dzīvnieku slaukšanas. Tiek lietots dzīvnieku pupu tiešai dezinficēšanai pirms slaukšanas, izmantojot manuālu noklāšanu ar putām.

Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) - Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas. Trīs pirms slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu. Lietojiet maksimums 5 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas.

Lietojiet tieši uz dzīvnieku pupiem pirms slaukšanas, izmantojot manuālu noklāšanu ar putām.

Trīs pirms slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu.

Lietojiet maksimums 5 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.3. **Lietošanas apraksts**

14 tabula. Lietošanas veids # 3 - Pirms slaukšanas dezinfekcija, manuāla apsmidzināšana (lietošanai gatavs šķīdums)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla apsmidzināšana Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pirms laktācijas dzīvnieku slaukšanas Tiek lietots dzīvnieku pupiem pirms slaukšanas, izmantojot manuālas apsmidzināšanas paņēmieni.

Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) - Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas. Trīs pirms slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu. Lietojiet maksimums 15 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.3.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Tiek lietots dzīvnieku pupiem pirms slaukšanas, izmantojot manuālas apsmidzināšanas paņēmieni.

Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas.

Trīs pirms slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu.

Lietojiet maksimums 15 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.3.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (cimdu materiālu norāda atļaujas turētājs informācijā par produktu).

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.3.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.4. **Lietošanas apraksts**

15 tabula. Lietošanas veids # 4 - Pēc slaukšanas dezinfekcija, manuāla iegremdēšana (lietošanai gatavs šķīdums)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla iegremdēšana dezinfekcijas līdzeklī Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas. Tiek lietots dzīvnieku pupu tiešai dezinficēšanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas, izmantojot manuālās iegremdēšanas metodi

Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) - Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas. Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu. Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.4.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Tiek lietots dzīvnieku pupu tiešai dezinficēšanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas, izmantojot manuālās iegremdēšanas metodi.

Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas.

Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu.

Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.4.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.4.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.4.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.4.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.5. Lietošanas apraksts

16 tabula. Lietošanas veids # 5 - Pēc slaukšanas dezinfekcija, manuāla noklāšana ar putām (lietošanai gatavs šķīdums)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla noklāšana ar putām Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas. Tiek lietots dzīvnieku pupu tiešai dezinficēšanai pēc slaukšanas, izmantojot manuālu noklāšanu ar putām.

Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) - Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas. Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu. Lietojiet maksimums 5 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.5.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Tiek lietots dzīvnieku pupu tiešai dezinficēšanai pēc slaukšanas, izmantojot manuālu noklāšanu ar putām.

Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas.

Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu.

Lietojiet maksimums 5 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.5.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.6. **Lietošanas apraksts**

17 tabula. Lietošanas veids # 6 - Pēc slaukšanas dezinfekcija, manuāla apsmidzināšana (lietošanai gatavs šķīdums)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekšelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla apsmidzināšana Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas. Tiek lietots dzīvnieku pupiem pēc slaukšanas, izmantojot manuālas apsmidzināšanas paņēmieni.

Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) - Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas. Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu. Lietojiet maksimums 15 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.6.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Tiek lietots dzīvnieku pupiem pēc slaukšanas, izmantojot manuālas apsmidzināšanas paņēmieni.

Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas.

Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu.

Lietojiet maksimums 15 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.6.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (cimdu materiālu norāda atļaujas turētājs informācijā par produktu).

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.7. **Lietošanas apraksts**

18 tabula. Lietošanas veids # 7 - Pēc slaukšanas dezinfekcija, automātiska apsmidzināšana (neapvienot ar pirms slaukšanas dezinfekciju (lietošanai gatavs šķīdums))

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekšelpas
Lietošanas metode(-es)	Automātiska apsmidzināšana Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas. Tiek lietots dzīvnieku pupiem pēc slaukšanas, izmantojot automātiskās apsmidzināšanas paņēmieni.

Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) - Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas. Piecas pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu. Lietojiet maksimums 15 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.7.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Tiek lietots dzīvnieku pupiem pēc slaukšanas, izmantojot automātiskās apsmidzināšanas paņēmieni.

Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas.

Piecas pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu. Nedrīkst apvienot ar pirmsslaukšanas dezinfekciju, kurā tiek izmantots jods.

Lietojiet maksimums 15 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.7.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.8. **Lietošanas apraksts**

19 tabula. Lietošanas veids # 8 - Pēc slaukšanas dezinfekcija, pusautomātiska iegremdēšana (lietošanai gatavs šķīdums)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekšelpas
Lietošanas metode(-es)	Pusautomātiska iegremdēšana Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas. Tiek lietots tieši uz dzīvnieku pupiem pēc slaukšanas, izmantojot pusautomātiskas iegremdēšanas paņēmieni.

Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) - Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas. Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu. Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.8.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Lietojiet tieši uz dzīvnieku pupiem pēc slaukšanas, izmantojot pusautomātiskās iegremdēšanas metodi.

Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas.

Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu.

Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.8.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.8.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.8.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.8.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.9. **Lietošanas apraksts**

20 tabula. Lietošanas veids # 9 - Pirms un pēc slaukšanas dezinfekcija, manuāla iegremdēšana (lietošanai gatavs šķīdums)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekšelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla iegremdēšana dezinfekcijas līdzeklī Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pirms un pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas. Tiek lietots tieši uz dzīvnieku pupiem pirms un pēc slaukšanas, izmantojot manuālas iegremdēšanas metodi.

Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) - Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas. Trīs pirms un trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes katram dzīvniekam, katru dienu (kopā līdz 5 reizēm). Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.9.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Tiek lietots tieši dzīvnieku pupiem pirms un pēc slaukšanas, izmantojot manuālas iegremdēšanas metodi.

Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas.

Trīs pirms un trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes katram dzīvniekam, katru dienu (kopā līdz 5 reizēm).

Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.9.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (cimdu materiālu norāda atļaujas turētājs informācijā par produktu).

4.9.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.9.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.9.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.10. **Lietošanas apraksts**

21 tabula. Lietošanas veids # 10 - Pirms un pēc slaukšanas dezinfekcija, manuāla noklāšana ar putām (lietošanai gatavs šķīdums)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla noklāšana ar putām Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pirms un pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas. Tiek lietots dzīvnieku pupiem pirms un pēc slaukšanas, izmantojot manuālu noklāšanu ar putām.

Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) - Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas. Trīs pirms un trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes katram dzīvniekam, katru dienu (kopā līdz 5 reizēm). Lietojiet maksimums 5 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.10.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas.

Lietojiet tieši dzīvnieku pupiem pirms un pēc slaukšanas, izmantojot manuālu noklāšanu ar putām.

Trīs pirms un pēc slaukšanas lietošanas reizes katram dzīvniekam, katru dienu (kopā līdz 5 reizēm).

Lietojiet maksimums 5 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.10.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (cimdu materiālu norāda atļaujas turētājs informācijā par produktu).

4.10.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.10.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.10.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.11. **Lietošanas apraksts**

22 tabula. Lietošanas veids # 11 - Pirms un pēc slaukšanas dezinfekcija, manuāla apsmidzināšana (lietošanai gatavs šķīdums)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla apsmidzināšana Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai laktācijas dzīvniekiem pirms un pēc slaukšanas Tiek lietots tieši uz dzīvnieku pupiem pirms un pēc slaukšanas, izmantojot manuālu apsmidzināšanu.

Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) - Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas. Trīs pirms un trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu (kopā līdz 5 reizēm). Lietojiet maksimums 15 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.11.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Tiek lietots tieši uz dzīvnieku pupiem pirms un pēc slaukšanas, izmantojot manuālu apsmidzināšanu.

Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas.

Trīs pirms un trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu (kopā līdz 5 reizēm).

Lietojiet maksimums 15 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.11.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (cimdu materiālu norāda atļaujas turētājs informācijā par produktu).

Lietojot produktu, valkājiet piemērotus aizsargapavus (EN 13832).

Jāvalkā arī aizsardzības uzsvārcis (vismaz 6. tipa, EN 13034)

4.11.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.11.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

4.11.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu

5. VISPĀRĪGAS NORĀDES ⁽²⁾ PAR META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 2 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Produktam pirms lietošanas ir jāsasniedz temperatūra, kas augstāka par 20 °C.

Pirms slaukšanas:

Uzklājiet produktu katram pupam visā tā garumā.

Lai efektīvi lietotu produktu pret baktērijām un raugiem, tam jābūt saskarē ar ādu vismaz 30 sekundes.

Kad attiecīgais saskares laiks ir pagājis, rūpīgi notīriet produktu, izmantojot vienreiz lietojamu papīra dvieli/drānu, lai panāktu, ka pupi ir tīri un sausi.

Šķīduma koncentrācija: 3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w)

⁽²⁾ Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

Pēc slaukšanas:

Pārklājiet ar produktu katru pupu visā tā garumā uzreiz pēc slaukšanas.

Lai nodrošinātu pietiekamu saskares laiku, sekojiet, lai produkts pēc tā lietošanas netiktu notīrīts (turiet govīs stāvus vismaz 5 minūtes)

Šķīduma koncentrācija: 3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w)

5.2. Riska samazināšanas pasākumi

Šo produktu var izmantot dezinfekcijai pirms un pēc slaukšanas, to kombinējot (kopā līdz 5 lietošanas reizēm dienā vienam dzīvniekam). Tomēr to nedrīkst lietot kombinācijā ar citiem jodu saturošiem produktiem.

Produkta iepildīšanai aprīkojumā ieteicams izmantot dozēšanas sūkni.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Ieelpošana: Parastas lietošanas laikā nav novērota nekāda iedarbība vai simptomi.

Saskare ar ādu: Parastas lietošanas laikā nav novērota nekāda iedarbība vai simptomi.

Saskare ar acīm: Parastas lietošanas laikā nav novērota nekāda iedarbība vai simptomi.

Norīšana: Parastas lietošanas laikā nav novērota nekāda iedarbība vai simptomi.

Pēc ieelpošanas: Izejiet svaigā gaisā; simptomu parādīšanās gadījumā vērsieties pie ārsta.

Pēc saskares ar ādu: Nekavējoties nomazgājiet skarto vietu ar ūdeni un ziepēm un kārtīgi noskalojiet.

Pēc saskares ar acīm: Vairākas minūtes skalojiet aci atvērtā stāvoklī zem tekoša ūdens (vismaz 15 minūtes).

Pēc norīšanas: Izskalojiet muti un pēc tam izdzeriet lielu daudzumu ūdens. Nekavējoties vērsieties pie ārsta.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes

Stabilitāte un reaģētspēja:

Reaģētspēja: Parastos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos nav zināms neviens reaģētspējas izraisīts apdraudējums.

Ķīmiskā noturība: Izstrādājums ir stabils parastos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos.

Bīstamu reakciju iespējamība: Parastos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos nav konstatēta neviena bīstama reakcija.

Apstākļi, no kuriem jāizvairās: Parastos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos nav zināmi.

Bīstami sadalīšanas produkti: Parastos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos nav zināmi.

Apkārtējās vides aizsardzības norādījumi:

Uzstādiet aizsprostu, lai savāktu lielu izšļakstījušos izstrādājuma daudzumu.

Ierobežojiet un/vai absorbējiet izšļakstījušos izstrādājumus ar inerti materiālu un pēc tam ievietojiet piemērotā tvertnē.

Nepieļaujiet izstrādājuma ieplūšanu kanalizācijā, notekcaurulēs vai ūdenstecēs.

Savāciet izstrādājumu piemērotās noslēdzamās tvertnēs, lai to utilizētu.

Neiepildiet izlijušos materiālus atpakaļ oriģinālajā tvertnē.

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Tukšās tvertnes pirms to utilizācijas jāizskalo trīs reizes.

No papīra dvieļiem, kas lietoti dzīvnieku pupu nosusināšanai un produkta noņemšanai, jāatbrīvojas kā no parastiem sadzīves atkritumiem.

Neizgāziet neatšķaidītu produktu kanalizācijā.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt tikai oriģinālā noslēdzamā tvertnē

Aizsargāt pret sasalšanu

Neuzglabāt temperatūrā, kas pārsniedz 30 °C

Derīguma termiņš: 24 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Nav

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: INDIVIDUĀLI PRODUKTI META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMĀ 2

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Deosan Activate Pre RTU AG108 Deosan Activate Pre RTU				
Atļaujas numurs	EU-0019228-0003 1-2				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Jods		Aktīvā viela	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.2. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Deosan Activate Pre/Post AG217 Deosan Activate Pre/Post Iodine Plus Pre & Post Deosan D4T Super AG211 Agros Iodo Agros Iodo Multi Poviclyn liquido				
Atļaujas numurs	EU-0019228-0004 1-2				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Jods		Aktīvā viela	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.3. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Deosan Activate PVP Plus AG215 Deosan Activate PVP Plus Agros Iodo-Prev POS-Ordenha Deosan Hitech 2 AG214 Iodine Teat Dip Solution				
Atļaujas numurs	EU-0019228-0005 1-2				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Jods		Aktīvā viela	7553-56-2	231-442-4	0,3

META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS 3

1. META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 3 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 identifikators**

Identifikators	Meta SPC 3 - Deosan Activate BPF – Lietošanai gatavs gēls
----------------	---

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-3
--------	-----

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
--------------------	---

2. META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 3 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Jods		Aktīvā viela	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2. **Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 preparatīvais veids(-i)**

Preparatīvais veids	GW - Ūdenī šķīstošs gēls
---------------------	--------------------------

3. META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 3 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi	Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Atbrīvoties no satura saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem

4. META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 3 ATĻAUTAIS LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas apraksts****23 tabula. Lietošanas veids # 1 - Pirms slaukšanas dezinfekcija, manuāla iegremdēšana (lietošanai gatavs gēls)**

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla iegremdēšana dezinfekcijas līdzeklī Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pirms laktācijas dzīvnieku slaukšanas Tiek lietots tieši uz dzīvnieku pupiem pirms slaukšanas, izmantojot manuālas iegremdēšanas paņēmieni.

Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) - Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas. Trīs pirms slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu. Lietojiet maksimums 10 ml produkta, vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.1.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Tiek lietots tieši uz dzīvnieku pupiem pirms slaukšanas, izmantojot manuālas iegremdēšanas paņēmieni.

Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas.

Trīs pirms slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu.

Lietojiet maksimums 10 ml produkta, vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.1.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu

4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu

4.1.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu

4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu

4.2. Lietošanas apraksts

24 tabula. Lietošanas veids # 2 - Pēc slaukšanas dezinfekcija, manuāla iegremdēšana (lietošanai gatavs gēls)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekšējais
Lietošanas metode(-es)	Manuāla iegremdēšana dezinfekcijas līdzeklī. Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas. Tiek lietots dzīvnieku pupu tiešai dezinficēšanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas, izmantojot manuālo iegremdēšanas metodi.

Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) - Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas. Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu. Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.2.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Tiek lietots dzīvnieku pupu tiešai dezinficēšanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas, izmantojot manuālo iegremdēšanas metodi.

Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas.

2-3 pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu.

Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.2.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu

4.2.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu

4.2.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu

4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu

4.3. Lietošanas apraksts

25 tabula. Lietošanas veids # 3 - Pēc slaukšanas dezinfekcija, pusautomātiska iegremdēšana (lietošanai gatavs gēls)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekšējais
Lietošanas metode(-es)	Pusautomātiska iegremdēšana Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis tiešai lietošanai pēc laktācijas dzīvnieku slaukšanas Tiek lietots tieši uz dzīvnieku pupiem pēc slaukšanas, izmantojot pusautomātiskas iegremdēšanu.

Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) - Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas. Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu. Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.3.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Tiek lietots tieši uz dzīvnieku pupiem pēc slaukšanas, izmantojot pusautomātiskas iegremdēšanas paņēmieni.

Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas.

Trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu.

Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.3.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu

4.3.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu

4.3.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu

4.3.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu

4.4. Lietošanas apraksts

26 tabula. Lietošanas veids # 4 - Pirms un pēc slaukšanas dezinfekcija, manuāla iegremdēšana (lietošanai gatavs gēls)

Produkta veids(-i)	3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Manuāla iegremdēšana dezinficēšanas līdzeklī Dzīvnieku pupu dezinficēšanas līdzeklis laktācijas dzīvniekiem pirms un pēc slaukšanas. Tiek lietots dzīvnieku pupiem pirms un pēc slaukšanas, izmantojot manuālu iegremdēšanu.

Lietošanas deva(-as) un biežums	3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w) - Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas. Trīs pirms un trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu (kopā līdz 5 reizēm). Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1, 5 un 20 litru HDPE vai f-HDPE tvertne 200 litru HDPE vai f-HDPE muca 950 litru HDPE vai f-HDPE sekundārās taras tvertne (Intermediate Bulk Container, IBC)

4.4.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Tiek lietots tieši uz dzīvnieku pupiem pirms un pēc slaukšanas, izmantojot manuālas iegremdēšanas paņēmieni.

Lietošanai gatavs sastāvs, kurā ir 0,3 % w/w joda. Neatšķaidīt pirms lietošanas.

Trīs pirms un trīs pēc slaukšanas lietošanas reizes, katram dzīvniekam, katru dienu (kopā līdz 5 reizēm).

Lietojiet maksimums 10 ml produkta vienam dzīvniekam, vienā lietošanas reizē.

4.4.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (cimdu materiālu norāda atļaujas turētājs informācijā par produktu).

4.4.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu

4.4.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu.

4.4.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet 5. sadaļu: Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu

5. VISPĀRĪGAS NORĀDES ^(*) PAR META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA 3 LIETOŠANU

5.1. Lietošanas instrukcija

Produktam pirms lietošanas ir jāsasniedz temperatūra, kas augstāka par 20 °C.

Pirms slaukšanas:

Uzklājiet produktu katram pupam visā tā garumā.

Lai efektīvi lietotu produktu pret baktērijām un raugiem, tam jābūt saskarē ar ādu vismaz 30 sekundes.

Kad attiecīgais saskares laiks ir pagājis, rūpīgi notīriet produktu, izmantojot vienreiz lietojamu papīra dvieli/drānu, lai panāktu, ka pupi ir tīri un sausi.

Šķīduma koncentrācija: 3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w)

^(*) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

Pēc slaukšanas:

Pārklājiet ar produktu katru pupu visā tā garumā uzreiz pēc slaukšanas.

Lai nodrošinātu pietiekamu saskares laiku, sekojiet, lai produkts pēc tā lietošanas netiktu notīrīts (turiet govīs stāvus vismaz 5 minūtes)

Šķīduma koncentrācija: 3 000 mg/kg joda koncentrācija (0,3 % w/w)

5.2. Riska samazināšanas pasākumi

Šo produktu var izmantot dezinfekcijai pirms un pēc slaukšanas, to kombinējot (kopā līdz 5 lietošanas reizēm dienā vienam dzīvniekam). Tomēr to nedrīkst lietot kombinācijā ar citiem jodu saturošiem produktiem.

Produkta iepildīšanai aprīkojumā ieteicams izmantot dozēšanas sūkni.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Ieelpošana: Parastas lietošanas laikā nav novērota nekāda iedarbība vai simptomi.

Saskare ar ādu: Parastas lietošanas laikā nav novērota nekāda iedarbība vai simptomi. Saskare ar acīm:

Parastas lietošanas laikā nav novērota nekāda iedarbība vai simptomi.

Norīšana: Parastas lietošanas laikā nav novērota nekāda iedarbība vai simptomi.

Pēc ieelpošanas: Izejiet svaigā gaisā; simptomu parādīšanās gadījumā vērsieties pie ārsta.

Pēc saskares ar ādu: Nekavējoties nomazgājiet skarto vietu ar ūdeni un ziepēm un kārtīgi noskalojiet.

Pēc saskares ar acīm: Vairākas minūtes skalojiet aci atvērtā stāvoklī zem tekoša ūdens (vismaz 15 minūtes).

Pēc norīšanas: Izskalojiet muti un pēc tam izdzeriet lielu daudzumu ūdens. Nekavējoties vērsieties pie ārsta.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

Stabilitāte un reaģētspēja:

Reaģētspēja: Parastos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos nav zināms neviens reaģētspējas izraisīts apdraudējums.

Ķīmiskā noturība: Izstrādājums ir stabils parastos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos.

Bīstamu reakciju iespējamība: Parastos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos nav konstatēta neviena bīstama reakcija.

Apstākļi, no kuriem jāizvairās: Parastos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos nav zināmi.

Bīstami sadalīšanas produkti: Parastos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos nav zināmi.

Apkārtējās vides aizsardzības norādījumi:

Uzstādiet aizsprostu, lai savāktu lielu izšķakstījušos izstrādājuma daudzumu.

Ierobežojiet un/vai absorbējiet izšķakstījušos izstrādājumus ar inerti materiālu un pēc tam ievietojiet piemērotā tvertnē.

Nepieļaujiet izstrādājuma ieplūšanu kanalizācijā, notekcaurulēs vai ūdenstecēs.

Savāciet izstrādājumu piemērotās noslēdzamās tvertnēs, lai to utilizētu.

Neiepildiet izlijušos materiālus atpakaļ oriģinālajā tvertnē.

5.4. Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Tukšās tvertnes pirms to utilizācijas jāizskalo trīs reizes.

No papīra dvieļiem, kas lietoti dzīvnieku pupu nosusināšanai un izstrādājuma noņemšanai, jāatbrīvojas kā no parastiem sadzīves atkritumiem.

Neizgāziet neatšķaidītu izstrādājumu kanalizācijā.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Uzglabāt tikai oriģinālā noslēdzamā tvertnē

Aizsargāt pret sasaldšanu

Neuzglabāt temperatūrā, kas pārsniedz 30 °C

Derīguma termiņš: 18 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Nav

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: INDIVIDUĀLI PRODUKTI META BIOČĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMĀ 3**7.1. Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Deosan Activate Barrier AG216 Agros Iodo Pó Povisyl espeso				
Atļaujas numurs	EU-0019228-0006 1-3				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Jods		Aktīvā viela	7553-56-2	231-442-4	0,3