

DECIJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-9 ta' Diċembru 2009

li temenda l-lista ta' sustanzi veġetal, preparazzjonijiet u taħlitiet tagħhom għall-użu fi prodotti mediciinali veġetal tradizzjonali

(notifikata bid-dokument numru C(2009) 9703)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2010/30/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediciinali għall-użu mill-bniedem, u b'mod partikolari l-Artikolu 16(f) tagħha (¹),

Wara li kkunsidrat l-opinjonijiet tal-Äġenzija Ewropea tal-Mediciċini, iż-żistgħi kif id-Deċiżjoni 2008/911/KE tiġi emendata kif ġej:

Billi:

- (1) L-“*Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim” u l-“*Echinacea purpurea* (L.) Moench” jikkonformaw mar-rewiżi stipulati fid-Direttiva 2001/83/KE. L-“*Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim” u l-“*Echinacea purpurea* (L.) Moench” jistgħu jitqiesu bhala sustanzi veġetal, preparazzjonijiet veġetal jew taħlitiet tagħhom.
- (2) Għalhekk huwa xieraq li jiġi inkluži l-“*Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim” u l-“*Echinacea purpurea* (L.) Moench” fil-lista ta' sustanzi veġetal, il-preparazzjo-

nijiet u taħlitiet tagħhom, għall-użu fi prodotti mediciinali veġetal tradizzjonali stabbiliti fl-Anness I tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/911/KE (²).

(3) Id-Deċiżjoni 2008/911/KE għandha għalhekk tiġi emendata skont dan.

(4) Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Mediciinali għall-Użu mill-Bniedem,

ADOTTAT DIN ID-DECIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2008/911/KE tiġi emendata kif ġej:

- (1) L-Anness I huwa emendat skont l-Anness I ta' din id-Deċiżjoni.
- (2) L-Anness II huwa emendat skont l-Anness II ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussel, id-9 ta' Diċembru 2009.

*Għall-Kummissjoni
Günter VERHEUGEN
Viċi President*

⁽¹⁾ GU L 311, 28.11.2001, p. 67.

⁽²⁾ GU L 328, 6.12.2008, p. 42.

ANNESS I

Fl-Anness I tad-Deċiżjoni 2008/911/KE, jiddahħlu ż-żewġ sustanzi li ġejjin wara l-“*Calendula officinalis L*”:

- “*Echinacea purpurea* (L.) Moench”,
 - “*Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim”.
-

ANNESS II

Fl-Anness I tad-Deċiżjoni 2008/911/KE il-punt li ġej jiddahħal wara l-punt relataż mal-“Calendula officinalis L”:

“DAHLA FIL-LISTA TAL-KOMUNITÀ DWAR L-ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH, HERBA RECENS

Isem xjentifiku tal-pjanta

“*Echinacea purpurea* (L.) Moench”

Familja botanika

Asteraceae

Sustanza vegetali

Echinacea

Isem komuni tas-sustanza veġetalni fil-lingwi kollha uffiċċiali tal-UE

BG (bālgarski): пурпурна ехинацея, пресен стрък

LT (lietuvių kalba): rausvažiedžių ežiuolių žolė

CS (čeština): čerstvá nať třapatky nachové

LV (latviešu valoda): purpursarkanās ehinacejas laksti

DA (dansk): Purpur solhat, frisk urt

MT (Malti): Echinacea Vjola

DE (deutsch): Purpursonnenhutkraut, frisch

NL (nederlands): rood zonnehoedkruid

EL (ellinikά): Πόα Εχινάκεας της πορφυράς

PL (polski): jeżówka purpurowa, świeże ziele

EN (English): purple coneflower herb

PT (português): Equinácea, partes aéreas floridas

ES (español): Equinácea purpúrea, partes aéreas incluidas sumidades floridas

RO (română): iarbă proaspătă de Echinacea, pălăria soarelui

ET (eesti keel): punane siilkübar

SK (slovenčina): echinacea purpurová, čerstvá vŕňať

FI (suomi): kaunopunahattu, tuore verso

SL (slovenščina): sveža zel škrlatne ehinaceje

FR (français): parties aériennes fraîches d'échinacée pourpre

SV (svenska): röd solhatt, färsk ört

HU (magyar): bíbor kasvirág virágos hajtása

IS (íslenska): Sólhattur

IT (italiano): *Echinacea purpurea*, pianta fresca

NO (norsk): Rød solhatt

Preparazzjoni/ijiet veġetalni

Meraq u meraq imnixxel minn partijiet friski tal-pjanta maqtugħin mill-art li qed jifforixxu.

Referenza monografika tal-Farmakopea Ewropea

Mhux Applikabbli

Indikazzjoni/jiet

Prodott medicinali veġetalni tradizzjonali għal trattament ta' ġrieħi żgħar superficjal.

Il-prodott huwa prodott medicinali veġetalni tradizzjonali biex jintuża f'indikazzjonijiet spċificati bbażati eskużivament fuq użu fit-tul.

Tip ta' tradizzjoni

Ewropea

Dožaġġ speċifikat

Minn 10 sa 20 g /100 g ta' meraq magħsur jew ammont ekwivalenti ta' meraq magħsur imnixxel f'forom ta' dožaġġ likwidji jew semi-solidi.

Požoloġija speċifikata

Adoloxxenti ta' aktar minn 12-il sena, adulti, anzjani:

Ammont żgħir ta' ingwent għandu jiġi applikat fuq il-gerħa darbtejn jew tliet darbiet kuljum.

Mhuwiex irrakkommandat l-użu minn tfal li jkollhom inqas minn 12-il sena (ara s-sezzjoni "Twissijiet speċjali u prekaw-zjonijiet ghall-użu").

Mnejn u kif jingħata

Użu fuq il-ġilda.

Tul ta' žmien tal-użu jew xi restrizzjonijiet fuq it-tul ta' žmien tal-użu

Tużax il-prodott mediciinali għal aktar minn ġimgha.

Jekk is-sintomi jibqgħu jippersistu matul l-użu tal-prodott mediciinali, għandu jiġi kkonsultat tabib jew prattikant ikkwalifikat fil-kura tas-sahħha.

Kwalunkwe tagħrif iehor ghall-użu bla periklu

Kontraindikazzjonijiet

Ipersensittività għas-sustanza attiva jew ghall-pjanti tal-familja Asteraceae (Compositae).

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet ghall-użu

Jekk jidħru sinjali ta' infezzjoni tal-ġilda, għandu jintalab parir mediku.

L-użu fit-tfal taħt it-12-il sena mhuwiex rakkommendant minħabba li ma hemmx stħarrig biżżejjed dwar l-użu sikur tiegħi.

Interazzjonijiet ma' prodotti mediciinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

Ebda interazzjoni ma ġiet irrappurtata.

Tqala u rdigħ

Ma hemm l-ebda dejta dwar l-użu fuq il-ġilda waqt it-tqala jew l-irdiġħ.

Il-prodotti li fihom l-Echinacea ma għandhomx jiġu applikati fuq sider in-nisa li jreddgħu.

Effetti fuq il-kapaċitā tas-sewqan u t-thaddim ta' magni

Ma sar ebda studju fuq kapaċità ta' sewqan u thaddim ta' magni.

Effetti mhux mixtieqa

Jista' jkun hemm reazzjonijiet ipersensittivi (raxx lokali, dermatite, ekżema u angioedema tax-xufftejn).

Il-frekwenza mhijiex magħrufa.

Jekk ikun hemm reazzjonijiet negattivi oħra mhux imsemmija hawn fuq, għandu jiġi kkonsultat tabib jew prattikant ikkwalifikat fil-kura tas-sahħha.

Doża eċċessiva

Ma ġie rrappurtat l-ebda każ ta' doża eċċessiva.

**DAHLA FIL-LISTA TAL-KOMUNITÀ DWAR L-ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS (RUPR. ET MAXIM.)
MAXIM., RADIX**

Isem xjentifiku tal-pjanta

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim..

Familja botanika

Araliaceae

Sustanza veġetalı

Gheruq tal-Eleutherococcus

Isem komuni tas-sustanza veġetalı fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE

BG (bālgarski): елеутерокок, корен

LT (lietuvių kalba): Eleuterokokų šaknys

CS (čeština): eleuterokokový kořen

LV (latviešu valoda): eleiterokoka sakne

DA (dansk): Russisk rod

MT (Malti): Għerq tal-elewterokokku

DE (deutsch): Taigawurzel

NL (nederlands): Russische ginsengwortel

EL (elliniká): Ριζα Ελευθεροκόκου

PL (polski): korzeń eleuterokoka

EN (English): Eleutherococcus root

PT (português): Raiz de Ginseng Siberiano

ES (español): Eleuterococo, raíz de

RO (română): Rădăcină de ginseng siberian

ET (eesti keel): eleuterokokijuur

SK (slovenčina): Všeňovcový koreň

FI (suomi): venäjänjuuren juuri

SL (slovenščina): korenina elevterokoka

FR (français): racine d'éléuthérococque (racine de ginseng sibérien)

SV (svenska): Rysk rot

HU (magyar): Szibériai ginszeng gyökér (tajga gyökér)

IS (íslenska): Síberíu ginseng, rót

IT (italiano): Eleuterococco radice

NO (norsk): Russisk rot

Preparazzjoni/ijiet veġetalı

Sustanza veġetalı mqatta' f'bicċiet żgħar għal preparazzjoni ta' te veġetalı

Estratt likwidu (1:1, etanol 30-40 % v/v)

Estratt niexef (13-25: 1, etanol 28-40 % v/v)

Estratt niexef (17-30: 1, etanol 70 % v/v)

Estratt ilmi niexef (15-17:1)

Tintura 1 (1:5, etanol 40 % v/v)

Referenza monografika tal-Farrmakopea Ewropea

Eleutherococcus – Eleutherococci radix (ref.: 01/2008: 1419 corrected 6.0)

Indikazzjoni/jiet

Prodott mediciċinali vegetali tradizzjonali għal sintomi ta' asthenia bħall-ghajja u dgħufija.

Il-prodott huwa prodott mediciċinali vegetali tradizzjonali ghall-użu f'indikazzjonijiet spċifikati bbażati eskużivament fuq użu fit-tul.

Tip ta' tradizzjoni

Činiża, Ewropea

Dožagg speċifikat

Mhux applikabbli

Pożoloġija speċifikata

Adoloxxenti ta' aktar minn 12-il sena, adulti, anzjani:

Preparazzjonijiet veġetal:

Doža ta' kuljum

Sustanza veġetali mqatta' fbiċċiet żgħar fil-forma ta' te tal-ħxejjex: 0,5-4 g

Preparazzjoni tat-te: 0,5 sa 4 g ta' sustanza veġetali mqatta' fbiċċiet żgħar għall-infuzjoni f'150 ml ta' mishun.

Frekwenza tad-dožagg: 150 ml ta' infuzjoni ta' te għandha tinqasam f'minn wieħed sa tliet doži li jridu jittieħdu tul il-għurnata.

Estratt likwidu: 2-3 ml

Estratti xotti (etanol 28-70 % v/v) li jikkorrespondu għal 0,5-4 g

Estratt ilmi niexef (15-17:1): 90 - 180 mg

Tintura: 10-15 ml

Id-doža ta' kuljum tista' tittieħed f'doža waħda jew fi tliet doži.

Mhuwiex irrakkomandat l-użu fuq tħal li jkollhom inqas minn 12-il sena (ara s-sezzjoni "Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu").

Kif tittieħed

Użu orali

Tul ta' żmien tal-użu jew restrizzjonijiet ohra fuq it-tul ta' żmien tal-użu

Ma għandhiex tittieħed għal aktar minn xahrejn.

Jekk is-sintomi jibqgħu preżenti wara ġimagħtejn tul l-użu tal-prodott mediciċinali, għandu jiġi kkonsultat tabib jew prattikant ikkwalifiċċat fil-kura tas-sahħha.

Kwalunkwe tagħrif iehor għall-użu bla periklu*Kontra-indikazzjoni*

L-ipersensitività għas-sustanza attiva.

Ipertensjoni arterjali.

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

L-użu fit-tfal taħt it-12-il sena mhuwiex rakkommandat minħabba li ma hemmx esperjenza disponibbli.

Jekk is-sintomi jibqghu preżenti waqt l-użu tal-prodott mediciinali, għandu jiġi kkonsultat tabib jew prattikant ikkwalifikat fil-kura tas-sahħha.

Interazzjonijiet ma' prodotti mediciinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

Ebda interazzjoni ma ġiet irrappurtata.

Tqala u rdigħ

Ma ġietx stabbilita s-sikurezza matul it-tqala u l-irdiġħ mhuwiex irrakkommandat.

Effetti fuq il-kapaċità tas-sewqan u t-thaddim ta' magni

Ma sar l-ebda studju dwar l-effett fuq il-kapaċità tas-sewqan u t-thaddim ta' magni.

Effetti mhux mixtieqa

Jista' jagħti l-każ li jkun hemm nuqqas ta' rqad, irritabilità, tachycardia u wǵiġi ta' ras. Il-frekwenza mhijiex magħrufa.

Doža eċċessiva

Ma ġie rrapprtata ebda każ ta' doža eċċessiva."
