

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 262



Edizzjoni bil-Malti

Legiżlazzjoni

Volum 55

27 ta' Settembru 2012

Werrej

II Atti mhux leġiżlattivi

DECIŽJONIJIET

2012/506/UE:

- ★ Deċižjoni ta' Implantazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Awwissu 2012 li temenda d-Deċižjoni 2002/253/KE li tistabbilixxi d-definizzjonijiet tal-każ għar-rapurtagg ta' mard li jinxtered fin-netwerk tal-Komunità permezz tad-Deċižjoni Nru 2119/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument numru C(2012) 5538) (¹). 1

Prezz: EUR 4

(¹) Test b'relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti b'titoli b'tipa ċara relatati mal-ġestjoni ta' kuljum ta' affarijiet agrikoli, u li generalment huma validi għal perjodu limitat. It-titoli tal-atti l-ohra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

II

(Atti mhux leġiżlattivi)

DECIJONIET**DECIJONI TA' IMPLEMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI****tat-8 ta' Awwissu 2012**

li temenda d-Deċiżjoni 2002/253/KE li tistabbilixxi d-definizzjonijiet tal-kaž għar-rapurtagg ta' mard li jinxter fin-netwerk tal-Komunità permezz tad-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata bid-dokument numru C(2012) 5538)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2012/506/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropaea,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 1998 dwar l-istabiliment ta' network għas-sorveljanza epidemoloġika u kontroll ta' mard li jinxter fil-Komunità⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 3(c) tagħha,

Billi:

Haemophilus influenzae (marda invażiva), epatite B u C, mard tal-menigħikkokki, gattone, legionelloži, rubella kongenitali, tossina shiga/veroċitotossina li tipproċi infekzjoni ta' Escherichia coli (STEC/VTEC), salmonelloži u leptospirozi għandhom ikunu aġġornati fuq il-baži ta' din l-opinjoni xjentifika mogħtija mill-ECDC.

- (1) Skont l-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/253/KE⁽²⁾, id-definizzjonijiet tal-kaži stabbiliti fl-Anness ta' dik id-Deċiżjoni għandhom jiġu aġġornati safejn ikun meħtieġ fuq il-baži tal-informazzjoni xjentifika l-aktar reċentei.
- (2) Skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 851/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 li jistabbilixxi ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard⁽³⁾ (ECDC), l-ECDC pprovda, fuq talba tal-Kummissjoni, opinjoni xjentifika dwar id-definizzjonijiet tal-kaži li tghix lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri fl-iżvilupp ta' strategiji ta' intervent fil-kamp tas-sorveljanza u tar-rispons għal mard li jinxtered.
- (3) Id-definizzjonijiet tal-kaži digħi elenkti fl-Anness tad-Deċiżjoni 2002/253/KE għal HIV/AIDS, disterite,

(4) Definizzjoni ġenerika ta' kaž ta' rezistenza antimikrobika, definizzjoni ġenerika ta' infekzjoni nożokomjali, ghadd ta' definizzjoni nożokomjali, u definizzjoni għall-kaž ta' encefalite li tingarr minn insetti parassiti għandhom ukoll ikunu inkluži fl-Anness tad-Deċiżjoni 2002/253/KE fuq il-baži ta' dik l-opinjoni xjentifika mogħtija mill-ECDC.

(5) Ghall-fin ta' carezza, ikun xieraq li l-Anness tad-Deċiżjoni 2002/253/KE jkun ristrutturat biex ikun żgurat li d-definizzjoni nożokomjali, u definizzjoni għall-kaž ta' kwistjoni speċjali ta' saħħha, u li, f'kull lista, id-definizzjoni tal-kaži jkunu jidhru fordni numeriku.

(6) Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE,

ADOTTAT DIN ID-DECIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni 2002/253/KE qed jinbidel bl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

⁽¹⁾ ĜU L 268, 3.10.1998, p. 1.⁽²⁾ ĜU L 86, 3.4.2002, p. 44.⁽³⁾ ĜU L 142, 30.4.2004, p. 1.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta' Awwissu 2012.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni

ANNESS

1. SPJEGAZZJONI TAT-TAQSIMIET UŽATI FID-DEFINIZZJONI U L-KLASSIFIKAZZJONI TAL-KAŽI**Il-kriterji klinici**

Il-kriterji klinici jinkludu sinjali u sintomi komuni u rilevanti tal-marda li jew individwalment jew magħqudin flimkien jikkostitwixx stampa klinika ċara jew indikattiva tal-marda. Huma jagħtu d-deskrizzjoni generali tal-marda u ma jindikawx neċċessarjament il-fatturi kollha meħtieġa għal dijanjozi klinika individwali.

Il-kriterji tal-laboratorju

Il-kriterji tal-laboratorju huma lista ta' metodi tal-laboratorju li jintużaw biex jikkonfermaw xi kaž. Generalment wieħed biss mit-testijiet imniżżla jkun biżżejjed biex jikkonferma l-kaž. Jekk tkun tinhiegħ tahlita ta' metodi biex tissodisa l-konferma tal-laboratorju, dan jiġi spċificat. It-tip ta' kampjun li għandu jingħabar għat-testijiet tal-laboratorju jiġi spċificat biss meta certi tipi ta' kampjuni biss jitqiesu rilevanti ghall-konferma ta' dijanjozi. Il-kriterji tal-laboratorju għal xi kaž probabbli huma inklużi għal xi kaži jipprova eċċeżzjonali miftieħma. Dawk il-kriterji tal-laboratorju jikkonsistu flista ta' metodi tal-laboratorju li jistgħu jintużaw biex isostnu d-dijanjozi ta' kaž iż-żda li ma jkunux konfermattivi.

Il-kriterji epidemjoloġiči u r-rabta epidemjoloġika

Il-kriterji epidemjoloġiči jitqiesu li ġew sodisfatti meta tkun tista' tiġi stabbilita r-rabta epidemjoloġika.

Ir-rabta epidemjoloġika, matul il-perjodu ta' inkubazzjoni, tfisser waħda minn dawn is-sitta li ġejjin:

- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem: il-fatt li persuna kellha kuntatt ma' kaž uman ikkonfermat mil-laboratorju b'tali mod li kellha l-possibbiltà li tiġi infettata
- Trażmissjoni minn animal għal bniedem: il-fatt li persuna kellha kuntatt ma' animal b'infezzjoni/kolonizzjoni kkonfermata mil-laboratorju b'tali mod li kellha l-possibbiltà li tiġi infettata
- Esponiment għal sors komuni: il-fatt li persuna tkun ġiet esposta għall-istess mezz jew sors komuni ta' infezzjoni, bħala kaž uman ikkonfermat
- Esponiment ġhal ikel/ilma tax-xorb ikkontaminat: il-fatt li persuna tkun ikkonsmat ikel jew ilma tax-xorb b'kontaminazzjoni kkonfermata mil-laboratorju jew li tkun ikkonsmat prodotti potenzjalment ikkontaminati minn animal b'infezzjoni/kolonizzazzjoni kkonfermata mil-laboratorju
- Esponiment ambjentali: il-fatt li persuna tkun għamet filma jew kellha kuntatt ma' sors ambjentali kkontaminat li jkun giekk kkonfermat mil-laboratorju
- Esponiment fil-laboratorju: il-fatt li persuna tkun ħadmet fl-laboratorju fejn ikun hemm potenzjal għal esponiment

Persuna tista' titqies marbuta b'mod epidemjoloġiku għal kaž ikkonfermat jekk għall-inqas kaž wieħed fil-katina ta' trażmissjoni jkun ikkonfermat mil-laboratorju. Fil-kaž ta' tifqigħha ta' infezzjoni indiretti trażmessi mill-hmeġġ tal-imsaren u mill-halq jew mill-arja, il-katina ta' trażmissjoni ma għandhiex neċċessarjament tiġi stabbilita biex kaž jitqies marbut b'mod epidemjoloġiku.

It-trażmissjoni tista' ssehh permezz ta' waħda jew aktar mir-rotot li ġejjin:

- Mill-arja: permezz ta' projezzjoni ta' aerosol minn persuna infettata għal fuq membrani mukużi waqt li din tkun qed tisħġol, tobżoq, tkanta jew titkellem, jew meta l-aerosols mikrobiċi mxerrda fl-atmosfera jingħibdu man-nifs minn persuni oħra
- Kuntatt: kuntatt dirett ma' persuna infettata (il-hmeġġ tal-imsaren u l-halq, il-qtar respiratorji, l-esponiment tal-ġilda jew dak sesswali) jew ma' animal (eż. gdim, mess) jew kuntatt indirett ma' materjali jew ogħġetti infettati (fomites infettati, fluwidi tal-ġisem, demm)
- Vertikali: mill-omm għat-tarbija, hafna drabi fl-utru, jew b'rizzultat tal-iskambju incidentali ta' fluwidi tal-ġisem normalment matul il-perjodu immedjatamente qabel jew wara t-tweliż
- Trażmissjoni minn vettur: trażmissjoni indiretta minn nemus, dud iriqi, dubbien u insetti oħra infettati li jittrażmettu l-mard lill-bniedmin permezz tal-għidim tagħhom
- Ikel jew ilma: konsum ta' ikel jew ilma tax-xorb potenzjalment ikkontaminat.

Klassifikazzjoni tal-kaž

Il-kaži huma kklassifikati bhala "possibbli", "probabbli" u "konfermati". Il-perjodi ta' inkubazzjoni għall-mard jingħataw fl-informazzjoni addizzjonal biex tiġi ffacilitata l-valutazzjoni tar-rabta epidemjoloġika.

Kaž possibbli

Kaž possibbli tfisser kaž li hu kklassifikat bħala possibbli għal għanijiet ta' rapportar. Ġeneralment dan ikun kaž li jissodisfa l-kriterji kliniči kif deskritti fid-definizzjoni tal-każ mingħajr evidenza epidemioloġika jew tal-laboratorju tal-marda konċernata. Id-definizzjoni ta' kaž bħala possibbli għandha sensitivitā għolja u specifiċità baxxa. Din tippermetti l-individwazzjoni tal-biċċa l-kbira tal-każi iżda xi kaži pozittivi foloz se jiġu inkluzi f'din il-kategorija.

Kaž probabbli

Kaž probabbli tfisser kaž li hu kklassifikat bħala probabbli għal għanijiet ta' rapportar. Dan hu ġeneralment kaž bi kriterji kliniči u b'rasha epidemioloġika kif deskritti fid-definizzjoni tal-każ. It-testijiet tal-laboratorju għal kaži probabbli huma specifikati biss għal čertu mard.

Kaž ikkonfermat

Kaž ikkonfermat tfisser kaž li hu kklassifikat bħala kkonfermat għal għanijiet ta' rapportar. Il-każi kkonfermati jkunu kkonfermati mil-laboratorju u jistgħu jissodisfa il-kriterji kliniči jew le kif deskritti fid-definizzjoni tal-każ. Id-definizzjoni ta' kaž bħala kkonfermat hija specifika ħafna u inqas sensitivitva; għalhekk ħafna mill-każi miġbura se jkunu kaži veri ghalkemm xi wħud mhumiex se jkunu individwati.

Il-kriterji kliniči ta' xi mard ma jalludux għall-fatt li ħafna kaži akuti ma jurux sintomi (eż. l-epatite A, B u C, il-kampilobatterjożi, s-salmonellożi), ghalkemm dawn il-każi xorta jistgħu jkunu importanti mill-perspettiva ta' saħħa pubblika fuq livell nazzjonali.

Il-każi kkonfermati jaqgħu fwaħda mit-tliet subkategoriji mniżżla hawn taħt. Huma se jkunu assenjati lil waħda minn dawk is-subkategoriji matul l-analiżi tad-dejta bl-użu tal-varjabbi miġburin fil-kuntest tal-informazzjoni dwar il-każ.

Kaž ikkonfermat mil-laboratorju bi kriterji kliniči

Il-każ jissodisfa l-kriterji tal-laboratorju għall-konferma tal-każ u l-kriterji kliniči inkluzi fid-definizzjoni tal-każ.

Kaž ikkonfermat mil-laboratorju bi kriterji kliniči mhux magħrufa

Il-każ jissodisfa l-kriterji tal-laboratorju għall-konferma tal-każ iżda ma hemm l-ebda informazzjoni disponibbli fir-rigward tal-kriterji kliniči (eż. ir-rapport tal-laboratorju biss).

Kaž ikkonfermat mil-laboratorju mingħajr kriterji kliniči

Il-każ jissodisfa l-kriterji tal-laboratorju għall-konferma tal-każ iżda ma jissodisfax il-kriterji kliniči fid-definizzjoni tal-każ jew ma jurix sintomi.

2. DEFINIZZJONIJIET TAL-KAŻI TA' MARD LI JINXTERED

2.1 SINDROMU TA' IMMUNODEFIĆENZA AKKWIŻITA (AIDS) U INFEZZJONI TAL-VIRUS UMAN TAL-IMMUNODEFIĆENZA (HIV)

Kriterji Kliniči (AIDS)

Kull persuna li għandha xi waħda mill-kundizzjonijiet kliniči kif iddefiniti fid-definizzjoni Ewropea tal-każ tal-AIDS:

- Adulti uadoloxxenti minn 15-il sena 'l fuq
- Tfal li jkollhom inqas minn 15-il sena

Kriterji tal-Laboratorju (HIV)

- Adulti,adoloxxenti u tfal minn 18-il xahar 'il fuq

Għall-inqas wahda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Riżultat pozittiv tat-test ta' skrining tal-antikorpi għall-HIV jew test ta' skrining ikkombinat (antikorpi għall-HIV u antiġen p. 24 tal-HIV) ikkonfermat minn test tal-antikorpi aktar specifiku (eż. il-Western blot)
- Riżultat pozittiv ta' żewġ testijiet tal-antikorpi għal EIA kkonfermat minn riżultat pozittiv ta' test EIA iehor
- Riżultati pozittivi fuq żewġ kampjuni separati minn għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:
 - Sejbien ta' aċċidu nuklejku tal-HIV (HIV-RNA, HIV-DNA)
 - Dimostrazzjoni tal-HIV permezz tat-test ta' antiġen HIV p. 24, inkluża analiżi ta' newtralizzazzjoni

- Izolament tal-HIV
- Tfal ta' età < 18-il xahar
 - Riżultati pozittivi fuq żewġ kampjuni separati (eskuż id-demm tal-kurdun) minn ghall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:
 - Izolament tal-HIV
 - Sejbien ta' aċidu nuklejku tal-HIV (HIV-RNA, HIV-DNA)
 - Dimostrazzjoni tal-HIV permezz ta' test tal-antiġen HIV p. 24, inkluża analiżi ta' newtralizzazzjoni f'tarbija li jkollha minn xahar 'il fuq

Kriterji Epidemiologiċi MA

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli MA

B. Każ probabbli MA

C. Każ ikkonfermat

— Infezzjoni tal-HIV

Kull persuna li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju ghall-infezzjoni tal-HIV

— AIDS

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči ghall-AIDS u l-kriterji tal-laboratorju ghall-infezzjoni tal-HIV

2.2 ANTHRAX (*Bacillus anthracis*)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha ghall-inqas waħda mill-forom kliniči li ġejjin:

Antraks kutanju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

— Ferita bi nfafet jew vexxikolari

— Eskar imħaffra sewda b'edema mad-dawra

Antraks gastrointestinali

— Deni jew stat ta' deni

U għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

— Uġiġħ akut addominali

— Dijarea

Id-dħul man-nijs tal-anthrax

— Deni jew stat ta' deni

U għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

— Diffikultà respiratorja akuta

— Evidenza radjologika ta' twessiġħ medjastinali

Antraks tal-meningi/meningoencefalopatiku

— Deni

U għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

— Konvulżjonijiet

— Telf tas-sensi

— Sinjali ta' meningi

Anthrax septicaemia

Kriterji tal-Laboratorju

— Izolament ta' *Bacillus anthracis* minn kampjun kliniku

— Sejbien tal-aċidu nuklejku ta' *Bacillus anthracis* f'kampjun kliniku

Kampjun nažali požittiv mingħajr sintomi kliniči ma jikkontribwixx għal dijanjozi kkonfermat ta' każ

Kriterji Epidemjoloġici

Għall-inqas waħda mit-tliet rabtiet epidemjoloġici li ġejjin:

- Trażmissjoni minn annimal għal bniedem
- Esponiment għal sors komuni
- Esponiment għal ikel/ilma tax-xorb ikkонтaminat

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli MA

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.3 INFLUENZA AVJARJA A/H5 JEW A/H5N1 FIL-BNEDMIN

Kriterji Kliniči

Kull persuna b'waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Deni U sinjali u sintomi ta' infezzjoni respiratorja akuta
- Mewt minħabba marda respiratorja akuta inspjegabbli

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Iżolament tal-influenza A/H5N1 minn kampjun kliniku
- Sejbien tal-acidu nuklejku tal-influenza A/H5 f'kampjun kliniku
- Reazzjoni specifika tal-antikorpi ghall-influenza A/H5 (żieda b'erba' darbiet jew aktar jew titru singolu għoli)

Kriterji Epidemjoloġici

Għall-inqas waħda minn dawn l-erbgħa li ġejjin:

- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem minħabba kuntatt mill-qrib (mhux aktar minn metru) ma' persuna rrapporata bhala każ probabbli jew ikkonfermat
- Esponiment fil-laboratorju: fejn hemm esponiment potenzjali għal influenza A/H5N1
- Kuntatt mill-qrib (mhux aktar minn metru) ma' annimal b'infezzjoni A/H5N1 ikkonfermata ghajr tjur u għasafar selvaġġi (eż. qattus jew hanżir)
- Ghajxien jew žara fżona fejn l-influenza A/H5N1 hi attwalment suspettata jew ikkonfermata⁽¹⁾ U għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:
 - Kuntatt mill-qrib (mhux aktar minn metru) ma' tjur domestiċi jew għasafar selvaġġi morda jew mejta⁽²⁾ fiż-żona affettwata
 - Kien f'dar jew frazzett fejn ikun ġie rrapporat tjur domestiku marid jew mejjet matul ix-xahar ta' qabel fiż-żona affettwata

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u epidemjoloġici

B. Każ probabbli

Kull persuna li jkollha test požittiv għal influenza A/H5 jew A/H5N1 imwettaq minn laboratorju li mħuwiex Laboratorju ta' Referenza Nazzjonali li jipparteċipa fin-Netwerk Komunitarju tal-UE tal-Laboratorji ta' Referenza ghall-influenza umana (CNRL)

⁽¹⁾ Ara l-Organizzazzjoni Dinjija għas-Sahha tal-Annimali –OIE- u l-Kummissjoni Ewropea (SANCO) Sistema ta' Notifika dwar Mard tal-Annimali (ADNS), disponibbli fuq: http://www.oie.int/eng/en_index.htm u http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm#

⁽²⁾ Dan ma jinkludix għasafar li jidhru b'sahħithom u li ġew maqtula, pereżempju mill-kaċċa.

C. Każ ikkonfermat nazzjonalment

Kull persuna li jkollha test pozittiv għal influwenza A/H5 jew A/H5N1 imwettaq minn Laboratorju ta' Referenza Nazzjonali li jipparteċipa fin-Netwerk Komunitarju tal-UE tal-Laboratorji ta' Referenza ghall-influwenza umana (CNRL)

D. Każ ikkonfermat mill-WHO

Kull persuna b'konferma tal-laboratojrū minn Ċentru ta' Kollaborazzjoni tal-WHO għal H5

2.4 BOTULIŻMU (*Clostridium botulinum*)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha għall-inqas waħda mill-forom kliniči li ġejjin:

Botuliżmu li jingarr fl-ikel u botuliżmu minn ferita

Għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Indeboliment tan-nervaturi kranjali bilaterali (eż. diplopja, viżjoni mċajpra, dysphagia, fjakkezza fil-boċċa tal-ghajnejn)

- Paraliżi simetrika periferali

Botuliżmu fit-trabi

Trabi li jkollhom għall-inqas wahda minn dawn is-sitta li ġejjin:

- Stitikezza

- Letarġija

- Nuqqas ta' aptit

- Ptożi

- Dysphagia

- Dghufija ġenerali fil-muskoli

It-tip ta' botuliżmu li normalment ikun hemm fit-trabi (ta' inqas minn 12-il xahar) jista' jaffettwa wkoll lit-tfal li jkollhom aktar minn 12-il xahar u xi kultant lill-adulti, b'anatomija gastrointestinali u mikroflora alterati.

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Iżolament ta' *Clostridium botulinum* għal botuliżmu fit-trabi (ippurgar) jew botuliżmu minn ferita (ferita) (l-izolament ta' *Clostridium botulinum* fl-ippurgar ta' adulti mhux rilevanti għad-dijanjozi ta' botuliżmu li jingarr fl-ikel)

- Sejbien ta' tossina tal-botulinum f'kampjun kliniku

Kriterji Epidemiologici

Għall-inqas waħda miż-żewġ rabtiet epidemiologici li ġejjin:

- Esponiment għal sors komuni (eż. l-ikel, l-iskambju ta' labar jew apparati oħra)

- Esponiment għal ikel/ilma tax-xorb ikkontaminat

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli MA

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemiologika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.5 BRUČELLOŽI (*Brucella spp.*)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha d-Deni

U għall-inqas wahda mis-sebgħa li ġejjin:

- Gharaq (abbundanti, jinten, speċjalment matul il-lejl)

— Riħ qawwi

— Artralgija

— Dghufija

— Depressjoni

— Uġiġi ta' ras

— Anoreksja

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

— Iżolament ta' *Brucella* spp. minn kampjun kliniku

— Reazzjoni specifika tal-antikorpi ghall-*Brucella* (Test ta' Agglutinazzjoni Standard, Fissazzjoni tal-Komplement, ELISA)

Kriterji Epidemiologiċi

Għall-inqas waħda mill-erba' rabtiet epidemiologiċi li ġejjin:

— Esponiment għal ikel/ilma tax-xorb ikkонтaminat

— Esponiment għal prodotti minn annimal ikkонтaminat (ħalib jew prodotti tal-ħalib)

— Trażmissjoni minn annimal għal bniedem (tnixxijiet jew organi kkontaminati eż-tnixxija vagħinali, plaċenta)

— Esponiment għal sors komuni

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. **Każ possibbli** MA

B. **Każ probabbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemiologiċa

C. **Każ ikkonfermat**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.6 KAMPILOBATTERJOŽI (*Campylobacter* spp.)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

— Dijarea

— Uġiġi addominali

— Deni

Kriterji tal-Laboratorju

— Iżolament ta' *Campylobacter* spp. mill-ippurgar jew mid-demm

Jekk ikun possibbli għandha ssir differenzjazzjoni ta' *Campylobacter* spp.

Kriterji Epidemiologiċi

Għall-inqas waħda mill-hames rabtiet epidemiologiċi li ġejjin:

— Trażmissjoni minn annimal għal bniedem

— Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem

— Esponiment għal sors komuni

— Esponiment għal ikel/ilma tax-xorb ikkonta minn

— Esponiment ambjentali

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. **Każ possibbli** MA

B. **Każ probabbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemiologiċa

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

- 2.7 INFEZZJONI TAL-KLAMIDJA (*Chlamydia trachomatis*), inkluża LYMPHOGRANULOMA VENEREUM (LGV)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha ghall-inqas waħda mill-forom kliniči li ġejjin:

Infezzjoni tal-Klamidja mhux LGV

Għall-inqas waħda minn dawn is-sitta li ġejjin:

- Uretrite
- Epididimite
- Salpingite akuta
- Endometrite akuta
- Ċerviċite
- Proktite

Fi trabi tat-tweldi ghall-inqas wahda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Konġuntivite
- Pulmonite

LGV

Għall-inqas waħda minn dawn il-ħamsa li ġejjin:

- Uretrite
- Ulċera ġenitali
- Limfadenopatija ingwinali
- Ċerviċite
- Proktite

Kriterji tal-Laboratorju

Infezzjoni tal-Klamidja mhux LGV

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Iżolament ta' *Chlamydia trachomatis* minn kampjun tal-passaġġ anoġenitali jew mill-konġuntiva
- Dimostrazzjoni ta' *Chlamydia trachomatis* permezz tat-test DFA fkampjun kliniku
- Sejbien tal-aċċidu nuklejku tal-*Chlamydia trachomatis* fkampjun kliniku

LGV

Għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Iżolament ta' *Chlamydia trachomatis* minn kampjun tal-passaġġ anoġenitali jew mill-konġuntiva
- Sejbien tal-aċċidu nuklejku tal-*Chlamydia trachomatis* fkampjun kliniku

U

- Identifikazzjoni ta' serovar (genovar) L1, L2 jew L3

Kriterji Epidemioloġici

Rabta epidemioloġika permezz ta' trażmissjoni minn bniedem għal bniedem (kuntatt sesswali jew trażmissjoni vertikali)

Klassifikazzjoni tal-Każ

- A. Każ possibbli MA

- B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemioloġika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju

2.8 KOLERA (*Vibrio cholerae*)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha ghall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Dijarea
- Remettar

Kriterji tal-Laboratorju

- Iżolament ta' *Vibrio cholerae* minn kampjun kliniku

U

- Dimostrazzjoni ta' antiġen O1 jew O139 fl-iżolat

U

- Dimostrazzjoni ta' enterotossina tal-kolera jew il-ġene tal-enterotossina tal-kolera fl-iżolat

Kriterji Epidemiologici

Għall-inqas waħda mill-erba' rabbiet epidemiologici li ġejjin:

- Esponiment għal sors komuni
- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem
- Esponiment għal ikel/ilma tax-xorb ikkонтaminat
- Esponiment ambjentali

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. **Każ possibbi** MA

B. **Każ probabli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemiologika

C. **Każ ikkonfermat**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.9 IL-MARDA CREUTZFELDT-JAKOB, VARJANTI (vCJD)

Kundizzjonijiet minn qabel

- Kull persuna li jkollha diżordni newropsikjatrika progressiva li ddum mill-inqas sitt xħur
- Investigazzjonijiet ta' rutina ma jissuġġerux dijanjozi alternattiva
- L-ebda kaž fl-imghoddi ta' esponiment għal ormoni pitwitarji umani jew tilqim uman ta' dura mater
- L-ebda evidenza ta' forma ġenetika ta' enċefalopatija spongiformi li tinxtered

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha ghall-inqas erbgħa minn dawn il-ħamsa li ġejjin:

- Sintomi psikjatriċi minn kmieni ⁽³⁾
- Sintomi sensorji b'uġiġ h-persistenti ⁽⁴⁾
- Ataksja
- Mijoklonus jew kolera jew distonja
- Dimenzja

Kriterji Dianjostici

Kriterji dianjostici għall-konferma tal-każ:

- Konferma newropatologika: bidla spongiformi u depożizzjoni estensiva tal-proteina prion b'qoxra żejda madwar iċ-ċerebru u ċ-ċervellett

⁽³⁾ Depressjoni, ansjetà, apatija, tbegħid mis-socjetà, taqriq.

⁽⁴⁾ Dan jinkludi kemm uġiġ evidenti u/jew disesteżja.

Kriterji dijanjostiċi għal każ probabbli jew possibbli:

- L-EEG ma jurix id-dehra tipika ⁽⁵⁾ ta' CJD sporadika ⁽⁶⁾ fl-istadji bikrija tal-marda
- Sinjal gholi pulvinari bilateral fuq scan tal-mohħ bl-MRI
- Bijopsija požittiva tat-tunsilli ⁽⁷⁾

Kriterji Epidemjoloġici

Rabta epidemjoloġika permezz ta' trażmissjoni minn bniedem għal bniedem (eż. trasfużjoni tad-demm)

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli

Kull persuna li tilhaq il-kundizzjonijiet minn qabel

U

- tilhaq il-kriterji kliniči

U

- EEG negattiv għal CJD sporadika ⁽⁸⁾

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kundizzjonijiet minn qabel

U

- tilhaq il-kriterji kliniči

U

- EEG negattiv għal CJD sporadika ⁽⁹⁾

U

- scan tal-mohħ bl-MRI požittiv

JEW

- Kull persuna li tilhaq il-kundizzjonijiet minn qabel

U

- bijopsija požittiva tat-tunsilli

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kundizzjonijiet minn qabel

U

tilhaq il-kriterji dijanjostiċi għall-konferma tal-każ

2.10 KRIPTOSPORIDJOŻI (*Cryptosporidium* spp.)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha ghall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Dijarea
- Uġiġħ addominali

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn l-erbgħa li ġejjin:

- Dimostrazzjoni ta' oociti tal-*Cryptosporidium* fl-ippurgar
- Dimostrazzjoni tal-*Cryptosporidium* fil-fluwidi intestinali jew minn kampjuni migbura b'bijopsija mill-imsaren iż-żgħar
- Sejbien tal-aċċidu nuklejku tal-*Cryptosporidium* fl-ippurgar

⁽⁵⁾ Id-dehra tipika tal-EEG f'CJD sporadika tikkonsisti f'kumplessi perjodiċi ġeneralizzati b'rata ta' madwar wieħed kull sekonda. Dawn jistgħu jidher kultant fl-ahħar stadji tal-vCJD.

⁽⁶⁾ Ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 5.

⁽⁷⁾ Il-bijopsija tat-tunsilli mhixiex irrakkomandata bhala rutina u lanqas f'kazijiet b'dehriet tal-EEG tipiċċi tas-CJD sporadika, iżda tista' tkun utli f'każi suspettati fejn il-fatturi kliniči jkunu kompatibbli mal-vCJD u l-MRI ma jurix sinjal gholi pulvinari.

⁽⁸⁾ Ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 5.

⁽⁹⁾ Ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 5.

- Sejbien tal-antigen tal-Cryptosporidium fl-ippurgar

Kriterji Epidemjoloġici

Waħda mill-hames rabtiet epidemjoloġici li ġejjin:

- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem
- Esponiment għal sors komuni
- Trażmissjoni minn annimal għal bniedem
- Esponiment għal ikel/ilma tax-xorb ikkонтaminat
- Esponiment ambjentali

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. **Każ possibbli** MA

B. **Każ probabbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. **Każ ikkonfermat**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.11 DIFTERITE (*Corynebacterium diphtheriae*, *Corynebacterium ulcerans* u *Corynebacterium pseudotuberculosis*)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha ghall-inqas waħda mill-forom kliniči li ġejjin:

Difterite Respiratorja Klassika:

Marda fil-passaġġ ta' fuq tan-nifs bil-laringħite jew bin-nażofarinġite jew bit-tonsillite

U

membrana/psewdomembrana aderenti

Difterite respiratorja hafifa:

Marda tal-passaġġ ta' fuq tan-nifs bil-laringħite jew bin-nażofarinġite jew bit-tonsillite

MINGHAJR

membrana/psewdomembrana aderenti.

Difterite fil-Ġilda:

Ferita fil-ġilda

Difterite ta' partijiet oħra:

Ferita tal-konġuntiva jew tal-membrani mukuži

Kriterji tal-Laboratorju

L-iżolament ta' *Corynebacterium diphtheriae*, *Corynebacterium ulcerans* jew *Corynebacterium pseudotuberculosis* li jiġi produċu tossina minn kampjun kliniku.

Kriterji Epidemjoloġici

Għall-inqas waħda mir-rabtiet epidemjoloġici li ġejjin:

- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem
- Trażmissjoni minn annimal għal bniedem

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. **Każ possibbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči għal difterite respiratorja klassika

B. **Każ probabbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči għad-difterite (*Difterite Respiratorja Klassika*, *Difterite Respiratorja Hafifa*, *Difterite fil-Ġilda*, *Difterite ta' partijiet oħra*) b'rabta epidemjoliġika ma' każ uman ikkonfermat jew b'rabta epidemjoliġika ma' trażmissjoni minn annimal għal bniedem

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju U ghall-inqas wahda mill-forom kliniči

- 2.12 EKINOKOKKOŽI (*Echinococcus spp.*)

Kriterji Kliniči

Mhux rilevanti għal għanijiet ta' sorveljanza

Kriterji Dijanostici

Għall-inqas wahda minn dawn il-hamsa li ġejjin:

- Istopatoloġija jew parassitoloġija kompatibbli ma' *Echinococcus multilocularis* jew *granulosus* (eż: viżwalizzazzjoni diretta tal-protoskoliċi fil-fluwidu taċ-ċista)
- Sejbien ta' morfoloġija makroskopika patonjomonika ta' *Echinococcus granulosus* ta' ċista/ċisti f'kampjuni kirurgiċi
- Feriti f'organi tipiči misjuba permezz ta' tekniki bl-immaġni (eż: tomografija kompjuterizzata, sonografija, MRI) U kkonfermati b'test seroloġiku
- Antikorpi specifiċi tas-serum ta' *Echinococcus spp.* b'test seroloġiku b'sensittivitā għolja U kkonfermati permezz ta' test seroloġiku bi specifiċità għolja
- Sejbien tal-acċidu nuklejku ta' *Echinococcus multilocularis* jew *granulosus* f'kampjun kliniku

Kriterji Epidemjoloġiči MA**Klassifikazzjoni tal-Każ**

- A. Każ possibbli MA

- B. Każ probabbli MA

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji dijanostici

- 2.13 GARDJAŽI (*Giardia lamblia*)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha ghall-inqas wahda minn dawn l-erbgha li ġejjin:

- Dijarea
- Uġiġħ addominali
- Nefha
- Sinjali ta' ħdim hażin tal-ikel (eż: steatorrea, telf fil-piż)

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas wahda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Dimostrazzjoni ta' ċisti jew tropożoġti tal-*Giardia lamblia* fl-ippurgar, fluwidu duodenali jew bijopsija tal-imsaren iż-żgħar
- Dimostrazzjoni ta' antiġeni ta' *Giardia lamblia* fl-ippurgar

Kriterji Epidemjoloġiči

Għall-inqas wahda mill-erba' rabtiet epidemjoloġiči li ġejjin:

- Esponenti għal ikel/ilma tax-xorb ikkонтaminat
- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem
- Esponenti għal sors komuni
- Esponenti ambjentali

Klassifikazzjoni tal-Każ

- A. Każ possibbli MA

- B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.14 GONORREA (*Neisseria gonorrhoeae*)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha ghall-inqas waħda minn dawn it-tmienja li ġejjin:

- Uretrite
- Salpingīte akuta
- Marda ta' infjammazzjoni pelvika
- Ċerviċite
- Epididimite
- Proktite
- Faringīte
- Artrite

JEW

Kull tarbija tat-twelid b'konġuntivite

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn l-erbgħa li ġejjin:

- L-iżolament ta' *Neisseria gonorrhoeae* minn kampjun kliniku
- Sejbien tal-aċċidu nuklejku ta' *Neisseria gonorrhoeae* f'kampjun kliniku
- Dimostrazzjoni ta' *Neisseria gonorrhoeae* permezz ta' test b'sonda mhux amplifikata tal-aċċidu nuklejku f'kampjun kliniku
- Sejbien mikroskopiku ta' diplokokki gram-negattivi intraċellulari f'kampjun maskili tal-uretra

Kriterji Epidemioloġici

Rabta epidemioloġika permezz ta' tražmissjoni minn bniedem għal bniedem (kuntatt sesswali jew tražmissjoni vertikali)

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. **Kaž possibbli** MA

B. **Kaž probabbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemioloġika

C. **Kaž ikkonfermat**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju

2.15 HAEMOPHILUS INFLUENZAE, MARDA INVAŻIVA (*Haemophilus influenzae*)

Kriterji Kliniči

Mhux rilevanti għal għanijiet ta' sorveljanza

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Iżolament ta' *Haemophilus influenzae* minn sit normalment sterili
- Sejbien tal-aċċidu nuklejku ta' *Haemophilus influenzae* minn sit normalment sterili

Kriterji Epidemioloġici MA

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. **Kaž possibbli** MA

B. **Kaž probabbli** MA

C. **Kaž ikkonfermat**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju

2.16 EPATITE A (Virus tal-Epatite A)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha bidu diskret ta' sintomi (eż. għeja kbira, uġiġi addominali, telf ta' aptit, nawżja u remettar intermittent)

U

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Deni
- Suffejra
- Livelli elevati ta' transaminaži tas-serum

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Sejbien ta' acīdu nuklejku tal-virus tal-epatite A fis-serum jew fl-ippurgar
- Reazzjoni specifika tal-antikorpi tal-virus tal-epatite A
- Sejbien ta' antiġen tal-virus tal-epatite A fl-ippurgar

Kriterji Epidemiologiċi

Għall-inqas waħda minn dawn l-erbgħa li ġejjin:

- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem
- Esponiment għal sors komuni
- Esponiment għal ikel/ilma tax-xorb ikkontaminat
- Esponiment ambjentali

Klassifikazzjoni tal-Każ**A. Każ possibbli** MA**B. Każ probabbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'raba epidemjoloġika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.17 EPATITE B (Virus tal-Epatite B)

Kriterji Kliniči

Mhux rilevanti għal għanijiet ta' sorveljanza

Kriterji tal-Laboratorju

Riżultati pozittivi ta' ghall-inqas wieħed jew aktar mit-testijiet li ġejjin jew taħlita ta' testijiet:

- Antikorp centrali tal-epatite B tal-IgM (anti-HBc IgM)
- Antiġen tal-wiċċi tal-epatite B (HBsAg)
- Antiġen e tal-epatite B (HBeAg)
- Acīdu nuklejku tal-epatite B (HBV-DNA)

Kriterji Epidemiologiċi

Mhux rilevanti għal għanijiet ta' sorveljanza

Klassifikazzjoni tal-Każ**A. Każ possibbli** MA**B. Każ probabbli** MA**C. Każ ikkonfermat**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju

2.18 EPATITE C (Virus tal-Epatite C)

Kriterji Kliniči

Mhux rilevanti għal għanijiet ta' sorveljanza

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Sejbien tal-aċċidu nuklejku tal-virus tal-epatite C (HCV RNA)
- Sejbien tal-antiġen centrali tal-virus tal-epatite C (HCV-core)
- Reazzjoni specifika tal-antikorp tal-virus tal-epatite C (anti-HCV) ikkonfermata minn test konferrattiv ta' antikorp (eż. immunoblot) fuq persuni ta' aktar minn 18-il xahar fl-età mingħajr evidenza ta' infekzjoni mfejqa

Kriterji Epidemjoloġici MA**Klassifikazzjoni tal-Każ**

A. **Każ possibbli** MA

B. **Każ probabbi** MA

C. **Każ ikkonfermat**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju

2.19 INFLUENZA (virus tal-influenza)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha għall-inqas waħda mill-forom kliniči li ġejjin:

Marda simili għall-influenza (ILI)

- Bidu għal għarrieda tas-sintomi

U

- Ghall-inqas wieħed mill-erba' sintomi sistemiċi li ġejjin:

- Deni jew stat ta' deni

- Telqa

- Ugħiġi ta' ras

- Ugħiġi fil-muskoli

U

- Ghall-inqas wieħed mit-tliet sintomi respiratorji li ġejjin:

- Sogħla

- Ugħiġi fil-geržuma

- Qtugħi tan-nifs

Infekzjoni respiratorja akuta (ARI)

- Bidu għal għarrieda tas-sintomi

U

- Ghall-inqas wieħed mill-erba' sintomi respiratorji li ġejjin:

- Sogħla

- Ugħiġi fil-geržuma

- Qtugħi tan-nifs

- Koriżha

U

- Opinjoni klinika li l-marda hi kkawżata minn infekzjoni

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn l-erbgħa li ġejjin:

- Iżolament tal-virus tal-influenza minn kampjun kliniku
- Sejbien tal-aċċidu nuklejku tal-virus tal-influenza f'kampjun kliniku
- Identifikazzjoni ta' antiġen tal-virus tal-influenza permezz tat-test DFA f'kampjun kliniku
- Reazzjoni specifika tal-antikorpi tal-influenza

Jekk ikun possibbli għandha ssir klassifikazzjoni tas-subtip tal-iżolati tal-influwenza

Kriterji Epidemjoloġici

Rabta epidemjoloġika bi trażmissjoni minn bniedem għal bniedem

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči (ILI jew ARI)

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči (ILI jew ARI) u b'rabta epidemjoloġika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči (ILI jew ARI) u tal-laboratorju

2.20 INFLUWENZA A(H1N1)

Kriterji Kliniči

Kull persuna b'waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- deni $> 38^{\circ}\text{C}$ U sintomi ta' infezzjoni respiratorja akuta
- Pulmonite (marda respiratorja akuta)
- Mewt minħabba marda respiratorja akuta inspjegabbli

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas wieħed mit-testijiet li ġejjin:

- RT-PCR
- koltivazzjoni viral (meħtieġa faċilitajiet BSIL 3)
- żieda b'erba' darbiet f'antikorpi newtralizzanti spċifikatament għal virus tal-influwenza A(H1N1) ġidha (li jimplika l-htieġa ta' seri pari, minn marda ffażi akuta u wara fi stadju ta' konvalexzenza ta' 10-14-il jum minimu)

Kriterji Epidemjoloġici

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin fis-sebat ijiem qabel il-bidu tal-marda:

- persuna li kienet f'kuntatt mill-qrib ma' każ ikkonfermat ta' infezzjoni minn virus tal-influwenza A(H1N1) ġidha waqt li l-każ kien waqt mard
- persuna li vyjaġġat f'post fejn tkun iddokumentata trażmissjoni kontinwa minn bniedem għal bniedem tal-influwenza A(H1N1) ġidha
- persuna li taħdem fl-laboratorju fejn isiru testijiet tal-virus tal-influwenza A(H1N1) ġidha

Klassifikazzjoni tal-każ

A. Każ taħt investigazzjoni

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u epidemjoloġici

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči U epidemjoloġici U b'riżultat mil-laboratorju li juri infezzjoni pożittiva tal-influwenza A ta' tip li ma jistax ikollu subtip

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju ghall-konferma

2.21 LEĞJONELLOŽI (*Legionella* spp.)

Kriterji Kliniči

Kull persuna b'pulmonite

Kriterji tal-Laboratorju

Kriterji tal-laboratorju ghall-konferma tal-każ

Għall-inqas wieħed minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Iżolament ta' *Legionella* spp. minn tnixxijiet respiratorji jew kull sit normalment sterili
- Sejbien tal-antiġen tal-*Legionella pneumophila* fl-urina
- Żieda sinifikanti fil-livell spċificu tal-antikorpi għal serograpp 1 tal-*Legionella pneumophila* f-kampjuni pari tas-serum

Kriterji tal-laboratorju għal kaž probabbli

Għall-inqas waħda minn dawn l-erbgħa li ġejjin:

- Sejbien tal-antiġen tal-*Legionella pneumophila* fi tnixxijiet respiratorji jew tessut tal-pulmuni eż-żebha bid-DFA bl-użu ta' reġamenti derivati tal-antikorpi monoklonali
- Sejbien tal-aċċidu nuklejku tal-*Legionella* spp. fi tnixxijiet respiratorji, tessut tal-pulmuni jew kull sit normalment sterili
- Żieda sinifikanti fil-livell spċificu tal-antikorpi għal-*Legionella pneumophila* minbarra serograpp 1 jew *Legionella* spp. oħra f-kampjuni pari tas-serum
- Livell singolu għoli tal-antikorp spċificu għal serograpp 1 tal-*Legionella pneumophila* fis-serum

Kriterji Epidemjoloġici MA

Klassifikazzjoni tal-Kaž

A. **Kaž possibbli** MA

B. **Kaž probabbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterju kliniku U għall-inqas kriterju wieħed tal-laboratorju għal kaž probabbli

C. **Kaž ikkonfermat**

Kull persuna li tilhaq il-kriterju kliniku U għall-inqas kriterju wieħed tal-laboratorju għal kaž probabbli

2.22 LEPTOSPIROŻI (*Leptospira* spp.)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha

- Deni

JEW

Għall-inqas tnejn minn dawn il-hdax li ġejjin:

- Riħ qawwi
- Uġiġħ ta' ras
- Uġiġħ fil-muskoli
- Xaqqa tal-ġħaraq konġuntivali
- Emorraġji tal-ġilda jew ta' membrani mukużi
- Raxx
- Suffeja
- Mijokardite
- Meningīte
- Indeboliment renali
- Sintomi respiratorji bħal emottiżi

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn l-erbgħa li ġejjin:

- Iżolament ta' *Leptospira interrogans* jew ta' kull *Leptospira* spp. patoġenika oħra minn kampjun kliniku
- Sejbien ta' *Leptospira interrogans* jew ta' aċċidu nuklejku ta' kull *Leptospira* spp. patoġenika oħra f-kampjun kliniku

- Dimostrazzjoni ta' *Leptospira interrogans* jew kull *Leptospira* spp. patoġenika oħra bl-immunofluworexxenza f'kampjun kliniku
- Reazzjoni speċifika tal-antikorpi għal *Leptospira interrogans* jew għal kull *Leptospira* spp. patoġenika oħra

Kriterji Epidemiologiċi

Għall-inqas waħda mit-tliet rabtiet epidemiologiċi li ġejjin:

- Trażmissjoni minn annimal għal bniedem
- Esponiment ambjentali
- Esponiment għal sors komuni

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli MA

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemiologiċa

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.23 LISTERJOŽI (*Listeria monocytogenes*)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha għall-inqas waħda minn dawn it-lieta li ġejjin:

- Listerjoži ta' trabi tat-twelid iddefinita bħala

Twelid ta' tarbijja mejta

JEW

Għall-inqas waħda minn dawn il-ħamsa li ġejjin matul l-ewwel xahar ta' ħajja:

- Granulomatoži infantisettika

- Meningite jew meningoencefalite

- Settiċemija

- Dispnea

- Feriti fil-ġilda, fil-membrani mukużi jew fil-konguntiva

- Listerjoži fit-tqala ddefinita bħala mill-inqas waħda minn dawn it-lieta li ġejjin:

- Abort, korriement, twelid ta' tarbijja mejta jew twelid prematur

- Deni

- Sintomi simili tal-influwenza

- Forma oħra ta' listerjoži ddefinita bħala mill-inqas waħda minn dawn l-erbgha li ġejjin:

- Deni

- Meningite jew meningoencefalite

- Settiċemija

- Infezzjonijiet lokalizzati bħal artrite, endokardite, u axxessi

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Iżolament ta' *Listeria monocytogenes* minn sit normalment sterili

- Iżolament ta' *Listeria monocytogenes* minn sit normalment mhux sterili fil-fetu, f'tarbijja mwielda mejta, f'tarbijja tat-twelid jew fl-omni fi żmien jew mal-24 siegħa mit-twelid

Kriterji Epidemiologiċi

Għall-inqas waħda mit-tliet rabtiet epidemiologiċi li ġejjin:

- Esponiment għal sors komuni

- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem (trażmissjoni vertikali)

- Esponenti għal ikel/ilma tax-xorb ikkontaminat

Informazzjoni addizzjonali

Perjodu ta' inkubazzjoni ta' 3 - 70 jum, ġafna drabi 21 jum

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. **Każ possibbli** MA

B. **Każ probabbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. **Każ ikkonfermat**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju

JEW

Kull omm li jkollha infezzjoni talisterjozi ikkonfermata mil-laboratorju fil-fetu, fit-tarbija mwielda mejta jew fit-tarbija tat-tweldi tagħha

2.24 MALARJA (*Plasmodium* spp.)

Kriterji Kliniči

Kull persuna bid-deni JEW storja ta' deni

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Dimostrazzjoni tal-parassiti tal-malarja permezz ta' mikroskopija ottika f'kampjuni tad-demm
- Sejbien tal-aċċidu nuklejku ta' *Plasmodium* fid-demm
- Sejbien tal-antiġen ta' *Plasmodium*

Jekk ikun possibbli għandha ssir differenzjazzjoni ta' *Plasmodium* spp.

Kriterji Epidemioloġici MA

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. **Każ possibbli** MA

B. **Każ probabbli** MA

C. **Każ ikkonfermat**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.25 HOŻBA (Virus tal-ħożba)

Kriterji Kliniči

Kull persuna bid-deni

U

- Raxx bi tbajja' u nfafet

U għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Sogħla
- Koriża
- Konguntivite

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn l-erbgħa li ġejjin:

- Iżolament tal-virus tal-ħożba minn kampjun kliniku
- Sejbien tal-aċċidu nuklejku tal-virus tal-ħożba f'kampjun kliniku
- Reazzjoni speċifika tal-antikorpi ghall-virus tal-ħożba karakteristika ta' infezzjoni akuta fis-serum jew fil-bżeq
- Sejbien tal-antiġen tal-virus tal-ħożba permezz tad-DFA f'kampjun kliniku bl-użu ta' antikorpi monoklonali speċifiċi tal-ħożba

Ir-riżultati tal-laboratorju għandhom ikunu interpretati skont l-istatus tat-tilqim. F'każ li t-tilqim ikun reċenti, investiga għall-virus naturali

Kriterji Epidemjoloġiči

Rabta epidemjoloġika bi trażmissjoni minn bniedem għal bniedem

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li ma ġietx imlaqqma reċentement u li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.26 MARDA MENINGOKKOKALI, INVAŻIVA (*Neisseria meningitidis*)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha ghall-inqas wieħed mis-sintomi li ġejjin:

- Sinjali ta' meningi
- Raxx emorraġiku
- Xokk settiku
- Artrite settika

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn l-erbgħa li ġejjin:

- Iżolament ta' *Neisseria meningitidis* minn sit normalment sterili, jew minn feriti purpuriċi fil-ġilda
- Sejbien tal-aċċidu nuklejku ta' *Neisseria meningitidis* minn sit normalment sterili, jew minn feriti purpuriċi fil-ġilda
- Sejbien tal-antigen ta' *Neisseria meningitidis* f'CSF
- Sejbien ta' diplokokku imtebba' gram-negativ f'CSF

Kriterji Epidemjoloġiči

Rabta epidemjoloġika bi trażmissjoni minn bniedem għal bniedem

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju

2.27 GATTONE (Virus tal-gattone)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha

- Deni

U

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Bidu għal għarrieda ta' nefha sensittiva unilaterali jew bilaterali tal-parotid jew ta' glandoli oħra tal-bżeq mingħajr kawża ohra apparenti
- Orkite
- Meningħite

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Iżolament tal-virus tal-gattone minn kampjun kliniku
- Sejbien tal-aċidu nuklejku tal-virus tal-gattone
- Reazzjoni specifika tal-antikorpi għall-virus tal-gattone karatteristika ta' infekzjoni akuta fis-serum jew fil-bžieq

Ir-riżultati tal-laboratorju għandhom ikunu interpretati skont l-istatus tat-tilqim

Kriterji Epidemjologicċi

Rabta epidemjologika bi trażmissjoni minn bniedem għal bniedem

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'raba epidemjologika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li ma ġietx imlaqqma reċentement u li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju

F'każ ta' tilqim reċenti: kull persuna b'sejbien ta' razza tal-virus tal-gattone tat-tip naturali

2.28 SOGHLA KONVULSIVA (*Bordetella pertussis*)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha sogħla li ddum mill-inqas ġimaghtejn

U ghall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Attakk ta' sogħla
- “Tqaħqiħ” ispiratorju
- Remettar wara s-sogħla

JEW

Kull persuna ddijanostikata b'sogħla konvulżiva minn tabib

JEW

Episodji ta' waqfien tan-nifs fit-trabi

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Iżolament ta' *Bordetella pertussis* minn kampjun kliniku
- Sejbien tal-aċidu nuklejku ta' *Bordetella pertussis* fkampjun kliniku
- Reazzjoni specifika tal-antikorpi għal *Bordetella pertussis*

Kriterji Epidemjologicċi

Rabta epidemjologika bi trażmissjoni minn bniedem għal bniedem

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'raba epidemjologika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.29 PESTA (*Yersinia pestis*)**Kriterji Kliniči**

Kull persuna li jkollha ghall-inqas waħda mill-forom kliniči li ġejjin:

Pesta bubonika:

- Deni

- U

- Bidu għal għarrieda ta' linfadenite li tikkawża l-ugħiġi

Pesta settiċemika:

- Deni

Pesta pulmonari:

- Deni

- U

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Sogħla

- Uġiġi fis-sider

- Emottiżi

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Iżolament ta' *Yersinia pestis* minn kampjun kliniku

- Sejbien tal-acidu nuklejku ta' *Yersinia pestis* minn kampjun kliniku (antiġen F1)

- Reazzjoni speċifika tal-antikorpi kontra l-antiġen F1 ta' *Yersinia pestis*

Kriterji Epidemjoloġici

Għall-inqas waħda mill-erba' rabtiet epidemjoloġici li ġejjin:

- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem

- Trażmissjoni minn animal għal bniedem

- Esponiment fil-laboratorju (fejn hemm esponiment potenzjalji għall-pesta)

- Esponiment għal sors komuni

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. **Każ possibbli** MA

B. **Każ probabbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. **Każ ikkonfermat**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju

2.30 MARD INVAŻIV TAL-PNEWMOKOKKI (*Streptococcus Pneumoniae*)**Kriterji Kliniči**

Mhux rilevanti għal għanijiet ta' sorveljanza

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Iżolament ta' *Streptococcus pneumoniae* minn sit normalment sterili

- Sejbien tal-acidu nuklejku ta' *Streptococcus pneumoniae* minn sit normalment sterili

- Sejbien tal-antiġen ta' *Streptococcus pneumoniae* minn sit normalment sterili

Kriterji Epidemjoloġiči MA**Klassifikazzjoni tal-Każ****A. Każ possibbli** MA**B. Każ probabbli** MA**C. Każ ikkonfermat**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju

2.31 POLJOMELITE (Virus tal-poljo)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li għandha inqas minn 15-il sena b'paralizi mpaħphha akuta (AFP)

JEW

Kull persuna li t-tabib jissuspetta li għandha l-poljo

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Iżolament tal-virus tal-poljo u differenzjazzjoni intratipika – Virus naturali tal-poljo (WPV)
- Virus tal-poljo derivat mill-vaċċin (VDPV) (ghall-VDPV mill-inqas 85 % xebh mal-virus tal-vaċċin fis-sekwenzi ta' nukleotide tat-taqṣima VP1)
- Virus tal-poljo simili għal Sabin differenzjazzjoni intratipika mwettqa minn laboratorju tal-poljo akkreditat mill-WHO (ghall-VDPV minn > 1 % sa 15 % differenza fis-sekwenza VP1 meta mqabbel mal-virus tal-vaċċin tal-istess serotip)

Kriterji Epidemjoloġiči

Għall-inqas waħda miż-żewġ rabtiet epidemjoloġici li ġejjin:

- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem
- Storja ta' vjaġġar lejn żona ta' poljo endemika jew żona b'ċirkolazzjoni suspettata jew ikkonfermata tal-virus tal-poljo

Klassifikazzjoni tal-Każ**A. Każ possibbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.32 DENI Q (Coxiella burnetii)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha ghall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Deni
- Pulmonite
- Epatite

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Iżolament ta' *Coxiella burnetii* minn kampjun kliniku
- Sejbien tal-aċċidu nuklejku ta' *Coxiella burnetii* fkampjun kliniku
- Reazzjoni specifika tal-antikorpi għal *Coxiella burnetii* (IgG jew IgM fazi II)

Kriterji Epidemjoloġiči

Għall-inqas waħda miż-żewġ rabtiet epidemjoloġici li ġejjin:

- Esponenti għal sors komuni
- Trażmissjoni minn annimal għal bniedem

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli MA

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.33 RABJA (virus Lyssa)

Kriterji Kliniči

Kull persuna b'enċefalomjelite akuta

U

Għall-inqas tnejn minn dawn is-sebgha li ġejjin:

- Bidliet sensorji rriferuti għas-sit fejn qabel seħħet gidma minn annimal
- Pareżi jew paraliżi
- Spażmi tal-muskoli li jomogħdu
- Idrofobija
- Delirju
- Konvulżjonijiet
- Ansjetà

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn l-erbgha li ġejjin:

- Iżolament tal-virus Lyssa minn kampjun kliniku
- Sejbien tal-aċidu nuklejku tal-virus Lyssa f'kampjun kliniku (eż. il-bżieq jew it-tessut tal-mohħ)
- Sejbien tal-antigeni viral minn DFA f'kampjun kliniku
- Reazzjoni spċċifika tal-antikorpi għall-virus Lyssa permezz ta' analiżi ta' newtralizzazzjoni tal-virus fis-serum jew CSF

Ir-riżultati tal-laboratorju għandhom iċkunu interpretati skont l-listat tat-tilqim jew tal-immunizzazzjoni

Kriterji Epidemjoloġici

Għall-inqas waħda mit-tliet rabtiet epidemjoloġici li ġejjin:

- Trażmissjoni minn annimal għal bniedem (annimal b'infezzjoni suspettata jew ikkonfermata)
- Esponiment għal sors komuni (l-istess annimal)
- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem (eż. trapjant tal-organi)

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.34 RUBELLA (virus tar-Rubella)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha bidu għal għarrieda ta' raxx ġeneralizzat bi tbajja' u nafet

U

Għall-inqas wahda minn dawn il-hamsa li ġejjin:

- Adenopatija ċervikali
- Adenopatija tas-suboċċipite
- Adenopatija ta' wara l-widna
- Artralgħija
- Artrite

Kriterji tal-Laboratorju

- Kriterji tal-laboratorju ghall-konferma tal-każ
- Għall-inqas wahda minn dawn it-tlieta li ġejjin:
- Iżolament tal-virus tar-rubella minn kampjun kliniku
 - Sejbien tal-aċċidu nuklejku tal-virus tar-rubella f'kampjun kliniku
 - Reazzjoni speċifika tal-antikorpi għall-virus tar-rubella (IgG) fis-serum jew fil-bżieq
 - Kriterji tal-laboratorju għal każ probabbli
 - Reazzjoni specifika tal-antikorpi għall-virus tar-rubella (IgM⁽¹⁰⁾)

Ir-riżultati tal-laboratorju għandhom ikunu interpretati skont l-istatus tat-tilqim

Kriterji Epidemjoloġiči

Rabta epidemjoloġika bi trażmissjoni minn bniedem għal bniedem

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u li jkollha għall-inqas wahda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Rabta epidemjoloġika
- Kriterji tal-laboratorju li jridu jintlaħqu għal każ probabbli

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li ma ġietx imlaqqma reċentement u li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju għall-konferma tal-każ

F'każ ta' tilqim reċenti, persuna b'sejbien ta' razza tal-virus tar-rubella tat-tip naturali

2.35 RUBELLA, KONGENITALI (Inkluz is-Sindromu tar-Rubella Kongenitali)

Kriterji Kliniči

Infezzjoni tar-rubella kongenitali (CRI)

Ma jistgħu jiġu ddefiniti l-ebda kriterji kliniči għal CRI

Sindromu tar-rubella kongenitali (CRS)

Kull tarbija li jkollha inqas minn sena jew kull tarbija mwielda mejta bi:

Għall-inqas tnejn mill-kundizzjonijiet imniżżla taht il-kategorija (A)

JEW

Waħda fil-kategorija (A) u waħda fil-kategorija (B)

(A)

- Katarretta/Katarretti
- Glawkoma kongenitali
- Mard tal-qalb kongenitali

⁽¹⁰⁾ Meta tkun issuspettata r-rubella fit-tqala, tinhiex konferma ulterjuri tar-riżultati pozittivi tal-IgM tar-rubella (eż, test ta' qawwa ta' IgG speċifika tar-rubella li juri qawwa baxxa). F'ċerti sitwazzjonijiet, bhal tifqighat ikkonfermati ta' rubella s-sejben tal-virus IgM tar-rubella jista' jitqies konfermattiv f'każżejjiet mhux ta' tqala.

- Nuqqas ta' smigħ
- Retinopatija pigmentarja
- (B)
 - Purpura
 - Splenomegalija
 - Mikroċefalija
 - Dewmien fl-iżvilupp
 - Meningoenċefalite
 - Marda tal-ghadam radjoluċida
 - Suffejra li tibda fi żmien 24 siegħa wara t-twelid

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn l-erbgħa li ġejjin:

- Iżolament tal-virus tar-rubella minn kampjun kliniku
- Sejbien tal-aċċidu nuklejku tal-virus tar-Rubella
- Reazzjoni speċifika tal-antikorpi għall-virus tar-rubella (IgM)
- Persistenza tal-IgG tar-rubella fl-ċċid ta' bejn 6 u 12-il xahar (ghall-inqas żewġ kampjuni b'konċentrazzjoni simili ta' IgG tar-rubella)

Ir-riżultati tal-laboratorju għandhom ikunu interpretati skont l-istatus tat-tilqim

Kriterji Epidemioloġici

Kull tarbija jew tarbija mwielda mejta ta' omm b'infezzjoni tar-rubella kkonfermata mil-laboratorju matul it-tqala permezz ta' trażmissjoni minn bniedem għal bniedem (trażmissjoni vertikali)

Klassifikazzjoni tal-Każż Rubella konġenitali

A. **Każż possibbli** MA

B. **Każż probabbli**

Kull tarbija mwielda mejta li jew mhixiex it-testjata JEW li jkollha riżultati negattivi tal-laboratorju u b'għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Rabta epidemjoloġika U għall-inqas waħda mill-kondizzjonijiet elenkti fil-kriterji kliniči ta' CRS tal-kategorija 'A'
- Il-kriterji kliniči li jridu jintlaħqu għal CRS

C. **Każż ikkonfermat**

Kull tarbija mwielda mejta li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju

JEW

Kull tarbija li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju U li jkollha għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Rabta epidemjoloġika
- Għall-inqas waħda mill-kondizzjonijiet elenkti fil-kriterji kliniči ta' CRS tal-kategorija "A"

2.36 SALMONELLOŻI (*Salmonella* spp. għajr *Salmonella typhi* u *Salmonella paratyphi*)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha għall-inqas waħda minn dawn l-erbgħa li ġejjin:

- Dijarea
- Deni
- Uġigh addominali
- Remettar

Kriterji tal-Laboratorju

L-iżolament ta' *Salmonella* (għajr *Salmonella typhi* u *Salmonella paratyphi*) mill-ippurgar, awrina, xi mkien fil-ġisem (eż. ferita infettata) jew minn kull fluwidu u tessut tal-ġisem normalment sterili (eż. demm, CSF, għadam, fluwidu sinovjali, eċċ.)

Kriterji Epidemjoloġiči

Għall-inqas waħda mill-ħames rabtiet epidemjoloġiči li ġejjin:

- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem
- Esponiment għal sors komuni
- Trażmissjoni minn annimal għal bniedem
- Esponiment għal ikel/ilma tax-xorb ikkонтaminat
- Esponiment ambjentali

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. **Każ possibbli** MA

B. **Każ probabbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. **Każ ikkonfermat**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.37 SINDROMU RESPIRATORJU AKUT GRAVI – SARS (SARS-coronavirus, SARS-CoV)

Kriterji Kliniči

Kull persuna bid-deni jew storja ta' deni

U

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Sogħla
- Diffikultà biex tieħu n-nifs
- Qtugħ tan-nifs

U

Għall-inqas waħda minn dawn l-erbgħa li ġejjin:

- Evidenza radjografika ta' pulmonite
- Evidenza radjografika tas-sindromu ta' diffikultà respiratorja akuta
- Sejbien ta' pulmonite fl-awtopsjā
- Sejbien fl-awtopsjā ta' sindromu ta' diffikultà respiratorja akuta

U

L-ebda dijanjozi alternattiva li tista' tispjega l-marda b'mod shih

Kriterji tal-Laboratorju

— Kriterji tal-laboratorju ghall-konferma tal-każ

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

— Iżolament tal-virus fil-koltivazzjoni taċ-ċelluli minn kull kampjun kliniku u identifikazzjoni ta' SARS-CoV bl-użu ta' metodu bhal RT-PCR

— Sejbien tal-aċidu nuklejku ta' SARS-CoV fghall-inqas waħda mit-tlieta li ġejjin:

— Għall-inqas żewġ kampjuni kliniči differenti (eż. kampjun rinofaringali u ppurgar)

— L-istess kampjun kliniku migħbur f'żewġ okkażjonijiet jew aktar matul il-marda (eż. aspirati rinofaringali sekwenzjali)

— Żewġ analizi differenti jew ripetizzjoni ta' RT-PCR bl-użu ta' estratt ġdid ta' RNA mill-kampjun kliniku originali f'kull okkażjoni tal-itteßtar

— Reazzjoni specifika tal-antikorpi tas-SARS-CoV permezz ta' wahda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

— Serokonverżjoni permezz ta' ELISA jew IFA tas-serum fil-faži akuta u konvalexxenti ttestjat b'mod parallel

— Żieda b'erba' darbiet jew aktar fit-titru tal-antikorpi bejn seri fil-faži akuta u konvalexxenti ttestjati b'mod parallel

- Kriterji tal-laboratorju għal każ probabbli
- Ghall-inqas wahda minn dawn it-tnejn li ġejjin:
- Test požittiv wieħed tal-antikorpi għas-SARS-CoV
- Riżultat požittiv tal-PCR għas-SARS-CoV f'kampjun kliniku wieħed u analizi wahda

Kriterji Epidemiologiċi

Għall-inqas wahda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Kull persuna li jkollha ghall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:
- Impjegati f'xogħol marbut ma' riskju akbar ta' esponenti għas-SARS-CoV (ez. l-istaff fl-laboratorju li jahdem b'virus ħajjin simili tas-SARS-CoV/SARS-CoV jew jahżeen kampjuni kliniči infettati bis-SARS-CoV; persuni b'espontenit għal annimali selväġġi jew annimali oħra meqjusa riżerva tas-SARS-CoV, il-hmieg jew it-tnixxijiet tagħhom, eċċ..)
- Kuntatt mill-qrib (⁽¹¹⁾) ta' persuna waħda jew aktar bis-SARS ikkonfermat jew taħt investigazzjoni għas-SARS
- Storja ta' vjaġġar jew residenza f'żona fejn isseħħi tifqigha ta' SARS
- Żewġ haddiema jew aktar fil-qasam tal-kura tas-sahħha (⁽¹²⁾) b'evidenza klinika ta' SARS fl-istess unità ta' kura tas-sahħha u bil-bidu tal-marda fl-istess perjodu ta' ghaxart ijiem
- Tliet persuni jew aktar (haddiema fil-qasam tal-kura tas-sahħha u/jew pazjenti u/jew viżitaturi) b'evidenza klinika ta' SARS bil-bidu tal-marda fl-istess perjodu ta' ghaxart ijiem u marbuta epidemiologikament ma' faċilità tal-kura tas-sahħha

Klassifikazzjoni tal-Każ għall-perjodu interepidemiku

Tapplika wkoll matul tifqigha f'pajjiż jew f'żona mhux affettwata

A. Każ possibbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemiologika

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči U b'rabta epidemiologika U li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju għal każ probabbli

C. Każ ikkonfermat nazzjonālment

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju ghall-konferma tal-każ fejn l-itteşjar ikun sar fl-laboratorju ta' referenza nazzjonali

D. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju ghall-konferma tal-każ fejn l-itteşjar ikun sar fl-laboratorju tal-WHO ta' referenza u ta' verifika tas-SARS

Klassifikazzjoni tal-Każ matul tifqigha

Tapplika matul tifqigha f'pajjiż/zona fejn mill-inqas persuna waħda għiet ikkonfermata minn laboratorju tal-WHO ta' referenza u ta' verifika tas-SARS

A. Każ possibbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemiologika ma' każ ikkonfermat nazzjonālment jew każ ikkonfermat

C. Każ ikkonfermat nazzjonālment

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju ghall-konferma tal-każ fejn l-itteşjar ikun sar fl-laboratorju ta' referenza nazzjonali

⁽¹¹⁾ Kuntatt mill-qrib hija persuna li hadet hsieb, ghexet ma', jew kellha kuntatt dirett mat-tnixxijiet respiratorji, il-fluwidi tal-ġisem u/jew il-hmieg (ez. il-fecī) ta' każżejjiet ta' SARS.

⁽¹²⁾ F'dan il-kuntest it-terminu "haddiem fil-qasam tal-kura tas-sahħha" jinkludi l-istaff kollu tal-isptar. Id-definizzjoni tal-unità tal-kura tas-sahħha fejn isehhu l-każżejjiet se iddepPENDI fuq is-itwazzjoni lokali. Id-daqs tal-unità jista' jvarja minn faċilità shiha tal-kura tas-sahħha jekk tkun żgħira, għal dipartiment wieħed jew sala waħda ta' sptar terzjarju kbir.

D. Każ ikkonfermat

Wahda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju ghall-konferma tal-każ fejn l-ittestjar ikun sar flaboratorju tal-WHO ta' referenza u ta' verifika tas-SARS
- Kull każ ikkonfermat nazzjonalment b'rabta epidemjoloġika ma' katina ta' trażmissjoni fejn mill-inqas każ wieħed gie vverifikat b'mod indipendent minn laboratorju tal-WHO ta' referenza u ta' verifika tas-SARS
- Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju għal każ probabbili b'rabta epidemjoloġika ma' katina ta' trażmissjoni fejn mill-inqas każ wieħed gie vverifikat b'mod indipendent minn laboratorju tal-WHO ta' referenza u ta' verifika tas-SARS

2.38 INFEZZJONI TA' ESCHERICHIA COLI LI TIPPRODUĆI T-TOSSINA SHIGA/VEROČITOTOSSINA (STEC/VTEC)

Kriterji Kliniči

Dijarea STEC/VTEC

Kull persuna li jkollha ghall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Dijarea
- Uġigh addominali

HUS

Kull persuna li jkollha insuffiċjenza renali akuta u ghall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Anemija emolitika mikroanġopatika
- Tromboċitopenija

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn l-erbgħa li ġejjin:

- Iżolament ta' razza ta' *Escherichia coli* li tipproduċi t-tossina Shiga (Stx) jew li żżomm fiha ġene/ġeni stx1 jew stx2
- Iżolament ta' *Escherichia coli* O157 li ma jiffermentax sorbitol (NSF) (mingħajr ittestjar tal-ġene Stx jew stx)
- Sejbien dirett tal-aċċidu nuklejku tal-ġene/ġeni stx1 jew stx2 (mingħajr l-iżolament tar-razza)
- Sejbien dirett ta' Stx hieles fil-feċi (mingħajr l-iżolament tar-razza)

Dan li ġej jiusta' jintuża bħala kriterju tal-laboratorju biex jikkonferma STEC/VTEC f'każ ta' HUS biss:

- Reazzjoni specifika tal-antikorpi ta' serogruppi (LPS) *Escherichia coli*

Jekk ikun possibbli għandhom isiru iż-żolament tar-razza STEC/VTEC u karatterizzazzjoni addizzjonali fserotip, tip batterjofagu, ġeni *eae*, u s-sottotipi ta' stx1/stx2

Kriterji Epidemjoloġici

Għall-inqas waħda mill-hames rabtiet epidemjoloġici li ġejjin:

- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem
- Esponiment għal sors komuni
- Trażmissjoni minn annimal għal bniedem
- Esponiment għal ikel/ilma tax-xorb ikkонтaminat
- Esponiment ambjentali

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli ta' HUS assoċjat ma' STEC

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči għal HUS

B. Każ probabbli ta' STEC/VTEC

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. Każ ikkonfermat ta' STEC/VTEC

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.39 SIĞELLOŽI (*Shigella* spp.)**Kriterji Kliniči**

Kull persuna li jkollha ghall-inqas waħda minn dawn l-erbgha li ġejjin:

- Dijarea
- Deni
- Remettar
- Uġiġħ addominali

Kriterji tal-Laboratorju

- Iżolament ta' *Shigella* spp. minn kampjun kliniku

Kriterji Epidemjoloġici

Għall-inqas waħda mill-hames rabtiet epidemjoloġici li ġejjin:

- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem
- Esponiment għal sors komuni
- Trażmissjoni minn annimal għal bniedem
- Esponiment għal ikel/ilma tax-xorb ikkонтaminat
- Esponiment ambjentali

Klassifikazzjoni tal-Każ**A. Każ possibbli** MA**B. Każ probabbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.40 ĜIDRI (Virus tal-Variola)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha ghall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Deni

U

Raxx b'vexxikoli jew ponot ibsin fl-istess stadju ta' žvilupp b'distribuzzjoni centrifuga

- Preżentazzjonijiet atipici ddefiniti bħala mill-inqas waħda minn dawn l-erbgha li ġejjin:
 - Feriti bl-emorragija
 - Feriti ċatti bellusin li ma jiżviluppawx f'ponot
 - Variola sine eruptione
 - Tip aktar hafif

Kriterji tal-Laboratorju

- Kriterji tal-laboratorju għall-konferma tal-każ

Għall-inqas wieħed miż-żewġ testijiet tal-laboratorju li ġejjin:

- Iżolament tal-ġidri (virus tal-Variola) minn kampjun kliniku segwit bl-ghoti ta' sekwenzi (laboratorji P4 spċċifikati biss)
- Sejbien tal-aċċidu nuklejku tal-virus tal-Variola f'kampjun kliniku segwit bl-ghoti ta' sekwenzi
- Ir-riżultati tal-laboratorju għandhom ikunu interpretati skont l-istatus tat-tilqim
- Kriterji tal-laboratorju għal każ probabbli
 - Identifikazzjoni tal-partikuli tal-virus tal-orthopox permezz ta' EM

Kriterji Epidemjoloġiči

Għall-inqas waħda miż-żewwg rabtiet epidemjoloġiči li ġejjin:

- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem
- Esponiment fil-laboratorju (fejn hemm esponiment potenzjali għall-virus tal-Variola)

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u li jkollha għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Rabta epidemjoloġika ma' każ uman ikkonfermat bi trażmissjoni minn bniedem għal bniedem
- Kriterji tal-laboratorju li jridu jintlaħqu għal każ probabbli

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju għall-konferma tal-każ

Matul tifqigha tal-marda: kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

2.41 SIFILIDE (*Treponema pallidum*)

Kriterji Kliniči

- Sifilide primarja

Kull persuna li jkollha ulċera waħda jew aktar (normalment mingħajr uġġi) fil-parti ġenitali, perineali u anali jew fil-mukuża tal-halq jew tal-faringi jew f-parti oħra ekstraġenitali

- Sifilide sekondarja

Kull persuna li jkollha għall-inqas wahda minn dawn il-ħamsa li ġejjin:

- Raxx bi tbajja' u nafet diffuži li spiss jinvolvi l-keff tal-id u l-qiegh tas-sieq
- Limfadenopatijsa ġeneralizzata
- Condyloma lata
- Enantema
- Alopecia diffuža
- Sifilide latenti prekoċi (inqas minn sena)

Storja ta' sintomi kompatibbli ma' dawk tal-istadji bikrin tas-sifilide fi żmien it-12-il xahar preċedenti

- Sifilide latenti tardiva (aktar minn sena)

Kull persuna li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju (testijiet serologiči specifiċi)

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas wieħed mill-erba' testijiet tal-laboratorju li ġejjin:

- Dimostrazzjoni ta' *Treponema pallidum* fl-effużjoni jew fit-tessuti tal-ferita permezz ta' eżami mikroskopiku fuq sfond skur
- Dimostrazzjoni ta' *Treponema pallidum* fl-effużjoni jew fit-tessuti tal-ferita permezz ta' test DFA
- Dimostrazzjoni ta' *Treponema* fl-effużjoni jew fit-tessuti tal-ferita permezz ta' PCR
- Sejbien ta' antikorpi ta' *Treponema pallidum* permezz ta' test ta' skrining (TPHA, TPPA jew EIA) U sejbien addizzjonal ta' antikorpi Tp-IgM (permezz ta' IgM-ELISA, IgM immunoblot jew 19S-IgM-FTA-abs) – ikkonfermati bit-tieni analizi tal-IgM

Kriterji Epidemjoloġiči

- Sifilide primarja/sekondarja

Rabta epidemjoloġika bi trażmissjoni minn bniedem għal bniedem (kuntatt sesswali)

- Sifilide latenti prekoċi (inqas minn sena)

Rabta epidemjoloġika bi trażmissjoni minn bniedem għal bniedem (kuntatt sesswali) fi żmien it-12-il xahar preċedenti

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. **Każ possibbli** MA

B. **Każ probabbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. **Każ ikkonfermat**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju ghall-konferma tal-każ

2.42 SIFILIDE, KONĞENITALI u NEONATALI (*Treponema pallidum*)

Kriterji Kliniči

Kull tarbija li għandha inqas minn sentejn li jkollha mill-inqas waħda minn dawn l-ghaxra li ġejjin:

- Epatosplenomegalija
- Feriti mukuži u fil-ġilda
- Condyloma lata
- Rinite persistenti
- Suffeja
- Pseudoparalizi (minħabba perjostite u osteokondrite)
- Involviment tas-sistema nervuża centrali
- Anemija
- Sindromu nefrotiku
- Malnutriment

Kriterji tal-Laboratorju

— Kriterji tal-laboratorju ghall-konferma tal-każ

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Dimostrazzjoni ta' *Treponema pallidum* permezz ta' mikroskopija fuq sfond skur fil-kurdun taż-żokra, plaċenta, tnixxija nażali jew materjal tal-ferita fil-ġilda
- Dimostrazzjoni ta' *Treponema pallidum* permezz ta' DFA-TP fil-kurdun taż-żokra, plaċenta, tnixxija nażali jew materjal tal-ferita fil-ġilda
- Sejbien ta' *Treponema pallidum* – IgM speċifika (FTA-abs, EIA)

U test reattiv mhux treponemali (VDRL, RPR) fis-serum tat-tarbija

— Kriterji tal-laboratorju għal każ probabbli

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Riżultat tat-test VDRL-CSF reattiv
- Testijiet serloġiċi reattivi mhux treponemali u dawk treponemali fis-serum tal-omm
- It-titru tal-antikorpi mhux treponemali tat-tarbija jkun erba' darbiet aktar mit-titru tal-antikorpi fis-serum tal-omm jew akbar

Kriterji Epidemjoloġiči

Kull tarbija b'rabta epidemjoloġika bi trażmissjoni minn bniedem għal bniedem (trażmissjoni vertikali)

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. **Każ possibbli** MA

B. **Każ probabbli**

Kull tarbija jew tifel/tifla li tilhaq il-kriterji kliniči u li jkollha għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Rabta epidemjoloġika
- Kriterji tal-laboratorju li jridu jintlahqu għal każ probabbli

C. Każ ikkonfermat

Kull tarbija li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju ghall-konferma tal-każ

2.43 TETNU (*Clostridium tetani*)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha ghall-inqas tnejn minn dawn it-lieta li ġejjin:

- Kontrazzjonijiet muskolari li jikkawżaw l-ugħiġi primarjament tal-muskoli masseteri u tal-ġhonq li jwasslu għal spażmi tal-wiċċ magħrufa bħala trismu u "risus sardonicus"
- Kontrazzjonijiet muskolari li jikkawżaw l-ugħiġi tal-muskoli tat-tronk
- Spażmi ġeneralizzati, ħafna drabi l-pożizzjoni tal-opistotonu

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Iżolament ta' *Clostridium tetani* minn sit tal-infezzjoni
- Sejbien ta' tossina tat-tetanu f'kampjun tas-serum

Kriterji Epidemioloġiċi MA

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli MA

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.44 ENCEFALITE MILL-QURDIEN (virus TBE)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha sintomi ta' infjammazzjoni tas-CNS (eż. meningīte, meningoencefalite, encefalomjelite, encefaloradikulite)

Kriterji tal-Laboratorju⁽¹³⁾

- Kriterji tal-laboratorju ghall-konferma tal-każ:
- Ghall-inqas waħda minn dawn il-hamsa li ġejjin:
- IgM speċifika ta' TBE U antikorpi IgG fid-demm
- Antikorpi ta' IgM speċifika ta' TBE f'CSF
- Serokonverżjoni jew żieda b'erba' darbiet ta' antikorpi speċifici ta' TBE f'kampjuni pari tas-serum
- Sejbien ta' acidu nuklejku virali ta' TBE f'kampjun kliniku,
- Iżolament tal-virus ta' TBE minn kampjun kliniku
- Kriterji tal-Laboratorju għal każ probabbli:
- Sejbien ta' antikorpi ta' IgM speċifika ta' TBE f'kampjun wieħed tas-serum

Kriterji Epidemioloġiċi

Esponenti għal sors komuni (prodotti tal-ħalib mhux pasturizzat)

Klassifikazzjoni tal-każ

A. Każ possibbli MA

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u l-kriterji tal-laboratorju għal każ probabbli,

JEW

⁽¹³⁾ Riżultati seroloġiċi għandhom ikunu interpretati skont l-istatus tat-tilqim u esponenti preċedenti għal infezzjonijiet flavivirali. Każ-żejjiet ikkonfermati f'sitwazzjonijiet bħal dawn għandhom ikunu vvalidati b'analizi ta' newtralizzazzjoni tas-serum jew b'analizi oħrajn ekwivalenti.

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju ghall-konferma tal-każ

2.45 TOKSOPLASMOŻI, KONĞENITALI (*Toxoplasma gondii*)

Kriterji Kliniči

Mhux rilevanti għal għanijiet ta' sorveljanza

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn l-erbgha li ġejjin:

- Dimostrazzjoni ta' *Toxoplasma gondii* fit-tessuti jew fil-fluwidi tal-ġisem
- Sejbien tal-aċidu nuklejku ta' *Toxoplasma gondii* f'kampjun kliniku
- Reazzjoni specifika tal-antikorpi għal *Toxoplasma gondii* (IgM, IgG, IgA) f'tarbijsa tat-twelid
- Titri ta' IgG *Toxoplasma gondii* stabbli b'mod persistenti f'tarbijsa (ta' inqas minn 12-il xahar)

Kriterji Epidemiologici MA

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli MA

B. Każ probabbli MA

C. Każ ikkonfermat

Kull tarbijsa li tilhaq il-kriterji tal-laboratorju

2.46 TRIKINOŻI (*Trichinella spp.*)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha għall-inqas tlieta minn dawn is-sitta li ġejjin:

- Deni
- Uġiġħ fil-muskoli
- Dijarea
- Edema tal-wiċċ
- Eosinofilija
- Emorraġji subkonġuntivali, taħt id-difer u tar-retina

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Dimostrazzjoni tal-larva ta' *Trichinella* fit-tessut miksuba minn bijopsija muskolari
- Reazzjoni specifika tal-antikorpi għat-Trichinella (test IFA, ELISA jew Western Blot)

Kriterji Epidemiologici

Għall-inqas waħda miż-żewġ rabtiet epidemjoloġici li ġejjin:

- Esponiment għal ikel (laham) ikkontaminat
- Esponiment għal sors komuni

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli MA

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u l-kriterji tal-laboratorju

2.47 TUBERKOLOŽI (Kumpless tal-*Mycobacterium tuberculosis*)**Kriterji Kliniči**

Kull persuna b'dawn it-tnejn li ġejjin:

- Sinjali, sintomi u/jew sejbiet radjologiċi konsistenti ma' tuberkoloži attiva f'kull sit

U

- Deciżjoni minn tabib biex il-persuna tieħu trattament b'kors shih ta' terapija kontra t-tuberkoloži

JEW

Kaž li ġie skopert post mortem b'sejbiet patologiċi konsistenti ma' tuberkoloži attiva li seta' jindika trattament antibibiotiku kontra t-tuberkoloži li kieku l-pazjent ġie ddijanostikat qabel mewtu

Kriterji tal-Laboratorju

- Kriterji tal-laboratorju għall-konferma tal-każ

Għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Izolament tal-kumpless tal-*Mycobacterium tuberculosis* (ghajr *Mycobacterium bovis-BCG*) minn kampjun kliniku

- Sejbien tal-aċidu nuklejku tal-kumpless tal-*Mycobacterium* tat-tuberkoloži f'kampjun kliniku U mikroskopija pozittiva għal baċċili b'raba aċiduża jew baċċili b'tebgħa fluworexxenti ekwivalenti fuq mikroskopija ottika

- Kriterji tal-laboratorju għal każ probabbli

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieti li ġejjin:

- Mikroskopija għal baċċili b'raba aċiduża jew baċċili b'tebgħha fluworexxenti ekwivalenti fuq mikroskopija ottika

- Sejbien tal-aċidu nuklejku tal-kumpless tal-*Mycobacterium* tat-tuberkoloži f'kampjun kliniku

- Dehra istoloġika ta' granulomata

Kriterji Epidemiologiċi MA**Klassifikazzjoni tal-Każ****A. Każ possibbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u l-kriterji tal-laboratorju għal każ probabbli

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju għall-konferma tal-każ

2.48 TULAREMJA (*Francisella tularensis*)**Kriterji Kliniči**

Kull persuna li jkollha għall-inqas waħda mill-forom kliniči li ġejjin:

- *Tularemja ulċeroglandolari*

- Ulċera fil-ġilda

U

- Limfadenopatija regionali

- *Tularemja glandolari*

- Glandoli limfatiċi kbar u li jikkawżaw l-ugħiġi mingħajr ulċera apparenti

- *Tularemja okuloglandolari*

- Konguntivite

U

- Limfadenopatija regionali

- *Tularemja orofaringiali*

- Limfadenopatija cervikali

U ghall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Stomatite
- Faringite
- Tonsillite
- *Tularemja intestinali*

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Uġiġħ addominali
- Remettar
- Dijarea
- *Tularemja pulmonari*
- Pulmonite
- *Tularemja tat-tifojde*

Għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Deni mingħajr sinjali jew sintomi lokalizzati minn qabel
- Settiċemija

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tlieta li ġejjin:

- Iżolament ta' *Francisella tularensis* minn kampjun kliniku
- Sejbien tal-aċċidu nuklejku ta' *Francisella tularensis* f'kampjun kliniku
- Reazzjoni spċċifika tal-antikorpi għal *Francisella tularensis*

Kriterji Epidemiologiċi

Għall-inqas waħda mit-tliet rabtiet epidemiologiċi li ġejjin:

- Esponiment għal sors komuni
- Trażmissjoni minn animal għal bniedem
- Esponiment għal ikel/ilma tax-xorb ikkонтaminat

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. Każ possibbli MA

B. Każ probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemiologika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.49 DENI TAT-TIFOJDE/PARATIFOJDE (*Salmonella typhi/paratyphi*)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Bidu ta' deni sostnun
- Ghall-inqas tnejn minn dawn l-erbgha li ġejjin:
 - Uġiġħ ta' ras
 - Bradikardija relattiva
 - Sogħla mhux produktiva
 - Dijarea, stitikezza, telqa tal-ġisem jew uġiġħ addominali

Id-deni tal-paratifojde għandu l-istess sintomi bhad-deni tat-tifojde, ghalkemm normalment ikun aktar hafif

Kriterji tal-Laboratorju

- Iżolament ta' *Salmonella Typhi* jew *paratyphi* minn kampjun kliniku

Kriterji Epidemioloġici

Għall-inqas waħda mit-thiet rabtiet epidemioloġici li ġejjin:

- Esponiment għal sors komuni
- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem
- Esponiment għal ikel/ilma tax-xorb ikkонтaminat

Klassifikazzjoni tal-Każ**A. Każ possibbli MA****B. Każ probabbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemioloġika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.50 DENI EMORRĀGIKU VIRALI (VHF)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha ghall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Deni
- Manifestazzjonijiet emorraġiċi taħt forom diversi li jistgħu jwasslu għal insuffiċjenza multiorganika

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Iżolament tal-virus spċificu minn kampjun kliniku
- Sejbien tal-aċċidu nuklejku tal-virus spċificu f'kampjun kliniku u ġenotipar

Kriterji Epidemioloġici

Għall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- Ivvjaġġar matul l-ahħar 21 jum lejn reġjun fejn huwa magħruf jew mahsub li seħħew kaži ta' VHF
- Esponiment matul l-ahħar 21 jum għal każ probabbli jew ikkonfermat ta' VHF li l-bidu tiegħu kien matul l-ahħar sitt xħur

Klassifikazzjoni tal-Każ**A. Każ possibbli MA****B. Każ probabbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemioloġika

C. Każ ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

2.51 DENI TAL-PUNENT TAN-NIL (Infezzjoni virali tal-Punent tan-Nil, WNV)

Kriterji Kliniči

Kull persuna bid-deni

JEW

Għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Enċefalite
- Meningīte

Kriterji tal-Laboratorju

- Test tal-laboratorju ghall-konferma tal-każ

Għall-inqas waħda minn dawn l-erbgha li ġejjin:

- Iżolament ta' WNV mid-demm jew CSF

- Sejbien tal-aċidu nuklejku ta' WNV fid-demm jew CSF
- Reazzjoni specifika tal-antikorpi għal WNV (IgM) f'CSF
- Titru għoli ta' WNV IgM U sejbien ta' WNV IgG, U konferma permezz ta' newtralizzazzjoni
- Test tal-laboratorju għal każ probabbli
Reazzjoni specifika tal-antikorpi għal WNV fis-serum
Ir-riżultati tal-laboratorju għandhom ikunu interpretati skont l-istatus tat-tilqim kontra l-flavivirus

Kriterji Epidemiologiċi

Għall-inqas waħda miż-żewġ rabtiet epidemiologiċi li ġejjin:

- Trażmissjoni minn animal għal bniedem (li jghix, żar jew kien espost għal gdim tan-nemus f'żona fejn il-WNV hija endemika fiz-żwiemel jew fl-ghasafar)
- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem (trażmissjoni vertikali, trasfużjoni tad-demm, trapjanti)

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. **Każ possibbli** MA

B. **Każ probabbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči U li jkollha għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Rabta epidemjoloġika
- Test tal-laboratorju għal każ probabbli

C. **Każ ikkonfermat**

Kull persuna li tilhaq il-Kriterji tal-laboratorju ghall-konferma tal-każ

2.52 DENI ISFAR (Virus tad-deni isfar)

Kriterji Kliniči

Kull persuna bid-Deni

U

Għall-inqas waħda minn dawn it-tnejn li ġejjin:

- Suffejra
- Emorragija generalizzata

Kriterji tal-Laboratorju

Għall-inqas waħda minn dawn il-hamsa li ġejjin:

- Izolament tal-virus tad-deni isfar minn kampjun kliniku
- Sejbien tal-aċidu nuklejku tal-virus tad-deni isfar
- Sejbien tal-antiġen tad-deni isfar
- Reazzjoni specifika tal-antikorpi għad-deni isfar
- Dimostrazzjoni ta' feriti tipiči fistopatologija tal-fwied post mortem

Ir-riżultati tal-laboratorju għandhom ikunu interpretati skont l-istatus tat-tilqim kontra l-flavivirus

Kriterji Epidemiologiċi

Ivvjaġġar matul l-ahħar ġimgha lejn reġjun fejn huwa magħruf jew maħsub li sehhew kaži ta' deni isfar

Klassifikazzjoni tal-Każ

A. **Każ possibbli** MA

B. **Każ probabbli**

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. **Każ ikkonfermat**

Kull persuna li ma ġietx imlaqqma reċentement u li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

Fkaż ta' tilqim reċenti, persuna b'sejbien ta' razza tal-virus tad-deni isfar tat-tip naturali

2.53 JERSINJOŽI (Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis)

Kriterji Kliniči

Kull persuna li jkollha Ghall-inqas waħda minn dawn il-ħamsa li ġejjin:

- Deni
- Dijarea
- Remettar
- Uġiġħ addominali (psewdoappendiċite)
- Teneżmu

Kriterji tal-Laboratorju

- L-iżolament ta' *Yersinia enterocolitica* jew *Yersinia pseudotuberculosis* patoġenika ghall-bniedem minn kampjun kliniku

Kriterji Epidemjoloġiči

Għall-inqas waħda mill-erba' rabtiet epidemjoloġiči li ġejjin:

- Trażmissjoni minn bniedem għal bniedem
- Esponiment għal sors komuni
- Trażmissjoni minn annimal għal bniedem
- Esponiment għal ikel ikkontaminat

Klassifikazzjoni tal-Kaž

A. Kaž possibbli MA

B. Kaž probabbli

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u b'rabta epidemjoloġika

C. Kaž ikkonfermat

Kull persuna li tilhaq il-kriterji kliniči u tal-laboratorju

3. DEFINIZZJONIJIET TAL-KAŻI TA' KWISTJONIJIET SPEċJALI TA' SAHHA

3.1 DEFINIZZJONI ĠENERALI TAL-KAŻI TA' INFEZZJONI NOŽOKOMJALI (JEW "INFEZZJONI ASSOĊJATA MAL-KURA TAS-SAHHA")

Infezzjoni nožokomjali assoċjata ma' permanenza attwali fi sptar hija ddefinita bħala infezzjoni li taqbel ma' waħda mid-definizzjonijiet tal-kaži U

- il-bidu tas-sintomi jkun fit-tielet jum jew wara (jum tad-dħul = l-ewwel jum) tad-dħul attwali fi sptar JEW
- il-pazjent ikun operat fl-ewwel jum jew fit-tieni jum u jiżviluppa sintomi ta' Infezzjoni ta' Sit Kirurġiku qabel it-tielet jum JEW
- apparat invaživ jitqiegħed fl-ewwel jum jew fit-tieni jum li jirriżulta f'HAI qabel it-tielet jum

Infezzjoni nožokomjali assoċjata ma' waqfa preċedenti fi sptar hija ddefinita bħala infezzjoni li taqbel ma' wahda mid-definizzjonijiet tal-kaži

U

- il-pazjent jisfa b'infezzjoni iżda jerġa' jiddahħal f'anqas minn jumejn wara dħul preċedenti fi sptar ta' kura akuta

JEW

- il-pazjent ikun iddahħal b'infezzjoni li tissodisfa d-definizzjoni tal-kaži ta' Infezzjoni ta' Sit Kirurġiku (SSI), jiġifieri l-SSI tkun seħħet fi żmien 30 jum mill-operazzjoni (jew fil-kaž ta' kirurġija li tinvolvi impjant kienet SSI fonda jew ta' organu/spażju li tkun żviluppat fi żmien sena mill-operazzjoni) u l-pazjent ikollu sintomi skont id-definizzjoni tal-kaž u/jew ikun fuq trattament antimikrobiku għal dik l-infezzjoni

JEW

- il-pazjent ikun iddahħal (jew jiżviluppa sintomi fi żmien jumejn) b'infezzjoni ta' *Clostridium difficile* f'anqas minn 28 jum minn rilaxx preċedenti minn sptar ta' kura akuta.

Għall-fini ta' sħarrig ta' prevalenza ta' punti, infezzjoni nožoknjali attiva li jkun hemm fil-jum tal-istħarrig hija ddefinita bhala infezzjoni li għaliha jkun hemm sinjal u sintomi tal-infezzjoni fid-data tal-istħarrig jew li kien hemm sinjal u sintomi tagħha fil-passat u l-pazjent ikun (għadu) qed jirċievi trattament għal dik l-infezzjoni fid-data tal-istħarrig. Il-preżenza ta' sintomi u sinjal għandha tkun ivverifikata sal-bidu tat-trattament biex ikun iddeterminat jekk l-infezzjoni ttrattata tkunx taqbel ma' waħda mid-definizzjonijiet tal-kaži ta' infezzjoni nožoknjali.

3.1.1 BJ: INFEZZJONI TAL-GHADAM U L-ĞOGI

BJ-BONE: Osteomelite

L-osteomelite għandha tilhaq għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn għadam
- Il-pazjent ikollu evidenza ta' osteomelite b'eżami dirett tal-ġħadam matul operazzjoni kirurġika jew eżami istopatoloġiku
- Il-pazjent ikollu għall-inqas tnejn mis-sinjal jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), nefha lokalizzata, irtubija, shana, jew skulatura f'sit suspettuż ta' infezzjoni tal-ġħadam

U għall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- organiżmi kkoltivati mid-demm
- test požittiv tal-antiġen tad-demm (eż. *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus Pneumoniae*)
- evidenza radjografika ta' infezzjoni (eż. sejbiet anormali b'X-ray, CT scan, MRI, scan b'marka radioattiva [gallju, teknezju, eċċ.]).

Innotta l-istruzzjoni dwar rapportar:

Irrapporta l-medjastinute wara kirurgija kardijaka li tkun akkumpanjata minn osteomelite bħala infezzjoni ta' sit kirurġiku-orgānu/spażju (SSI-O).

BJ-JNT: Ġog jew bursa

Infezzjonijiet tal-ġġogi jew tal-bursae għandhom jilhqu għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn fluwidu tal-ġġogi jew bijopsja sinovjali
- Il-pazjent ikollu evidenza ta' infezzjoni tal-ġġogi jew tal-bursae li tidher matul operazzjoni kirurġika jew eżami istopatoloġiku
- Il-pazjent ikollu għall-inqas tnejn mis-sinjal jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: uġiġi fil-ġġogi, nefha, irtubija, shana, evidenza ta' effużjoni jew limitazzjoni tal-moviment

U għall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- organiżmi u ċelluli tad-demm bojod li jidhru fuq tebħha Gram ta' fluwidu tal-ġġogi
- test požittiv tal-antiġen fuq demm, awrina jew fluwidu tal-ġġogi
- profil ċellulari u kimiki ta' fluwidu tal-ġġogi kompatibbli ma' infezzjoni u mhux spjegabbli b'diżordni rewmatologiku fil-baži
- evidenza radjografika ta' infezzjoni (eż. sejbiet anormali b'X-ray, CT scan, MRI, scan b'marka radioattiva [gallju, teknezju, eċċ.])

BJ-DISC: Infezzjoni fl-ispazju tad-diska

L-infezzjoni fl-ispazju ta' diskা vertebrali għandu jilhaq għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn tessut mill-ispazju ta' diskă vertebrali miksub matul operazzjoni kirurġika jew aspirazzjoni bil-labru
- Il-pazjent ikollu evidenza ta' infezzjoni fl-ispazju ta' diskă vertebrali li tidher matul operazzjoni kirurġika jew eżami istopatoloġiku
- Il-pazjent ikollu d-deni ($> 38^{\circ}\text{C}$) b'ebda kawża oħra magħrufa jew uġiġi fl-ispazju tad-diska vertebrali involut
- U evidenza radjografika ta' infezzjoni, (eż. sejbiet anormali b'X-ray, CT scan, MRI, scan b'marka radioattiva [gallju, teknezju, eċċ.]).

Pazjent ikollu d-deni ($> 38^{\circ}\text{C}$) b'ebda kawża oħra magħrufa u uġiġi fl-ispazju tad-diska vertebrali involut

- U test pozittiv tal-antiġen fuq demm jew awrina (eż. *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus Pneumoniae*, *Neisseria meningitidis*, jew *Streptococcus* ta' Grupp B).

3.1.2 BSI: INFEZZJONI TAL-FLUSS TAD-DEMM FIL-ĞISEM

BSI: Infezzjoni tal-fluss tad-demmi fil-ġisem ikkonfermata mil-laboratorju

Koltivazzjoni požittiva wahda tad-demmi għal patoġen magħruf

JEW

Il-pazjent ikollu għall-inqas wieħed minn dawn is-sinjalji jew sintomi li ġejjin: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), riħ qawwi, jew pressjoni għolja

U żewġ koltivazzjonijiet požittivi ta' demm għal kontaminant komuni tal-ġilda (minn żewġ kampjuni separati ta' demm, is-soltu fi żmien 48 siegħa)

Kontaminanti tal-ġilda = stafilokokki koagulaži-negattivi, *Micrococcus* spp., *Propionibacterium acnes*, *Bacillus* spp., *Corynebacterium* spp.

Sors ta' infezzjoni tal-fluss tad-demmi fil-ġisem:

- Relatav ma' kateter: l-istess mikroorganizmu kien ikkoltivat mill-kateter jew sintomi jitjiebu fi żmien 48 siegħa wara t-tnejħha tal-kateter (C-PVC: kateter periferali, C-CVC: kateter centrali venuż (nota: irrapporta C-CVC jew C-PVC BSI bhala CRI3-CVC jew CRI3-PVC rispettivament jekk il-mikrobijologija tkun ikkonfermata, ara d-definizzjoni CRI3)).
- Sekondarju għal infezzjoni oħra: l-istess mikroorganizmu kien iżolat minn sit ieħor ta' infezzjoni jew tkun teżisti evidenza klinika qawwija li l-infezzjoni tal-fluss tad-demmi fil-ġisem kienet sekondarja għal sit ieħor ta' infezzjoni, proċedura invażiva dijanostika jew korp barrani
 - Pulmonari (S-PUL)
 - Infezzjoni tal-passaġġ tal-awrina (S-UTI)
 - Infezzjoni tal-passaġġ digestiv (S-DIG)
 - SSI (S-SSI): infezzjoni ta' sit kirurġiku
 - Ģilda u tessut artab (S-SST)
 - Oħrajn (S-OTH)
- Oriġini mhux magħrufa (UO): Xejn minn ta' hawn fuq, infezzjoni tal-fluss tad-demmi fil-ġisem ta' oriġini mhux magħrufa (ivverifikata matul stħarrig u ma nstab ebda sors)
- Mhux magħruf (UNK): M'hemm ebda informazzjoni dwar is-sors tal-infezzjoni tal-fluss tad-demmi fil-ġisem jew dwar informazzjoni nieqsa

3.1.3 CNS: INFEZZJONI TAS-SISTEMA NERVUŻA ĊENTRALI

CNS-IC: Infezzjoni intrakraniali (axxess tal-mohħ, infezzjoni subdurali jew epidurali, enċefalite)

Infezzjoni intrakraniali għandha tilhaq għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn tessut tal-mohħ jew dura
- Il-pazjent ikollu axxess jew evidenza ta' infezzjoni intrakraniali li tidher matul operazzjoni kirurġika jew eżami istopatoloġiku
- Il-pazjent ikollu għall-inqas tnejn mis-sinjalji jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: ugiġi ta' ras, sturdament, deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), sinjalji newroloġici li jillokalizzaw, livell jinbidel ta' kuxjenza, jew konfużjoni

U għall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- organiżmi li jidħru f-eżami mikroskopiku ta' tessut tal-mohħ jew axxess miksubin b'aspirazzjoni bil-labra jew b'bijopsja matul operazzjoni kirurġika jew awtopsja
- test požittiv tal-antiġen fuq demm jew awrina
- evidenza radjografika ta' infezzjoni, (eż. sejbiet anomalji bl-ultrasound, CT scan, MRI, scan tal-mohħ b'raddjunuklide, jew arteriogram)
- titru ta' antikorp wieħed dijanostiku (IgM) jew żieda b'erba' darbiet f'seri pari (IgG) għal patoġen

U jekk issir dijanjoži *antemortem*, it-tabib jibda terapija antimikrobika xierqa.

Innota l-istruzzjoni dwar rapportar:

Jekk ikun hemm il-meningħejte u axxess tal-mohh flimkien, irrapporta l-infezzjoni bhala IC

CNS-MEN: Meningħite jew ventrikulite

Il-meningħejte jew il-ventrikulite għandhom jilħqu għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn fluwidu ċerebrospinali (CSF)
- Il-pazjent ikollu għall-inqas wieħed minn dawn is-sinjalji jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), uġiġi ta' ras, għonq iebes, sinjalji ta' meningħi, sinjalji ta' nervi kranjali, jew irritabbiltà

U għall-inqas wahda minn dawn li ġejjin:

- żieda fċelluli bojod, proteina elevata, u/jew glukożju anqas f'CSF
- organiżmi li jidhru fuq tebgħha Gram ta' CSF
- organiżmi kkoltivati mid-demmm
- test požittiv tal-antiġen ta' CSF, demmm, jew awrina
- titru ta' antikorp wieħed dijanostiku (IgM) jew żieda b'erba' darbiet f'seri pari (IgG) għal patoġen

U jekk issir dijanjoži *antemortem*, tabib jibda terapija antimikrobika xierqa.

Innota l-istruzzjonijiet dwar rapportar

- Irrapporta infezzjoni ta' passaġġ alternattiv għaċ-ċirkolazzjoni tad-demm (shunt) tas-CSF bhala SSI jekk isseħħi l-sena minn meta jkun tqiegħed; jekk aktar tard jew wara manipulazzjoni tal-passaġġ alternattiv għaċ-ċirkolazzjoni tad-demm jew aċċess għaliex, irrapporta bhala CNS-MEN
- Irrapporta meningoencfalite bhala MEN
- Irrapporta axxess spinali bil-meningħite bhala MEN

CNS-SA: axxess spinali mingħajr meningħite

Axxess tal-ispażju tal-epidurali jew subdurali spinali, mingħajr ma jkollhom x'jaqsmu l-fluwidu ċerebrospinali jew l-istruzzuri tal-ghadlu ta' mal-ġenb, għandu jilħaq għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn axxess fl-ispażju epidurali jew subdurali spinali
- Il-pazjent ikollu axxess fl-ispażju epidurali jew subdurali spinali li jidher matul operazzjoni kirurgika jew waqt awtropsja jew ikun hemm evidenza ta' axxess li jidher matul eż-żami istopatologiku
- Il-pazjent ikollu għall-inqas wieħed minn dawn is-sinjalji jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), uġiġi tad-dahar, irtubija fokali, radikulite, parapareżi, jew paraplegja

U għall-inqas wahda minn dawn li ġejjin:

- organiżmi kkoltivati mid-demmm
- evidenza radjografika ta' axxess spinali (eż. sejbiet anormali f'majlografija, ultrasound, CT scan, MRI, jew scans oħra [għallju, tekneżju, eċċi,])

U jekk issir dijanjoži *antemortem*, tabib jibda terapija antimikrobika xierqa

Innota l-istruzzjonijiet dwar rapportar

Irrapporta axxess spinali bil-meningħite bhala meningħite (CNS-MEN)

3.1.4 CRI: INFEZZJONI RELATATA MA' KATERER⁽¹⁴⁾**CRI1-CVC: Infezzjoni lokali relatata ma' CVC (ebda koltivazzjoni pozittiva tad-demm)**

- koltivazzjoni kwantitattiva ta' CVC ≥ 103 CFU/ml jew semikoltivazzjoni kwantitattiva ta' CVC > 15 CFU
- U materja/infjammazzjoni fis-sit ta' inserzjoni jew mina

CRI1-PVC: Infezzjoni lokali relatata ma' PVC (ebda koltivazzjoni pozittiva tad-demm)

- koltivazzjoni kwantitattiva ta' PVC ≥ 103 CFU/ml jew semikoltivazzjoni kwantitattiva ta' PVC > 15 CFU
- U materja/infjammazzjoni fis-sit ta' inserzjoni jew mina

CRI2-CVC: Infezzjoni ġenerali relatata ma' CVC (ebda koltivazzjoni pozittiva tad-demm)

- koltivazzjoni kwantitattiva ta' CVC ≥ 103 CFU/ml jew semikoltivazzjoni kwantitattiva ta' CVC > 15 CFU
- U sinjal kliniči jitjiebu fi żmien 48 siegħa wara t-tneħħija tal-kateter

CRI2-PVC: Infezzjoni ġenerali relatata ma' PVC (ebda koltivazzjoni pozittiva tad-demm)

- koltivazzjoni kwantitattiva ta' PVC ≥ 103 CFU/ml jew semikoltivazzjoni kwantitattiva ta' PVC > 15 CFU
- U sinjal kliniči jitjiebu fi żmien 48 siegħa wara t-tneħħija tal-kateter

CRI3-CVC: infezzjoni tal-fluss tad-demm fil-ġisem relatata ma' CVC kkonfermata mikrobijologikament

- BSI li sseħħ 48 siegħa qabel jew wara t-tneħħija tal-kateter

U koltivazzjoni pozittiva bl-istess mikroorganizmu ta':

- koltivazzjoni kwantitattiva ta' CVC ≥ 103 CFU/ml jew semikoltivazzjoni kwantitattiva ta' CVC > 15 CFU jew
- kampjun tad-demm CVC/kampjun tad-demm periferali > 5 ta' proporzjon ta' koltivazzjoni kwantitattiva tad-demm jew
- dewmien divrenzjali ta' koltivazzjonijiet pozittivi tad-demm: koltivazzjonijiet ta' kampjun tad-demm ta' CVC pozittiv sagħejn jew aktar qabel koltivazzjonijiet periferali tad-demm (kampjuni tad-demm meħudin fl-istess hin) jew
- koltivazzjoni pozittiva bl-istess mikroorganizmu minn materja minn sit ta' inserzjoni

CRI3-PVC: infezzjoni tal-fluss tad-demm fil-ġisem relatata ma' PVC ikkonfermata mikrobijologikament

- BSI li sseħħ 48 siegħa qabel jew wara t-tneħħija tal-katerer

U koltivazzjoni pozittiva bl-istess mikroorganizmu ta':

- koltivazzjoni kwantitattiva ta' PVC ≥ 103 CFU/ml jew semikoltivazzjoni kwantitattiva ta' PVC > 15 CFU jew
- koltivazzjoni pozittiva bl-istess mikroorganizmu minn materja minn sit ta' inserzjoni

3.1.5 CVS: INFEZZJONI TAS-SISTEMA KARDJOVASKULARI

CVS-VASC: Infezzjoni arterjali jew venuža

Infezzjoni arterjali jew venuža għandha tilhaq għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn arterji jew vini mnejħha matul operazzjoni kirurgika
- U koltivazzjoni tad-demm li ma tkunx saret jew ebda organiżmu kkoltivat mid-demm
- Il-pazjent ikollu evidenza ta' infezzjoni arterjali jew venuža li tidher matul operazzjoni kirurgika jew eżami istopatoloġiku
- Il-pazjent ikollu ghall-inqas wieħed minn dawn is-sinjal jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża ohra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), uġigh, eritema, jew shana fis-sit vaskulari involut
- U aktar minn 15-il kolonna kkoltivati minn ponta ta' kannula intravaskulari bl-użu tal-metodu ta' koltivazzjoni semikwantitattiva

⁽¹⁴⁾ CVC = kateter vaskulari centrali, PVC = kateter vaskulari periferal kolonizzazzjoni ta' kateter vaskulari centrali m'għandhiex tkun irrapportata. CRI3 (-CVC or -PVC) hija wkoll infezzjoni tal-fluss tad-demm fil-ġisem b'sors ta' C-CVC jew C-PVC rispettivament; iż-żda meta CRI3 tkun irrapportata, il-BSI m'għandhiex tkun irrapportata fl-istħarrig tal-prevalenza tal-punti; BSI relatata ma' kateter ikkonfermata mikrobijologikament għandha tkun irrapportata bhala CRI3

- U koltivazzjoni tad-demm li ma tkunx saret jew ebda organiżmu kkoltivat mid-demm
- Il-pazjent ikollu skulatura purulenti fis-sit vaskulari involut
- U koltivazzjoni tad-demm li ma tkunx saret jew ebda organiżmu kkoltivat mid-demm

Innota l-istruzzjonijiet dwar rapportar

Irrapporta infelizzjonijiet ta' tilqim arterjovenuž, passaġġ alternattiv għaċ-ċirkolazzjoni tad-demm, jew fistula jew sit ta' kannulazzjoni intravaskulari mingħajr organiżmi kkoltivati mid-demm bhala CVS-VASC

CVS-ENDO: Endokardite

Endokardite ta' valv naturali jew prostetiku tal-qalb għandha tilhaq ghall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn valv jew veġetazzjoni
- Il-pazjent ikollu tnejn jew aktar mis-sinjali u sintomi li ġejjin b'ebda kawża ohra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), murmurju ġdid jew jinbidel, fenomena embolika, manifestazzjonijiet tal-ġilda (eż. tbenġil, emorraġiji separati, għoqod taht il-ġilda jweġġgħu), attakk tal-qalb konġestiv, jew anomalija ta' kondizzjoni kardijaka

U ghall-inqas wahda minn dawn li ġejjin:

- organiżmi kkoltivati minn tnejn jew aktar koltivazzjonijiet tad-demm
- organiżmi li jidħru fuq tebħha Gram ta' valv meta l-koltivazzjoni tkun negattiva jew ma tkunx saret
- veġetazzjoni valvulari li tidher matul operazzjoni kirurġika jew awtopsja
- test pozittiv tal-antiġen fuq demm jew awrina (eż. *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis*, jew *Streptococcus* ta' Grupp B)
- evidenza ta' veġetazzjoni ġidda li tidher fuq ekokardjogramma

U jekk issir dijanjozi *antemortem*, tabib jibda terapija antimikrobika xierqa

CVS-CARD: Mijokardite jew perikardite

Il-mijokardite jew il-perikardite għandhom jilħqu ghall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn tessut perikardju jew fluwidu miksub b'aspirazzjoni bil-labba jew matul operazzjoni kirurġika
- Il-pazjent ikollu ghall-inqas tnejn mis-sinjali jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża ohra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), uġiġi fis-sider, polz paradossal, jew daqs tal-qalb akbar

U ghall-inqas wahda minn dawn li ġejjin:

- EKG anormali konsistenti ma' mijokardite jew perikardite
- test pozittiv tal-antiġen fuq demm (eż. *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus Pneumoniae*)
- evidenza ta' mijokardite jew perikardite fuq eżami istologiku ta' tessut tal-qalb
- żieda b'erba' darbiet fantikorp spċificu għal tip b'iżolament jew mingħajru ta' virus mill-falanġi jew mill-feċi
- effużjoni perikardjali identifikata b'ekokardjogramma, CT scan, MRI, jew angjografija

CVS-MED: Medjastinite

Il-medjastinite għandha tilhaq ghall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn tessut medjastinali jew fluwidu miksub minn operazzjoni kirurġika jew aspirazzjoni bil-labba
- Il-pazjent ikollu evidenza ta' medjastinite li tidher matul operazzjoni kirurġika jew eżami istopatologiku
- Il-pazjent ikollu ghall-inqas wieħed minn dawn is-sinjali jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża ohra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), uġiġi fis-sider, jew instabbiltà sternali

U ghall-inqas wahda minn dawn li ġejjin:

- rilaxx purulenti minn parti medjastinali
- organiżmi kkoltivati mid-demm jew rilaxx minn parti medjastinali

- twessigh medjastinali b'X-ray

Innota l-istruzzjonijiet dwar rapportar

Irrapporta medjastinite wara kirurgija kardijaka li tkun akkumpanjata minn osteomjelite bhala SSI-O

3.1.6 EENT: INFEZZJONI TAL-GHAJN, WIDNA, IMNIEħER, GERŻUMA, JEW HALQ

EENT-CONJ: Konġuntivite

Konġuntivite għandha tilhaq ghall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu patoġeni kkoltivati minn effużjoni purulent i-miksuba mill-konġuntiva jew minn tessuti kontigwi, bhal tebqet il-ghajn, kornea, glandoli tal-Mejbomju, jew glandoli tad-dmugħ
- Il-pazjent ikollu wżejh jew hmura tal-konġuntiva jew madwar l-ghajn

U ghall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- WBCs u organiżmi li jidhru fuq tebgħa Gram ta' effużjonijiet
- Effużjonijiet purulent
- test pożittiv tal-antiġen (eż. ELISA jew IF għal *Chlamydia trachomatis*, virus ta' herpes simplex, adenovirus) fuq fdal effużjonali jew konġuntivali
- ċelluli ġganti b'hafna nuklei li jidhru feżami mikroskopiku ta' effużjoni konġuntivali jew ta' fdalijiet
- koltivazzjoni pożittiva virali
- titru ta' antikorp wieħed dijanostiku (IgM) jew žieda b'erba' darbiet f'seri pari (IgG) għal patogen

Innota l-istruzzjonijiet dwar rapportar

- Irrapporta infelizzjonijiet oħra tal-ghajn bhala EYE

- Tirrapportax konġuntivite kimika kkawżata minn nitrat tal-fidda (AgNO_3) bhala infelizzjoni assoċjata ma' kura tas-sahħha
- Tirrapportax konġuntivite li sseħħi bhala parti minn marda virali mxerrda aktar fil-wisa' (bħal hożba, ġidri r-riħ, jew URI)

EENT-EYE: Ghajn, minbarra konġuntivite

Infelizzjoni tal-ghajn, minbarra konġuntivite, għandha tilhaq ghall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn kavità anterjuri jew posterjuri jew minn fluwidu trasparenti
- Il-pazjent ikollu ghall-inqas tnejn mis-sinjali jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: ghajn tuġa', disturb viżwali, jew ipopjun

U ghall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- dijanjozi ta' tabib ta' infelizzjoni ta' ghajn
- test pożittiv tal-antiġen fuq demm (eż. *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus Pneumoniae*)
- organiżmi kkoltivati mid-demm

EENT-EAR: Mastoħde tal-widna

Infelizzjonijiet tal-widna u tal-mastoħde għandhom jilhqu ghall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

Otite esterna għandha tilhaq ghall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu patoġeni kkoltivati minn skulatura purulent mill-kanal tal-widna
- Il-pazjent ikollu ghall-inqas wieħed minn dawn is-sinjali jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), uġiġi, hmura, jew skulatura mill-kanal tal-widna
- U organiżmi li jidhru fuq tebgħa Gram ta' skulatura purulenti

Otite medja għandha tilhaq ghall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn fluwidu min-nofs tal-widna i-miksuba minn timpanoċentesi jew waqt operazzjoni kirurgika
- Il-pazjent ikollu ghall-inqas tnejn mis-sinjali jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), uġiġi fit-tanbur tal-widna, infjammazzjoni, ritrattazzjoni jew mobilità mnaqqsa tat-tanbur tal-widna, jew fluwidu wara t-tanbur tal-widna

Otite interna għandha tilhaq għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn fluwidu fil-widna ta' ġewwa miksub waqt operazzjoni kirurgika
- Il-pazjent ikollu dijanjozi ta' tabib ta' infelazzjoni fil-widna ta' ġewwa

Mastoidite għandha tilhaq għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn skulatura purulent minn mastoje
- Il-pazjent ikollu għall-inqas tnejn mis-sinjali jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), uġiġi, irtubija, eritema, uġiġi ta' ras, jew paralizi tal-wiċċ

U għall-inqas wahda minn dawn li ġejjin:

- organiżmi li jidhru fuq tebgħa Gram ta' materjal purulent minn mastoje
- test požittiv tal-antiġen fuq demm

EENT-ORAL: Kavità orali (halq, ilsiem, jew hniek)

Infezzjonijiet tal-kavità orali għandhom jilhqu għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn materjal purulent minn tessuti ta' kavità orali
- Il-pazjent ikollu axxess jew evidenza oħra ta' infelazzjoni ta' kavità orali li tidher feżżami dirett, matul operazzjoni kirurgika, jew matul eżami istopatologiku
- Il-pazjent ikollu ghall-inqas wieħed minn dawn is-sinjali jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: axxess, ulċerazzjoni, jew irraqja' bojod imqabbżin fuq mukuža infammata, jew plakek fuq mukuža orali

U għall-inqas wahda minn dawn li ġejjin:

- organiżmi li jidhru fuq tebgħa Gram
- tebgħa KOH požittiva (idrossidu)
- ċelluli ġġanti b'hafna nuklei li jidhru feżżami mikroskopiku ta' fdalijiet mukuži
- test požittiv tal-antiġen fuq tnixxijiet orali
- titru ta' antikorp wieħed dijanostiku (IgM) jew žieda b'erba' darbiet f'seri pari (IgG) għal patogen
- dijanjozi ta' tabib ta' infelazzjoni u trattament b'terapija topikali jew orali kontra l-fungi

Innota l-istruzzjonijiet dwar rapportar

Irrapporta infelazzjoni primarji ta' herpes simplex tal-kavità orali assoċjati mal-kura tas-sahha bhala ORAL; infelazzjoni herpes li jirrikorru mhumiex assoċjati ma' kura tas-sahha

EENT-SINU: Sinužite

Sinužite għandha tilhaq għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn materjal purulent miksub minn kavità tas-sinus
- Il-pazjent ikollu ghall-inqas wieħed minn dawn is-sinjali jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), uġiġi jew irtubija mferxa fuq is-sinus involut, uġiġi ta' ras, effuzjoni purulent, jew imblukkar nażali

U għall-inqas wahda minn dawn li ġejjin:

- Tranżilluminazzjoni požittiva
- Eżami radjografiku požittiv (inkluż CT scan)

EENT-UR: Passaġġ ta' fuq tan-nifs, farinġite, laringite, epiglottite

Infezzjonijiet tal-passaġġ ta' fuq tan-nifs għandhom jilhqu għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu għall-inqas tnejn mis-sinjali jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), eritema tal-falangi, uġiġi fil-gerżuma, sogħla, hanqa, jew effużjoni purulent fil-gerżuma

U għall-inqas wahda minn dawn li ġejjin:

- organiżmi kkoltivati mis-sit specifiku
- organiżmi kkoltivati mid-demm
- test požittiv tal-antiġen fuq demm jew tnixxijiet respiratorji
- titru ta' antikorp wieħed dijanostiku (IgM) jew žieda b'erba' darbiet f'seri pari (IgG) għal patogen

- dijanjozi ta' tabib ta' infezzjoni tal-passaġġ ta' fuq tan-nifs

Il-pazjent ikollu axxess li jidher feżami dirett, matul operazzjoni kirurgika, jew matul eżami istopatoloġiku

3.1.7 GI: INFEZZJONI TAS-SISTEMA GASTROINTESTINALI

GI-CDI: Infezzjoni tal-*Clostridium difficile*

Infezzjoni tal-*Clostridium difficile* (li r-referenza għaliha qabel kienet ta' dijarea assoczjata tal-*Clostridium difficile* jew CDAD) għandha tilhaq għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Ippurgar b'dijarea jew megakolon tossiku, u analizi tal-laboratorju požittiva għal tossina A u/jew B tal-*Clostridium difficile* fl-ippurgar
- Kolite psewdomembrana murija b'endoskopija gastrointestinali ta' taħt
- Istopatoloġija tal-kolon karatteristika tal-infezzjoni tal-*Clostridium difficile* (b'dijarea jew mingħajrha) fuq kampjun miksib minn endoskopija, kolektomija jew awtropsja

GI-GE: Gastroenterite (CDI eskuża)

Gastroenterite għandha tilhaq għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu biđu akut ta' dijarea (ippurgar likwidu għal aktar minn 12-il siegħa) b'remettar jew mingħajru jew deni ($> 38^{\circ}\text{C}$) u x'aktarx mingħajr kawża mhux infettiva (eż. testijiet dijanostici, dieta terapewtika minbarra aġenti antimikrobiċi, agravar akut ta' kondizzjoni kronika, jew tensjoni psikoloġika)
- Il-pazjent ikollu għall-inqas tnejn mis-sinjali jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: nawżea, remettar, uġiġi addominali, deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), jew uġiġi ta' ras

U għall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- patoġen enteriku li jkun ikkoltivat mill-ippurgar jew minn kampjun tar-rektum
- patoġen enteriku li jinstab b'mikroskopija ta' rutina jew tal-elettroni
- patoġen enteriku li jinstab b'analizi ta' antiġen jew ta' antikorp fuq demm jew feċi
- evidenza ta' patoġen enteriku li tinstab b'tibdiliet čitopatiċi fkoltivazzjoni ta' tessuti (analizi ta' tossina)
- titru ta' antikorp wieħed dijanostiku (IgM) jew žieda b'erba' darbiet f'seri pari (IgG) għal patoġen

GI-GIT: Passaġġ gastrointestinali (l-esofagu, l-istonku, il-musrana l-kbira u ż-żgħira, u r-rektum) eskuži l-gastroenterite u l-appendiċite

Infezzjoni tal-passaġġi gastrointestinali, eskuži l-gastroenterite u l-appendiċite, għandha tilhaq għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu axxess jew evidenza oħra ta' infezzjoni li tidher matul operazzjoni kirurgika jew eżami istopatoloġiku
- Il-pazjent ikollu għall-inqas tnejn mis-sinjali jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa u kompatibbli ma' infezzjoni tal-organu jew tat-tessut involuti: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), nawżea, remettar, uġiġi addominali, jew irtubija

U għall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- organiżmi kkoltivati minn skulatura jew tessut miksib minn operazzjoni kirurgika jew endoskopija jew minn drejn imiqiegħed b'operazzjoni kirurgika
- organiżmi li jidhru fuq tebgħa Gram jew KOH jew ċelluli ġġanti b'hafna nuklei li jidhru feżami mikroskopiku ta' skulatura jew tessut miksib minn operazzjoni kirurgika jew endoskopija jew minn drejn imiqiegħed b'operazzjoni kirurgika
- organiżmi kkoltivati mid-demm
- evidenza ta' sejbiet patoloġiči feżami radjografiku
- evidenza ta' sejbiet patoloġiči feżami endoskopiku (eż. esopaġite jew proktite ta' *Candida spp.*)

GI-HEP: Epatite

l-epatite għandha tilhaq il-kriterju li ġej:

Il-pazjent ikollu għall-inqas tnejn mis-sinjali jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), anoreksja, nawżea, remettar, uġiġ addominali, suffeja, jew storja ta' trasfużjoni tul it-tliet xhur preċedenti

U għall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- antigen pozittiv jew test għal antikorp għall-epatite A, l-epatite B, l-epatite C, jew epatite delta
- testijiet għal funzjoni anormali tal-fwied (eż. ALT/AST elevati, bilirubin)
- čitomegalovirus (CMV) misjud fl-awrina jew fi tnixxijiet orofaringi

Innotta l-istruzzjonijiet dwar rapportar

- Tirrapportax epatite jew suffeja ta' oriġini mhux infettiva (deficjenza antitrypsin alpha-1, eċċ.)
- Tirrapportax epatite jew suffeja li tkun ġejja minn esponenti għal epatotossini (epatite alkoholika jew miġjuba bl-aċetaminofen, eċċ.)
- Tirrapportax epatite jew suffeja li jiġu minn imblukkar biljari (koleċistite)

GI-IAB: Intraaddominali, mhux speċifikat band'oħra, inkużi l-bużżeeqa tal-marrara, kanali tal-bili, il-fwied (eskużha l-epatite virali), il-milsa, il-frixa, il-peritonew, l-ispażju subfreniku jew subdijaframmatiku, jew tessut intraaddominali iehor jew parti mhux speċifikata band'oħra

Infezzjonijiet intraaddominali għandhom jilhqu għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organizmi kkoltivati minn materjal purulent minn spazju intraaddominali miksub minn operazzjoni kirurgika jew aspirazzjoni bil-labru
- Il-pazjent ikollu axxess jew evidenza oħra ta' infezzjoni intraaddominali li tidher matul operazzjoni kirurgika jew eżami istopatologiku
- Il-pazjent ikollu għall-inqas tnejn mis-sinjali jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), nawżea, remettar, uġiġ addominali, jew suffeja

U għall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- organizmi kkoltivati minn skulatura minn drejn imqiegħed b'operazzjoni kirurgika (eż. sistema ta' skulatura bi rdigh magħluu, drejn miftugh, drejn għamlu ta' T)
- organizmi li jidhru fuq tebgħha Gram ta' skulatura jew tessut miksuba minn operazzjoni kirurgika jew aspirazzjoni bil-labru
- organizmi kkoltivati mid-demmu u evidenza radjografika ta' infezzjoni (eż. sejbiet anormali bl-ultrasound, CT scan, MRI, jew scans b'marka radioattiva [gallju, teknezju, eċċ.] jew b'X-ray addominali)

Innotta l-istruzzjonijiet dwar rapportar

Tirrapportax pankreatite (sindromu li jidu infjammazzjoni kkaratterizzata minn uġiġ addominali, nawżea, u remettar assoċjat ma' livelli ġħoljien ta' serum ta' enzimi tal-frixa) ħlief jekk ikun stabbilit li tkun infettiva fl-oriġini

3.1.8 LRI: INFEZZJONI TAL-PASSAGġ TA' ISFEL TAN-NIFS, MINBARRA PULMONITE

LRI-BRON: Bronkite, trakeobronkite, bronkijolite, trakeite, mingħajr evidenza ta' pulmonite

Infezzjonijiet trakeobronkjal għandhom jilhqu għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

Il-pazjent ma jkollux evidenza klinika jew radjografika ta' pulmonite

U l-pazjent ikollu għall-inqas tnejn mis-sinjali jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), soġħla, produzzjoni ġidida jew miżjuda ta' bżżeq, rhonchi, tharhir

U għall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- koltivazzjoni požittiva miksuba minn aspirat fil-fond tat-trakea jew bi bronkoskopija
- test požittiv tal-antiġen fuq tnixxijiet respiratorji

Innota l-istruzzjonijiet dwar rapportar

Tirrapportax bronkite kronika fpazjent b'marda kronika tal-pulmun bhala infezzjoni hlief jekk ikun hemm evidenza ta' infezzjoni sekondarja akuta, murija b'bidla fl-organizmu

LRI-LUNG: Infezzjonijiet oħra tal-passaġġ ta' isfel tan-nifs

Infezzjonijiet oħra tal-passaġġ ta' isfel tan-nifs għandhom jilħqu għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi li jidhru fuq tiċpisa jew ikkoltivati minn tessut tal-pulmun jew fluwidu, inkluż fluwidu tal-plewra
- Il-pazjent ikollu axxess tal-pulmun jew materja fil-plewra (*empyema*) li jidhru matul operazzjoni kirurġika jew eżami istopatologiku
- Il-pazjent ikollu kavità ta' axxess li tidher feżami radjografiku tal-pulmun

Innota l-istruzzjonijiet dwar rapportar

Irrapporta axxess tal-pulmun jew empyema mingħajr pulmonite bhala LUNG

3.1.9 NEO: DEFINIZZJONIJIET SPEċIFIČI TAL-KAŻI NEONATALI

NEO-CSEP: Sepsis klinika

It-tliet kriterji KOLLHA li ġejjin:

- It-tabib li jagħmel superviżjoni jkun beda terapija antimikrobika xierqa għal sepsis għal mill-inqas ħamest ijiem.
- Ebda sejbien ta' patoġeni fil-koltivazzjoni tad-demm jew li ma jkunux gew ittestjati
- Ebda infezzjoni čara f'sit iehor

U tnejn mill-kriterji li ġejjin (mingħajr kawża apparenti oħra):

- Deni ($> 38^{\circ}\text{C}$) jew instabbiltà fit-temperatura (post-set frekwenti tal-inkubatur) jew ipotermja ($< 36,5^{\circ}\text{C}$)
- Takikardija ($> 200/\text{min}$) jew bradikardija gdida/miżjudha ($< 80/\text{min}$)
- Hin ta' mili kapillari mill-ġdid (CRT) $> 2\text{s}$
- Apnea (s) gdida jew miżjudha ($> 20\text{s}$)
- Aċidozi metabolika inspjegabbi
- Bidu ġdid ta' ipergliċemja ($> 140 \text{ mg/dL}$)
- Sinjal iehor ta' sepsis (kulur il-ġilda (biss jekk ma jintużax CRT)), sinjali tal-laboratorju (CRP, interleukin), htiega akbar ta' ossiġnu (intubazzjoni), kondizzjoni ġenerali mhux stabbli tal-pazjent, apatija)

NEO-LCBI: BSI kkonfermata mil-laboratorju

- ghall-inqas tnejn minn: temperatura $> 38^{\circ}\text{C}$ jew $< 36,5^{\circ}\text{C}$ jew instabbiltà fit-temperatura, takikardija jew bradikardija, apnea, hin ta' mili kapillari mill-ġdid (CRT) estiż, aċidozi metabolika, ipergliċemja, sinjal iehor ta' BSI bhall-apatija

U

- patoġen magħruf minbarra stafilocokki koagulaži-negattivi (CNS) ikkoltivat mid-demm jew fluwidu cerebrospinali (CSF) dan huwa inkluż minħabba li meniġite fil-grupp ta' din l-eti is-soltu tkun ematoġenuza, għalhekk CSF pozittiv jista' jitqies bhala evidenza ta' BSI wkoll jekk koltivazzjoni jiet tad-demm ikunu negattivi jew ma jkunux ittieħdu)

Innota l-istruzzjonijiet dwar rapportar

- biex tkun konsistenti frapportar dwar BSI f'adulti (inkluża BSI sekondarja), il-kriterju "l-organizmu mhux relatax ma' infezzjoni f'sit iehor" tnejha mid-definizzjoni ta' Neo-KISS għall-finijiet tal-PPS tal-UE
- irrapporta l-origini tal-BSI neonatali fil-qasam ta' origini ta' BSI
- jekk iż-żewġ definizzjoni jiet tal-każi għal NEO-LCBI u NEO-CNSB ikunu jaqblu, irrapporta NEO-LCBI

NEO-CNSB: BSI kkonfermata mil-laboratorju bi stafilocokki koagulaži-negattivi (CNS)

- ghall-inqas tnejn minn: temperatura $> 38^{\circ}\text{C}$ jew $< 36,5^{\circ}\text{C}$ jew instabbiltà fit-temperatura, takikardija jew bradikardija, apnea, hin estiż għal rikapillarizzazzjoni, aċidozi metabolika, ipergliċemja, sinjal iehor ta' BSI bhall-apatija
- U CNS tkun ikkoltivata mid-demm jew minn ponta ta' kateter
- U l-pazjent ikollu wahda minn: proteina C-reattiva $> 2,0 \text{ mg/dL}$, proporzjon ta' newtrofilu immatur/totali (I/T ratio) $> 0,2$, lewkoċċi $< 5/\text{nL}$, platelets $< 100/\text{nL}$

Innata l-istruzzjonijiet dwar rapportar:

- biex tkun konsistenti frapportar dwar BSI f'adulti (inkluża BSI sekondarja), il-kriterju “l-orgniżmu mhux relataf ma’ infelizzjoni f’sit iehor” tneħha mid-definizzjoni ta’ Neo-KISS għall-finijiet tal-PPS tal-UE
- irrapporta l-origini tal-BSI neonatali fil-qasam ta’ oriġini ta’ BSI
- jekk iż-żeġw definizzjonijiet tal-kaži għal NEO-LCBI u NEO-CNSB ikunu jaqblu, irrapporta NEO-LCBI

NEO-PNEU: Pulmonite

- kompromess respiratorju
- U infiltrat ġdid, konsolidazzjoni jew effużjoni plewrali fuq X-ray tas-sider
- U ghall-inqas erbgha minn: temperatura $> 38^{\circ}\text{C}$ jew $< 36,5^{\circ}\text{C}$ jew instabbiltà fit-temperatura, takikardija jew bradikardija, takipnoea jew apnea, dispnea, aktar tnixxijiet respiratorji, bidu ġdid ta’ bżieg purulenti, iżolament ta’ patoġen minn tnixxijiet respiratorji, proteina C-reattiva $> 2,0 \text{ mg/dL}$, I/T proporzjon $> 0,2$

NEO-NEC: Enterokolite nekrotika

- Evidenza istopatoloġika ta’ enterokolite nekrotika

JEW

- ghall-inqas anormalità radjografika karakteristika waħda (pnewmoperitonew, pnewmatożi intestinali, ċieki ‘riġidi’ li ma jinbidlux tal-musrana ż-żgħira) u ghall-inqas tnejn minn dawn li ġejjin mingħajr spjegazzjoni ohra: remettar, distensjoni addominali, fdalijiet ta’ qabel l-ikel, ippurgar persistentement mikroskopiku jew bħafna demm

3.1.10 PN: PULMONITE

Żewġ X-rays jew CT-scans jew aktar wara xulxin tas-sider bi xbiha sugġestiva tal-pulmonite għal pazjenti li jkollhom ukoll mard tal-qalb jew tal-pulmun. Fpazjenti li ma jkollhomx ukoll mard tal-qalb jew tal-pulmun, X-ray jew CT-scan wieħed definitiv tas-sider ikun biżżejjed

U ghall-inqas wieħed mis-sintomi li ġejjin:

Deni $> 38^{\circ}\text{C}$ b'ebda kawża ohra

Lewkopenja ($< 4\,000 \text{ WBC/mm}^3$) jew lewkočitozi ($12\,000 \text{ WBC/mm}^3$)

U ghall-inqas waħda minn dawn li ġejjin (jew ghall-inqas tnejn jekk ikun hemm pulmonite klinika biss = PN 4 u PN 5)

- Bidu ġdid ta’ bżieg purulenti, jew bidla fil-karatru tal-bżieg (lewn, riħa, kwantità, konsistenza)
- Sogħla jew dispnea jew takipnea
- Askultazzjoni suġġestiva (ħsejjes tan-nifs tal-pulmun jew tal-bronki), ronki, tharħir
- Skambju jehžien ta’ gass (eż. desaturazzjoni ta’ O_2 jew aktar ħtiġijiet ta’ ossigenu jew talba għal aktar ventilazzjoni)

u skont il-metodu dijanjostiku użat

a Dijanjostika batterjologika mwettqa permezz ta’:

Koltivazzjoni kwantitattiva pożittiva b’kampjun LRT⁽¹⁵⁾ minimament ikkontaminat (PN 1)

- Hasil bronkoalveolari (BAL), b'limitu ta’ $\geq 10^4 \text{ CFU/ml}$ ⁽¹⁶⁾ jew $\geq 5\%$ ta’ ċelluli miksuba minn BAL, ikun fil-batterja intraċellullari f'ezami mikroskopiku dirett (ikklassifikat fil-kategorija dijanjostika BAL)
- Pinzellata protetta (PB Wimberley) b'limitu ta’ $\geq 10^3 \text{ CFU/ml}$
- Aspirat protett fit-tarf (DPA) b'limitu ta’ $\geq 10^3 \text{ CFU/ml}$

Koltivazzjoni kwantitattiva pożittiva possibbilment minn kampjun LRT kontaminat (PN 2)

- Koltivazzjoni kwantitattiva ta’ kampjun LRT (eż. aspirat endotrakeali) b'limitu ta’ 10^6 CFU/ml

⁽¹⁵⁾ LRT = Passagg tan-Nifs ta’ Isfel [Lower Respiratory Tract]

⁽¹⁶⁾ CFU = Unitajiet li Jifformaw Kolonji [Colony Forming Units]

b Metodi alternativi mikrobijoloġiči (PN 3)

- Koltivazzjoni požittiva tad-demm mhux relatata ma' sors ta' infezzjoni
- Tkabbir požittiv fil-koltivazzjoni ta' fluwidu plewrali
- Axxess plewrali jew pulmonari b'aspirazzjoni požittiva bil-labrali
- Eżami istologiku pulmonari juri evidenza ta' pulmonite
- Eżamijiet požittivi għal pulmonite b'virus jew b'mikrobi partikolari (eż. *Legionella*, *Aspergillus*, mikobatterja, mikoplażma, *Pneumocystis jirovecii*)
- Sejbien pozitiv ta' antiġen viral iż-żejjew minn tkompli (eż. EIA, FAMA, analizi ta' kunjett magħluq, PCR)
- Eżami dirett požittiv jew koltivazzjoni požittiva minn tnixxijiet respiratorji (eż. EIA, FAMA, analizi ta' kunjett magħluq, PCR)
- Konverżjoni ta' serum (eż. virus tal-influwenza, *Legionella*, *Chlamydia*)
- Sejbien ta' antiġeni fl-awrina (*Legionella*)

c Ohrajn

- Koltivazzjoni ta' bżieq požittiv jew koltivazzjoni ta' kampjun LRT mhux kwantitattiv (PN 4)
- Ebda mikrobijoloġija požittiva (PN 5)

Nota: Kriterji ta' PN 1 u PN 2 ikunu ġew invalidati mingħajr terapija minn qabel kontra l-mikrobi

Pulmonite assoċjata ma' intubazzjoni (IAP)

Il-pulmonite hija ddefinita bħala assoċjata ma' intubazzjoni (IAP) jekk ikun hemm apparat tan-nifs invażiv (ukoll minn hin għal iehor) fit-48 siegha qabel il-bidu ta' infezzjoni

Nota: Pulmonite li għaliha tkun inbdiet intubazzjoni fil-jum meta tkun bdiet mingħajr informazzjoni addizzjonali fis-sekwenza ta' ġrajjiet ma titqies bħala IAP

3.1.11 REPR: INFEZZJONI TAL-PASSAĞġ RIPRODUTTIV

REPR-EMET: Endometrite

Endometrite għandha tilhaq għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjenta jkollha organiżmi kkoltivati minn fluwidu jew tessut minn endometriju miex-subha minn operazzjoni kirurġika, b'aspirazzjoni bil-labrali, jew b'bijopsja bil-pinżell
- Il-pazjenta jkollha għall-inqas tnejn mis-sinjalji jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: deni (> 38 °C), uqigh addominali, irtubija tal-utru, jew skulatura purulenti mill-utru

Innota l-istruzzjonijiet dwar rapportar

Irrapporta endometrite wara t-twelid bhala infezzjoni assoċjata ma' kura tas-sahha ħlief jekk il-fluwidu amnijotiku ikun infettat fil-hin meta l-pazjenta tiddahħhal jew il-pazjenta tkun iddahħħlet 48 siegħa wara li l-membrana tkun inqasmet

REPR-EPIS: Episjotomija

Infezzjonijiet tal-episjotomija għandhom jilħqu għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjenta wara l-hlas postvaġinali jkollha skulatura purulenti mill-episjotomija
- Il-pazjenta wara l-hlas postvaġinali jkollha axxess ta' episjotomija

REPR-VCUF: Keffa vaġinali

Infezzjoni tal-keffa vaġinali għandha tilhaq għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjenta wara isterektomija jkollha skulatura purulenti mill-keffa vaġinali
- Il-pazjenta wara isterektomija jkollha axxess tal-keffa vaġinali
- Il-pazjenta wara isterektomija jkollha patoġeni kkoltivati minn fluwidu jew tessut miex-subha mill-keffa vaġinali

Innota l-istruzzjonijiet dwar rapportar

Irrapporta infezzjonijiet tal-keffa vaġinali bhala SSI-O

REPR-OREP: Infezzjonijiet ohra tal-passaġġ riproduttiv tar-raġel jew tal-mara (epididimu, testikuli, pros-tata, vaġina, ovarji, utru, jew tessuti ohra pelviċi, eskuži infezzjonijiet tal-endometrite jew tal-keffa vaġinali)

Infezzjonijiet ohra tal-passaġġ riproduttiv tar-raġel jew tal-mara għandhom jilhqo ghall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn tessut jew fluwidu minn sit affettwat
- Il-pazjent ikollu axxess jew evidenza oħra ta' infezzjoni ta' sit affettwat li tidher matul operazzjoni kirurgika jew eżami istopatoloġiku
- Il-pazjent ikollu tnejn mis-sinjalji jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża ohra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), nawżea, remettar, uġigh, irtubija, jew disurja

U għall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- organiżmi kkoltivati mid-demm
- dijanjozi ta' tabib

Innota l-istruzzjonijiet dwar rapportar

- Irrapporta endometrite bhala EMET
- Irrapporta infezzjonijiet tal-keffa vaġinali bhala VCUF

3.1.12 SSI: INFEZZJONI TA' SIT KIRURGIKU

Nota: Il-preżunzjoni hija li d-definizzjonijiet kollha jkunu kkonfermati ghall-finijiet ta' rapportar ta' sorveljanza.

Inciżjoni superficjali (SSI-S)

Infezzjoni sseħħ fi żmien 30 jum wara l-operazzjoni U l-infezzjoni tinvolvi biss il-ġilda u tessut ta' taħbi il-ġilda tal-inciżjoni U għall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- Skulatura purulent b'konferma mil-laboratorju jew mingħajrha, mill-inciżjoni superficjali
- Organiżmi iżolati minn koltivazzjoni miksuba b'mod mhux settiku ta' fluwidu jew tessut mill-inciżjoni superficjali
- Ghall-inqas wieħed minn dawn is-sinjalji jew sintomi li ġejjin ta' infezzjoni: uġigh jew irtubija, nefha lokalizata, ħmura, jew šħana U inciżjoni superficjali li tinfetah deliberatament mill-kirurgu, hlief jekk l-inciżjoni tkun koltivazzjoni negattiva
- Dijanjozi ta' SSI inciżjonali superficjali magħmulha minn kirurgu jew tabib assistant

Inciżjoni fonda (SSI-D)

Infezzjoni sseħħ fi żmien 30 jum wara l-operazzjoni jekk impjant ma jithalliex fil-post jew fi żmien sena jekk impjant ikun f'postu U l-infezzjoni tkun tidher relatata mal-operazzjoni U l-infezzjoni tinvolvi tessut artab fond (eż. faxxa, muskolu) tal-inciżjoni U għall-inqas wahda minn dawn li ġejjin:

- Skulatura purulent mill-inciżjoni fonda iżda mhux mill-komponent ta' organu/spazju tas-sit kirurgiku
- Inciżjoni fonda tinferaḥ spontanament jew tinfetah deliberatament minn kirurgu meta l-pazjent ikollu għall-inqas wieħed minn dawn is-sinjalji jew sintomi li ġejjin: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), uġigh jew irtubija lokalizzati, hlief jekk l-inciżjoni tkun koltivazzjoni negattiva
- Axxess jew evidenza ohra ta' infezzjoni li jinvolvu l-inciżjoni fonda jinstabu feżami dirett, matul operazzjoni mill-ġdid, jew feżami istopatoloġiku jew radjologiku
- Dijanjozi ta' SSI inciżjonali fil-fond magħmulha minn kirurgu jew tabib assistant

Organu/Spazju (SSI-O)

Infezzjoni sseħħ fi żmien 30 jum wara l-operazzjoni jekk impjant ma jithalliex fil-post jew fi żmien sena jekk impjant ikun f'postu U l-infezzjoni tidher li tkun relatata mal-operazzjoni U l-infezzjoni tinvolvi kull parti tal-anatomija (eż. organi u spazji) minbarra l-inciżjoni li tkun infethet jew li tkun giet immanipulata matul operazzjoni U għall-inqas wahda minn dawn li ġejjin:

- Skulatura purulenti minn drejn li jitqiegħed fl-organu/spazju minn naħha għal oħra ta' ferita b'oġgett bil-ponta
- Organiżmi iżolati minn koltivazzjoni miksuba b'mod mhux settiku ta' fluwidu jew tessut fl-organu/spazju
- Axxess jew evidenza oħra ta' infezzjoni li tinvvoli l-organu/spazju li jinstabu feżami dirett, matul operazzjoni mill-ġdid, jew b'eżami istopatologiku jew radjologiku
- Dijanjoži ta' organu/spazju ta' SST magħmula minn kirurgu jew tabib assistent

3.1.13 SST: INFEZZJONI TAL-ĞILDA U TA' TESSUT ARTAB

SST-SKIN: Infezzjoni tal-ġilda

Infezzjonijiet tal-ġilda għandhom jilħqu ghall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu skulatura purulenti, ponot bil-materja, bżieżaq, jew imsiemer
- Il-pazjent ikollu ghall-inqas tnejn mis-sinjali jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: uġiġ jew irtubija, nefha lokalizzata, hmura, jew shana

U ghall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- organiżmi kkoltivati minn aspirat jew skulatura minn sit affettwat; jekk l-organiżmi jkunu flora ta' ġilda normali (eż. difteroиди [Corynebacterium spp.], *Bacillus* [mhux *B.anthracis*] spp., *Propionibacterium* spp., stafilocokki koagulaži negattivi [inkluża *Staphylococcusepidermidis*], streptokokki tal-grupp viridans, *Aerococcus* spp., *Micrococcus* spp.), huma għandhom ikunu koltivazzjoni pura
- organiżmi kkoltivati mid-demm
- test pożittiv tal-antiġen magħmul fuq tessut jew demm infettat (eż. herpes simplex, varicella zoster, *Haemophilus influenzae*, *Neisseria meningitidis*)
- ċelluli ġganti b'ħafna nuklei li jidhru feżami mikroskopiku ta' tessut affettwat
- titru ta' antikorp wieħed dijanostiku (IgM) jew żieda b'erba' darbiet f'seri pari (IgG) għal patogen

Innota l-istruzzjonijiet dwar rapportar

- Irrapporta ulċeri decubitus infettati bħala DECU
- Irrapporta ħruq infettat bħala BURN
- Irrapporta axxessi tas-sider jew mastite bħala BRST

SST-ST: Tessut artab (faxxite nekrotika, kankrena infettiva, ċellulite nekrotika, mijożite infettiva, limfadenite, jew limfanġite)

Infezzjonijiet ta' tessut artab għandhom jilħqu ghall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu organiżmi kkoltivati minn tessut jew skulatura minn sit affettwat
- Il-pazjent ikollu skulatura purulenti fis-sit affettwat
- Il-pazjent ikollu axxess jew evidenza oħra ta' infezzjoni li tidher matul operazzjoni kirurgika jew eżami istopatologiku
- Il-pazjent ikollu ghall-inqas tnejn mis-sinjali jew sintomi li ġejjin fis-sit affettwat b'ebda kawża oħra magħrufa: uġiġ jew irtubija lokalizzata, hmura, nefha, jew shana

U ghall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- organiżmi kkoltivati mid-demm
- test pożittiv tal-antiġen magħmul fuq demm jew awrina (eż. *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus Pneumoniae*, *Neisseria meningitidis*, *Streptococcus* ta' Grupp B, *Candida* spp.)
- titru ta' antikorp wieħed dijanostiku (IgM) jew żieda b'erba' darbiet f'seri pari (IgG) għal patogen

Innota l-istruzzjonijiet dwar rapportar

- Irrapporta ulċeri decubitus infettati bħala DECU
- Irrapporta infezzjoni ta' tessuti pelviċi fondi bħala OREP

SST-DECU: Ulċera decubitus, inkluži infezzjonijiet kemm superficjali kif ukoll fondi

Infezzjonijiet ta' ulċeri decubitus għandhom jilħqu l-kriterju li ġej:

- Il-pazjent ikollu ghall-inqas tnejn mis-sinjali jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: hmura, irtubija, jew nefha fil-ġnub tal-ferita decubitus

U ghall-inqas wahda minn dawn li ġejjin:

- organizmi kkoltivati minn fluwidu jew tessut miġburin kif imiss
- organizmi kkoltivati mid-demmm

SST-BURN: Hruq

Infezzjonijiet minn hruq għandhom jilħqu ghall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu bidla fid-dehra jew fil-karattru tal-ferita minn hruq, bhal separazzjoni rapida ta' eskar, jew tidni tal-kultur f'kannella skur, iswed, jew ta' lewn vjola tal-eskar, jew edema f'tarf il-ferita

U eżami istologiku tal-bijopsija tal-harqa juri invażjoni ta' organiżmi f'tessut vijabbbi fil-ġenb

Il-pazjent ikollu bidla fid-dehra jew fil-karattru tal-ferita minn hruq, bhal separazzjoni rapida ta' eskar, jew tidni tal-kultur f'kannella skur, iswed, jew ta' lewn vjola tal-eskar, jew edema f'tarf il-ferita

U ghall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- organizmi kkoltivati mid-demmm fin-nuqqas ta' infezzjonijiet oħra identifikabbli
- l-iżolament tal-virus ta' herpes simplex, identifikazzjoni istologika ta' inklużjonijiet b'mikroskopija ottika jew ta' elettroni, jew viżwalizzazzjoni ta' partikuli b'mikroskopija tal-elettroni f'bijopsiji jew fdalijiet ta' leżjoni

Il-pazjent b'harqa jkollu ghall-inqas tnejn mis-sinjali jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$) jew ipotermja ($< 36^{\circ}\text{C}$), pressjoni għolja, oligurja ($< 20 \text{ cc/hr}$), ipergħiċemja flivell ta' karboidrat ta' dieta li qabel kien iż-żorr, jew konfuzjoni mentali

U ghall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- eżami istologiku tal-bijopsija tal-harqa juri invażjoni ta' organiżmi f'tessut vijabbbi fil-ġenb
- organizmi kkoltivati mid-demmm
- l-iżolament tal-virus ta' herpes simplex, identifikazzjoni istologika ta' inklużjonijiet b'mikroskopija ottika jew ta' elettroni, jew viżwalizzazzjoni ta' partikuli b'mikroskopija tal-elettroni f'bijopsiji jew fdalijiet ta' leżjoni

SST-BRST: Axxess tas-sider jew mastite

Axxess tas-sider jew mastite għandu jilħaq għall-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

- Il-pazjent ikollu koltivazzjoni pozittiva ta' tessut tas-sider affettwat jew fluwidu miksub b'inċiżjoni u skulatura jew aspirazzjoni bil-labba
- Il-pazjent ikollu axxess tas-sider jew evidenza oħra ta' infezzjoni li tidher matul operazzjoni kirurgika jew eżami istopatologiku
- Il-pazjent ikollu d-deni ($> 38^{\circ}\text{C}$) u infjammazzjoni lokali tas-sider

U dijanjozi ta' tabib ta' axxess tas-sider

3.1.14 SYS: INFEZZJONI SISTEMIKA**SYS-DI: Infezzjoni mferrxa**

Infezzjoni mferrxa hija infezzjoni li tinvolvi organi jew sistemi multipli, mingħajr ebda sit wieħed ta' infezzjoni li jkun jidher, is-soltu ta' oriġini virali, u b'sinjalji jew sintomi ma' ebda kawża oħra magħrufa u kompatibbli ma' involviment infettiv ta' organi jew sistemi multipli

Innota l-istruzzjonijiet dwar rapportar

- Uża dan il-kodiċi għal infezzjonijiet virali li jinvolvu sistemi multipli ta' organi (eż. hożba, gattone, rubella, varicella, eritema infectiosum). Dawn l-infezzjonijiet sikkit jistgħu jkunu identifikati bi kriterji klinici biss. Tużax dan il-kodiċi għal kura assoċjata mas-saħħa infezzjonijiet b'siti metastatċi multipli, bhal b'endokardite batterjali: għandu jkun irrapportat biss is-sit primarju ta' dawn l-infezzjoni

- Tirrapportax deni ta' oriġini mhux magħrufa (FUO) bhala DI
- Irrapporta eżantemi jew mard ta' raxx bhala DI

SYS-CSEP: Sepsis klinika f'adulti u tfal

- Il-pazjent ikollu għall-inqas waħda minn dawn li ġejjin
- sinjal kliniči jew sintomi b'ebda kawża oħra magħrufa
 - deni ($> 38^{\circ}\text{C}$)
 - pressjoni għolja (pressjoni sistolika $< 90 \text{ mm/Hg}$)
 - jew oligurija ($20 \text{ cm}^3(\text{ml})/\text{hr}$)

U koltivazzjoni tad-demm li ma tkunx saret jew ebda organiżmi jew antiġen misjubin fid-demm

U ebda infezzjoni apparenti f'sit ieħor

U tabib jistitwixxi trattament għal sepsi

Innota l-istruzzjonijiet dwar rapportar:

- Tużax din il-kodiċi ħlief jekk ikun assolutament meħtieġ
- Għal CSEP fi trabi tat-tweliż, uža d-definizzjoni tal-każ NEO-CSEP (ara hawn taħt)

3.1.15 UTI: INFEZZJONI FIL-PASSAĞġ TAL-AWRINA

UTI-A: UTI sintomatika kkonfermata mikrobijologikament

Il-pazjent ikollu għall-inqas wieħed minn dawn is-sinjal jew sintomi li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), urġenza, frekwenza, disurja, jew irtubija *suprapubes*

U

Il-pazjent ikollu koltivazzjoni pozittiva tal-awrina, jiġifieri, $\geq 10^5$ mikroorganiżmi għal kull ml ta' awrina b'mħux aktar minn żewġ speċijiet ta' mikroorganiżmi.

UTI-B: UTI sintomatika mhux ikkonfermata mikrobijologikament

Il-pazjent ikollu għall-inqas tnejn minn dawn li ġejjin b'ebda kawża oħra magħrufa: deni ($> 38^{\circ}\text{C}$), urġenza, frekwenza, disurja, jew irtubija *suprapubes*

U

Għall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

- Dipstik pozittiva għall-lewkoċite esterażi u/jew nitrat
- Kampjun ta' awrina bil-materja bi $\geq 10^4$ WBC/ml jew ≥ 3 WBC/qasam mikroskopiku ta' riżoluzzjoni għolja ta' awrina mhux centrifuga
- Organizmi li jidħru fuq tebħha Gram ta' awrina mhux centrifuga
- Ghall-inqas żewġ koltivazzjoni jiet tal-awrina b'iżolament imtenni tal-istess uropatoġen (batterja gram negattiva jew *Staphylococcus saprophyticus*) bi $\geq 10^2$ kolonji/ml awrina fkampjuni mhux kompluti
- $\leq 10^5$ kolonji/ml ta' uropatoġen wieħed (batterja gram negattiva jew *Staphylococcus saprophyticus*) f'pazjent li jkun qed jiġi ttrattat b'aġġent antimikrobiku effettiv għal infezzjoni tal-awrina
- Dijanjozi ta' tabib ta' infezzjoni fil-passaġġ tal-awrina
- Tabib jistitwixxi terapija xierqa għal infezzjoni tal-awrina

Batterjurja asintomatika m'ghandhiex tkun irrapportata, iżda infezzjoni jiet tal-fluss tad-demm fil-ġisem sekondarja għall-batterjurja asintomatika jkunu rrapportati bhala BSI b'sors (oriġini) S-UTI

Infezzjoni fil-passaġġ tal-awrina (UCA-UTI) hija ddefinita bhala li jkollha rabta ma' kateter jekk kateter tal-awrina li jkun imqiegħed ġewwa kien preżenti (ukoll kultant) fis-sebat ijjem qabel il-bidu tal-infezzjoni

3.2 DEFINIZZJONI ĠENERIKA TA' KAŻ TA' REŽISTENZA ANTIMIKROBIKA

Definizzjoni

Mikroorganiżmu huwa ddefinit bhala suxxettibbi klinikament, intermedju klinikament jew reżistenti klinikament għal aġġent antimikrobiku skont il-valuri tal-limitu kliniči EUCAST, jiġifieri valuri tal-limitu MIC kliniči u l-korrelati tad-dijametru taż-żona ta' inibizzjoni tagħhom⁽¹⁷⁾

⁽¹⁷⁾ http://www.eucast.org/clinical_breakpoints/

Suxxettibbli Klinikament (S)

- mikroorganizmu huwa ddefinit bħala suxxettibbli b'livell ta' attivită antimikrobika assoċjat ma' probabbiltà kbira ta' suċċess terapeutiku
- mikroorganizmu huwa kkategorizzat bħala suxxettibbli (S) bl-applikazzjoni tal-valur tal-limitu adatt f'sistema definita ta' test fenotipiku
- dan il-valur tal-limitu jista' jinbidel b'tibdiliet leġittimi fiċ-ċirkostanzi

Intermedju Klinikament (I)

- mikroorganizmu huwa ddefinit bħala intermedju b'livell ta' attivită ta' aġġent antimikrobiku assoċjata ma' effett terapeutiku incert. Jimplika li infezzjoni minħabba l-iżolat tista' tigħi trtrattata kif imiss f'siti ta' korpi fejn il-mediciċini jkunu kkonċentrati fizikament jew meta tkun tista' tintuża doža għolja ta' mediciċina; jindika wkoll faxxa ta' protezzjoni li m'għandhiex thall-fatturi tekniċi żgħar, mhux ikkontrollati, joholqu diskrepanzi kbar f'interpretazzjonijiet
- mikroorganizmu huwa kkategorizzat bħala intermedju (I) bl-applikazzjoni tal-valuri tal-limitu adatti f'sistema definita ta' test fenotipiku
- dawn il-valuri tal-limitu jistgħu jinbidlu b'tibdiliet leġittimi fiċ-ċirkostanzi

Reżistenti Klinikament (R)

- mikroorganizmu huwa ddefinit bħala reżistenti b'livell ta' attivită antimikrobika assoċjat ma' probabbiltà kbira ta' falliment terapeutiku
- mikroorganizmu huwa kkategorizzat bħala reżistent (R) bl-applikazzjoni tal-valur tal-limitu adatt f'sistema definita ta' test fenotipiku
- dan il-valur tal-limitu jista' jinbidel b'tibdiliet leġittimi fiċ-ċirkostanzi

Valuri tal-limitu kimiċi huma ppreżentati bhala $S \leq x$ mg/L; $I > x$, $\leq y$ mg/L; $R > y$ mg/L

Mikroorganiżmi u aġġenti antimikrobiċi korrispondenti (tahlitiet ta' mediciċini kontra virus) rilevanti għal sorveljanza fil-bnemin huma ddefiniti fil-protokolli ta' sorveljanza rilevanti

PREZZ TAL-ABBONAMENT 2012 (mingħajr VAT, inkluži l-ispejjeż tal-posta b'kunsinna normali)

Il-Ġurnal Ufficijal tal-UE, serje L + C, edizzjoni stampata biss	22 lingwa ufficijali tal-UE	EUR 1 200 fis-sena
Il-Ġurnal Ufficijal tal-UE, serje L + C, stampati + DVD annwali	22 lingwa ufficijali tal-UE	EUR 1 310 fis-sena
Il-Ġurnal Ufficijal tal-UE, serje L, edizzjoni stampata biss	22 lingwa ufficijali tal-UE	EUR 840 fis-sena
Il-Ġurnal Ufficijal tal-UE, serje L + C, DVD fix-xahar (kumulattiva)	22 lingwa ufficijali tal-UE	EUR 100 fis-sena
Suppliment tal-Ġurnal Ufficijal (serje S), Swieq Pubblici u Appalti, DVD, edizzjoni fil-ġimgħa	multilingwi: 23 lingwa ufficijali tal-UE	EUR 200 fis-sena
Il-Ġurnal Ufficijal tal-UE, serje C — Kompetizzjonijiet	Skont il-lingwa/i tal-Kompetizzjoni	EUR 50 fis-sena

L-abbonament f'Il-Ġurnal Ufficijal tal-Unjoni Ewropea, li johroġ fil-lingwi ufficijali tal-Unjoni Ewropea, hu disponibbli fi 22 verżjoni lingwistika. Inkluži fih hemm is-serje L (Leġiżlazzjoni) u C (Informazzjoni u Avviżi).

Kull verżjoni lingwistika jeħtiġilha abbonament separat.

B'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005, ippubblikat fil-Ġurnal Ufficijal L 156 tat-18 ta' Ĝunju 2005, li jistipula li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhumiex temporanjament obbligati li jiktbu l-atti kollha bl-Irlandiż u li jippubblikawhom b'din il-lingwa, il-Ġurnali Ufficijal ppubblikati bl-Irlandiż jinbiegħu apparti.

L-abbonament tas-Suppliment tal-Ġurnal Ufficijal (serje S — Swieq Pubblici u Appalti) jiġbor fih it-total tat-23 verżjoni lingwistika ufficijali f'DVD waħdieni multilingwi.

Fuq rikiesta, l-abbonament f'Il-Ġurnal Ufficijal tal-Unjoni Ewropea jagħti d-dritt li l-abbonat jircievi diversi annessi tal-Ġurnal Ufficijal. L-abbonati jiġu mgħarrfa dwar il-ħruġ tal-annessi permezz ta' "Avviż lill-qarrej" inserit f'Il-Ġurnal Ufficijal tal-Unjoni Ewropea.

Bejgħ u Abbonamenti

Abbonamenti fil-perjodici diversi bi ħlas, bħalma huwa l-abbonament f'Il-Ġurnal Ufficijal tal-Unjoni Ewropea, huma disponibbli mill-ufficiċi tal-bejgħ tagħna. Il-lista tal-ufficiċi tal-bejgħ hi disponibbli fuq l-internet fl-indirizz li ġej:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_mt.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) joffri aċċess dirett u bla ħlas għal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan is-sit jippermetti li jkun ikkonsultat Il-Ġurnal Ufficijal tal-Unjoni Ewropea u jinkludi wkoll it-Trattati, il-leġiżlazzjoni, il-ġurisprudenza u l-atti preparatorji tal-leġiżlazzjoni.

Biex tkun taf aktar dwar l-Unjoni Ewropea, ikkonsulta: <http://europa.eu>

