

RECTIFICATIES

Rectificatie op het programma „Europa tegen kanker” — Voorstel voor een actieplan 1987—1989

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 50 van 26 februari 1987)

(87/C 69/10)

Bladzijde 17, tabel 3, wordt als volgt gewijzigd:

TABEL 3

Percentage gevallen van bepaalde vormen van kanker dat toe te schrijven is aan voedingsfactoren

(Bron: IAK)

Hoewel men algemeen van oordeel is dat voedingsfactoren belangrijke determinanten kunnen zijn voor het risico van verschillende vormen van kanker, zijn de wetenschappelijke gegevens te beperkt voor een nauwkeurige schatting van het percentage kankergevallen dat met een zekere mate van waarschijnlijkheid toe te schrijven is aan bepaalde bestanddelen van de voeding. In onderstaande tabel geven wij de schattingen weer van het toe te schrijven risico bij typen van kanker waar een verband met de ziekte kan worden aangenomen. Deze lijst is niet volledig: verschillende bestanddelen van de voeding die voor de mens kankerverwekkend kunnen zijn kunnen niet worden geëvalueerd bij gebrek aan wetenschappelijke gegevens. De genoemde schattingen van het toe te schrijven risico zijn gebaseerd op onder bevolkingsgroepen in Europa, Australië-Azië en Noord-Amerika uitgevoerde studies. Uit de marge in de schattingen blijkt het verschil in de prevalentie van de risicofactor in diverse bevolkingen. Zo zijn bij voorbeeld de laagste waarden voor het aan alcohol toe te schrijven risico eerder van toepassing op de bevolkingen van Noord-Europa, terwijl de hoogste waarden zijn geregistreerd bij Zuid Europese bevolkingen, waar de gemiddelde consumptie veel groter was.

Voedingsfactor	Vorm van kanker	Toe te schrijven risico: percentage gevallen dat etiologisch verband houdt met de vermelde factoren
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN	Mondholte en oropharynx	Tot 75 % in verbinding met tabak
	Hypopharynx	10-70 % bij een consumptie van 20 tot meer dan 120 g per dag
	Strottehoofd	25-40 % bij een consumptie van 20 tot meer dan 120 g per dag 30-65 % in verbinding met tabak
	Slokdarm	40-75 % bij een consumptie van 20 tot meer dan 120 g per dag
	Lever	15-40 % bij een consumptie van 30 tot 340 g per dag
AAN VERS FRUIT EN VERSE GROENTEN ARME VOEDING	Slokdarm	15-50 %
	Maag	Tot 70 %
	Alveesklier	Tot 15 %
	Kartel- en endeldarm	20-40 %
	Longen	Tot 20 % (waarschijnlijk door geringe consumptie van aan bètacaroteen rijke voeding)
AAN CALORIEËN (OF AAN VETTEN?) TE RIJKE VOEDING MET ALS GEVOLG EEN TE GROOT GEWICHT	Borsten	0-12 % (zeer onzeker)
	Endometrium	Tot 20 %
	Prostaat	Tot 20 %