

Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

► **B**

**ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1844**

z dnia 22 października 2019 r.

udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „BPF\_Iodine\_VET”

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 283 z 5.11.2019, s. 1)

zmienione przez:

Dziennik Urzędowy

|   | nr    | strona | data      |
|---|-------|--------|-----------|
| ► <u><b>M1</b></u> Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/977 z dnia 7 czerwca 2021 r. | L 216 | 26     | 18.6.2021 |



**ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1844**

**z dnia 22 października 2019 r.**

**udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych  
„BPF\_Iodine\_VET”**

**(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

*Artykuł 1*

Przedsiębiorstwu Applied Biocide GmbH udziela się pozwolenia unijnego o numerze EU-0020540-0000 na udostępnianie na rynku i stosowanie rodziny produktów biobójczych „BPF\_Iodine\_VET” zgodnie z charakterystyką produktu biobójczego określoną w załączniku.

Pozwolenie unijne jest ważne od dnia 25 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2029 r.

*Artykuł 2*

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼ **M1****ZAŁĄCZNIK****Charakterystyka rodziny produktów biobójczych**

BPF\_Iodine\_VET

Grupa produktowa 3 – Higiena weterynaryjna (Środki dezynfekujące)

Numer pozwolenia: EU-0020540-0000

Numer zasobu w R4BP: EU-0020540-0000

**CZĘŚĆ I****PIERWSZY POZIOM INFORMACYJNY****1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE****1.1. Nazwa handlowa rodziny produktów biobójczych**

|       |                |
|-------|----------------|
| Nazwa | BPF_Iodine_VET |
|-------|----------------|

**1.2. Grupa produktowa**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Grupa produktowa | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna |
|------------------|--------------------------------|

**1.3. Posiadacz pozwolenia**

|                                     |                  |                                       |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Nazwa i adres posiadacza pozwolenia | Nazwa            | Applied Biocide GmbH                  |
|                                     | Adres            | Siemensstraße 42, 59199 Bönen, Niemcy |
| Numer pozwolenia                    | EU-0020540-0000  |                                       |
| <i>Numer zasobu w R4BP</i>          | EU-0020540-0000  |                                       |
| Data udzielenia pozwolenia          | 25 November 2019 |                                       |
| Data ważności pozwolenia            | 31 October 2029  |                                       |

**1.4. Producent (-ci) produktów biobójczych**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nazwa producenta                   | THESEO Deutschland GmbH                     |
| Adres producenta                   | Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Niemcy |
| Lokalizacja zakładów produkcyjnych | Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Niemcy |

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Nazwa producenta | FINK TEC GmbH                       |
| Adres producenta | Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Niemcy |

▼ **M1**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Lokalizacja zakładów produkcyjnych | Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Niemcy                             |
| Nazwa producenta                   | I.R.C.A. SERVICE S.p.A.   |
| Adres producenta                   | S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Włochy |
| Lokalizacja zakładów produkcyjnych | S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Włochy |
| Nazwa producenta                   | Laboratorios Maymó S.A.   |
| Adres producenta                   | Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Hiszpania                     |
| Lokalizacja zakładów produkcyjnych | Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Hiszpania                     |

1.5. **Producent (-ci) substancji czynnych**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Substancja czynna                  | Jod   |
| Nazwa producenta                   | Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo              |
| Adres producenta                   | Amunátegui 178, 7th Floor, 8320000 Santiago Chile     |
| Lokalizacja zakładów produkcyjnych | S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile |
| Substancja czynna                  | Jod   |
| Nazwa producenta                   | ACF Minera S.A.                                       |
| Adres producenta                   | San Martin 499, 1100000 Iquique Chile                 |
| Lokalizacja zakładów produkcyjnych | Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Chile              |
| Substancja czynna                  | Jod   |
| Nazwa producenta                   | Sociedad Quimica y Minera SA                          |

▼ **M1**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Adres producenta                   | Los Militares 4290, 7550000 Las Condes Chile   |
| Lokalizacja zakładów produkcyjnych | Nueva Victoria, 1180000 Pozo Almonte Chile<br>Pedro de Valdivia, 1240000 Antofagasta Chile |

**2. SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA RODZINY PRODUKTÓW****2.1. Informacje o składzie jakościowym i ilościowym rodziny produktów**

| Nazwa zwyczajowa   | Nazwa IUPAC  | Funkcja                                | Numer CAS  | Numer WE  | Zawartość (%) |       |
|--|--|--|------------|-----------|---------------|-------|
|  |  |  |            |           | Min.          | Maks. |
| Jod  |  | Substancja czynna                      | 7553-56-2  | 231-442-4 | 0,1           | 3,0   |
| Kwas ortofosforowy   | Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy                               | Substancja niebędąca substancją czynną | 7664-38-2  | 231-633-2 | 0,0           | 10,0  |
| Poly(oxy-1,2-ethane-diyl).alpha.-tridecyl.omega.-hydroxy-,branched | Poly(oxy-1,2-ethane-diyl).alpha.-tridecyl.omega.-hydroxy-,branched | Substancja niebędąca substancją czynną | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0           | 31,8  |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate         | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate         | Substancja niebędąca substancją czynną | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0           | 31,8  |

**2.2. Rodzaj(-e) postaci użytkowej**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Postać użytkowa | AL - Ciecz<br>SL- Koncentrat rozpuszczalny |
|-----------------|--|

**CZĘŚĆ II****DRUGI POZIOM INFORMACYJNY – META SPC****META SPC 1****1. META SPC 1 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE****1.1. Meta SPC 1 – identyfikator**

|               |            |
|---------------|------------|
| Identyfikator | Meta SPC 1 |
|---------------|------------|

**1.2. Rozszerzenie numeru pozwolenia**

|       |     |
|-------|-----|
| Numer | 1-1 |
|-------|-----|

**1.3. Grupa produktowa**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Grupa produktowa | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna |
|------------------|--------------------------------|

▼ **M1****2. META SPC 1 – SKŁAD****2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 1**

| Nazwa zwyczajowa  | Nazwa IUPAC   | Funkcja                                | Numer CAS  | Numer WE  | Zawartość (%) |       |
|---|---|--|------------|-----------|---------------|-------|
|   |   |  |            |           | Min.          | Maks. |
| Jod   |   | Substancja czynna                      | 7553-56-2  | 231-442-4 | 0,15          | 0,15  |
| Kwas ortofosforowy  | Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy                                | Substancja niebędąca substancją czynną | 7664-38-2  | 231-633-2 | 0,0           | 0,0   |
| Poly(oxy-1,2-ethane-diyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Poly(oxy-1,2-ethane-diyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Substancja niebędąca substancją czynną | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0           | 0,0   |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate          | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate          | Substancja niebędąca substancją czynną | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0           | 0,0   |

**2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 1**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Postać użytkowa | AL - Ciecz |
|-----------------|------------|

**3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 1**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  | Może powodować korozję metali.  |
| Zwroty wskazujące środki ostrożności | Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.<br>Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.<br>Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej. |

**4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 1****4.1. Opis użycia**

**Tabela 1. Zastosowanie # 1 – Higiena weterynaryjna - hodowla zwierząt - poudojowa dezynfekcja strzyków - profesjonalny - wewnątrz pomieszczeń –metodą natryskową**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Grupa produktowa  | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna |
| W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem | -                              |
| Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)                           | Bakterie<br>Drożdże            |

▼ **M1**

|   |   |
|---|---|
| Obszar zastosowania                         | Wewnątrz  |
| Sposób (-oby) nanoszenia                    | System otwarty: natrysk   |
|   | Poudojowa, niemedyzna dezynfekcja strzyków krów, produktem gotowym do użycia ręczną lub automatyczną metodą natryskową.   |
| Stosowane dawki i częstotliwość stosowania  | Dawka stosowania: 10-15 ml na krowę - 0   |
|   | Częstotliwość stosowania:<br>W okresie laktacji:<br>• metoda ręczna 2 aplikacje na dzień (po udoju)<br>• metoda zautomatyzowana: 3 aplikacje na dzień (po udoju)<br>W okresie suszy: 1 aplikacja na dzień |
| Kategoria (-e) użytkowników                 | Profesjonalny   |
| Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe | Butelka polietylen wysokiej gęstości (HDPE): 1 l, Zakrętka wykonana jest z PP<br>Puszka Jerry'ego HDPE: 5 - 60 l<br>Beczka HDPE: 200 l<br>IBC: HDPE: 600 - 1000 l   |

4.1.1. *Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania*

- - -

4.1.2. *Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania*

- - -

4.1.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

- - -

4.1.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

- - -

4.1.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

- - -

5. **OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA <sup>(1)</sup>Z META SPC 1**5.1. **Instrukcje stosowania**

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety lub ulotki i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Przed użyciem produkt należy ogrzać do temperatury powyżej 20 °C

W celu napełnienia sprzętu do aplikacji produktu, zaleca się użycie pompki dozującej.

<sup>(1)</sup> Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 1.

**▼ M1**

Natychmiast po udoju każdej krowy należy spryskać roztworem całą powierzchnię każdego ze strzyków. Pozostawić produkt do następnego udoju. Nie czyścić strzyków bezpośrednio po dezynfekcji.

Krowy trzymać w pozycji stojącej do momentu wyschnięcia produktu (co najmniej 5 minut).

Produkt może być aplikowany ręcznie lub za pomocą automatycznego spryskiwacza strzyków.

Przed kolejnym udojem strzyki należy oczyścić, najlepiej jedną nową, moką ściereczką na każdą krowę.

Częstotliwość stosowania nie może przekraczać dwóch aplikacji na krowę dziennie w przypadku ręcznej metody natryskowej i nie może przekraczać trzech aplikacji na krowę dziennie automatycznej metody natryskowej

**5.2. Środki zmniejszające ryzyko**

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nosić rękawice ochronne odporne chemicznie, powlekane kombinezony i buty podczas postępowania z produktem i podczas jego stosowania (materiał powinien być określony przez posiadacza pozwolenia w informacji o produkcie).

W przypadku gdy konieczne jest połączenie dezynfekcji przed i poudojowej, do dezynfekcji przedudojowej należy rozważyć zastosowanie innego produktu niezawierającego jodu.

**5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

W przypadku wdychania: Wyprowadzić na świeże powietrze, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Dokładnie umyć skórę.

W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy przy otwartych powiekach, zdjąć soczewki kontaktowe, płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta, a następnie wypić trochę wody. Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać pomoc lekarską.

W przypadku konsultacji lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę i zadzwonić do lokalnego ośrodka kontroli zatruc [tutaj wstawić lokalny numer].

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Poinformować stosowne władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (kanały, drogi wodne, gleba lub powietrze) Aby zapobiec awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałości zawierające produkt w zależności od wymogów lokalnych można usunąć do kanalizacji lub w miejsce składowania obornika (do rozrzucenia na glebach rolnych lub fermentacji w instalacjach biogazu).

**5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

Po zakończeniu zabiegu usunąć niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyty produkt można usunąć do kanalizacji miejskiej lub miejsca składowania obornika zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Unikać uwalniania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Europejski Katalog odpadów: 200130 – detergenty inne, niż wymienione w 20 01 29



▼ **M1****5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

Produkt przechowywać w nieprzezroczystych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 12 miesięcy w HDPE

**6. INNE INFORMACJE****7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 1****7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

|                  |   |                   |           |           |               |
|------------------|---|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| Nazwa handlowa   | FINK - Io Spray 15<br>FINK - Euter-DIP PVP-S<br>FINK Pattedyp PVP<br>IOSpray 15 PVP |                   |           |           |               |
| Numer pozwolenia | EU-0020540-0001 1-1   |                   |           |           |               |
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa IUPAC   | Funkcja           | Numer CAS | Numer WE  | Zawartość (%) |
| Jod              |   | Substancja czynna | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,15          |

**META SPC 2****1. META SPC 2 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE****1.1. Meta SPC 2 – identyfikator**

|               |            |
|---------------|------------|
| Identyfikator | Meta SPC 2 |
|---------------|------------|

**1.2. Rozszerzenie numeru pozwolenia**

|       |     |
|-------|-----|
| Numer | 1-2 |
|-------|-----|

**1.3. Grupa produktowa**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Grupa produktowa | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna |
|------------------|--------------------------------|

**2. META SPC 2 – SKŁAD****2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 2**

| Nazwa zwyczajowa   | Nazwa IUPAC                          | Funkcja                                | Numer CAS | Numer WE  | Zawartość (%) |       |
|--------------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------|-------|
|                    |                                      |  |           |           | Min.          | Maks. |
| Jod                |                                      | Substancja czynna                      | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,3           | 0,5   |
| Kwas ortofosforowy | Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy | Substancja niebędąca substancją czynną | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,0           | 0,0   |

▼ **M1**

| Nazwa zwyczajowa  | Nazwa IUPAC   | Funkcja                                | Numer CAS  | Numer WE  | Zawartość (%) |       |
|---|---|--|------------|-----------|---------------|-------|
|   |   |  |            |           | Min.          | Maks. |
| Poly(oxy-1,2-ethane-diyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Poly(oxy-1,2-ethane-diyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Substancja niebędąca substancją czynną | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0           | 0,0   |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate          | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate          | Substancja niebędąca substancją czynną | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0           | 0,0   |

2.2. **Rodzaj(e) receptury z meta SPC 2**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Postać użytkowa | AL - Ciecz |
|-----------------|------------|

3. **ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 2**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  | Może powodować korozję metali.<br>Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.   |
| Zwroty wskazujące środki ostrożności | Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.<br>Unikać uwolnienia do środowiska.<br>Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.<br>Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłóce wewnętrznej.<br>Usuwać zawartość do pojemnik zgodnie z lokalnymi przepisami. |

4. **ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 2**4.1. **Opis użycia**

**Tabela 2. Zastosowanie # 1 – Higiena weterynaryjna - hodowla zwierząt - poudojowa dezynfekcja strzyków - profesjonalny - wewnątrz pomieszczeń –metodą natryskową**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Grupa produktowa  | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna |
| W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem | -                              |
| Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)                           | Bakterie<br>Drożdże            |
| Obszar zastosowania   | Wewnątrz                       |

▼ **M1**

|   |  |
|---|--|
| Grupa produktowa                            | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna   |
| Sposób (-oby) nanoszenia                    | System otwarty: natrysk<br>Poudojowa, niemedyyczna dezynfekcja strzyków krów, produktem gotowym do użycia ręczną lub automatyczną metodą natryskową.   |
| Stosowane dawki i częstotliwość stosowania  | Dawka stosowania: 10-15 ml na krowę - 0<br>Częstotliwość stosowania:<br>W okresie laktacji: <ul style="list-style-type: none"> <li>• metoda ręczna 2 aplikacje na dzień (po udoju)</li> <li>• metoda zautomatyzowana: 3 aplikacje na dzień (po udoju)</li> </ul> W okresie suszy: 1 aplikacja na dzień |
| Kategoria (-e) użytkowników                 | Profesjonalny  |
| Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe | Butelka HDPE: 1 l, Zakrętka wykonana jest z PP<br>Puszka Jerry'ego HDPE: 5 - 60 l<br>Beczka HDPE: 200 l<br>IBC: HDPE: 600 - 1000 l   |

4.1.1. *Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania*

-

4.1.2. *Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania*

-

4.1.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

-

4.1.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

-

4.1.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

-

5. **OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA <sup>(2)</sup>Z META SPC 2**5.1. **Instrukcje stosowania**

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety lub ulotki i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Przed użyciem produkt należy ogrzać do temperatury powyżej 20 °C

W celu napełnienia sprzętu do aplikacji produktu, zaleca się użycie pompki dozującej.

Natychmiast po udoju każdej krowy należy spryskać roztworem całą powierzchnię każdego ze strzyków. Pozostawić produkt do następnego udoju. Nie czyścić strzyków bezpośrednio po dezynfekcji.

<sup>(2)</sup> Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 2.

**▼ M1**

Krowy trzymać w pozycji stojącej do momentu wyschnięcia produktu (co najmniej 5 minut).

Produkt może być aplikowany ręcznie lub za pomocą automatycznego spryskiwacza strzyków.

Przed kolejnym udojem strzyki należy oczyścić, najlepiej jedną nową, moką ściereczką na każdą krowę.

Częstotliwość stosowania nie może przekraczać dwóch aplikacji na krowę dziennie w przypadku ręcznej metody natryskowej ii nie może przekraczać trzech aplikacji na krowę dziennie automatycznej metody natryskowej

**5.2. Środki zmniejszające ryzyko**

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nosić rękawice ochronne odporne chemicznie, powlekane kombinezony i buty podczas obchodzenia się z produktem i stosowania (materiał powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie).

W przypadku gdy konieczne jest połączenie dezynfekcji przed i poudojowej, do dezynfekcji przedudojowej należy rozważyć zastosowanie innego produktu niezawierającego jodu.

**5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

W przypadku wdychania: Wyprowadzić na świeże powietrze, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Dokładnie umyć skórę.

W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy przy otwartych powiekach, zdjąć soczewki kontaktowe, płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta, a następnie wypić trochę wody. Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać pomoc lekarską.

W przypadku konsultacji lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę i zadzwonić do lokalnego ośrodka kontroli zatruc [tutaj wstawić lokalny numer].

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Poinformować stosowne władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (kanały, drogi wodne, gleba lub powietrze) Aby zapobiec awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałości zawierające produkt w zależności od wymogów lokalnych można usunąć do kanalizacji lub w miejsce składowania obornika (do rozrzucenia na glebach rolnych lub fermentacji w instalacjach biogazu).

**5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

Po zakończeniu zabiegu usunąć niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyty produkt można usunąć do kanalizacji miejskiej lub miejsca składowania obornika zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Unikać uwalniania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Europejski Katalog odpadów: 200130 – detergenty inne, niż wymienione w 20 01 29

**▼ M1****5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

Produkt przechowywać w nieprzezroczystych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 12 miesięcy w HDPE

**6. INNE INFORMACJE****7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 2****7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

|                  |   |                   |           |           |               |
|------------------|---|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| Nazwa handlowa   | FINK – Io Spray 30<br>ST-Io Spray<br>DESINTEC MH Iodine S<br>DESINTEC MH Raidip plus<br>Iodine Spray 3000<br>Iodine Spray<br>Io Spray 30<br>Iodine Spray 30 |                   |           |           |               |
| Numer pozwolenia | EU-0020540-0002 1-2   |                   |           |           |               |
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa IUPAC   | Funkcja           | Numer CAS | Numer WE  | Zawartość (%) |
| Jod              |   | Substancja czynna | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,3           |

**7.2. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

|                  |  |                   |           |           |               |
|------------------|--|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| Nazwa handlowa   | Fink - Io Spray 50<br>DESINTEC MH Raidip 5000<br>Iodine Spray 5000 |                   |           |           |               |
| Numer pozwolenia | EU-0020540-0003 1-2  |                   |           |           |               |
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa IUPAC  | Funkcja           | Numer CAS | Numer WE  | Zawartość (%) |
| Jod              |  | Substancja czynna | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,5           |

**META SPC 3****1. META SPC 3 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE****1.1. Meta SPC 3 – identyfikator**

|               |            |
|---------------|------------|
| Identyfikator | Meta SPC 3 |
|---------------|------------|

**1.2. Rozszerzenie numeru pozwolenia**

|       |     |
|-------|-----|
| Numer | 1-3 |
|-------|-----|

**1.3. Grupa produktowa**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Grupa produktowa | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna |
|------------------|--------------------------------|

▼ **M1**2. **META SPC 3 – SKŁAD**2.1. **Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 3**

| Nazwa zwyczajowa  | Nazwa IUPAC   | Funkcja                                | Numer CAS  | Numer WE  | Zawartość (%) |       |
|---|---|--|------------|-----------|---------------|-------|
|   |   |  |            |           | Min.          | Maks. |
| Jod   |   | Substancja czynna                      | 7553-56-2  | 231-442-4 | 0,5           | 0,5   |
| Kwas ortofosforowy  | Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy                                | Substancja niebędąca substancją czynną | 7664-38-2  | 231-633-2 | 0,0           | 0,0   |
| Poly(oxy-1,2-ethane-diyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Poly(oxy-1,2-ethane-diyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Substancja niebędąca substancją czynną | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0           | 0,0   |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate          | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate          | Substancja niebędąca substancją czynną | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0           | 0,0   |

2.2. **Rodzaj(e) receptury z meta SPC 3**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Postać użytkowa | AL - Ciecz |
|-----------------|------------|

3. **ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 3**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  | Może powodować korozję metali.<br>Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.   |
| Zwroty wskazujące środki ostrożności | Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.<br>Unikać uwolnienia do środowiska.<br>Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.<br>Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.<br>Usuwać zawartość do pojemnik zgodnie z lokalnymi przepisami. |

4. **ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 3**4.1. **Opis użycia**

**Tabela 3. Zastosowanie # 1 – Higiena weterynaryjna - hodowla zwierząt - poudojowa dezynfekcja strzyków - profesjonalny - wewnątrz pomieszczeń –metodą natryskową**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Grupa produktowa  | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna |
| W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem | -                              |

▼ **M1**

|  |  |
|--|--|
| Zwalczany(-e) organizm(-y)<br>(w tym etap rozwoju) | Bakterie<br>Drożdże  |
| Obszar zastosowania                                | Wewnątrz   |
| Sposób (-oby) nanoszenia                           | System otwarty: natrysk<br>Poudojowa, niemedyyczna dezynfekcja strzyków krów, produktem gotowym do użycia ręczną lub automatyczną metodą natryskową.   |
| Stosowane dawki i częstotliwość stosowania         | Dawka stosowania: 10-15 ml na krowę - 0<br>Częstotliwość stosowania:<br>W okresie laktacji: <ul style="list-style-type: none"> <li>• metoda ręczna 2 aplikacje na dzień (po udoju)</li> <li>• metoda zautomatyzowana: 3 aplikacje na dzień (po udoju)</li> </ul> W okresie suszy: 1 aplikacja na dzień |
| Kategoria (-e) użytkowników                        | Profesjonalny  |
| Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe        | Butelka HDPE: 1 l, Zakrętka wykonana jest z PP<br>Puszka Jerry'ego HDPE: 5 - 60 l<br>Beczka HDPE: 200 l<br>IBC: HDPE: 600 - 1000 l   |

4.1.1. *Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania*

—

4.1.2. *Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania*

—

4.1.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

—

4.1.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

—

4.1.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

—

5. **OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA <sup>(3)</sup>Z META SPC 3**5.1. **Instrukcje stosowania**

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety lub ulotki i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Przed użyciem produkt należy ogrzać do temperatury powyżej 20 °C

W celu napełnienia sprzętu do aplikacji produktu, zaleca się użycie pompki dozującej.

<sup>(3)</sup> Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 3.

**▼ M1**

Natychmiast po udoju każdej krowy należy spryskać roztworem całą powierzchnię każdego ze strzyków. Pozostawić produkt do następnego udoju. Nie czyścić strzyków bezpośrednio po dezynfekcji.

Krowy trzymać w pozycji stojącej do momentu wyschnięcia produktu (co najmniej 5 minut).

Produkt może być aplikowany ręcznie lub za pomocą automatycznego spryskiwacza strzyków.

Przed kolejnym udojem strzyki należy oczyścić, najlepiej jedną nową, moką ściereczką na każdą krowę.

Częstotliwość stosowania nie może przekraczać dwóch aplikacji na krowę dziennie w przypadku ręcznej metody natryskowej i nie może przekraczać trzech aplikacji na krowę dziennie automatycznej metody natryskowej

**5.2. Środki zmniejszające ryzyko**

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nosić rękawice ochronne odporne chemicznie, powlekane kombinezony i buty podczas obchodzenia się z produktem i stosowania (materiał powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie).

W przypadku gdy konieczne jest połączenie dezynfekcji przed i poudojowej, do dezynfekcji przedudojowej należy rozważyć zastosowanie innego produktu niezawierającego jodu.

**5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

W przypadku wdychania: Wyprowadzić na świeże powietrze, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Dokładnie umyć skórę.

W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy przy otwartych powiekach, zdjąć soczewki kontaktowe, płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta, a następnie wypić trochę wody. Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać pomoc lekarską.

W przypadku konsultacji lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę i zadzwonić do lokalnego ośrodka kontroli zatruc [tutaj wstawić lokalny numer].

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Poinformować stosowne władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (kanały, drogi wodne, gleba lub powietrze) Aby zapobiec awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałości zawierające produkt w zależności od wymogów lokalnych można usunąć do kanalizacji lub w miejsce składowania obornika (do rozrzucenia na glebach rolnych lub fermentacji w instalacjach biogazu).

**5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

Po zakończeniu zabiegu usunąć niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyty produkt można usunąć do kanalizacji miejskiej lub miejsca składowania obornika zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Unikać uwalniania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Europejski Katalog odpadów: 200130 – detergenty inne, niż wymienione w 20 01 29



▼ **M1****5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

Produkt przechowywać w nieprzezroczystych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 12 miesięcy w HDPE

**6. INNE INFORMACJE****7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 3****7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

|                  |  |                   |           |           |               |
|------------------|--|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| Nazwa handlowa   | Fink - Io Spray 50 (Jodophor)<br>Fink - Io Spray 50 (Iodophor) |                   |           |           |               |
| Numer pozwolenia | EU-0020540-0004 1-3  |                   |           |           |               |
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa IUPAC  | Funkcja           | Numer CAS | Numer WE  | Zawartość (%) |
| Jod              |  | Substancja czynna | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,5           |

**META SPC 4****1. META SPC 4 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE****1.1. Meta SPC 4 – identyfikator**

|               |            |
|---------------|------------|
| Identyfikator | Meta SPC 4 |
|---------------|------------|

**1.2. Rozszerzenie numeru pozwolenia**

|       |     |
|-------|-----|
| Numer | 1-4 |
|-------|-----|

**1.3. Grupa produktowa**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Grupa produktowa | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna |
|------------------|--------------------------------|

**2. META SPC 4 – SKŁAD****2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 4**

| Nazwa zwyczajowa  | Nazwa IUPAC   | Funkcja                                | Numer CAS  | Numer WE  | Zawartość (%) |       |
|---|---|--|------------|-----------|---------------|-------|
|   |   |  |            |           | Min.          | Maks. |
| Jod   |   | Substancja czynna                      | 7553-56-2  | 231-442-4 | 0,1           | 0,15  |
| Kwas ortofosforowy  | Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy                                | Substancja niebędąca substancją czynną | 7664-38-2  | 231-633-2 | 0,0           | 0,0   |
| Poly(oxy-1,2-ethane-diyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Poly(oxy-1,2-ethane-diyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Substancja niebędąca substancją czynną | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0           | 0,0   |

▼ **M1**

| Nazwa zwyczajowa   | Nazwa IUPAC  | Funkcja                                | Numer CAS  | Numer WE  | Zawartość (%) |       |
|--|--|--|------------|-----------|---------------|-------|
|  |  |  |            |           | Min.          | Maks. |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Substancja niebędąca substancją czynną | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0           | 0,0   |

2.2. **Rodzaj(e) receptury z meta SPC 4**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Postać użytkowa | AL - Ciecz |
|-----------------|------------|

3. **ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 4**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  | Może powodować korozję metali.  |
| Zwroty wskazujące środki ostrożności | Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.<br>Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.<br>Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej. |

4. **ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 4**4.1. **Opis użycia**

**Tabela 4. Zastosowanie # 1 – Higiena weterynaryjna - hodowla zwierząt - poudojowa dezynfekcja strzyków - profesjonalny - wewnątrz pomieszczeń –metodą zanurzeniową**

|   |  |
|---|--|
| Grupa produktowa  | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna   |
| W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem | -  |
| Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)                           | Bakterie<br>Drożdże  |
| Obszar zastosowania   | Wewnątrz   |
| Sposób (-oby) nanoszenia  | System otwarty: krótkotrwałe zanurzenie Poudojowa, niemedyzna dezynfekcja strzyków krów, produktem gotowym do użycia ręczną metodą zanurzeniową                          |
| Stosowane dawki i częstotliwość stosowania                                | Dawka stosowania: 5-10 ml na krowę - 0<br>Częstotliwość stosowania:<br>W okresie laktacji:<br>• 2 aplikacje dziennie (po udoju)<br>W okresie suszy: 1 aplikacja dziennie |

▼ **M1**

|   |  |
|---|--|
| Kategoria (-e) użytkowników                 | Profesjonalny  |
| Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe | Butelka HDPE: 1 l<br>Puszka Jerry'ego HDPE: 5 - 60 l<br>Beczka HDPE: 200 l<br>IBC HDPE: 600 - 1000 l |

4.1.1. *Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania*

—

4.1.2. *Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania*

—

4.1.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

—

4.1.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

—

4.1.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

—

**5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA <sup>(4)</sup>Z META SPC 4****5.1. Instrukcje stosowania**

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety lub ulotki i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Przed użyciem produkt musi być doprowadzony do temperatury powyżej 20 °C.

W celu napełnienia sprzętu do aplikacji produktu, zaleca się użycie pompki dozującej.

Napełnij 2/3 kubka do zanurzania strzyków produktem. Natychmiast po udoju każdej krowy należy zanurzyć każdy strzyk ręcznie w roztworze. Upewnić się, że co najmniej dwie trzecie strzyka, najlepiej całe strzyki, mają kontakt z roztworem.

Nie czyścić strzyków bezpośrednio po dezynfekcji. Pozostawić produkt do następnego udoju. Krowy trzymać w pozycji stojącej do momentu wyschnięcia produktu (co najmniej 5 minut)..

W razie potrzeby napełnić kubek.

Kubki zanurzania strzyków należy opróżnić po udoju i umyć przed ponownym użyciem. Przed kolejnym udojem strzyki należy oczyścić, najlepiej jedną nową, moką ściereczką na każdą krowę.

Częstotliwość aplikacji nie może przekraczać dwóch aplikacji na każdą krowę dziennie (po udoju).

**5.2. Środki zmniejszające ryzyko**

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

<sup>(4)</sup> Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 4.

▼ **M1**

W przypadku gdy konieczne jest połączenie dezynfekcji przed i poudo-  
jowej, do dezynfekcji przedudojowej należy rozważyć zastosowanie  
innego produktu niezawierającego jodu.

5.3. **Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich  
działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz  
środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

W przypadku wdychania: Wyprowadzić na świeże powietrze, w razie  
dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Dokładnie umyć skórę.

W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy przy otwartych powiekach,  
zdjąć soczewki kontaktowe, płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą.  
Następnie należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta, a następnie wypić trochę wody.  
Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać pomoc lekarską.

W przypadku konsultacji lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub  
etykiętę i zadzwonić do lokalnego ośrodka kontroli zatruc [tutaj wstawić  
lokalny numer].

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Poinformować stosowne władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie  
środowiska (kanały, drogi wodne, gleba lub powietrze) Aby zapobiec  
awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałości zawierające  
produkt w zależności od wymogów lokalnych można usunąć do kana-  
lizacji lub w miejsce składowania obornika (do rozrzucenia na glebach  
rolnych lub fermentacji w instalacjach biogazu).

5.4. **Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opako-  
wania**

Po zakończeniu zabiegu usunąć niewykorzystany produkt i opakowanie  
zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyty produkt można usunąć do kana-  
lizacji miejskiej lub miejsca składowania obornika zgodnie z lokalnymi  
wymaganiami. Unikać uwalniania do przydomowych oczyszczalni  
ścieków.

Europejski Katalog odpadów: 200130 – detergenty inne, niż wymienione  
w 20 01 29

5.5. **Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania  
produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

Produkt przechowywać w nieprzezroczystych, szczelnie zamkniętych  
pojemnikach w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.  
Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 12 miesięcy w HDPE

6. **INNE INFORMACJE**

7. **TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE  
PRODUKTY W META SPC 4**

7.1. **Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład  
wszystkich poszczególnych produktów**

|                  |                                  |                      |           |           |               |
|------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| Nazwa handlowa   | FINK - Io Dip 10<br>IODip 10 PVP |                      |           |           |               |
| Numer pozwolenia | EU-0020540-0005 1-4              |                      |           |           |               |
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa IUPAC                      | Funkcja              | Numer CAS | Numer WE  | Zawartość (%) |
| Jod              |                                  | Substancja<br>czynna | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,1           |

▼ **M1**7.2. **Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

|                  |  |                   |           |           |               |
|------------------|--|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| Nazwa handlowa   | FINK - Io Dip Protect<br>DESINTEC MH Iodine Barrier<br>TvP - Barrier Dip |                   |           |           |               |
| Numer pozwolenia | EU-0020540-0006 1-4  |                   |           |           |               |
| Nazwa zwyczajowa | Nazwa IUPAC  | Funkcja           | Numer CAS | Numer WE  | Zawartość (%) |
| Jod              |  | Substancja czynna | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,15          |

**META SPC 5**1. **META SPC 5 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**1.1. **Meta SPC 5 – identyfikator**

|               |            |
|---------------|------------|
| Identyfikator | Meta SPC 5 |
|---------------|------------|

1.2. **Rozszerzenie numeru pozwolenia**

|       |     |
|-------|-----|
| Numer | 1-5 |
|-------|-----|

1.3. **Grupa produktowa**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Grupa produktowa | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna |
|------------------|--------------------------------|

2. **META SPC 5 – SKŁAD**2.1. **Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 5**

| Nazwa zwyczajowa  | Nazwa IUPAC   | Funkcja                                | Numer CAS  | Numer WE  | Zawartość (%) |       |
|---|---|--|------------|-----------|---------------|-------|
|   |   |  |            |           | Min.          | Maks. |
| Jod   |   | Substancja czynna                      | 7553-56-2  | 231-442-4 | 0,3           | 0,45  |
| Kwas ortofosforowy  | Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy                                | Substancja niebędąca substancją czynną | 7664-38-2  | 231-633-2 | 0,35          | 0,4   |
| Poly(oxy-1,2-ethane-diyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Poly(oxy-1,2-ethane-diyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Substancja niebędąca substancją czynną | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0           | 0,0   |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate          | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate          | Substancja niebędąca substancją czynną | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0           | 0,0   |

▼ **M1**2.2. **Rodzaj(e) receptury z meta SPC 5**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Postać użytkowa | AL - Ciecz |
|-----------------|------------|

3. **ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 5**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  | Może powodować korozję metali.<br>Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  |
| Zwroty wskazujące środki ostrożności | Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.<br>Unikać uwolnienia do środowiska.<br>Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.<br>Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.<br>Usuwać zawartość do zgodnie z lokalnymi przepisami. |

4. **ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 5**4.1. **Opis użycia**

**Tabela 5. Zastosowanie # 1 – Higiena weterynaryjna - hodowla zwierząt - poudojowa dezynfekcja strzyków - profesjonalny - wewnątrz pomieszczeń –metodą zanurzeniową**

|   |  |
|---|--|
| Grupa produktowa  | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna   |
| W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem | -  |
| Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)                           | Bakterie<br>Drożdże  |
| Obszar zastosowania   | Wewnątrz   |
| Sposób (-oby) nanoszenia  | System otwarty: krótkotrwałe zanurzenie Poudojowa, niemedyzna dezynfekcja strzyków krów, produktem gotowym do użycia ręczną metodą zanurzeniową                          |
| Stosowane dawki i częstotliwość stosowania                                | Dawka stosowania: 5-10 ml na krowę - 0<br>Częstotliwość stosowania:<br>W okresie laktacji:<br>• 2 aplikacje dziennie (po udoju)<br>W okresie suszy: 1 aplikacja dziennie |
| Kategoria (-e) użytkowników   | Profesjonalny  |
| Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe                               | Butelka HDPE: 1 l<br>Puszka Jerry'ego HDPE: 5 - 60 l<br>Beczka HDPE: 200 l<br>IBC HDPE: 600 - 1000 l   |

**▼ M1**4.1.1. *Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania*

—

4.1.2. *Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania*

—

4.1.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

—

4.1.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

—

4.1.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

—

**5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA <sup>(5)</sup>Z META SPC 5****5.1. Instrukcje stosowania**

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety lub ulotki i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Przed użyciem produkt musi być doprowadzony do temperatury powyżej 20 °C.

W celu napełnienia sprzętu do aplikacji produktu, zaleca się użycie pompki dozującej.

Napełnij 2/3 kubka do zanurzania strzyków produktem. Natychmiast po udoju każdej krowy należy zanurzyć każdy strzyk ręcznie w roztworze. Upewnić się, że co najmniej dwie trzecie strzyka, najlepiej całe strzyki, mają kontakt z roztworem.

Nie czyścić strzyków bezpośrednio po dezynfekcji. Pozostawić produkt do następnego udoju.

Krowy trzymać w pozycji stojącej do momentu wyschnięcia produktu (co najmniej 5 minut).

W razie potrzeby napełnić kubek.

Kubki zanurzania strzyków należy opróżnić po udoju i umyć przed ponownym użyciem. Przed kolejnym udojem strzyki należy oczyścić, najlepiej jedną nową, mokrą ściereczką na każdą krowę.

Częstotliwość aplikacji nie może przekraczać dwóch aplikacji na każdą krowę dziennie (po udoju).

**5.2. Środki zmniejszające ryzyko**

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku gdy konieczne jest połączenie dezynfekcji przed i poudojowej, do dezynfekcji przedudojowej należy rozważyć zastosowanie innego produktu niezawierającego jodu.

**5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

W przypadku wdychania: Wyprowadzić na świeże powietrze, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Dokładnie umyć skórę.

W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy przy otwartych powiekach, zdjąć soczewki kontaktowe, płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie należy skonsultować się z lekarzem.

<sup>(5)</sup> Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 5.

▼ **M1**

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta, a następnie wypić trochę wody. Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać pomoc lekarską.

W przypadku konsultacji lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę i zadzwonić do lokalnego ośrodka kontroli zatruc [tutaj wstawić lokalny numer].

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Poinformować stosowne władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (kanały, drogi wodne, gleba lub powietrze) Aby zapobiec awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałości zawierające produkt w zależności od wymogów lokalnych można usunąć do kanalizacji lub w miejsce składowania obornika (do rozrzucenia na glebach rolnych lub fermentacji w instalacjach biogazu).

#### 5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu zabiegu usunąć niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyty produkt można usunąć do kanalizacji miejskiej lub miejsca składowania obornika zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Unikać uwalniania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Europejski Katalog odpadów: 200130 – detergenty inne, niż wymienione w 20 01 29

#### 5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w nieprzezroczystych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 12 miesięcy w HDPE

#### 6. INNE INFORMACJE

#### 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 5

#### 7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

|                    |  |  |           |           |               |
|--------------------|--|--|-----------|-----------|---------------|
| Nazwa handlowa     | Jodofilm 75/5 4500 ppm<br>IOFILMO SUPER<br>SUPERIO 4.5<br>PROTEGO 4500<br>TIGER 50<br>ASSOLUTO 5<br>REDFOX S<br>SUPER MANGUST<br>AUGUSTO P5<br>IO-DIN 45 |  |           |           |               |
| Numer pozwolenia   | EU-0020540-0007 1-5  |  |           |           |               |
| Nazwa zwyczajowa   | Nazwa IUPAC  | Funkcja                                | Numer CAS | Numer WE  | Zawartość (%) |
| Jod                |  | Substancja czynna                      | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,45          |
| Kwas ortofosforowy | Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy   | Substancja niebędąca substancją czynną | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,4           |



▼ **M1**7.2. **Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

|                    |   |  |           |           |               |
|--------------------|---|--|-----------|-----------|---------------|
| Nazwa handlowa     | Jodofilm 75/5 3000 ppm<br>JODOFILM 75/3<br>IOFILMO<br>SUPERIO 3.0<br>PROTEGO 3000<br>TIGER 30<br>ASSOLUTO 3<br>REDFOX E<br>MANGUST<br>AUGUSTO P3<br>IO-DIN 30 |  |           |           |               |
| Numer pozwolenia   | EU-0020540-0008 1-5   |  |           |           |               |
| Nazwa zwyczajowa   | Nazwa IUPAC   | Funkcja                                | Numer CAS | Numer WE  | Zawartość (%) |
| Jod                |   | Substancja czynna                      | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,3           |
| Kwas ortofosforowy | Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy  | Substancja niebędąca substancją czynną | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,35          |

**META SPC 6**1. **META SPC 6 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**1.1. **Meta SPC 6 – identyfikator**

|               |            |
|---------------|------------|
| Identyfikator | Meta SPC 6 |
|---------------|------------|

1.2. **Rozszerzenie numeru pozwolenia**

|       |     |
|-------|-----|
| Numer | 1-6 |
|-------|-----|

1.3. **Grupa produktowa**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Grupa produktowa | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna |
|------------------|--------------------------------|

2. **META SPC 6 – SKŁAD**2.1. **Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 6**

| Nazwa zwyczajowa  | Nazwa IUPAC   | Funkcja                                | Numer CAS  | Numer WE  | Zawartość (%) |       |
|---|---|--|------------|-----------|---------------|-------|
|   |   |  |            |           | Min.          | Maks. |
| Jod   |   | Substancja czynna                      | 7553-56-2  | 231-442-4 | 1,75          | 2,4   |
| Kwas ortofosforowy  | Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy                              | Substancja niebędąca substancją czynną | 7664-38-2  | 231-633-2 | 3,0           | 10,0  |
| Poly(oxy-1,2-ethanediylo).alpha.-tridecyl-omega-hydroxy-,branched | Poly(oxy-1,2-ethanediylo).alpha.-tridecyl-omega-hydroxy-,branched | Substancja niebędąca substancją czynną | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0           | 25,6  |

## ▼ M1

| Nazwa zwyczajowa   | Nazwa IUPAC  | Funkcja                                | Numer CAS  | Numer WE  | Zawartość (%) |       |
|--|--|--|------------|-----------|---------------|-------|
|  |  |  |            |           | Min.          | Maks. |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Substancja niebędąca substancją czynną | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0           | 31,8  |

## 2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 6

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Postać użytkowa | SL- Koncentrat rozpuszczalny |
|-----------------|------------------------------|

## 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 6

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  | Może powodować korozję metali.<br>Działa szkodliwie po połknięciu.<br>Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.<br>Powoduje poważne uszkodzenie oczu.<br>Może powodować uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.<br>Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.   |
| Zwroty wskazujące środki ostrożności | Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.<br>Nie wdychać mgły.<br>Nie wdychać rozpylonej cieczy.<br>Unikać uwolnienia do środowiska.<br>Stosować rękawice ochronne.<br>Stosować odzież ochronną.<br>Stosować ochronę twarzy.<br>W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.<br>W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.<br>Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.<br>Przechowywać pod zamknięciem.<br>Chronić przed dziećmi. |

## 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 6

## 4.1. Opis użycia

**Tabela 6. Zastosowanie # 1 – Higiena weterynaryjna - hodowla zwierząt – środek do dezynfekcji powierzchni twardych - profesjonalny - wewnątrz pomieszczeń - metoda natryskowa**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Grupa produktowa  | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna |
| W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem | -                              |

▼ **M1**

|  |   |
|--|---|
| Zwalczany(-e) organizm(-y)<br>(w tym etap rozwoju) | Bakterie<br>Drożdże<br>Wirusy   |
| Obszar zastosowania                                | Wewnątrz  |
| Sposób (-oby) nanoszenia                           | System otwarty: natrysk<br>Środek dezynfekujący do powierzchni twardych w budynkach inwentarskich (z wyjątkiem wylęgarni). Oprysk rozcieńczonym koncentratem za pomocą ręcznego opryskiwacza plecakowego (4-7 bar)  |
| Stosowane dawki i częstotliwość stosowania         | 100 mL/m <sup>2</sup> - stężenie jodu w roztworze użytkowym: 750 ppm (0,075 %w/w).<br>Częstotliwość stosowania w ciągu roku:<br>Krowy mleczne: 1<br>Bydło wołowe: 1<br>Cielęta: 4<br>Maciory, w kojach indywidualnych: 5<br>Maciory w grupach: 5<br>Tuczniaki: 3<br>Kury nioski w klatkach bateryjnych bez obróbki: 1<br>kury nioski w klatkach bateryjnych z napowietrzaniem (suszenie taśmowe): 1<br>kury nioski w klatkach bateryjnych z wymuszonym suszeniem (głęboki dół, wysoki wzrost): 1<br>kury nioski w kompaktowych klatkach bateryjnych: 1<br>Kury nioski na wolnym wybiegu z podłogą ściółkową (częściowo ściółkowana, częściowo listwowana): 1<br>Brojlery na wolnym wybiegu z podłogą: 7<br>kury nioski na wolnym wybiegu z kratownicą (system aviery): 1<br>brojlery rodzicielskie w wolnym wybiegu z kratownicą: 1<br>brojlery rodzicielskie w odchowie z podłogą kratową: 3<br>indyki na wolnym wybiegu z klepiskiem: 2<br>kaczki na wolnym wybiegu z podłogą: 13<br>gęsi na wolnym wybiegu z klepiskiem: 6 |
| Kategoria (-e) użytkowników                        | Profesjonalny   |
| Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe        | Butelka HDPE: 1 l, zakrętka wykonana jest z PP<br>Puszka Jerry'ego HDPE: 5 - 60 l<br>Beczka HDPE: 200 l<br>IBC HDPE: 600 - 1000 l   |

## 4.1.1. Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Iodosan 30: Zmieszać 29 mL produktu z 971 mL wody, by uzyskać 1 l roztworu do aplikacji.

Iodosan 18: Zmieszać 40 mL produktu z 960 mL wody, by uzyskać 1 l roztworu do aplikacji.

▼ **M1**4.1.2. *Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania*

- - -

4.1.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

- - -

4.1.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

- - -

4.1.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

- - -

**5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA <sup>(6)</sup>Z META SPC 6****5.1. Instrukcje stosowania**

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety lub ulotki i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

W celu przygotowania roztworu środka dezynfekującego należy zmieszać płynny produkt z wodą. Zawsze najpierw zalewamy wodą, a następnie ostrożnie mieszamy produkt.

Stosować maks. 100 ml roztworu aplikacyjnego na m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej. Nie należy przygotowywać większej ilości płynów niż jest to absolutnie konieczne.

Produkt może być stosowany w pustych (niezamieszkanym) obiektach dla zwierząt dopiero po dokładnym oczyszczeniu powierzchni odpowiednim środkiem czyszczącym.

Czyszczenie wstępne jest obowiązkowe. Wypłukać lub przetrzeć powierzchnie, które będą następnie poddane obróbce. Pozostawić je do wyschnięcia na około 24 do 36 godzin przed dezynfekcją w celu uzyskania powierzchni zwilżonych. Instalacje i urządzenia dokładnie nasączyć cienką warstwą przygotowanego roztworu przez natryskiwanie, przy użyciu odpowiednich urządzeń (4 do 7 bar). Podczas procesu i przez czas trwania kontaktu (min. 30 minut) wszystkie otwory muszą być zamknięte, a wentylacja musi być wyłączona.

**5.2. Środki zmniejszające ryzyko**

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Forma butelki produktu powinna minimalizować ryzyko rozprysków, aby zapobiec narażeniu oczu i skóry podczas rozcieńczania produktu.

Podczas fazy mieszania i załadunku: Stosowanie osłony twarzy i rękawic ochronnych (materiał, który ma być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) jest obowiązkowe.

Podczas aplikacji roztworu roboczego metodą natryskową: Należy nosić rękawice i kombinezon ochronny (co najmniej typ X, EN XXXXX), który jest nieprzepuszczalny dla produktu biobójczego (rękawice i materiał na kombinezon muszą być określone przez posiadacza pozwolenia w informacji o produkcie). Do każdej zmiany roboczej należy używać nowych rękawic.

Specjaliści nie mogą przeprowadzać dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt więcej niż 3 razy w miesiącu. Specjaliści ci nie powinni używać produktów jodowych do dodatkowych celów.

<sup>(6)</sup> Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 6.

▼ **M1**

Należy stosować tylko jeden rodzaj produktu zawierającego jod dziennie.

Dezynfekcji budynków inwentarskich nie prowadzić częściej niż raz w okresie życia dla cieląt i świń. Koryta należy zasłonić podczas stosowania.

5.3. **Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

W przypadku wdychania: Wynieść na świeże powietrze, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć i dokładnie umyć skórę.

W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast przepłukać oczy przy otwartych powiekach, zdjęć soczewki kontaktowe, płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta, a następnie wypić trochę wody. Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać pomoc lekarską.

W przypadku utraty przytomności umieścić pacjenta stabilnie w pozycji bocznej ustalonej na czas transportu. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej

W przypadku konsultacji lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę i zadzwonić do lokalnego centrum kontroli zatruc [tutaj wstawić lokalny numer].

Środki nadzwyczajne w zakresie ochrony środowiska:

Poinformować stosowne władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (kanały, drogi wodne, gleba lub powietrze) Aby zapobiec awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałości zawierające produkt w zależności od wymogów lokalnych można usunąć do kanalizacji lub w miejsce składowania obornika (do rozrzucenia na glebach rolnych lub fermentacji w instalacjach biogazu).

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zatrzymać wyciek, jeśli jest to bezpieczne. Zebrać wyciek za pomocą materiału wiążącego płyny (piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, lepiszcza kwaśne, uniwersalne lepiszcza, trociny) i umieścić w pojemniku do utylizacji zgodnie z przepisami lokalnymi.

5.4. **Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

Po zakończeniu zabiegu usunąć niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyty produkt można usunąć do kanalizacji miejskiej lub miejsca składowania obornika zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Unikać uwalniania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Europejski Katalog odpadów: 200130 – detergenty inne, niż wymienione w 20 01 29

5.5. **Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

Produkt przechowywać w nieprzezroczystych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 24 miesiące w HDPE

▼ **M1**

6. **INNE INFORMACJE**
7. **TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 6**
- 7.1. **Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

|  |   |  |            |           |               |
|--|---|--|------------|-----------|---------------|
| Nazwa handlowa   | IODOSAN 30<br>IODOSAN<br>JODAT<br>DESINTEC FL-JODES<br>ROTIE-SOL J<br>Disinfect Jod<br>FINK - Jodophos 15<br>Jod-Reiniger sauer<br>Tankrein extra |  |            |           |               |
| Numer pozwolenia   | EU-0020540-0009 1-6   |  |            |           |               |
| Nazwa zwyczajowa   | Nazwa IUPAC   | Funkcja                                | Numer CAS  | Numer WE  | Zawartość (%) |
| Jod  |   | Substancja czynna                      | 7553-56-2  | 231-442-4 | 2,4           |
| Kwas ortofosforowy   | Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy  | Substancja niebędąca substancją czynną | 7664-38-2  | 231-633-2 | 10,0          |
| Poly(oxy-1,2-ethanediył).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Poly(oxy-1,2-ethanediył).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched  | Substancja niebędąca substancją czynną | 69011-36-5 | 500-241-6 | 25,6          |

- 7.2. **Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

|  |  |  |            |           |               |
|--|--|--|------------|-----------|---------------|
| Nazwa handlowa   | IODOSAN 18   |  |            |           |               |
| Numer pozwolenia   | EU-0020540-0010 1-6  |  |            |           |               |
| Nazwa zwyczajowa   | Nazwa IUPAC  | Funkcja                                | Numer CAS  | Numer WE  | Zawartość (%) |
| Jod  |  | Substancja czynna                      | 7553-56-2  | 231-442-4 | 1,75          |
| Kwas ortofosforowy   | Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy                       | Substancja niebędąca substancją czynną | 7664-38-2  | 231-633-2 | 3,0           |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate | Substancja niebędąca substancją czynną | 68439-46-3 | 614-482-0 | 31,8          |

▼ **M1****META SPC 7****1. META SPC 7 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE****1.1. Meta SPC 7 – identyfikator**

|               |            |
|---------------|------------|
| Identyfikator | Meta SPC 7 |
|---------------|------------|

**1.2. Rozszerzenie numeru pozwolenia**

|       |     |
|-------|-----|
| Numer | 1-7 |
|-------|-----|

**1.3. Grupa produktowa**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Grupa produktowa | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna |
|------------------|--------------------------------|

**2. META SPC 7 – SKŁAD****2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 7**

| Nazwa zwyczajowa   | Nazwa IUPAC  | Funkcja                                | Numer CAS  | Numer WE  | Zawartość (%) |       |
|--|--|--|------------|-----------|---------------|-------|
|  |  |  |            |           | Min.          | Maks. |
| Jod  |  | Substancja czynna                      | 7553-56-2  | 231-442-4 | 3,0           | 3,0   |
| Kwas ortofosforowy   | Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy                               | Substancja niebędąca substancją czynną | 7664-38-2  | 231-633-2 | 10,0          | 10,0  |
| Poly(oxy-1,2-ethanediył).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Poly(oxy-1,2-ethanediył).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Substancja niebędąca substancją czynną | 69011-36-5 | 500-241-6 | 31,8          | 31,8  |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate         | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate         | Substancja niebędąca substancją czynną | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0           | 0,0   |

**2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 7**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Postać użytkowa | SL- Koncentrat rozpuszczalny |
|-----------------|------------------------------|

**3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 7**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia | Może powodować korozję metali.<br>Działa szkodliwie po połknięciu.<br>Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.<br>Powoduje poważne uszkodzenie oczu.<br>Może powodować uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.<br>Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
|-------------------------------------|--|

▼ **M1**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Zwroty wskazujące środki ostrożności | <p>Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.<br/>         Nie wdychać mgły.<br/>         Nie wdychać rozpylonej cieczy.<br/>         Unikać uwolnienia do środowiska.<br/>         Stosować rękawice ochronne.<br/>         Stosować odzież ochronną.<br/>         Stosować ochronę twarzy.<br/>         W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody.<br/>         W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.<br/>         Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.<br/>         Przechowywać pod zamknięciem.<br/>         Chronić przed dziećmi.</p> |
|--------------------------------------|---|

4. **ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 7**4.1. **Opis użycia**

**Tabela 7. Zastosowanie # 1 – Higiena weterynaryjna - hodowla zwierząt – środek do dezynfekcji powierzchni twardych - profesjonalny - wewnątrz pomieszczeń - metoda natryskowa**

|   |   |
|---|---|
| Grupa produktowa  | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna  |
| W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem | -   |
| Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)                           | Bakterie<br>Drożdże<br>Wirusy   |
| Obszar zastosowania   | Wewnątrz  |
| Sposób (-oby) nanoszenia  | System otwarty: natrysk<br>Środek dezynfekujący do powierzchni twardych w budynkach inwentarskich (z wyjątkiem wylęgarni). Oprysk rozcieńczonym koncentratem za pomocą ręcznego opryskiwacza plecakowego (4-7 bar).   |
| Stosowane dawki i częstotliwość stosowania                                | 100 mL/m <sup>2</sup> - stężenie jodu w roztworze użytkowym: 750 ppm (0,075 %w/w).<br>Częstotliwość stosowania w ciągu roku:<br>Krowy mleczne: 1<br>Bydło wołowe: 1<br>Cielęta: 4<br>Maciory, w kojach indywidualnych: 5<br>Maciory w grupach: 5<br>Tuczniki: 3<br>Kury nioski w klatkach bateryjnych bez obróbki: 1<br>kury nioski w klatkach bateryjnych z napowietrzaniem (suszenie taśmowe): 1<br>kury nioski w klatkach bateryjnych z wymuszonym suszeniem (głęboki dół, wysoki wzrost): 1<br>kury nioski w kompaktowych klatkach bateryjnych: 1 |



▼ **M1**

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Kury nioski na wolnym wybiegu z podłogą ściółkową (częściowo ściółkowana, częściowo listwowa): 1</p> <p>Brojlery na wolnym wybiegu z podłogą: 7</p> <p>kury nioski na wolnym wybiegu z kratownicą (system aviery): 1</p> <p>brojlery rodzicielskie w wolnym wybiegu z kratownicą: 1</p> <p>brojlery rodzicielskie w odchowcie z podłogą kratową: 3</p> <p>indyki na wolnym wybiegu z klepiskiem: 2</p> <p>kaczki na wolnym wybiegu z podłogą: 13</p> <p>gęsi na wolnym wybiegu z klepiskiem: 6</p> |
| Kategoria (-e) użytkowników                 | Profesjonalny   |
| Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe | <p>Butelka HDPE: 1 l, zakrętka wykonana jest z PP</p> <p>Puszka Jerry'ego HDPE: 5 - 60 l</p> <p>Beczka HDPE: 200 l</p> <p>IBC HDPE: 600 - 1000 l</p>  |

4.1.1. *Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania*

Iodosan 30 plus: Zmieszać 23 mL produktu z 977 mL wody, by uzyskać 1 l roztworu do aplikacji.

4.1.2. *Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania*

---

4.1.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

---

4.1.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

---

4.1.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

---

5. **OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA <sup>(?)</sup>Z META SPC 7**5.1. **Instrukcje stosowania**

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety lub ulotki i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

W celu przygotowania roztworu środka dezynfekującego należy zmieszać płynny produkt z wodą. Zawsze najpierw zalewamy wodą, a następnie ostrożnie mieszamy produkt.

Stosować maks. 100 ml roztworu aplikacyjnego na m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej. Nie należy przygotowywać większej ilości płynów niż jest to absolutnie konieczne.

Produkt może być stosowany w pustych (niezamieszkanym) obiektach dla zwierząt dopiero po dokładnym oczyszczeniu powierzchni odpowiednim środkiem czyszczącym.

<sup>(?)</sup> Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 7.

▼ **M1**

Czyszczenie wstępne jest obowiązkowe. Wypłukać lub przetrzeć powierzchnie, które będą następnie poddane obróbce. Pozostawić je do wyschnięcia na około 24 do 36 godzin przed dezynfekcją w celu uzyskania powierzchni zwilżonych. Instalacje i urządzenia dokładnie nasączyć cienką warstwą przygotowanego roztworu przez natryskiwanie, przy użyciu odpowiednich urządzeń (4 do 7 bar). Podczas procesu i przez czas trwania kontaktu (min. 30 minut) wszystkie otwory muszą być zamknięte, a wentylacja musi być wyłączona.

5.2. **Środki zmniejszające ryzyko**

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Forma butelki produktu powinna minimalizować ryzyko rozprysków, aby zapobiec narażeniu oczu i skóry podczas rozcieńczania produktu.

Podczas fazy mieszania i załadunku: Stosowanie osłony twarzy i rękawic ochronnych (materiał, który ma być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) jest obowiązkowe.

Podczas aplikacji roztworu roboczego metodą natryskową: Należy nosić rękawice i kombinezon ochronny (co najmniej typ X, EN XXXXX), który jest nieprzepuszczalny dla produktu biobójczego (rękawice i materiał na kombinezon muszą być określone przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie). Do każdej zmiany roboczej należy używać nowych rękawic.

Specjaliści nie mogą przeprowadzać dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt więcej niż 3 razy w miesiącu. Specjaliści ci nie powinni używać produktów jodowych do dodatkowych celów.

Należy stosować tylko jeden rodzaj produktu zawierającego jod dziennie.

Dezynfekcji stajni nie prowadzić częściej niż raz w okresie życia dla cieląt i świń. Koryta należy zasłonić podczas stosowania.

5.3. **Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

W przypadku wdychania: Wynieść na świeże powietrze, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć i dokładnie umyć skórę.

W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast przepłukać oczy przy otwartych powiekach, zdjęć soczewki kontaktowe, płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta, a następnie wypić trochę wody. Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać pomoc lekarską.

W przypadku utraty przytomności umieścić pacjenta stabilnie w pozycji bocznej ustalonej na czas transportu. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej

W przypadku konsultacji lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę i zadzwonić do lokalnego centrum kontroli zatruc [tutaj wstawić lokalny numer].

Środki nadzwyczajne w zakresie ochrony środowiska: Poinformować stosowne władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (kanały, drogi wodne, gleba lub powietrze) Aby zapobiec awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałości zawierające produkt w zależności od wymogów lokalnych można usunąć do kanalizacji lub w miejsce składowania obornika (do rozrzucenia na glebach rolnych lub fermentacji w instalacjach biogazu).

▼ **M1**

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zatrzymać wyciek, jeśli jest to bezpieczne. Zebrać wyciek za pomocą materiału wiążącego płyny (piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, lepiszcza kwaśne, uniwersalne lepiszcza, trociny) i umieścić w pojemniku do utylizacji zgodnie z przepisami lokalnymi.

#### 5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu zabiegu usunąć niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyty produkt można usunąć do kanalizacji miejskiej lub miejsca składowania obornika zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Unikać uwalniania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Europejski Katalog odpadów: 200130 – detergenty inne, niż wymienione w 20 01 29

#### 5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w nieprzezroczystych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 24 miesiące w HDPE

### 6. INNE INFORMACJE

#### 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 7

##### 7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

|  |  |  |            |           |               |
|--|--|--|------------|-----------|---------------|
| Nazwa handlowa   | IODOSAN 30 Plus<br>YODO CONTROL<br>YODIVEN                         |  |            |           |               |
| Numer pozwolenia   | EU-0020540-0011 1-7  |  |            |           |               |
| Nazwa zwyczajowa   | Nazwa IUPAC  | Funkcja                                | Numer CAS  | Numer WE  | Zawartość (%) |
| Jod  |  | Substancja czynna                      | 7553-56-2  | 231-442-4 | 3,0           |
| Kwas ortofosforowy   | Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy                               | Substancja niebędąca substancją czynną | 7664-38-2  | 231-633-2 | 10,0          |
| Poly(oxy-1,2-ethanediył).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Poly(oxy-1,2-ethanediył).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Substancja niebędąca substancją czynną | 69011-36-5 | 500-241-6 | 31,8          |

### META SPC 8

#### 1. META SPC 8 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

##### 1.1. Meta SPC 8 – identyfikator

|               |            |
|---------------|------------|
| Identyfikator | Meta SPC 8 |
|---------------|------------|

▼ **M1**1.2. **Rozszerzenie numeru pozwolenia**

|       |     |
|-------|-----|
| Numer | 1-8 |
|-------|-----|

1.3. **Grupa produktowa**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Grupa produktowa | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna |
|------------------|--------------------------------|

2. **META SPC 8 – SKŁAD**2.1. **Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 8**

| Nazwa zwyczajowa  | Nazwa IUPAC   | Funkcja                                | Numer CAS  | Numer WE  | Zawartość (%) |       |
|---|---|--|------------|-----------|---------------|-------|
|   |   |  |            |           | Min.          | Maks. |
| Jod   |   | Substancja czynna                      | 7553-56-2  | 231-442-4 | 1,5           | 1,5   |
| Kwas ortofosforowy  | Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy                                | Substancja niebędąca substancją czynną | 7664-38-2  | 231-633-2 | 3,0           | 3,0   |
| Poly(oxy-1,2-ethane-diyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Poly(oxy-1,2-ethane-diyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Substancja niebędąca substancją czynną | 69011-36-5 | 500-241-6 | 18,0          | 18,0  |
| Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate          | Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate          | Substancja niebędąca substancją czynną | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0           | 0,0   |

2.2. **Rodzaj(e) receptury z meta SPC 8**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Postać użytkowa | SL- Koncentrat rozpuszczalny |
|-----------------|------------------------------|

3. **ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 8**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  | Może powodować korozję metali.<br>Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.<br>Powoduje poważne uszkodzenie oczu.<br>Może powodować uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.<br>Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| Zwroty wskazujące środki ostrożności | Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.<br>Nie wdychać mgły.<br>Nie wdychać rozpylonej cieczy.<br>Unikać uwolnienia do środowiska.<br>Stosować rękawice ochronne.<br>Stosować odzież ochronną.<br>Stosować ochronę twarzy.   |

▼ **M1**

|  |   |
|--|---|
|  | <p>W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.</p> <p>W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.</p> <p>Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.</p> <p>Przechowywać pod zamknięciem.</p> <p>Chronić przed dziećmi.</p> |
|--|---|

## 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 8

## 4.1. Opis użycia

**Tabela 8. Zastosowanie # 1 – Higiena weterynaryjna - hodowla zwierząt – środek do dezynfekcji powierzchni twardych - profesjonalny - wewnątrz pomieszczeń - metoda natryskowa**

|   |   |
|---|---|
| Grupa produktowa  | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna  |
| W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem | -   |
| Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)                           | Bakterie<br>Drożdże<br>Wirusy   |
| Obszar zastosowania   | Wewnątrz  |
| Sposób (-oby) nanoszenia  | System otwarty: natrysk<br>Środek dezynfekujący do powierzchni twardych w budynkach inwentarskich (z wyjątkiem wylęgarni). Oprysk rozcieńczonym koncentratem za pomocą ręcznego opryskiwacza plecakowego (4-7 bar).   |
| Stosowane dawki i częstotliwość stosowania                                | 100 mL/m <sup>2</sup> - stężenie jodu w roztworze użytkowym: 750 ppm (0,075 %w/w).<br>Częstotliwość stosowania w ciągu roku:<br>Krowy mleczne: 1<br>Bydło wołowe: 1<br>Cielęta: 4<br>Maciory, w kojach indywidualnych: 5<br>Maciory w grupach: 5<br>Tuczniaki: 3<br>Kury nioski w klatkach bateryjnych bez obróbki: 1<br>kury nioski w klatkach bateryjnych z napowietrzaniem (suszenie taśmowe): 1<br>kury nioski w klatkach bateryjnych z wymuszonym suszeniem (głęboki dół, wysoki wzrost): 1<br>kury nioski w kompaktowych klatkach bateryjnych: 1<br>Kury nioski na wolnym wybiegu z podłogą ściółkową (częściowo ściółkowana, częściowo listwowa): 1<br>Brojlery na wolnym wybiegu z podłogą: 7<br>kury nioski na wolnym wybiegu z kratownicą (system aviery): 1<br>brojlery rodzicielskie w wolnym wybiegu z kratownicą: 1 |

▼ **M1**

|   |  |
|---|--|
|   | brojlery rodzicielskie w odchowie z podłogą kratową: 3<br>indyki na wolnym wybiegu z klepiskiem: 2<br>kaczki na wolnym wybiegu z podłogą: 13<br>gęsi na wolnym wybiegu z klepiskiem: 6 |
| Kategoria (-e) użytkowników                 | Profesjonalny  |
| Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe | Butelka HDPE: 1 l, zakrętka wykonana jest z PP<br>Puszka Jerry'ego HDPE: 5 - 60 l<br>Beczka HDPE: 200 l<br>IBC HDPE: 600 - 1000 l  |

4.1.1. *Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania*

Iodosan 15: Zmieszać 46 mL produktu z 954 mL wody, by uzyskać 1 l roztworu do aplikacji.

4.1.2. *Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania*

- - -

4.1.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

- - -

4.1.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

- - -

4.1.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

- - -

**5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA <sup>(8)</sup>Z META SPC 8****5.1. Instrukcje stosowania**

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety lub ulotki i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

W celu przygotowania roztworu środka dezynfekującego należy zmieszać płynny produkt z wodą. Zawsze najpierw zalewamy wodą, a następnie ostrożnie mieszamy produkt.

Stosować maks. 100 ml roztworu aplikacyjnego na m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej. Nie należy przygotowywać większej ilości płynów niż jest to absolutnie konieczne.

Produkt może być stosowany w pustych (niezamieszkanym) obiektach dla zwierząt dopiero po dokładnym oczyszczeniu powierzchni odpowiednim środkiem czyszczącym.

Czyszczenie wstępne jest obowiązkowe. Wyplukać lub przetrzeć powierzchnie, które będą następnie poddane obróbce. Pozostawić je do wyschnięcia na około 24 do 36 godzin przed dezynfekcją w celu uzyskania powierzchni zwilżonych. Instalacje i urządzenia dokładnie nasączyć cienką warstwą przygotowanego roztworu przez natryskiwanie, przy użyciu odpowiednich urządzeń (4 do 7 bar). Podczas procesu i przez czas trwania kontaktu (min. 30 minut) wszystkie otwory muszą być zamknięte, a wentylacja musi być wyłączona.

<sup>(8)</sup> Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 8.

**▼ M1****5.2. Środki zmniejszające ryzyko**

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Forma butelki produktu powinna minimalizować ryzyko rozprysków, aby zapobiec narażeniu oczu i skóry podczas rozcieńczania produktu.

Podczas fazy mieszania i załadunku: Stosowanie osłony twarzy i rękawic ochronnych (materiał, który ma być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) jest obowiązkowe.

Podczas aplikacji roztworu roboczego metodą natryskową: Należy nosić rękawice i kombinezon ochronny (co najmniej typ X, EN XXXXX), który jest nieprzepuszczalny dla produktu biobójczego (rękawice i materiał na kombinezon muszą być określone przez posiadacza pozwolenia w informacji o produkcie). Do każdej zmiany roboczej należy używać nowych rękawic.

Specjaliści nie mogą przeprowadzać dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt więcej niż 3 razy w miesiącu. Specjaliści ci nie powinni używać produktów jodowych do dodatkowych celów.

Należy stosować tylko jeden rodzaj produktu zawierającego jod dziennie.

Dezynfekcji stajni nie prowadzić częściej niż raz w okresie życia dla cieląt i świń. Koryta należy zasłonić podczas stosowania.

**5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

W przypadku wdychania: Wynieść na świeże powietrze, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć i dokładnie umyć skórę.

W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast przepłukać oczy przy otwartych powiekach, zdjęć soczewki kontaktowe, płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta, a następnie wypić trochę wody. Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać pomoc lekarską.

W przypadku utraty przytomności umieścić pacjenta stabilnie w pozycji bocznej ustalonej na czas transportu. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej

W przypadku konsultacji lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę i zadzwonić do lokalnego centrum kontroli zatruc [tutaj wstawić lokalny numer].

Środki nadzwyczajne w zakresie ochrony środowiska: Poinformować stosowne władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (kanały, drogi wodne, gleba lub powietrze) Aby zapobiec awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałości zawierające produkt w zależności od wymogów lokalnych można usunąć do kanalizacji lub w miejsce składowania obornika (do rozrzucenia na glebach rolnych lub fermentacji w instalacjach biogazu).

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zatrzymać wyciek, jeśli jest to bezpieczne. Zebrać wyciek za pomocą materiału wiążącego płyny (piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, lepiszcza kwaśne, uniwersalne lepiszcza, trociny) i umieścić w pojemniku do utylizacji zgodnie z przepisami lokalnymi.

▼ **M1****5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

Po zakończeniu zabiegu usunąć niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyty produkt można usunąć do kanalizacji miejskiej lub miejsca składowania obornika zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Unikać uwalniania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Europejski Katalog odpadów: 200130 – detergenty inne, niż wymienione w 20 01 29

**5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

Produkt przechowywać w nieprzezroczystych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 24 miesiące w HDPE

**6. INNE INFORMACJE****7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 8****7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

|  |  |  |            |           |               |
|--|--|--|------------|-----------|---------------|
| Nazwa handlowa   | IODOSAN 15   |  |            |           |               |
| Numer pozwolenia   | EU-0020540-0012 1-8  |  |            |           |               |
| Nazwa zwyczajowa   | Nazwa IUPAC  | Funkcja                                | Numer CAS  | Numer WE  | Zawartość (%) |
| Jod  |  | Substancja czynna                      | 7553-56-2  | 231-442-4 | 1,5           |
| Kwas ortofosforowy   | Kwas fosforowy(V) Kwas ortofosforowy                               | Substancja niebędąca substancją czynną | 7664-38-2  | 231-633-2 | 3,0           |
| Poly(oxy-1,2-ethanediył).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Poly(oxy-1,2-ethanediył).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched | Substancja niebędąca substancją czynną | 69011-36-5 | 500-241-6 | 18,0          |