

31999R2293

6.11.1999

DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

L 284/1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2293/1999**z dnia 14 października 1999 r.****rozszerzające tymczasowe zezwolenia na niektóre dodatki paszowe****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych⁽¹⁾, ostatnio zmienioną rozporządzeniem Komisji (WE) 1636/1999⁽²⁾, w szczególności jego art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Artykuł 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG stanowi, że udzielone może być tymczasowe zezwolenie na stosowanie nowego dodatku lub na nowy sposób użycia dodatku, jeżeli, na poziomie dozwolonym dla pasz, nie ma to negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, zwierząt lub na środowisko, ani nie szkodzi konsumentom przez zmianę cech inwentarza żywego, jeżeli ich obecność w paszach może być kontrolowana i można przyjąć rozsądne założenie w świetle dostępnych wyników, że ma to korzystny wpływ na cechy pasz lub produkcję inwentarza żywego, jeśli dodatki te są wprowadzane do pasz.
- (2) Dyrektywa 70/524/EWG określa, że dodatki są zatwierdzane na szczeblu wspólnotowym, tymczasowo od dnia 1 października 1999 r. na okres, który nie może być dłuższy niż cztery lata; dodatki lub zastosowania dodatków tymczasowo zatwierdzone po raz pierwszy między dniem 1 kwietnia 1998 r. a dniem 30 września

1999 r., podlegają krajowym tymczasowym zezwoleniom z terminem ważności upływającym dnia 30 września 1999 r.; uznaje się za stosowne przedłużyć wspomniane tymczasowe zezwolenia.

- (3) Komisja skonsultowała się z Komitetem Naukowym ds. Żywienia Zwierząt w sprawie tymczasowego zatwierdzenia enzymów i mikroorganizmów wymienionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia; Komitet wyraził opinię w szczególności w zakresie bezpieczeństwa tych dodatków.
- (4) Środki określone w niniejszym rozporządzeniu, są zgodne z opinią Stałej Komisji ds. Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dodatki wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia są zatwierdzone na podstawie dyrektywy 70/524/EWG, zgodnie z warunkami ustanowionymi w tym Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 1999 r.

W imieniu Komisji,

David BYRNE

Członek Komisji

⁽¹⁾ Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1.⁽²⁾ Dz.U. L 194 z 27.7.1999, str. 17.

ZAŁĄCZNIK

BARWNIKI, W TYM PIGMENTY

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek paszowy jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					w mg substancji w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
1. Karotenoidy i ksantofile								
E 160a	Beta-karoten	C ₄₀ H ₅₆	Kanarki	—	—	—	—	30.9.2000 ^(a)
E 161g	Kantaksantyna	C ₄₀ H ₅₂ O ₂	Zwierzęta domowe lub ptaki ozdobne	—	—	—	—	30.9.2000 ^(a)
2. Inne substancje koloryzujące								
12	Astaksantyna — wzbogacona <i>Phaffia rhodozyna</i> (ATCC 74219)	Skoncentrowana biomasa nieaktywnych drożdży <i>Phaffia rhodozyna</i> (ATTC 74219), zawierająca, co najmniej 4,0 g astaksantyny w 1 kg dodatku i zawierająca maksymalnie 2 000 mg/kg ethoxyquin	Łosoś	—	—	100	Maksymalna zawartość podana jest w przeliczeniu na astaksantynę. Użycie jest dozwolone od 6 miesiąca życia. Mieszanina z kantaksantyną jest dozwolona, jeżeli łączna zawartość astaksantyny i kantaksantyny nie jest większa niż 100 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej. Zawartość ethoquin wymaga oznaczenia.	30.9.2000 ^(a)
			Pstrąg	—	—	100	Maksymalna zawartość podana jest w przeliczeniu na astaksantynę. Użycie jest dozwolone od 6 miesiąca życia. Mieszanina z kantaksantyną jest dozwolona, jeżeli łączna zawartość astaksantyny i kantaksantyny nie jest większa niż 100 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej. Zawartość ethoquin wymaga oznaczenia.	30.9.2000 ^(a)

MIKROELEMENTY

Numer rejestracyjny WE	Pierwiastek	Nazwa dodatku paszowego	Wzór chemiczny dodatku paszowego	Maksymalna zawartość pierwiastka w mg na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
E 4	Miedź – Cu	Kompleks miedzi i siarczanu lizyny	$\text{Cu}(\text{C}_6\text{H}_{13}\text{N}_2\text{O}_2)_2 \cdot \text{SO}_4$	Tuczniaki: — w Państwach Członkowskich, gdzie średnia gęstość populacji świń jest równa lub wyższa niż 175 świń na 100 ha użytków rolnych: — do 16 tygodni: 175 (łącznie) — w Państwach Członkowskich, gdzie średnia gęstość populacji świń jest niższa niż 175 świń na 100 ha użytków rolnych: — do 16 tygodni: 175 (łącznie)	Nie więcej niż 50 mg miedzi w 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej pochodzącej z kompleksu miedzi i siarczanu lizyny	30.9.2000 ^(b)
				Tuczniaki: — w Państwach Członkowskich, gdzie średnia gęstość populacji świń jest równa lub wyższa niż 175 świń na 100 ha użytków rolnych: — od 17 tygodnia do uboju: 35 (łącznie) — w Państwach Członkowskich, gdzie średnia gęstość populacji świń jest niższa niż 175 świń na 100 ha użytków rolnych: — od 17 tygodnia do sześciu miesięcy: 100 (łącznie) — od sześciu miesięcy do uboju: 35 (łącznie) Świnie hodowlane: 35 (łącznie) Inne gatunki lub rodzaje zwierząt, za wyjątkiem cieląt przed okresem przeżuwania i owiec: 35 (łącznie)	Nie więcej niż 25 mg miedzi w 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej pochodzącej z kompleksu miedzi i siarczanu lizyny	30.9.2000

SPOIWA, CZYNNIKI ANTYZBRYLAJĄCE I KOAGULAJĄCE

Numer rejestra-cyjny (lub numer rejestra-cyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					w mg substancji w 1 kg mieszanki paszy pełnoprocjowej			
3	Clinoptilolit pochodzenia wulkanicznego	Uwodniony glinokrzemian wapnia pochodzenia wulkanicz-nego zawierający minimum 85 % clinoptilolitu i maksimum 15 % skalenia, miki i glinki mineralnej wolnej od włókien i kwarcu. Maksymalna zawartość ołowiu: 80 mg/kg.	Świnie	—	—	20 000	Wszystkie pasze	30.9.2000 (c)
			Króliki	—	—	20 000	Wszystkie pasze	30.9.2000 (c)
			Drób	—	—	20 000	Wszystkie pasze	30.9.2000 (c)

ENZYMY

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
1	3-fitaza WE 3.1.3.8	Preparat 3-fitazy wytwarzany przez <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94) o minimalnej aktywności: 5 000 FTU ⁽¹⁾ /g w preparatach stałych i płynnych	Indyki	—	125 FTU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 200–800 FTU. 3. Do użycia w mieszankach paszowych zawierających minimum 0,3 % fitatu, np. 20 % pszenicy	30.9.2000 ⁽⁴⁾
2	3-fitaza WE 3.1.3.8	Preparat 3-fitazy wytwarzany przez <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10 289) o minimalnej aktywności: W formie powlekanej: 2 500 FYT ⁽²⁾ /g Forma płynna: 5 000 FYT/g	Prosięta	Cztery miesiące	250 FYT	1 000 FYT	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 FYT 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w fitaty, np. zawierające więcej niż 40 % zbóż (kukurydza, jęczmień, owies, pszenica, żyto, pszenżyto), nasiona oleiste i nasiona roślin strączkowych	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Tuczniki	—	400 FYT	1 000 FYT	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 FYT 3. Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w fitaty, np. zawierających więcej niż 40 % zbóż (kukurydza, jęczmień, owies, pszenica, żyto, pszenżyto), nasiona oleiste i nasiona roślin strączkowych	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
			Kurczęta brojlery	—	200 FYT	1 000 FYT	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 FYT 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w fitaty, np. zawierające więcej niż 40 % zbóż (kukurydza, jęczmień, owies, pszenica, żyto, pszenżyto), nasiona oleiste i nasiona roślin strączkowych	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Kury nioski	—	500 FYT	1 000 FYT	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 750 FYT 3. Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w fitaty, np. zawierających więcej niż 40 % zbóż (kukurydza, jęczmień, owies, pszenica, żyto, pszenżyto), nasiona oleiste i nasiona roślin strączkowych	30.9.2000 ⁽⁴⁾
3	Alfa-galaktozydaza WE 3.2.1.22	Preparat alfa-galaktozydazy wytwarzany przez <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10 286) o minimalnej aktywności: Forma płynna: 1 000 GALU ⁽³⁾ /g	Kurczęta brojlery	—	300 GALU	1 000 GALU	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 450 GALU 3. Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w olisacharydy, np. zawierających więcej niż 25 % mączki sojowej, makuchu bawełnianego, grochu	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
4	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza WE 3.2.1.6	Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzany przez <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94) o minimalnej aktywności: W formie powlekaniej: 50 FBG ⁽⁴⁾ g Forma płynna: 120 FBG/g	Prosięta	Cztery miesiące	25 FBG	40 FBG	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 25 FBG 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukan), np. zawierających więcej niż 50 % kukurydzy lub jęczmienia	30.9.2000 ⁽⁴⁾
5	Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10 287) o minimalnej aktywności: W formie powlekaniej: 1 000 FXU ⁽⁵⁾ /g Forma płynna: 650 FXU/ml	Kurczęta brojlery	—	80 FXU	200 FXU	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 150 FXU 3. Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy, np. zawierających więcej niż 50 % pszenicy	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Indyki brojlery	—	225 FXU	600 FXU	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 225–600 FXU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % pszenicy	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
			Prosięta	Cztery miesiące	200 FXU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 200 FXU 3. Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % pszenicy	30.9.2000 ⁽⁴⁾
6	Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glukanaza WE 3.2.1.4	Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Humicola insolens</i> (DSM 10442) o minimalnej aktywności: W formie powlekanej: 800 FXU ⁽⁶⁾ /g 75 FBG ⁽⁷⁾ /g Mikrogranulat: 800 FXU/g 75 FBG/g Forma płynna: 550 FXU/ml 50 FBG/ml	Kurczęta brojlery	—	200 FXU 19 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 400 FXU 38 FBG 3. Do stosowania w mieszankach poszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % jęczmienia i/lub owsa, pszenicy	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Prosięta	Cztery miesiące	240 FXU 22 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 400 FXU 38 FBG 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % jęczmienia i/lub owsa, pszenicy	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracy- jny (lub numer rejestracy- jny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
			Tuczniki	—	200 FXU 19 FBG	800 FXU 75 FBG	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 400 FXU 38 FBG 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % jęczmienia i/lub owsa, pszenicy	30.9.2000 ^(g)
7	Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glukanaza WE 3.2.1.4	Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzany przez <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94) o minimalnej aktywności: W formie stałej i ciekłej: 12 000 FXU ⁽⁸⁾ /g 5 000 BGU ⁽⁹⁾ /g	Kurczęta broj- lery	—	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 3 600–6 000 FXU 1 500-2 500 BGU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy, żyta, pszenżyta	30.9.2000 ^(d)

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
8	Endo-1,4-beta-glukanaza WE 3.2.1.4 Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzany przez <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94) o minimalnej aktywności: W formie stałej i ciekłej: 10 000 BGU ⁽¹⁰⁾ / g 4 000 FXU ⁽¹¹⁾ / g	Kurczęta broj- lery	—	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 3 000–10 000 BGU 1 200–4 000 FXU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % jęczmienia	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Prosięta	Cztery miesiące	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 3 000–5 000 BGU 1 200–2 000 FXU. 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % jęczmienia	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
9	Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Aspergillus niger</i> (CBS 270.95) o minimalnej aktywności: Forma stała: 28 000 EXU ⁽¹²⁾ /g Forma płynna: 14 000 EXU/ml	Kurczęta broj- lery	—	1 400 EXU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji. 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1 400 EXU. 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksy- lany), np. zawierających więcej niż 50 % pszenicy	30.9.2000 ⁽⁴⁾
10	Alfa-amylaza WE 3.2.1.1	Preparat alfa-amylazy wytwa- rzany przez <i>Bacillus amyloliquefa- ciens</i> (CBS 390.94) o minimalnej aktywności: Forma stała: 45 000 RAU ⁽¹³⁾ /g Forma płynna: 20 000 RAU/ml	Prosięta	Cztery miesiące	1 800 RAU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1 800 RAU 3. Do stosowania wyłącznie w mieszan- kach paszowych pełnoporcjowych przeznaczonych do płynnych systemów żywieniowych, zawierają- cych bogate w skrobię materiały paszowe, np. zawierających więcej niż pokarmowych bogatych w 35 % pszenicy	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Tuczniki	—	1 800 RAU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1 800 RAU 3. Do stosowania wyłącznie w mieszan- kach paszowych pełnoporcjowych przeznaczonych do płynnych systemów żywieniowych, zawierają- cych bogate w skrobię materiały paszowe, np. zawierających więcej niż 35 % pszenicy	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
			Lochy	—	1 800 RAU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1 800 RAU 3. Do stosowania wyłącznie w mieszankach paszowych pełnoporcjowych przeznaczonych do płynnych systemów żywieniowych, zawierających bogate w skrobię materiały paszowe, np. zawierających więcej niż 35 % pszenicy	30.9.2000 ⁽⁴⁾
11	Endo-1,4-beta-glukanaza WE 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza WE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,4-beta-glukanazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 74 252) o minimalnej aktywności: Endo-1,4-beta-glukanaza: 8 000 U ⁽¹⁴⁾ /ml Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 18 000 U ⁽¹⁵⁾ /ml Endo-1,4-beta-ksylanaza: 26 000 U ⁽¹⁶⁾ /ml	Kurczęta brojlery	—	Endo-1,4-beta-glukanaza: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900 U Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1 300 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg paszy pełnoporcjowej: endo-1,4-beta-glukanaza: 400–1 600 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900–3 600 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 1 300–5 200 U 3. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % pszenicy lub jęczmienia i więcej niż 10 % żyta	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
12	Endo-1,4-beta-glukanaza WE 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-gluka- naza WE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,4-beta-gluka- nazy i endo-1,3(4)-beta-gluka- nazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Trichoderma viride</i> (FERM BP-4447) o mini- malnej aktywności: Endo-1,4-beta-glukanaza 8 000 U ⁽¹⁷⁾ /ml Endo-1,3(4)-beta-glukanaza 18 000 U ⁽¹⁸⁾ /ml Endo-1,4-beta-ksylanaza: 26 000 U ⁽¹⁹⁾ /ml	Kurczęta broj- lery	—	Endo-1,4-beta- glukanaza: 200 U Endo-1,3(4)- beta-glukanaza: 450 U Endo-1,4-beta- ksylanaza: 650 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,4-beta-glukanaza: 800–1 200 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 800–2 700 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 2 600–3 900 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierające ponad 20 % pszenicy i 20 % jęcz- mienia i/lub 25 % żyta	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
			Kury nioski	—	Endo-1,4-beta-glukanaza: 640 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 440 U Endo-1,4-beta-ksylanaza: 2 080 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,4-beta-glukanaza: 640–1 280 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 440–2 880 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 2 080–4 160 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierające ponad 20 % pszenicy i 20 % jęczmienia i/lub 25 % żyta	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Indyki brojlery	—	Endo-1,4-beta-glukanaza: 1 200 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 700 U Endo-1,4-beta-ksylanaza: 3 900 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,4-beta-glukanaza: 1 200 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 700 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 3 900 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierające ponad 20 % pszenicy i 20 % jęczmienia i/lub 20 % żyta	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
13	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza WE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 357.94) o minimalnej aktywności: Forma proszku: 8 000 BGU ⁽²⁰⁾ /g 11 000 EXU ⁽²¹⁾ /g Granulat: 6 000 BGU/g 8 250 EXU/g Forma płynna: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Kurczęta brojlery	—	100 BGU 130 EXU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 100 BGU 130 EXU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 30 % pszenicy i 30 % jęczmienia lub 20 % żyta	30.9.2000 ⁽⁴⁾
14	Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Aspergillus niger</i> (CBS 520.94) o minimalnej aktywności: Forma stała: 600 U ⁽²²⁾ /g Forma płynna: 300 U/ml	Kurczęta brojlery	—	300 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 300–600 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % pszenicy	30.9.2000 ⁽⁴⁾
15	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza WE 3.2.1.6	Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzany przez <i>Trichoderma viride</i> (CBS 517.94) o minimalnej aktywności: Forma stała: 650 U ⁽²³⁾ /g Forma płynna: 325 U/ml	Kurczęta brojlery	—	325 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 325–650 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 50 % jęczmienia	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
16	Endo-1,4-beta-glukanaza WE 3.2.1.4	Preparat endo-1,4-beta-gluka- nazy wytwarzany przez <i>Tricho- derma longibrachiatum</i> (IMI SD 142) o minimalnej aktywności: Forma stała: 1 000 CU ⁽²⁴⁾ /g Forma płynna: 2 000 CU/ml	Kurczęta broj- lery	—	250 CU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500–1 000 CU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Kury nioski	—	250 CU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500–1 000 CU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Prosięta	Cztery miesiące	250 CU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500–1 000 CU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
			Tuczniki	—	250 CU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500–1 000 CU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia	30.9.2000 ⁽⁴⁾
17	Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Przygotowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135) o minimalnej aktywności: Forma stała: 3 000 EPU ⁽²⁵⁾ /g Forma płynna: 6 000 EPU/ml	Kurczęta brojlery	—	750 EPU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1 500–3 000 EPU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksy-lany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy lub kukurydzy	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Kury nioski	Cztery miesiące	750 EPU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1 500–3 000 CU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksy-lany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy lub kukurydzy	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
			Prosięta	4 miesiące	750 EPU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1 500–3 000 EPU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy lub kukurydzy	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Tuczniaki	—	750 EPU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1 500–3 000 EPU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy lub kukurydzy	30.9.2000 ⁽⁴⁾
18	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza WE 3.2.1.6	Preparat endo-1,3(4)-beta- glukanazy wytwarzany przez <i>Aspergillus niger</i> (MÜCL 39199) o minimalnej aktywności: Forma stała: 2 000 AGL ⁽²⁶⁾ /g Forma płynna: 500 AGL/ml	Kurczęta brojlery	—	100 AGL	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 100 AGL 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia lub 20 % pszenicy	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
19	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza WE 3.2.1.6	Preparat endo-1,3(4)-beta- glukanazy wytwarzany przez <i>Aspergillus niger</i> (MUCL 39199) o minimalnej aktywności: Forma stała: 1 500 AGL ⁽²⁷⁾ /g Forma płynna: 200 AGL/ml	Kurczęta broj-lery	—	25 AGL	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 25–100 AGL 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 50 % jęczmienia	30.9.2000 ⁽⁴⁾
20	Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (MUCL 39203) o minimalnej aktywności: Forma stała: 2 000 AXC ⁽²⁸⁾ /g Forma płynna: 500 AXC/ml	Kurczęta broj-lery	—	100 AXC	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 100 AXC 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksy-lany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy lub żyta	30.9.2000 ⁽⁴⁾
21	Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (MUCL 39203) o minimalnej aktywności: Forma stała: 1 500 AXC ⁽²⁹⁾ /g Forma płynna: 200 AXC/ml	Kurczęta broj-lery	—	25 AXC	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 25–100 AXC 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksy-lany), np. zawierających więcej niż 50 % pszenicy	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
22	Endo-1,3(4)-beta-gluka- naza WE 3.2.1.6	Preparat endo-1,3(4)-beta-gluka- nazy wytwarzany przez <i>Tricho- derma longibrachiatum</i> (CNCM MA 6-10 W) o minimalnej aktywności: Forma stała: 70 000 BGN ⁽³⁰⁾ /g Forma płynna: 14 000 BGN/ml	Kurczęta broj- lery	—	1 050 BGN	—	1. W sposobie użycia dodatku i premixsu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 2 800 BGN 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 50 % jęczmienia	30.9.2000 ⁽⁴⁾
23	Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CNCM MA 6- 10 W) o minimalnej aktyw- ności: Forma stała: 70 000 IFP ⁽³¹⁾ /g Forma ciekła: 7 000 IFP/ml	Kurczęta broj- lery	—	1 050 IFP	—	1. W sposobie użycia dodatku i premixsu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1 400 IFP 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksy- lany), np. zawierających więcej niż 56 % pszenicy	30.9.2000 ⁽⁴⁾
24	Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-gluka- naza WE 3.2.1.6	Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,3(4)-beta- glukanazy wytwarzanej przez <i>Aspergillus niger</i> (CNCM 1-1517) o mini- malnej aktywności: 28 000 QXU ⁽³²⁾ /g 140 000 QGU ⁽³³⁾ /g	Kurczęta broj- lery	—	420 QXU 2 100 QGU	1 120 QXU 5 600 QGU	1. W sposobie użycia dodatku i premixsu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 560 QXU 2 800 QGU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % pszenicy i 30 % jęc- zmienia	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
25	Endo-1,3(4)-beta-gluka- naza WE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,3(4)-beta- gluka- nazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez <i>Aspergillus niger</i> (NRRL 25541) o mini- malnej aktywności: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 100 U ⁽³⁴⁾ /g Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1 600 U ⁽³⁵⁾ /g	Kurczęta broj- lery	—	Endo-1,3(4)- beta-glukanaza: 138 U Endo-1,4-beta- ksylanaza: 200 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,3(4)-beta-glukanaza:138 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 200 U. 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % jęczmienia lub 30 % pszenicy i 30 % kukurydzy	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Kury nioski	—	Endo-1,3(4)- beta-glukanaza: 138 U Endo-1,4-beta- ksylanaza: 200 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 138 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 200 U. 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % jęczmienia lub 30 % pszenicy i 30 % kukurydzy	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
26	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza WE 3.2.1.6	Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 526.94) o minimalnej aktywności: Forma stała: 350 000 BU ⁽³⁶⁾ /g Forma płynna: 50 000 BU/g	Kurczęta brojlery	—	23 000 BU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 23 000-50 000 BU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie glukany), np. zawierających więcej niż 20 % jęczmienia lub 30 % żyta	30.9.2000 (*)
			Prosięta	Cztery miesiące	26 000 BU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 26 000–35 000 BU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie glukany), np. zawierających więcej niż 60 % jęczmienia lub pszenicy	30.9.2000 (*)
27	Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza WE 3.2.1.6	Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 529.94) i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzany przez <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 526.94) o minimalnej aktywności: Forma stała: 200 000 BXU ⁽³⁷⁾ /g 200 000 BU ⁽³⁸⁾ /g Forma płynna: 30 000 BXU/g 30 000 BU/g	Kurczęta brojlery	—	2 500 BXU 2 500 BU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 10 000 BXU 10 000 BU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie glukany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy lub 30 % żyta	30.9.2000 (*)

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
28	3-fitaza WE 3.1.3.8	Preparat 3-fitazy wytwarzany przez <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 528.94) o minimalnej aktywności: Forma stała: 5 000 PPU ⁽³⁹⁾ /g Forma płynna: 1 000 PPU/g	Prosięta	Cztery miesiące	250 PPU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500–750 PPU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w fitaty, np. zawierających więcej niż 50 % zbóż (kukurydza, jęczmień, pszenica), tapiok, nasiona roślin oleistych i nasiona roślin strączkowych	30.9.2000 ^(e)
			Tuczniaki	—	500 PPU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500–750 PPU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w fitaty, np. zawierających więcej niż 50 % zbóż (kukurydza, jęczmień, pszenica) tapiok, nasiona roślin oleistych i nasiona roślin strączkowych	30.9.2000 ^(e)
29	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza WE 3.2.1.6	Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez <i>Geosmithia emersonii</i> (IMI SD 133) o minimalnej aktywności: 5 500 U ⁽⁴⁰⁾ /g	Kurczęta brojlerzy	—	250 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 250 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 50 % jęczmienia	30.9.2000 ^(f)

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
30	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza WE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,3(4)-beta- glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Penicillium funiculosum</i> (IMI SD 101) o minimalnej aktywności: Forma sypka: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 000 U ⁽⁴¹⁾ /g Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1 400 U ⁽⁴²⁾ /g Forma płynna: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 U/ml Endo-1,4-beta-ksylanaza: 350 U/ml	Kurczęta brojlery	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U Endo-1,4-beta-ksylanaza: 70 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 70 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % jęczmienia lub 60 % pszenicy	30.9.2000 ^(f)
31	Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 614.94) o minimalnej aktywności: Forma stała: 300 EU ⁽⁴³⁾ /g Forma płynna: 1 000 EU/g	Kurczęta brojlery	—	600 EU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 600 EU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 60 % pszenicy	30.9.2000 ^(f)
			Kury nioski	—	300 EU	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 600 EU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 60 % pszenicy	30.9.2000 ^(f)

Numer rejestracy- jny (lub numer rejestracy- jny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
32	Endo-1,3(4)-beta-gluka- naza WE 3.2.1.6	Preparat endo-1,3(4)-beta-gluka- nazy wytwarzanej przez <i>Tricho- derma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) o minimalnej aktywności: 200 U ⁽⁴⁴⁾ /ml	Kurczęta broj- lery	—	100 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premixu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 100 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % jęczmienia	30.9.2000 (8)
		1 200 U/ml	Prosięta	Cztery miesiące	400 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premixu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 400 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 55 % jęczmienia	30.9.2000 (8)
			Tuczniki	—	500 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premixu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 70 % jęczmienia	30.9.2000 (8)

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
33	Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) o minimalnej aktywności: Forma sypka: 2 000 U ⁽⁴⁵⁾ /g Forma płynna: 5 000 U/ml	Kurczęta broj- lery	—	500 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500–2 500 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoglu- kany), np. zawierających więcej niż 55 % pszenicy i 60 % żyta	30.9.2000 (§)
			Kury nioski	—	2 000 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 2 000 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoglu- kany), np. zawierających więcej niż 35 % pszenicy	30.9.2000 (§)
		Forma sypka: 4 000 U/g Forma płynna: 10 000 U/ml	Prosięta	Cztery miesiące	5 000 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 5 000 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoglu- kany), np. zawierających więcej niż 45 % pszenicy	30.9.2000 (§)

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
		Forma sypka: 4 000 U/g Forma płynna: 8 000 U/ml	Tuczniki	—	4 000 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 4 000 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 35 % pszenicy	30.9.2000 (*)
34	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza WE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8 Alfa-amylaza WE 3.2.1.1.	Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Aspergillus niger</i> (NRRL 25541) oraz alfa-amylazy wytwarzany przez <i>Aspergillus oryzae</i> (ATCC 66222) o minimalnej aktywności: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 275 U ⁽⁴⁶⁾ /g Endo-1,4-beta-ksylanaza: 400 U ⁽⁴⁷⁾ /g Alfa-amylaza: 3 100 U ⁽⁴⁸⁾ /g	Prosięta	4 miesiące	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza 165 U Endo-1,4-beta-ksylanaza: 240 U Alfa-amylaza 1 860 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 165 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 240 U alfa-amylaza: 1 860 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoglukany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 45 % jęczmienia i 10 % pszenicy i 10 % kukurydzy	30.9.2000 ^(b)

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
35	Endo-1,3(4)-beta-gluka- naza WE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,3(4)-beta-gluka- nazy wytwarzany przez <i>Tricho- derma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) o minimalnej aktywności: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 80 U ⁽⁴⁹⁾ /g endo-1,4-beta-ksylanaza: 180 U ⁽⁵⁰⁾ /g	Kury nioski	—	Endo-1,3(4)- beta-glukanaza: 80 U Endo-1,4-beta- ksylanaza: 180 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 80 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 180 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 60 % jęczmienia	30.9.2000 ^(b)
36	Endo-1,3(4)-beta-gluka- naza WE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,3(4)-beta-gluka- nazy wytwarzany przez <i>Tricho- derma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135) o minimalnej aktywności: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U ⁽⁵¹⁾ /g endo-1,4-beta-ksylanaza: 300 U ⁽⁵²⁾ /g	Kurczęta broj- lery	—	Endo-1,3(4)- beta-glukanaza: 300 U Endo-1,4-beta- ksylanaza: 300 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 300 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia	30.9.2000 ^(b)

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
			Kury nioski	—	Endo-1,3(4)- beta-glukanaza: 300 U Endo-1,4-beta- ksylanaza: 300 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 300 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 35 % jęczmienia	30.9.2000 ^(b)
37	Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8 Subtilisin WE 3.4.21.62	Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) i subtiliziny otrzymanej z hodowli <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107) o minimalnej aktywności: endo-1,4-beta-ksylanaza: 2 500 U ⁽⁵³⁾ /g subtilisin: 800 U ⁽⁵⁴⁾ /g	Kurczęta brojlery	—	Endo-1,4-beta-ksylanaza: 500 U Subtilisin: 160 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,4-beta-ksylanaza: 500-2 500 U subtilisin: 160–800 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych, np. zawierających więcej niż 65 % pszenicy	30.9.2000 ^(b)
			Indyki	—	Endo-1,4-beta-ksylanaza: 825 U Subtilisin: 265 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,4-beta-ksylanaza: 825-2 500 U subtilisin: 265–800 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych, np. zawierających więcej niż 45 % pszenicy	30.9.2000 ^(b)

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
38	Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8 Subtilisin WE 3.4.21.62	Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) i subtilisin wytwarzany przez <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107) o minimalnej aktywności: endo-1,4-beta-ksylanaza: 5 000 U ⁽⁵⁵⁾ /g Subtilisin: 500 U ⁽⁵⁶⁾ /g	Prosięta	Cztery miesiące	Endo-1,4-beta- ksylanaza: 5 000 U Subtilisin: 500 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,4-beta-ksylanaza: 5 000 U subtilisin: 500 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych, np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy	30.9.2000 ^(b)
39	Endo-1,3(4)-beta-gluka- naza WE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,3(4)-beta-gluka- nazy wytwarzany przez <i>Tricho- derma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) o minimalnej aktywności: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U ⁽⁵⁷⁾ /g endo-1,4-beta-ksylanaza: 400 U ⁽⁵⁸⁾ /g	Tuczniki	—	Endo-1,3(4)- beta-glukanaza: 400 U Endo-1,4-beta- ksylanaza: 400 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 400 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskrobiowe (głównie arabinoglukany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 65 % jęczmienia	30.9.2000 ^(b)
40	Endo-1,3(4)-beta-gluka- naza WE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8 Subtilisin WE 3.4.21.62	Preparat endo-1,3(4)-beta-gluka- nazy wytwarzany przez <i>Tricho- derma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) i subtilisin wytwarzany przez <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107) o minimalnej aktywności: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U ⁽⁵⁹⁾ /g endo-1,4-beta-ksylanaza: 300 U ⁽⁶⁰⁾ /g subtilisin: 800 U ⁽⁶¹⁾ /g	Kurczęta broj- lery	—	Endo-1,3(4)- beta-glukanaza: 30 U Endo-1,4-beta- ksylanaza: 90 U Subtilisin: 240 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,(3)4-beta-glukanaza: 30-100 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 90-300 U subtilisin: 240–800 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych, np. zawierających więcej niż 60 % jęczmienia	30.9.2000 ^(b)

Numer rejestracyjny (lub numer rejestracyjny WE)	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony	Maksymalny wiek zwierząt	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek substancji czynnej w 1 kg mieszanki paszy pełnoporcjowej			
41	Endo-1,3(4)-beta-gluka- naza WE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8 Subtilisin WE 3.4.21.62	Preparat endo-1,3(4)-beta-gluka- nazy wytwarzany przez <i>Tricho- derma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) i subtilisin wytwarzany przez <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107) o minimalnej aktywności: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U ⁽⁶²⁾ /g endo-1,4-beta-ksylanaza: 2 500 U ⁽⁶³⁾ /g subtilisin: 800 U ⁽⁶⁴⁾ /g	Kurczęta broj- lery	—	Endo-1,3(4)- beta-glukanaza: 25 U Endo-1,4-beta- ksylanaza: 625 U Subtilisin: 200 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 25-100 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 625-2 500 U subtilisin: 200–800 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych, np. zawierających więcej niż 30 % pszenicy i 10 % jęczmienia	30.9.2000 ^(b)
			Kury nioski	—	Endo-1,3(4)- beta-glukanaza: 100 U Endo-1,4-beta- ksylanaza: 2 500 U Subtilisin: 800 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 2 500 U subtilisin: 800 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych, np. zawierających więcej niż 50 % pszenicy i 25 % jęczmieni	30.9.2000 ^(b)
42	Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8	Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135) o minimalnej aktywności: Forma stała: 4000 U ⁽⁶⁵⁾ /g Właściwości preparatu autoryzo- wanego: endo-1,4-beta-ksylanaza: 1,99 % pszenica: 97,7 % propionian wapnia: 0,3 % lecytyna: 0,01 %	Prosięta	Cztery miesiące	4 000 U	—	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 4 000 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy niskoskrobiowe (głównie arabinoksy- lany), np. zawierających więcej niż 60 % pszenicy	30.9.2000 ^(b)

MIKROORGANIZMY

Numer rejestra- cyjny	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek tworzących kolonie w 1 kg (CFU/kg) mieszanki paszy pełnoporcjowej			
1	<i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> NCIMB 40112/CNCM I-1012	Preparat <i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> zawierający minimum 1×10^{10} CFU/g dodatku	Kurczęta broj- lery	—	$0,2 \times 10^9$	1×10^9	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowy- wania, okres trwałości i trwałość granu- lacji Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających następujące dodatki paszowe z grupy kokcydiosta- tyki: monenzyna-sól sodowa, lasalocid- sól sodowa, salinomycyna-sól sodowa, amprolium-etopabat, benzokwat mety- lowy metiklorpindolu, dekokwinat, robenidyna, narasin, halofuginon	30.9.2000 (§)
			Kury nioski	—	$0,2 \times 10^9$	1×10^9	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowy- wania, okres trwałości i trwałość granu- lacji	30.9.2000 (§)
			Cielęta	Sześć miesięcy	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowy- wania, okres trwałości i trwałość granu- lacji	30.9.2000 (§)
			Bydło opasowe	—	$0,2 \times 10^9$	$0,2 \times 10^9$	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowy- wania, okres trwałości i trwałość granu- lacji Ilość bakterii <i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> w dawce dziennej nie może przekraczać $1,0 \times 10^9$ CFU na każde 100 kg masy ciała. Dodać $0,2 \times 10^9$ CFU na każde dodatkowe 100 kg masy.	30.9.2000 (§)

Numer rejestracyjny	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek tworzących kolonie w 1 kg (CFU/kg) mieszanki paszy pełnoporcjowej			
			Królice reprodukcyjne	—	0,1 × 10 ⁹	5 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających dodatek paszowy z grupy kokcydiaki: robenidyna	30.9.2000 (g)
			Brojlery królicze	—	0,1 × 10 ⁹	5 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających dodatek paszowy z grupy kokcydiaki: metiklorpindol, robenidyna, salinomycyna-sól sodowa	30.9.2000 (g)
3	Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47	Preparat Saccharomyces cerevisiae zawierający minimum 5 × 10 ⁹ CFU/g dodatku	Brojlery królicze	—	2,5 × 10 ⁹	5 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających dodatek paszowy z grupy kokcydiaki: metiklorpindol	30.9.2000 (d)
			Lochy	—	5 × 10 ⁹	2,5 × 10 ¹⁰	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji	30.9.2000 (d)
			Prosięta	Cztery miesiące	5 × 10 ⁹	1 × 10 ¹⁰	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji	30.9.2000 (d)

Numer rejestracyjny	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek tworzących kolonie w 1 kg (CFU/kg) mieszanki paszy pełnoporcjowej			
4	<i>Bacillus cereus</i> ATCC 14 893	Preparat <i>Bacillus cereus</i> zawierający minimum 10 ¹⁰ CFU/g dodatku	Prosięta	Cztery miesiące	5 × 10 ⁸	1 × 10 ¹⁰	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Tuczniki	—	2 × 10 ⁸	1 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Lochy	15 dni przed oprosieniem i w czasie laktacji	8,5 × 10 ⁸	1,2 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Cielęta	16 tygodni	1 × 10 ⁹	1,2 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Kurczęta brojlery	—	2 × 10 ⁸	1 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających dodatek paszowy z grupy kokcydiaki: amprolium, halofuginon, lasalocid-sól sodowa, maduramycyna amonu, monenzyna- sól sodowa, narasin, salinomycyna- sól sodowa, metiklorpindol, diclazuril	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Indyki brojlery	26 tygodni	2 × 10 ⁸	1 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających dodatek paszowy z grupy kokcydiaki: amprolium, halofuginon, metiklorpindol/ benzokwat metylu, diclazuril, nifursol	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracyjny	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek tworzących kolonie w 1 kg (CFU/kg) mieszanki paszy pełnoporcjowej			
5	Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94	Preparat Saccharomyces cerevisiae zawierający minimum 1 × 10 ⁸ CFU/g dodatku	Cieleta	Sześć miesięcy	2 × 10 ⁸	2 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Bydło opasowe	—	1,7 × 10 ⁸	1,7 × 10 ⁸	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji Ilość Saccharomyces cerevisiae w dawce dziennej nie może przekraczać 7,5 × 10 ⁸ CFU na 100 kg masy ciała. Dodać 1 × 10 ⁸ CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała	30.9.2000 ⁽⁴⁾
6	Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079	Preparat Saccharomyces cerevisiae zawierający minimum 2 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatku	Lochy	—	2 × 10 ⁹	1 × 10 ¹⁰	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji.	30.9.2000 ⁽⁴⁾
			Prosięta	Cztery miesiące	6 × 10 ⁹	3 × 10 ¹⁰	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji.	30.9.2000 ⁽⁴⁾
7	Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077	Preparat Saccharomyces cerevisiae zawierający minimum 2 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatku	Krowy mleczne	—	5,5 × 10 ⁸	2,1 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji Ilość Saccharomyces cerevisiae w dawce dziennej nie może przekraczać 8,4 × 10 ⁹ CFU na 100 kg masy ciała. Dodać 1,8 × 10 ⁹ CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała	30.9.2000 ⁽⁴⁾

Numer rejestracy- nyjny	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek tworzących kolonie w 1 kg (CFU/kg) mieszanki paszy pełnoporcjowej			
			Bydło opasowe	—	1 × 10 ⁹	1,5 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji Ilość <i>Saccharomyces cerevisiae</i> w dawce dziennej nie może przekraczać 4,6 × 10 ⁹ CFU na 100 kg masy ciała. Dodać 2 × 10 ⁹ CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała	30.9.2000 ⁽⁴⁾
8	<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 53519 <i>Enterococcus faecium</i> ATCC 55593 (W proporcji 1/1)	Mieszanina: Kapsułkowany <i>Enterococcus faecium</i> ATCC 53519 i kapsułkowany <i>Enterococcus faecium</i> ATCC 55593 zawierająca minimum: 2 × 10 ⁸ CFU/g dodatku (tj. minimum 1 × 10 ⁸ CFU/g każdej bakterii)	Kurczęta broj- lery	—	1 × 10 ⁸	1 × 10 ⁸	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających dodatek paszowy z grupy kokcydiaki: amprolium, dekokwinat, halofuginon, lasalocid-sól sodowa, maduramycyna amonowa, monenzyna-sól sodowa, narasin, nicarbasin, salinomycyna-sól sodowa	30.9.2000 ⁽⁴⁾
9	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M	Preparat <i>Pediococcus acidilactici</i> zawierający minimum 1 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatku	Kurczęta broj- lery	—	1 × 10 ⁹	1 × 10 ¹⁰	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających dodatek paszowy z grupy kokcydiaki: amprolium, metiklorpindol, dekokwinat, halofuginon, narasin, salinomycyna-sól sodowa, nicarbasin, maduramycyna amonowa, diclazuril	30.9.2000 ⁽⁵⁾
			Prosięta	Cztery miesiące	1 × 10 ⁹	1 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji	30.9.2000 ⁽⁵⁾

Numer rejestracyjny	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek tworzących kolonie w 1 kg (CFU/kg) mieszanki paszy pełnoporcjowej			
			Świnie	—	1 × 10 ⁹	1 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji	30.9.2000 ^(f)
10	Enterococcus faecium NCIMB 10 415	Preparat Enterococcus faecium zawierający minimum: Forma mikrokapsułkowa: 1 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatku 1,75 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatku	Kurczęta brojlery	—	0,3 × 10 ⁹	2,8 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających dodatek paszowy z grupy kokcydiaki: amprolium,	30.9.2000 ^(f)
			Świnie	—	0,35 × 10 ⁹	1,5 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji	30.9.2000 ^(f)
			Lochy	—	0,2 × 10 ⁹	1,25 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji	30.9.2000 ^(f)
			Bydło opasowe	—	0,25 × 10 ⁹	0,6 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji Ilość Enterococcus faecium w dawce dziennej nie może przekraczać 1 × 10 ⁹ CFU na 100 kg masy ciała. Dodać 1 × 10 ⁹ CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała	30.9.2000 ^(f)

Numer rejestra-cyjny	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek tworzących kolonie w 1 kg (CFU/kg) mieszanki paszy pełnoporcjowej			
		Preparat <i>Enterococcus faecium</i> zawierający minimum: Forma mikrokapsułkowa: 1,0 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatku 1,75 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatku oraz Forma granulowana: 3,5 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatku	Prosięta	Cztery miesiące	0,3 × 10 ⁹	1,4 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji Forma granulowana może być używana wyłącznie w preparatach mlekozastępczych	30.9.2000 (f)
			Cielęta	Sześć miesięcy	0,35 × 10 ⁹	6,6 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji Forma granulowana może być używana wyłącznie w preparatach mlekozastępczych	30.9.2000 (f)
11	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 5464	Preparat <i>Enterococcus faecium</i> zawierający minimum: 5 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatku	Prosięta	Cztery miesiące	0,5 × 10 ⁹	1 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji	30.9.2000 (f)
12	<i>Lactobacillus farciminis</i> CNCM MA 67/4R	Preparat <i>Lactobacillus farciminis</i> zawierający minimum: 1 × 10 ⁹ CFU/g dodatku	Prosięta	Cztery miesiące	1 × 10 ⁹	1 × 10 ¹⁰	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji	30.9.2000 (g)

Numer rejestracyjny	Nazwa dodatku paszowego	Skład, wzór chemiczny i opis	Gatunek lub grupa technologiczna zwierząt	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne uwagi	Termin ważności autoryzacji
					jednostek tworzących kolonie w 1 kg (CFU/kg) mieszanki paszy pełnoporcjowej			
13	<i>Enterococcus faecium</i> DAM 10 663/NCIMB 10 415	Preparat <i>Enterococcus faecium</i> zawierający minimum: Forma sypka i granulowana: 3,5 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatku Forma powlekana: 2 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatku Forma płynna: 1 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatku	Prosięta	Cztery miesiące	1 × 10 ⁹	1 × 10 ¹⁰	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji	30.9.2000 (g)
			Cielęta	Sześć miesięcy	1 × 10 ⁹	1 × 10 ¹⁰	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji	30.9.2000 (h)
			Kurczęta broj-lery	—	1 × 10 ⁹	1 × 10 ¹⁰	1. W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji 2. Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających dodatek paszowy z grupy kokcydiaki: amprolium, amprolium-etopabat, dekokwinat, diclazuril, halofuginon, lasalocid-sól sodowa, maduramycyna amonowa, metiklorpindol/benzokwat metylu, monensin-sól sodowa, narasin, nicarbazin, robenidyna, salinomycyna-sól sodowa	30.9.2000 (h)
14	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39 885	Preparat <i>Saccharomyces cerevisiae</i> zawierający minimum: Forma sproszkowanego, kulistego i owalnego granulatu: 1 × 10 ⁹ CFU/g dodatku	Prosięta	Cztery miesiące	3 × 10 ⁹	3 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji	30.9.2000 (g)
			Bydło opasowe	—	9 × 10 ⁹	9 × 10 ⁹	W sposobie użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, okres trwałości i trwałość granulacji Ilość <i>Saccharomyces cerevisiae</i> w dawce dziennej nie może przekraczać 1,6 × 10 ¹⁰ CFU na 100 kg masy ciała. Dodać 3,2 × 10 ⁹ CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała	30.9.2000 (g)

- (^a) Pierwsza autoryzacja na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2316/98 (Dz.U. L 289 z 28.10.1998, str. 4).
- (^b) Pierwsza autoryzacja na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 639/1999 (Dz.U. L 82 z 26.3.1999, str. 6).
- (^c) Pierwsza autoryzacja na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1245/1999 (Dz.U. L 150 z 17.6.1999, str. 15).
- (^d) Pierwsza autoryzacja na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1436/98 (Dz.U. L 191 z 7.7.1998, str. 15).
- (^e) Pierwsza autoryzacja na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2374/98 (Dz.U. L 295 z 4.11.1998, str. 3).
- (^f) Pierwsza autoryzacja na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 866/1999 (Dz.U. L 108 z 27.4.1999, str. 21).
- (^g) Pierwsza autoryzacja na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1411/1999 (Dz.U. L 164 z 30.6.1999, str. 56).
- (^h) Pierwsza autoryzacja na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1636/1999 (Dz.U. L 194 z 27.7.1999, str. 17).
- (¹) FTU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol nieorganicznego fosforanu w ciągu minuty z fitynianu sodowego przy pH 5,5 i temperaturze 37 °C.
- (²) FYT odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol nieorganicznego fosforanu w ciągu minuty z fitynianu sodowego przy pH 5,5 i temperaturze 37 °C.
- (³) 1 GALU odpowiada ilości enzymu hydrolizującej 1 mikromol p-nitrofenylo-alfa-galaktopiranozydu minucie ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 30 °C.
- (⁴) 1 FBG odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,5 i temperaturze 37 °C.
- (⁵) 1 FXU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 7,8 mikromola redukujących cukrów (odpowiedników ksylazy) z azo-arabinoksydanu pszenicy w ciągu minuty przy wskaźniku pH 6,0 i temperaturze 50 °C.
- (⁶) 1 FXU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 3,1 mikromola redukujących cukrów (odpowiedników ksylazy) z azo-arabinoksydanu pszenicy w ciągu minuty przy pH 6,0 i temperaturze 50 °C.
- (⁷) 1 FBG odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 6,0 i temperaturze 50 °C.
- (⁸) 1 FXU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,15 mikromola ksylazy z azuryno-ksylanu poprzecznie usieciowanego w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 40 °C.
- (⁹) 1 BGU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,15 mikromola glukozy z azuryno-ksylanu poprzecznie usieciowanego w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 40 °C.
- (¹⁰) 1 BGU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,15 mikromola glukozy z azuryno-ksylanu poprzecznie usieciowanego w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 40 °C.
- (¹¹) 1 FXU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,15 mikromola ksylazy z azuryno-ksylanu poprzecznie usieciowanego w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 40 °C.
- (¹²) 1 EXU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylazy) z arabinoksydanu w ciągu minuty przy pH 3,5 i temperaturze 55 °C.
- (¹³) 1 RAU odpowiada ilości enzymu, która przekształca 1 mg rozpuszczalnej skrobi w produkt posiadający absorbancję odpowiadającą barwie odniesienia przy 620 nm po odbyciu reakcji z jodem w ciągu minuty przy pH 6,6 i temperaturze 30 °C.
- (¹⁴) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,1 mikromoli glukozy z karboksymetylocelulozy w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 40 °C.
- (¹⁵) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,1 mikromola glukozy z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 3,5 i temperaturze 40 °C.
- (¹⁶) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,1 mikromoli glukozy z ksydanu pszenicy orkisz (owsa) w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 40 °C.
- (¹⁷) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,1 mikromoli glukozy z karboksymetylocelulozy w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 40 °C.
- (¹⁸) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,1 mikromoli glukozy z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 40 °C.
- (¹⁹) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,1 mikromoli glukozy z ksydanu pszenicy orkisz (owsa) w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 40 °C.
- (²⁰) 1 BGU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,278 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 3,5 i temperaturze 40 °C.
- (²¹) 1 EXU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylazy) z arabinoksydanu pszenicy w ciągu minuty przy pH 3,5 i temperaturze 55 °C.
- (²²) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol ksylazy z ksydanu drewna brzoźowego w ciągu minuty przy pH 5,3 i temperaturze 50 °C.
- (²³) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 50 °C.
- (²⁴) 1 CU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,128 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,5 i temperaturze 30 °C.
- (²⁵) 1 EPU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,0083 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników ksylazy) z ksydanu pszenicy orkisz (owsa) w ciągu minuty przy pH 4,7 i temperaturze 30 °C.
- (²⁶) 1 AGL odpowiada ilości enzymu uwalniającej 5,55 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników maltozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,6 i temperaturze 30 °C.
- (²⁷) 1 AGL odpowiada ilości enzymu uwalniającej 5,55 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników maltozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,6 i temperaturze 30 °C.
- (²⁸) 1 AXC odpowiada ilości enzymu uwalniającej 17,2 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników maltozy) z ksydanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,7 i temperaturze 30 °C.
- (²⁹) 1 AXC odpowiada ilości enzymu uwalniającej 17,2 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników maltozy) z ksydanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,7 i temperaturze 30 °C.
- (³⁰) 1 BGN odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,8 i temperaturze 50 °C.
- (³¹) 1 IFP odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylazy) z ksydanu owsa w ciągu minuty przy pH 4,8 i temperaturze 50 °C.
- (³²) 1 QXU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylazy) z ksydanu owsa minucie ciągu minuty przy pH 5,1 i temperaturze 50 °C.
- (³³) 1 QGU odpowiada ilości enzymu, która uwalnia 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,8 i temperaturze 50 °C.
- (³⁴) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu owsa w ciągu minuty przy wskaźniku pH 4,0 i temperaturze 30 °C.
- (³⁵) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylazy) z ksydanu owsa w ciągu minuty przy pH 4,0 i temperaturze 30 °C.
- (³⁶) 1 BU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,06 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,8 i temperaturze 50 °C.
- (³⁷) 1 BXU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,06 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników ksylazy) z ksydanu drewna brzoźowego w ciągu minuty przy pH 5,3 i temperaturze 50 °C.
- (³⁸) 1 BU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,06 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,8 i temperaturze 50 °C.
- (³⁹) 1 PPU odpowiada ilości enzymu uwalniających 1 mikromol nieorganicznego fosforanu z fitynianu sodowego w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 37 °C.
- (⁴⁰) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 2,78 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników maltozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 50 °C.
- (⁴¹) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 5,55 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników maltozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 50 °C.
- (⁴²) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 4,00 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników maltozy) z ksydanu drewna brzoźowego w ciągu minuty przy pH 5,5 i temperaturze 50 °C.
- (⁴³) 1 EU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylazy) z ksydanu owsa w ciągu minuty przy pH 4,5 i temperaturze 40 °C.
- (⁴⁴) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 30 °C.
- (⁴⁵) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników ksylazy) z ksydanu pszenicy orkisz (owsa) w ciągu minuty przy pH 5,3 i temperaturze 50 °C.
- (⁴⁶) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu owsa w ciągu minuty przy pH 4,0 i temperaturze 30 °C.
- (⁴⁷) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z ksydanu owsa w ciągu minuty przy pH 4,0 i temperaturze 30 °C.
- (⁴⁸) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) ze skrobi pszenicy w ciągu minuty przy pH 4,0 i temperaturze 30 °C.
- (⁴⁹) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 30 °C.
- (⁵⁰) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylazy) z ksydanu pszenicy orkisz (owsa) w ciągu minuty przy pH 5,3 i temperaturze 50 °C.
- (⁵¹) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 30 °C.
- (⁵²) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylazy) z ksydanu pszenicy orkisz (owsa) w ciągu minuty przy pH 5,3 i temperaturze 50 °C.
- (⁵³) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylazy) z ksydanu pszenicy orkisz (owsa) w ciągu minuty przy pH 5,3 i temperaturze 50 °C.
- (⁵⁴) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikrogram komponentów fenolowych (odpowiedników tyrozyny) z substratu kazeiny w ciągu minuty przy pH 7,5 i temperaturze 40 °C.
- (⁵⁵) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylazy) z ksydanu pszenicy orkisz (owsa) w ciągu minuty przy pH 5,3 i temperaturze 50 °C.

- ⁽⁵⁶⁾ 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikrogram komponentów fenolowych (odpowiedników tyrozyny) z substratu kazeiny w ciągu minuty przy pH 7,5 i temperaturze 40 °C.
- ⁽⁵⁷⁾ 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 30 °C.
- ⁽⁵⁸⁾ 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z ksyłanu pszenicy orkisz (owsa) w ciągu minuty przy pH 5,3 i temperaturze 50 °C.
- ⁽⁵⁹⁾ 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 30 °C.
- ⁽⁶⁰⁾ 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z ksyłanu pszenicy orkisz (owsa) w ciągu minuty przy pH 5,3 i temperaturze 50 °C.
- ⁽⁶¹⁾ 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikrogram komponentów fenolowych (odpowiedników tyrozyny) z substratu kazeiny w ciągu minuty przy pH 7,5 i temperaturze 40 °C.
- ⁽⁶²⁾ 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 30 °C.
- ⁽⁶³⁾ 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z ksyłanu pszenicy orkisz (owsa) w ciągu minuty przy pH 5,3 i temperaturze 50 °C.
- ⁽⁶⁴⁾ 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikrogram komponentów fenolowych (odpowiedników tyrozyny) z substratu kazeiny w ciągu minuty przy pH 7,5 i temperaturze 40 °C.
- ⁽⁶⁵⁾ 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksyłanu pszenicy orkisz (owsa) w ciągu minuty przy pH 5,3 i temperaturze 50 °C.