

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2019/403 DA COMISSÃO**de 13 de março de 2019****que concede uma autorização da União à família de produtos biocidas «Deosan Activate BPF based on Iodine»**

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas ⁽¹⁾, nomeadamente o artigo 44.º, n.º 5,

Considerando o seguinte:

- (1) Em 7 de julho de 2015, a empresa Diversey Europe Operations B.V. apresentou, em conformidade com o artigo 43.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 528/2012, um pedido de autorização de uma família de produtos biocidas denominada «Deosan Activate BPF based on Iodine» («família de produtos»), do tipo de produtos 3, tal como descrito no anexo V do referido regulamento. A autoridade competente do Reino Unido aceitou avaliar o pedido, nos termos do artigo 43.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 528/2012. O pedido foi registado com o número de processo BC-JN018376-30 no Registo de Produtos Biocidas.
- (2) A família de produtos biocidas contém iodo como substância ativa, o qual está incluído na lista da União de substâncias ativas aprovadas referida no artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 528/2012. Tendo em conta as propriedades intrínsecas da substância ativa e os critérios científicos para a determinação das propriedades desreguladoras do sistema endócrino estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ⁽²⁾, a Comissão analisará a necessidade de rever a aprovação do iodo, incluindo a polivinilpirrolidona-iodo, em conformidade com o artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 528/2012. Em função do resultado dessa revisão, a Comissão analisará em seguida se as autorizações da União para os produtos que contêm a substância ativa devem ser revistas em conformidade com o artigo 48.º do Regulamento (UE) n.º 528/2012.
- (3) Em 20 de dezembro de 2017, a autoridade competente de avaliação apresentou, em conformidade com o artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 528/2012, o relatório de avaliação e as conclusões da sua avaliação à Agência Europeia dos Produtos Químicos («Agência»).
- (4) Em 6 de julho de 2018, a Agência apresentou à Comissão um parecer ⁽³⁾, incluindo o projeto de resumo das características do produto biocida («RCP») da família de produtos e o relatório de avaliação final sobre a família de produtos, em conformidade com o artigo 44.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 528/2012. O parecer conclui que a família de produtos é abrangida pela definição de «família de produtos biocidas» estabelecida no artigo 3.º, n.º 1, alínea s), do Regulamento (UE) n.º 528/2012, que é elegível para autorização da União nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do referido regulamento e que, sob reserva da conformidade com o projeto de RCP, satisfaz as condições estabelecidas no artigo 19.º, n.º 1 e n.º 6, do referido regulamento.
- (5) Em 17 de setembro de 2018, a Agência transmitiu à Comissão o projeto de RCP em todas as línguas oficiais da União, em conformidade com o artigo 44.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 528/2012.
- (6) A Comissão concorda com o parecer da Agência e considera, por conseguinte, adequado conceder uma autorização da União à família de produtos biocidas.
- (7) As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos Produtos Biocidas,

⁽¹⁾ JO L 167 de 27.6.2012, p. 1.

⁽²⁾ Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão, de 4 de setembro de 2017, que estabelece critérios científicos para a determinação das propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos termos do Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 301 de 17.11.2017, p. 1).

⁽³⁾ Parecer da ECHA, de 6 de julho de 2018, sobre a autorização da União de «Deosan Activate BPF based on Iodine» (ECHA/BPC/207/2018).

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

É concedida uma autorização da União à empresa Diversey Europe Operations B.V. para a família de produtos biocidas «Deosan Activate BPF based on Iodine» com o número de autorização EU-0019228-0000.

A autorização da União é válida de 3 de abril de 2019 a 31 de março de 2029.

A autorização da União está subordinada à conformidade com o resumo das características do produto biocida constante do anexo.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 13 de março de 2019.

Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER

ANEXO

Resumo das características do produto para uma família de produtos biocidas (SPC BPF)

Deosan Activate BPF based on Iodine

TP 03 - Higiene veterinária (Desinfetantes)

Número da autorização: EU-0019228-0000

Número de referência do ativo R4BP 3: EU-0019228-0000

PARTE I

PRIMEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO**1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA****1.1. Nome da família de produtos**

Denominação	Deosan Activate BPF based on Iodine
-------------	-------------------------------------

1.2. Tipo(s) do produto

Tipo(s) do produto	TP 03 - Higiene veterinária
--------------------	-----------------------------

1.3. Titular da Autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	Diversey Europe Operations B.V.
	Endereço	Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, Holanda
Número da autorização	EU-0019228-0000	
Número de referência do ativo R4BP 3	EU-0019228-0000	
Data da autorização	3 de abril de 2019	
Data de caducidade da autorização	31 de março de 2029	

1.4. Fabricante(s) dos produtos biocidas

Nome do fabricante	Diversey Europe Operations B.V.
Endereço do fabricante	Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Holanda
Localização das instalações de fabrico	Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Itália Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid) Espanha Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Holanda Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton Reino Unido Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Alemanha

1.5. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	Iodo
Nome do fabricante	ACF Minera S.A.
Endereço do fabricante	San Martin No 499, 1100000 Iquique Chile
Localização das instalações de fabrico	Lagunas mine, 118 0000 Pozo Almonte Chile

Substância ativa	Iodo
Nome do fabricante	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Endereço do fabricante	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Chile
Localização das instalações de fabrico	Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Chile

Substância ativa	Iodo
Nome do fabricante	Cosayach Nitratos S.A.
Endereço do fabricante	Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Chile
Localização das instalações de fabrico	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 118 0000 Pozo Almonte Chile

Substância ativa	Iodo
Nome do fabricante	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
Endereço do fabricante	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Japão
Localização das instalações de fabrico	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Japão

Substância ativa	Iodo
Nome do fabricante	ISE Chemicals Corporation
Endereço do fabricante	3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Japão
Localização das instalações de fabrico	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, 299-3201 Chiba Japão

Substância ativa	Iodo
Nome do fabricante	Atacama Minerals SCM
Endereço do fabricante	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes, 8320000 Santiago Chile
Localização das instalações de fabrico	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility, 3580000 Antofagasta Chile

2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DA FAMÍLIA DO PRODUTO

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição da família

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)	
					Mín.	Máx.
Iodo		Substância ativa	7553-56-2	231-442-4	0,3	1,6

2.2. Tipo(s) de formulação

Formulação(ões)	AL - Qualquer outro líquido E - Concentrado solúvel GW - Gel solúvel em água
-----------------	--

PARTE II

SEGUNDO NÍVEL DE INFORMAÇÃO - META-SPC(S)

META-SPC 1

1. INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DE META-SPC 1

1.1. Identificador de meta-SPC 1

Identificador	Meta SPC 1 - Deosan Activate BPF - Concentrate
---------------	--

1.2. Sufixo do número de autorização

Número	1-1
--------	-----

1.3. Tipo(s) do produto

Tipo(s) do produto	TP 03 - Higiene veterinária
--------------------	-----------------------------

2. COMPOSIÇÃO DE META-SPC 1

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição de meta-SPC 1

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)	
					Mín.	Máx.
Iodo		Substância ativa	7553-56-2	231-442-4	1,35	1,6

2.2. Tipo(s) de formulação de meta-SPC 1

Formulação(ões)	E - Concentrado solúvel
-----------------	-------------------------

3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E AS RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DE META-SPC 1

Advertências de perigo	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Recomendações de prudência	Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar a libertação para o ambiente. Eliminar o conteúdo em de acordo com a legislação nacional. Eliminar o recipiente em de acordo com a legislação nacional.

4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DE META-SPC 1

4.1. Descrição do uso

Quadro 1. Utilização # 1 – Desinfecção pré-ordenha, aplicação manual, por imersão (concentrado)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Aplicação de espuma manual - Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pré-ordenha através do método de aplicação manual por imersão.
Taxa(s) e frequência de aplicação	Concentração de utilização de iodo de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p) - Para produtos contendo 1,5 % de iodo: Diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo para utilização. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução. 3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia Aplicar um máximo de 10 ml/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.1.1. Instruções específicas de utilização

Para produtos contendo 1,5 % de iodo: Diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração 0,3 % de iodo para utilização. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução.

Aplicar diretamente nos tetos do animal pré-ordenha através do método de aplicação manual por imersão.

3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia

Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação

4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.1.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.1.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.1.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.2. Descrição do uso

Quadro 2. Utilização # 2 – Desinfecção pré-ordenha, aplicação manual, por espuma (concentrado)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Aplicação de espuma Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré-ordenha Aplicação manual diretamente nos tetos do animal, pré-ordenha, por espuma
Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização iodo é 3 000 mg/kg (0,3 % p/p) - Para produtos contendo 1,5 % de iodo: Diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de utilização de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução. 3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia Aplicar um máximo de 5 ml/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.2.1. Instruções específicas de utilização

Para produtos contendo 1,5 % de iodo: Diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de utilização de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução.

Aplicar manualmente diretamente nos tetos do animal, pré-ordenha, através do método de aplicação de espuma.

3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia

Aplicar um máximo de 5 ml de produto/animal/aplicação

4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.2.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.2.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.2.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.3. Descrição do uso

Quadro 3. Utilização # 3 – Desinfecção pré-ordenha, aplicação manual, por pulverização (concentrado)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Pulverização manual Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré-ordenha Aplicação manual diretamente nos tetos do animal, pré-ordenha, por pulverização manual.
Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p) - Para produtos contendo 1,5 % de iodo Diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução. 3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.3.1. Instruções específicas de utilização

Para produtos contendo 1,5 % de iodo Diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução.

Aplicação manual, diretamente nos tetos do animal, pré-ordenha, por pulverização.

3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia

Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação

4.3.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Use luvas de proteção resistentes a químicos durante a fase de manuseamento do produto (material das luvas a ser especificado pelo detentor da autorização dentro da informação sobre o produto).

4.3.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.3.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.3.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.4. Descrição do uso

Quadro 4. Utilização # 4 – Desinfecção pós-ordenha, aplicação manual, por pulverização (concentrado)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Imersão manual
Método(s) de aplicação	Imersão manual Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pós-ordenha. Aplicação manual, diretamente nos tetos do animal, pós-ordenha, por imersão.
Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Para produtos contendo 1,5 % de iodo Diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução. 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.4.1. Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de imersão.

Para produtos contendo 1,5 % de iodo Diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução.

3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia (5 aplicações no total)

Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação

4.4.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.4.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.4.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.4.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.5. Descrição do uso

Quadro 5. Utilização # 5 – Desinfecção pós-ordenha, aplicação manual, por espuma (concentrado)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Aplicação de espuma manual Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pós-ordenha Aplicação manual, diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de aplicação de espuma.
Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Para produtos contendo 1,5 % de iodo Diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução.- 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia Aplicar um máximo de 5 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.5.1. Instruções específicas de utilização

Aplicação manual, diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de aplicação de espuma.

Para produtos contendo 1,5 % de iodo Diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução.

3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia

Aplicar um máximo de 5 ml de produto/animal/aplicação

4.5.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.5.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.5.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.5.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.6. Descrição do uso

Quadro 6. Utilização # 6 – Desinfecção pós-ordenha, aplicação manual, por pulverização (concentrado)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Pulverização Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pós-ordenha Aplicação manual, diretamente nos tetos do animal, pós-ordenha, por pulverização.
Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Para produtos contendo 1,5 % de iodo Diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução. 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.6.1. Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha por pulverização manual.

Para produtos contendo 1,5 % de iodo Diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução.

3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia

Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação

4.6.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Use luvas de proteção resistentes a químicos durante a fase de manuseamento do produto (material das luvas a ser especificado pelo detentor da autorização dentro da informação sobre o produto).

4.6.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.6.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.6.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.7. Descrição do uso

Quadro 7. Utilização # 7 – Desinfecção pós-ordenha, por pulverização automática (concentrado)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Pulverização automática Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pós-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha por pulverização automática.
Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Para produtos contendo 1,5 % de iodo Diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução. 5 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia. Não deve ser combinado com desinfecção pré-ordenha. Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.7.1. Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de pulverização automática.

Para produtos contendo 1,5 % de iodo: diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução.

5 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia. Não deve ser combinado com desinfecção pré-ordenha à base de iodo.

Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação

4.7.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.7.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.7.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.7.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.8. Descrição do uso

Quadro 8. Utilização # 8 – Desinfecção pós-ordenha, por imersão semiautomática (concentrado)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Imersão semiautomática Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pós-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de imersão semiautomática.
Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Para produtos contendo 1,5 % de iodo: diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução.- 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Grande Recipiente para Granel (CRG) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.8.1. Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de imersão semiautomática.

Para produtos contendo 1,5 % de iodo: diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução.

3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia

Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação

4.8.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.8.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.8.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.8.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.9. Descrição do uso

Quadro 9. Utilização # 9 – Desinfecção pré e pós-ordenha, aplicação manual, por imersão (concentrado)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Imersão manual Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré e pós-ordenha Aplicação manual diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordenha por imersão.
Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Para produtos contendo 1,5 % de iodo: diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução. 3 aplicações pré-ordenha e 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia (até 5 aplicações por dia, no total.) Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC de 950 litros de PEAD ou f-HPDE)

4.9.1. Instruções específicas de utilização

Para produtos contendo 1,5 % de iodo: diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução.

Aplicação manual diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordenha por imersão.

3 aplicações pré-ordenha e 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total).

Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação

4.9.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.9.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.9.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.9.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.10. Descrição do uso

Quadro 10. Utilização # 10 – Desinfecção pré e pós-ordenha, aplicação manual, por espuma (concentrado)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Indoor
Método(s) de aplicação	Aplicação de espuma manual Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré e pós-ordenha Aplicação manual diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordenha por espuma.
Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Para produtos contendo 1,5 % de iodo: diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução. 3 aplicações pré-ordenha e 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total) Aplicar um máximo de 5 ml/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.10.1. Instruções específicas de utilização

Para produtos contendo 1,5 % de iodo: Diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar 0,3 % na concentração de iodo para utilização. Para produtos com outra concentração deve adotar-se esta instrução.

Aplicar diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordenha através do método de aplicação de espuma manual.

3 aplicações pré-ordenha e 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total)

Aplicar um máximo de 5 ml de produto/animal/aplicação.

4.10.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.10.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.10.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.10.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.11. Descrição do uso

Quadro 11. Utilização # 11 – Desinfecção pré e pós-ordenha, aplicação manual, por pulverização (concentrado)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Pulverização manual Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré e pós-ordenha Aplicação manual, diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordenha por pulverização.
Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Para produtos contendo 1,5 % de iodo: diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução. 3 aplicações pré-ordenha e 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total). Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.11.1. Instruções específicas de utilização

Para produtos contendo 1,5 % de iodo: diluir 1 parte do produto em 4 partes de água para alcançar a concentração de 0,3 % de iodo. Para produtos com outra concentração deve adaptar-se esta instrução.

Aplicação manual diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordenha por pulverização.

3 aplicações pré-ordenha e 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total)

Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação

4.11.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Use luvas de proteção resistentes a químicos durante a fase de manuseamento do produto (material das luvas a ser especificado pelo detentor da autorização dentro da informação sobre o produto)

Use calçado de proteção adequado (EN 13832) quando aplicar o produto.

Deve usar-se um fato de proteção (pelo menos tipo 6, EN 13034)

4.11.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.11.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.11.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO ⁽¹⁾ DOS META-SPC 1

5.1. **Instruções de utilização**

O produto deve ser colocado a uma temperatura de > 20 °C antes de utilizar

Pré-ordenha:

Aplicar o produto em todo o comprimento de cada teto.

Para uma utilização eficaz contra bactérias e leveduras o produto deve ser deixado em contacto com a pele durante, pelo menos 30 segundos.

Após um tempo de contacto apropriado, remova bem o produto utilizando uma toalha de papel/pano descartável para garantir que os tetos estão limpos e secos.

A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p).

Pós-ordenha:

Cubra todo o comprimento de cada teto com o produto, imediatamente após ordenha.

Para garantir um tempo de contacto suficiente, deve ter-se cuidado para que o produto não seja removido após aplicação (por ex., manter as vacas em pé, pelo menos, durante 5 minutos)

A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p).

5.2. **Medidas de redução do risco**

Este produto pode ser usado conjugando a desinfecção pré-ordenha e a desinfecção pós-ordenha (até 5 aplicações no total por animal e por dia). No entanto, não deve ser usado em conjugação com outros produtos à base de iodo.

Recomenda-se a utilização de uma bomba de dosagem para encher o produto no equipamento de aplicação.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Inalação: Sem efeitos ou sintomas conhecidos em condições de utilização normal.

Contacto com a pele: Sem efeitos ou sintomas conhecidos em condições de utilização normal.

Contacto com os olhos: Sem efeitos ou sintomas conhecidos em condições de utilização normal.

Ingestão: Sem efeitos ou sintomas conhecidos em condições de utilização normal

Após inalação: Forneça ar fresco, consulte um médico em caso de sintomas.

Após contacto com a pele: Lavar imediatamente com água e sabão passar bem por água.

Após contacto com os olhos: Passe os olhos abertos por água corrente durante vários minutos (pelo menos 15 minutos).

Após ingestão: Lave a boca com água e depois beba bastante água. Contactar imediatamente um médico.

Se for necessário consultar um médico leve a embalagem do produto e o rótulo

Estabilidade e reatividade:

Reatividade: Sem riscos reativos conhecidos em condições de armazenamento e utilização normais.

Estabilidade química: Estável em condições de armazenamento e utilização normais.

Possibilidade de reações perigosas: Sem reações perigosas conhecidas em condições de armazenamento e utilização normais.

Condições a evitar: Nenhum conhecido em condições de armazenamento e utilização normais.

⁽¹⁾ As instruções de utilização, as medidas de redução dos riscos e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas no âmbito do meta-SPC 1.

Produtos de decomposição perigosos: Nenhum conhecido em condições de armazenamento e utilização normais.

Precauções ambientais:

Dique de contenção para recolha de derrames de líquidos grandes.

Contenha ou absorva o derrame com material inerte e depois coloque num recipiente adequado.

Evite que os produtos derramados entrem em drenos, esgotos e águas subterrâneas.

Recalha em contentores fechados e adequados para eliminação.

Não volte a por os materiais derramados no contentor original.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Os contentores vazios devem ser enxaguados três vezes antes da eliminação

As toalhas de papel utilizadas para secar os tetos dos animais e remover o produto dos mesmos devem ser eliminadas como lixo indiferenciado/doméstico.

Não descarregar produto não diluído para o esgoto.

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Guardar apenas no recipiente original, fechado

Proteger de congelação

Não guardar a temperaturas acima de 40 °C

Prazo de c de 24 meses

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Nenhum

7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 1

7.1. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome comercial do produto	Deosan Activate Pre AG106 Deosan Activate Pre				
Número da autorização	EU-0019228-0001 1-1				
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Iodo		Substância ativa	7553-56-2	231-442-4	1,5

7.2. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome comercial do produto	Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Conc. Deosan Hitech concentrate Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. Iodine Concentrate				
Número da autorização	EU-0019228-0002 1-1				
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Iodo		Substância ativa	7553-56-2	231-442-4	1,5

META-SPC 2

1. INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DE META-SPC 2

1.1. **Identificador de meta-SPC 2**

Identificador	Meta SPC 2 - Deosan Activate BPF – RTU liquid
---------------	---

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-2
--------	-----

1.3. **Tipo(s) do produto**

Tipo(s) do produto	TP 03 - Higiene veterinária
--------------------	-----------------------------

2. COMPOSIÇÃO DE META-SPC 2

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição de meta-SPC 2**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)	
					Mín.	Máx.
Iodo		Substância ativa	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2. **Tipo(s) de formulação de meta-SPC 2**

Formulação(ões)	AL - Qualquer outro líquido
-----------------	-----------------------------

3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E AS RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DE META-SPC 2

Advertências de perigo	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Recomendações de prudência	Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar a libertação para o ambiente. Eliminar o conteúdo em de acordo com a legislação nacional. Eliminar o recipiente em de acordo com a legislação nacional.

4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DE META-SPC 2

4.1. **Descrição do uso****Quadro 12. Utilização # 1 – Desinfecção pré-ordenha, aplicação manual por imersão (líquido RTU)**

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Imersão manual - Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré-ordenha Aplicação manual diretamente nos tetos do animal pré-ordenha por imersão.

Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. 3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia. Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.1.1. Instruções específicas de utilização

Aplicação manual diretamente nos tetos do animal pré-ordenha por imersão

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia.

Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação

4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.1.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.1.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.1.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.2. Descrição do uso

Quadro 13. Utilização # 2 – Desinfecção pré-ordenha, aplicação manual por espuma (líquido RTU)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Aplicação de espuma Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré-ordenha Aplicação manual diretamente nos tetos do animal pré-ordenha por espuma.

Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. 3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia. Aplicar um máximo de 5 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD. Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD. Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE.

4.2.1. Instruções específicas de utilização

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

Aplicar diretamente nos tetos do animal pré-ordenha através do método de aplicação de espuma manual.

3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia.

Aplicar um máximo de 5 ml de produto/animal/aplicação

4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.2.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.2.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.2.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.3. Descrição do uso

Quadro 14. Utilização # 3 – Desinfecção pré-ordenha, pulverização manual (líquido RTU)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior interior
Método(s) de aplicação	Pulverização manual Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pré-ordenha através do método de pulverização manual.

Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. 3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia. Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.3.1. Instruções específicas de utilização

Aplicação manual diretamente nos tetos do animal pré-ordenha por pulverização.

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia.

Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação

4.3.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Use luvas de proteção resistentes a químicos durante a fase de manuseamento do produto (material das luvas a ser especificado pelo detentor da autorização dentro da informação sobre o produto)

4.3.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.3.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.3.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.4. Descrição do uso

Quadro 15. Utilização # 4 – Desinfecção pós-ordenha, imersão manual (líquido RTU)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Indoor
Método(s) de aplicação	Imersão manual Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pós-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de imersão.

Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia. Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.4.1. Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de imersão.

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia.

Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação

4.4.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.4.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.4.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.4.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.5. Descrição do uso

Quadro 16. Utilização # 5 – Desinfecção pós-ordenha, manual, aplicação de espuma (líquido RTU)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Aplicação de espuma manual Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pós-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através de aplicação manual de espuma.

Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia. Aplicar um máximo de 5 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.5.1. Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de aplicação manual de espuma.

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia.

Aplicar um máximo de 5 ml de produto/animal/aplicação

4.5.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.5.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.5.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.5.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.6. Descrição do uso

Quadro 17. Utilização # 6 – Desinfecção pós-ordenha, manual por pulverização (líquido RTU)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Pulverização manual Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pós-ordenha Aplicação manual diretamente nos tetos do animal pós-ordenha por pulverização.

Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia. Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.6.1. Instruções específicas de utilização

Aplicação manual, diretamente nos tetos do animal pós-ordenha por pulverização.

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia.

Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação

4.6.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Use luvas de proteção resistentes a químicos durante a fase de manuseamento do produto (material das luvas a ser especificado pelo detentor da autorização de acordo com a informação sobre o produto)

4.6.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.6.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.6.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.7. Descrição do uso

Quadro 18. Utilização # 7 – Desinfecção pós-ordenha, pulverização automática (não pode ser combinada com a desinfecção pré-ordenha) (líquido RTU)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Pulverização automática - Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pós-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de pulverização automática.

Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. 5 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia. Não deve ser combinado com desinfecção pré-ordenha à base de iodo. Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.7.1. Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de pulverização automática.

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

5 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia. Não deve ser combinado com desinfecção pré-ordenha à base de iodo.

Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação

4.7.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.7.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.7.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.7.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.8. Descrição do uso

Quadro 19. Utilização # 8 – Desinfecção pós-ordenha, imersão semiautomática (líquido RTU)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Imersão semiautomática - Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pós-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de imersão semiautomática.

Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia. Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.8.1. Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de imersão semiautomática.

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia.

Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação

4.8.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.8.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.8.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.8.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.9. Descrição do uso

Quadro 20. Utilização # 9 – Desinfecção pré e pós-ordenha, pulverização manual (líquido RTU)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Imersão manual Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré e pós-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordenha através de métodos de imersão manual

Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. 3 aplicações pré-ordenha e 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total). Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.9.1. Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pré-ordenha através de métodos de imersão manual.

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

3 aplicações pré-ordenha e 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total).

Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação

4.9.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Use luvas de proteção resistentes a químicos durante a fase de manuseamento do produto (material das luvas a ser especificado pelo detentor da autorização de acordo com a informação sobre o produto)

4.9.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.9.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.9.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.10. Descrição do uso

Quadro 21. Utilização # 10 – Desinfecção pré e pós-ordenha, aplicação manual de espuma (líquido RTU)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Aplicação de espuma manual - Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré e pós-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordenha através do método de aplicação manual de espuma.

Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. 3 aplicações pré-ordenha e 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total). Aplicar um máximo de 5 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.10.1. Instruções específicas de utilização

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

Aplicar diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordenha através do método de aplicação manual de espuma

3 aplicações pré-ordenha e 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total).

Aplicar um máximo de 5 ml de produto/animal/aplicação

4.10.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Use luvas de proteção resistentes a químicos durante a fase de manuseamento do produto (material das luvas a ser especificado pelo detentor da autorização de acordo com a informação sobre o produto)

4.10.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.10.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.10.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.11. Descrição do uso

Quadro 22. Utilização # 11 – Desinfecção pré e pós-ordenha, pulverização manual (líquido RTU)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior interior
Método(s) de aplicação	Pulverização manual Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré e pós-ordenha Aplicado manual diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordenha por pulverização.

Taxa(s) e frequência de aplicação	Na utilização de uma concentração de iodo de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p) - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. - 3 aplicações pré-ordemha e 3 aplicações pós-ordemha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total). Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.11.1. Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordemha através do método de pulverização manual.

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

3 aplicações pré-ordemha e 3 aplicações pós-ordemha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total).

Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação

4.11.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Use luvas de proteção resistentes a químicos durante a fase de manuseamento do produto (material das luvas a ser especificado pelo detentor da autorização de acordo com a informação sobre o produto)

Use calçado de proteção adequado (EN 13832) quando aplicar o produto.

Deve usar-se um fato de proteção (pelo menos tipo 6, EN 13034)

4.11.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.11.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.11.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO ⁽²⁾ DOS META-SPC 2

5.1. Instruções de utilização

O produto deve ser colocado a uma temperatura de > 20 °C antes de utilizar

Pré-ordemha:

Aplicar o produto em todo o comprimento de cada teto.

Para uma utilização eficaz contra bactérias e leveduras o produto deve ser deixado em contacto com a pele durante, pelo menos 30 segundos.

Após um tempo de contacto apropriado, remova bem o produto utilizando uma toalha de papel/pano descartável para garantir que os tetos estão limpos e secos.

A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p).

⁽²⁾ As instruções de utilização, as medidas de redução dos riscos e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas no âmbito do meta-SPC 2.

Pós-ordenha:

Cubra todo o comprimento de cada teto com o produto, imediatamente após ordenha.

Para garantir um tempo de contacto suficiente, deve ter-se cuidado para que o produto não seja removido após aplicação (por ex., manter as vacas em pé, pelo menos, durante 5 minutos)

A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p).

5.2. **Medidas de redução do risco**

Este produto pode ser usado conjugando a desinfecção pré-ordenha e a desinfecção pós-ordenha (até 5 aplicações no total por animal e por dia). No entanto, não deve ser usado em conjugação com outros produtos à base de iodo.

Recomenda-se a utilização de uma bomba de dosagem para encher o produto no equipamento de aplicação.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Inalação: Sem efeitos ou sintomas conhecidos em condições de utilização normal.

Contacto com a pele: Sem efeitos ou sintomas conhecidos em condições de utilização normal.

Contacto com os olhos: Sem efeitos ou sintomas conhecidos em condições de utilização normal.

Ingestão: Sem efeitos ou sintomas conhecidos em condições de utilização normal

Após inalação: Forneça ar fresco, consulte um médico em caso de sintomas.

Após contacto com a pele: Lavar imediatamente com água e sabão passar bem por água.

Após contacto com os olhos: Passe os olhos abertos por água corrente durante vários minutos (pelo menos 15 minutos).

Após ingestão: Lave a boca com água e depois beba bastante água. Contactar imediatamente um médico.

Se for necessário consultar um médico leve a embalagem do produto e o rótulo

Estabilidade e reatividade:

Reatividade: Sem riscos reativos conhecidos em condições de armazenamento em condições de utilização normais.

Estabilidade química: Estável em condições de armazenamento e utilização normais.

Possibilidade de reações perigosas: Sem reações perigosas conhecidas em condições de armazenamento e utilização normais.

Condições a evitar: Nenhum conhecido em condições de armazenamento e utilização normais.

Produtos de decomposição perigosos: Nenhum conhecido em condições de armazenamento e utilização normais.

Precauções ambientais:

Dique para recolha de derrames de líquidos grandes.

Contenha ou absorva o derrame com material inerte e depois coloque num recipiente adequado.

Evite que os produtos derramados entrem em drenos, esgotos e águas subterrâneas.

Recalhe em contentores fechados e adequados para eliminação.

Não volte a por os materiais derramados no contentor original.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Os contentores vazios devem ser enxaguados três vezes antes da eliminação

As toalhas de papel utilizadas para secar os tetos dos animais e remover o produto dos mesmos devem ser eliminadas como lixo indiferenciado/doméstico.

Não descarregar produto não diluído para o esgoto.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Guardar apenas no recipiente original, fechado

Proteger de congelação

Não armazenar a temperaturas acima de 30 °C

Prazo de validade 24 meses.

6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nenhum

7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 2**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome comercial do produto	Deosan Activate Pre RTU AG108 Deosan Activate Pre RTU				
Número da autorização	EU-0019228-0003 1-2				
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Iodo		Substância ativa	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.2. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome comercial do produto	Deosan Activate Pre/Post AG217 Deosan Activate Pre/Post Iodine Plus Pre & Post Deosan D4T Super AG211 Agros Iodo Agros Iodo Multi Poviclyn liquido				
Número da autorização	EU-0019228-0004 1-2				
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Iodo		Substância ativa	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.3. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome comercial do produto	Deosan Activate PVP Plus AG215 Deosan Activate PVP Plus Agros Iodo-Prev POS-Ordenha Deosan Hitech 2 AG214 Iodine Teat Dip Solution				
Número da autorização	EU-0019228-0005 1-2				
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Iodo		Substância ativa	7553-56-2	231-442-4	0,3

META-SPC 3

1. INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DE META-SPC 3

1.1. **Identificador de meta-SPC 3**

Identificador	Meta SPC 3 - Deosan Activate BPF – RTU gel
---------------	--

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-3
--------	-----

1.3. **Tipo(s) do produto**

Tipo(s) do produto	TP 03 - Higiene veterinária
--------------------	-----------------------------

2. COMPOSIÇÃO DE META-SPC 3

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição de meta-SPC 3**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)	
					Mín.	Máx.
Iodo		Substância ativa	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2. **Tipo(s) de formulação de meta-SPC 3**

Formulação(ões)	GW - Gel solúvel em água
-----------------	--------------------------

3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E AS RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DE META-SPC 3

Advertências de perigo	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Recomendações de prudência	Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar a libertação para o ambiente. Eliminar o conteúdo em de acordo com a legislação nacional. Eliminar o recipiente em de acordo com a legislação nacional.

4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DE META-SPC 3

4.1. **Descrição do uso****Quadro 23. Utilização # 1 – Desinfecção pré-ordenha, imersão manual (gel RTU)**

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Imersão manual - Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pré-ordenha através do método de aplicação manual por imersão.

Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. 3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia. Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.1.1. Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pré-ordenha através do método de aplicação manual por imersão

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia.

Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação

4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.1.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.1.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.1.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.2. Descrição do uso

Quadro 24. Utilização # 2 – Desinfecção pós-ordenha, imersão manual (gel RTU)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Imersão manual Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pós-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método manual por imersão.

Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia. aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.2.1. Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método manual por imersão.

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

2 a 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia.

Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação

4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.2.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.2.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.2.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.3. Descrição do uso

Quadro 25. Utilização # 3 – Desinfecção pós-ordenha, imersão semiautomática (gel RTU)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Imersão semiautomática Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pós-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de imersão semiautomática.

Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia. Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação.
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.3.1. Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de imersão semiautomática.

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia.

Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação

4.3.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.3.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.3.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.3.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.4. Descrição do uso

Quadro 26. Utilização # 4 – Desinfecção pré e pós-ordenha, imersão manual (gel RTU)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Bactérias Leveduras
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Imersão manual Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré-ordenha e pós-ordenha. Aplicado diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordenha através de método de aplicação manual por imersão

Taxa(s) e frequência de aplicação	A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. 3 aplicações pré-ordemha e 3 aplicações pós-ordemha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total) Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.4.1. Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordemha através do método de aplicação manual por imersão.

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3 % p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

3 aplicações pré-ordemha e 3 aplicações pós-ordemha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total)

Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação

4.4.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Use luvas de proteção resistentes a químicos quando aplicar o produto por imersão (material das luvas a ser especificado pelo detentor da autorização de acordo com a informação sobre o produto)

4.4.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver a secção 5 - Instruções gerais de utilização.

4.4.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver a secção 5 - Instruções gerais de utilização.

4.4.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver a secção 5 - Instruções gerais de utilização.

5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO ⁽³⁾ DOS META-SPC 3

5.1. Instruções de utilização

O produto deve ser colocado a uma temperatura de > 20 °C antes de utilizar

Pré-ordemha:

Aplicar o produto em todo o comprimento de cada teto.

Para uma utilização eficaz contra bactérias e leveduras o produto deve ser deixado em contacto com a pele durante, pelo menos 30 segundos.

Após um tempo de contacto apropriado, remova bem o produto utilizando uma toalha de papel/pano descartável para garantir que os tetos estão limpos e secos.

A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p).

⁽³⁾ As instruções de utilização, as medidas de redução dos riscos e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas no âmbito do meta-SPC 3.

Pós-ordenha:

Cubra todo o comprimento de cada teto com o produto, imediatamente após ordenha.

Para garantir um tempo de contacto suficiente, deve ter-se cuidado para que o produto não seja removido após aplicação (por ex., manter as vacas em pé, pelo menos, durante 5 minutos)

A concentração de utilização de iodo é de 3 000 mg/kg (0,3 % p/p).

5.2. Medidas de redução do risco

Este produto pode ser usado conjugando a desinfecção pré-ordenha e a desinfecção pós-ordenha (até 5 aplicações no total por animal e por dia). No entanto, não deve ser usado em conjugação com outros produtos à base de iodo.

Recomenda-se a utilização de uma bomba de dosagem para encher o produto no equipamento de aplicação.

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Inalação: Sem efeitos ou sintomas conhecidos em condições de utilização normal.

Contacto com a pele: Sem efeitos ou sintomas conhecidos em condições de utilização normal.

Contacto com os olhos: Sem efeitos ou sintomas conhecidos em condições de utilização normal.

Ingestão: Sem efeitos ou sintomas conhecidos em condições de utilização normal

Após inalação: Forneça ar fresco, consulte um médico em caso de sintomas.

Após contacto com a pele: Lavar imediatamente com água e sabão passar bem por água.

Após contacto com os olhos: Passe os olhos abertos por água corrente durante vários minutos (pelo menos 15 minutos).

Após ingestão: Lave a boca com água e depois beba bastante água. Contactar imediatamente um médico.

Se for necessário consultar um médico leve a embalagem do produto e o rótulo

Estabilidade e reatividade:

Reatividade: Sem riscos reativos conhecidos em condições de armazenamento e utilização normais.

Estabilidade química: Estável em condições de armazenamento e utilização normais.

Possibilidade de reações perigosas: Sem reações perigosas conhecidas em condições de armazenamento e utilização normais.

Condições a evitar: Nenhum conhecido em condições de armazenamento e utilização normais.

Produtos de decomposição perigosos: Nenhum conhecido em condições de armazenamento e utilização normais.

Precauções ambientais:

Dique para recolha de derrames de líquidos grandes.

Contenha ou absorva o derrame com material inerte e depois coloque num recipiente adequado.

Evite que os produtos derramados entrem em drenos, esgotos e águas subterrâneas.

Recolha em contentores fechados e adequados para eliminação.

Não volte a por os materiais derramados no contentor original.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Os contentores vazios devem ser enxaguados três vezes antes da eliminação

As toalhas de papel utilizadas para secar os tetos dos animais e remover o produto dos mesmos devem ser eliminadas como lixo indiferenciado/doméstico.

Não descarregar produto não diluído para o esgoto.

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Guardar apenas no recipiente original, fechado

Proteger de congelação

Não armazenar a temperaturas acima de 30 °C

Prazo de validade de 18 meses

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

None

7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 3**7.1. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome comercial do produto	Deosan Activate Barrier AG216 Agros Iodo Pós Povisyl espeso				
Número da autorização	EU-0019228-0006 1-3				
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Iodo		Substância ativa	7553-56-2	231-442-4	0,3