

Este texto constitui um instrumento de documentação e não tem qualquer efeito jurídico. As Instituições da União não assumem qualquer responsabilidade pelo respetivo conteúdo. As versões dos atos relevantes que fazem fé, incluindo os respetivos preâmbulos, são as publicadas no Jornal Oficial da União Europeia e encontram-se disponíveis no EUR-Lex. É possível aceder diretamente a esses textos oficiais através das ligações incluídas no presente documento

►B

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/2470 DA COMISSÃO

de 20 de dezembro de 2017

que estabelece a lista da União de novos alimentos em conformidade com o Regulamento (UE) 2015/2283 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a novos alimentos

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(JO L 351 de 30.12.2017, p. 72)

Alterado por:

		Jornal Oficial		
		n.º	página	data
► <u>M1</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/460 da Comissão de 20 de março de 2018	L 78	2	21.3.2018
► <u>M2</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/461 da Comissão de 20 de março de 2018	L 78	7	21.3.2018
► <u>M3</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/462 da Comissão de 20 de março de 2018	L 78	11	21.3.2018
► <u>M4</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/469 da Comissão de 21 de março de 2018	L 79	11	22.3.2018
► <u>M5</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/991 da Comissão de 12 de julho de 2018	L 177	9	13.7.2018
► <u>M6</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/1011 da Comissão de 17 de julho de 2018	L 181	4	18.7.2018
► <u>M7</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/1018 da Comissão de 18 de julho de 2018	L 183	9	19.7.2018
► <u>M8</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/1032 da Comissão de 20 de julho de 2018	L 185	9	23.7.2018
► <u>M9</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/1023 da Comissão de 23 de julho de 2018	L 187	1	24.7.2018
► <u>M10</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/1122 da Comissão de 10 de agosto de 2018	L 204	36	13.8.2018
► <u>M11</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/1123 da Comissão de 10 de agosto de 2018	L 204	41	13.8.2018
► <u>M12</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/1132 da Comissão de 13 de agosto de 2018	L 205	15	14.8.2018
► <u>M13</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/1133 da Comissão de 13 de agosto de 2018	L 205	18	14.8.2018
► <u>M14</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/1293 da Comissão de 26 de setembro de 2018	L 243	2	27.9.2018
► <u>M15</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/1631 da Comissão de 30 de outubro de 2018	L 272	17	31.10.2018
► <u>M16</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/1632 da Comissão de 30 de outubro de 2018	L 272	23	31.10.2018

► <u>M17</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/1633 da Comissão de 30 de outubro de 2018	L 272	29	31.10.2018
► <u>M18</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/1647 da Comissão de 31 de outubro de 2018	L 274	51	5.11.2018
► <u>M19</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/1648 da Comissão de 29 de outubro de 2018	L 275	1	6.11.2018
► <u>M20</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/1991 da Comissão de 13 de dezembro de 2018	L 320	22	17.12.2018
► <u>M21</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/2016 da Comissão de 18 de dezembro de 2018	L 323	1	19.12.2018
► <u>M22</u>	Regulamento de Execução (UE) 2018/2017 da Comissão de 18 de dezembro de 2018	L 323	4	19.12.2018
► <u>M23</u>	Regulamento de Execução (UE) 2019/108 da Comissão de 24 de janeiro de 2019	L 23	4	25.1.2019
► <u>M24</u>	Regulamento de Execução (UE) 2019/109 da Comissão de 24 de janeiro de 2019	L 23	7	25.1.2019
► <u>M25</u>	Regulamento de Execução (UE) 2019/110 da Comissão de 24 de janeiro de 2019	L 23	11	25.1.2019
► <u>M26</u>	Regulamento de Execução (UE) 2019/387 da Comissão de 11 de março de 2019	L 70	17	12.3.2019
► <u>M27</u>	Regulamento de Execução (UE) 2019/388 da Comissão de 11 de março de 2019	L 70	21	12.3.2019
► <u>M28</u>	Regulamento de Execução (UE) 2019/456 da Comissão de 20 de março de 2019	L 79	13	21.3.2019
► <u>M29</u>	Regulamento de Execução (UE) 2019/506 da Comissão de 26 de março de 2019	L 85	11	27.3.2019
► <u>M30</u>	Regulamento de Execução (UE) 2019/760 da Comissão de 13 de maio de 2019	L 125	13	14.5.2019
► <u>M31</u>	Regulamento de Execução (UE) 2019/1272 da Comissão de 29 de julho de 2019	L 201	3	30.7.2019
► <u>M32</u>	Regulamento de Execução (UE) 2019/1294 da Comissão de 1 de agosto de 2019	L 204	16	2.8.2019
► <u>M33</u>	Regulamento de Execução (UE) 2019/1314 da Comissão de 2 de agosto de 2019	L 205	4	5.8.2019
► <u>M34</u>	Regulamento de Execução (UE) 2019/1686 da Comissão de 8 de outubro de 2019	L 258	13	9.10.2019
► <u>M35</u>	Regulamento de Execução (UE) 2019/1976 da Comissão de 25 de novembro de 2019	L 308	40	29.11.2019
► <u>M36</u>	Regulamento de Execução (UE) 2019/1979 da Comissão de 26 de novembro de 2019	L 308	62	29.11.2019

▼B

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/2470 DA COMISSÃO

de 20 de dezembro de 2017

que estabelece a lista da União de novos alimentos em conformidade com o Regulamento (UE) 2015/2283 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a novos alimentos

(Texto relevante para efeitos do EEE)

Artigo 1.º

Lista da União de novos alimentos autorizados

Fica estabelecida a lista da União de novos alimentos autorizados para serem colocados no mercado da União referida no artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 2015/2283, tal como consta do anexo do presente regulamento.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

▼M9

ANEXO

LISTA DA UNIÃO DE NOVOS ALIMENTOS

Conteúdo da lista

1. A lista da União é constituída pelos quadros 1 e 2.
2. O quadro 1 inclui os novos alimentos autorizados e contém as seguintes informações:

Coluna 1: Novo alimento autorizado

Coluna 2: Condições em que o novo alimento pode ser utilizado. Esta coluna está subdividida em duas: categoria especificada de alimentos e níveis máximos

Coluna 3: Requisitos específicos de rotulagem adicionais

Coluna 4: Outros requisitos

3. O quadro 2 inclui as especificações dos novos alimentos e contém as seguintes informações:

Coluna 1: Novo alimento autorizado

Coluna 2: Especificações

▼M9

Quadro 1: Novos alimentos autorizados

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado	Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Ácido N-acetil-D-neuramínico	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	<p>A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «ácido N-acetil-D-neuramínico». Os suplementos alimentares que contêm ácido N-acetil-D-neuramínico devem ostentar uma menção que indique que o suplemento alimentar não deve ser ministrado a lactentes, crianças pequenas e crianças com menos de 10 anos caso consumam, no mesmo período de vinte e quatro horas, leite materno ou outros alimentos com adição de ácido N-acetil-D-neuramínico.</p>	
	Fórmulas para lactentes e fórmulas de transição, tal como definidas no Regulamento (UE) n.º 609/2013 (¹)	0,05 g/l de fórmula reconstituída		
	Alimentos transformados à base de cereais e alimentos para bebés destinados a lactentes e crianças pequenas, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	0,05 g/kg para alimentos sólidos		
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos para lactentes e crianças pequenas, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com as necessidades nutricionais específicas dos lactentes e crianças pequenas a que os produtos se destinam mas, em qualquer caso, não superiores aos níveis máximos especificados no quadro relativamente à categoria correspondente aos produtos		
	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	0,2 g/l (bebidas) 1,7 g/kg (barras)		
	Alimentos que ostentam menções sobre a ausência ou a presença reduzida de glúten em conformidade com os requisitos do Regulamento de Execução (UE) n.º 828/2014 da Comissão (²)	1,25 g/kg		
	Produtos à base de leite pasteurizados e esterilizados (incluindo ultrapasteurizados — UHT) não aromatizados	0,05 g/l		

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
	Produtos à base de leite fermentados não aromatizados, tratados termicamente após a fermentação, produtos lácteos fermentados aromatizados, incluindo os produtos tratados termicamente	0,05 g/l (bebidas) 0,4 g/kg (sólidos)			
	Sucedâneos de produtos lácteos, incluindo branqueadores para bebidas	0,05 g/l (bebidas) 0,25 g/kg (sólidos)			
	Barras de cereais	0,5 g/kg			
	Edulcorantes de mesa	8,3 g/kg			
	Bebidas à base de fruta e de produtos hortícolas	0,05 g/l			
	Bebidas aromatizadas	0,05 g/l			
	Café especial, chá, infusões de plantas e de frutos, chicória; extratos de chá, de infusões de plantas e de frutos e de chicória; preparações à base de chá, plantas, frutos e cereais para infusões	0,2 g/kg			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE ⁽³⁾	300 mg/dia para a população em geral com mais de 10 anos 55 mg/dia para lactentes 130 mg/dia para crianças pequenas 250 mg/dia para crianças entre os 3 e os 10 anos			
Polpa seca do fruto de <i>Adansonia digitata</i> (embondeiro)	Não especificado		A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «polpa do fruto do embondeiro»		

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Extrato de <i>Ajuga reptans</i> de culturas de células	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Niveis máximos</i>			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	De acordo com a utilização normal em suplementos alimentares de um extrato semelhante das partes aéreas floridas de <i>Ajuga reptans</i>			
L-Alanil-L-glutamina	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Niveis máximos</i>			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE				
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013, exceto alimentos destinados a lactentes e crianças pequenas				
	Bebidas adaptadas a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas				
Óleo da microalga <i>Ulkenia sp.</i>	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Niveis máximos de DHA</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «óleo da microalga <i>Ulkenia sp.</i> »		
	Produtos de panificação (pães, pãezinhos e bolachas e biscoitos adicionados de edulcorantes)	200 mg/100 g			
	Barras de cereais	500 mg/100 g			
	Bebidas não alcoólicas (incluindo bebidas lácteas)	60 mg/100 ml			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ▲
▼M25					
Óleo de semente de <i>Allanblackia</i>	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>			
	Produtos gordos para barrar de cor amarela e pastas para barrar à base de natas	30 g/100 g	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «óleo de semente de <i>Allanblackia</i> »		
	Misturas de óleos vegetais (*) e de leite (abrangidas pela categoria de alimentos: Sucedâneos de produtos lácteos, incluindo branqueadores para bebidas)	30 g/100 g			
	(*) Exceto azeites e óleos de bagaço de azeitona, tal como definidos no anexo VII, parte VIII, do Regulamento (UE) n.º 1308/2013.				
▼M9					
Extrato de folha de <i>Aloe macroclada</i> Baker	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	De acordo com a utilização normal nos suplementos alimentares do gel semelhante derivado de <i>Aloe vera</i> (L.) Burm.			
Óleo de krill-do-antártico de <i>Euphausia superba</i>	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de DHA e EPA combinados</i>			
	Produtos lácteos, exceto bebidas lácteas	200 mg/100 g ou, para produtos de queijo, 600 mg/100 g	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «extrato lipídico do crustáceo krill-do-antártico (<i>Euphausia superba</i>)»		
	Sucedâneos de produtos lácteos, exceto bebidas	200 mg/100 g ou, para sucedâneos de produtos de queijo, 600 mg/100 g			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado	Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
	Bebidas não alcoólicas Bebidas lácteas Bebidas de sucedâneos de produtos lácteos	80 mg/100 ml		
	Gorduras para barrar e guarnições	600 mg/100 g		
	Gorduras para cozinhar	360 mg/100 ml		
	Cereais para pequeno-almoço	500 mg/100 g		
	Produtos de panificação (pães, pãezinhos e bolachas e biscoitos adicionados de edulcorantes)	200 mg/100 g		
	Barras nutritivas/barras de cereais	500 mg/100 g		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	3 000 mg/dia para a população em geral 450 mg/dia para mulheres grávidas e lactantes		
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com as necessidades nutricionais específicas das pessoas a que os produtos se destinam		
	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013 e substitutos de refeição para controlo do peso	250 mg/refeição		

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado	Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
	Alimentos transformados à base de cereais e alimentos para bebés destinados a lactentes e crianças pequenas abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 609/2013	200 mg/100 ml		
	Alimentos adaptados a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas			
	Alimentos que ostentam menções sobre a ausência ou a presença reduzida de glúten em conformidade com os requisitos do Regulamento de Execução (UE) n.º 828/2014 da Comissão			
Óleo rico em fosfolípidos de krill-do-antártico de <i>Euphausia superba</i>	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de DHA e EPA combinados</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «extrato lipídico do crustáceo krill-do-antártico (<i>Euphausia superba</i>)»	
	Produtos lácteos, exceto bebidas lácteas	200 mg/100 g ou, para produtos de queijo, 600 mg/100 g		
	Sucedâneos de produtos lácteos, exceto bebidas	200 mg/100 g ou, para sucedâneos de produtos de queijo, 600 mg/100 g		
	Bebidas não alcoólicas Bebidas lácteas Bebidas de sucedâneos de produtos lácteos	80 mg/100 ml		
	Gorduras para barrar e guarnições	600 mg/100 g		
	Gorduras para cozinhar	360 mg/100 ml		
	Cereais para pequeno-almoço	500 mg/100 g		
	Produtos de panificação (pães, pãezinhos e bolachas e biscoitos adicionados de edulcorantes)	200 mg/100 g		
	Barras nutritivas/barras de cereais	500 mg/100 g		

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Óleo do fungo <i>Mortierella alpina</i> rico em ácido araquidônico	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	3 000 mg/dia para a população em geral 450 mg/dia para mulheres grávidas e lactantes			
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com as necessidades nutricionais específicas das pessoas a que os produtos se destinam			
	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013 e substitutos de refeição para controlo do peso	250 mg/refeição			
	Alimentos transformados à base de cereais e alimentos para bebés destinados a lactentes e crianças pequenas abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 609/2013	200 mg/100 ml			
	Alimentos adaptados a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas				
	Alimentos que ostentam menções sobre a ausência ou a presença reduzida de glúten em conformidade com os requisitos do Regulamento de Execução (UE) n.º 828/2014 da Comissão				
	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «óleo de <i>Mortierella alpina</i> »		
Fórmulas para lactentes e fórmulas de transição, tal como definidas no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 609/2013				
Alimentos destinados a fins medicinais específicos para lactentes prematuros, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 609/2013				

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Óleo de argão de <i>Argania spinosa</i>	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «óleo de argão» e, se for utilizado como tempero, deve ser mencionado no rótulo «óleo vegetal apenas para tempero»		
	Como tempero	Não especificado			
Oleoresina rica em astaxantina da alga <i>Haematococcus pluvialis</i>	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «astaxantina»		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	De acordo com as utilizações alimentares normais dos óleos vegetais			
Sementes de manjericão (<i>Ocimum basilicum</i>)	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>			
	Sumos de frutas e bebidas à base de misturas de frutas e de produtos hortícolas	3 g/200 ml para a adição de sementes inteiras de manjericão (<i>Ocimum basilicum</i>)			
Betaína	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «betaína». Na rotulagem dos alimentos que contêm betaína deve figurar uma advertência de que os alimentos não devem ser utilizados se forem consumidos no mesmo dia suplementos alimentares que contêm betaína.		Autorizado em 22 de agosto de 2019. Esta inserção baseia-se em provas científicas e dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283. Requerente: DuPont Nutrition Biosciences ApS, Langebrogade 1 Copenhagen K, DK-1411, Dinamarca. Durante o período de proteção de dados, só a DuPont Nutrition Biosciences ApS está autorizada a colocar no mercado da União o novo alimento betaína, salvo se um
	Bebidas em pó, bebidas energéticas e isotónicas destinadas a desportistas	60 mg/100 g			
	Barra de cereais e de proteínas destinadas a desportistas	500 mg/100 g			
	Substitutos de refeição destinados a desportistas	20 mg/100 g			
	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	500 mg/100 g (barra) 136 mg/100 g (sopa) 188 mg/100 g (papas) 60 mg/100 g (bebidas)			
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013, para adultos	400 mg/dia			

▼M32

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
					<p>requerente posterior obtiver autorização para o novo alimento sem fazer referência às provas científicas ou aos dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283, ou com o acordo da DuPont Nutrition Biosciences ApS.</p> <p>Termo do período de proteção de dados: 22 de agosto de 2024.</p>

▼M9

Extrato de soja preta fermentada	<i>Categoría especificada de alimentos</i> Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	<i>Níveis máximos</i> 4,5 g/dia	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «extrato de soja preta fermentada» ou «extrato de soja fermentada»		
Lactoferrina bovina	<i>Categoría especificada de alimentos</i> Fórmulas para lactentes e fórmulas de transição, tal como definidas no Regulamento (UE) n.º 609/2013 (prontas a beber)	<i>Níveis máximos</i> 100 mg/100 ml	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «lactoferrina de leite de vaca»		
	Alimentos lácteos destinados a crianças pequenas (prontos a comer/beber)	200 mg/100 g			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Alimentos à base de cereais transformados (sólidos)	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	670 mg/100 g Dependendo das necessidades do indivíduo, até 3 g/dia			
	Bebidas lácteas	200 mg/100 g			
	Misturas em pó para bebidas lácteas (prontas a beber)	330 mg/100 g			
	Bebidas à base de leite fermentado (incluindo bebidas à base de iogurte)	50 mg/100 g			
	Bebidas não alcoólicas	120 mg/100 g			
	Produtos à base de iogurte	80 mg/100 g			
	Produtos à base de queijo	2 000 mg/100 g			
	Gelados	130 mg/100 g			
	Bolos e produtos de pastelaria	1 000 mg/100 g			
	Rebuçados	750 mg/100 g			
	Gomas de mascar	3 000 mg/100 g			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado	Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
▼M34 Isolado de proteína básica de soro de leite de bovino	<p><i>Categoría especificada de alimentos</i></p> <p>Fórmulas para lactentes, tal como definidas no Regulamento (UE) n.º 609/2013</p> <p>Fórmulas de transição, tal como definidas no Regulamento (UE) n.º 609/2013</p> <p>Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013</p> <p>Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013</p> <p>Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE</p>	<p><i>Níveis máximos</i></p> <p>30 mg/100 g (em pó) 3,9 mg/100 ml (reconstituídas)</p> <p>30 mg/100 g (em pó) 4,2 mg/100 ml (reconstituídas)</p> <p>300 mg/dia</p> <p>30 mg/100 g (fórmula em pó para lactentes durante os primeiros meses de vida até à introdução de alimentação complementar adequada)</p> <p>3,9 mg/100 ml (fórmula reconstituída para lactentes durante os primeiros meses de vida até à introdução de alimentação complementar adequada)</p> <p>30 mg/100 g (fórmula em pó para lactentes quando é introduzida uma alimentação complementar adequada)</p> <p>4,2 mg/100 ml (fórmula reconstituída para lactentes quando é introduzida uma alimentação complementar adequada)</p> <p>58 mg/dia para crianças pequenas 380 mg/dia para crianças e adolescentes entre 3 e 18 anos de idade 610 mg/dia para adultos</p> <p>25 mg/dia para lactentes 58 mg/dia para crianças pequenas 250 mg/dia para crianças e adolescentes entre 3 e 18 anos de idade 610 mg/dia para adultos</p>	<p>A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «isolado de proteína de soro de leite».</p> <p>Os suplementos alimentares que contêm isolado de proteína básica de soro de leite de bovino devem ostentar a seguinte menção:</p> <p>«Este suplemento alimentar não pode ser consumido por lactentes/crianças/adolescentes com menos de 1/3/18 anos de idade (*)»</p> <p>(*) Dependendo do grupo etário a que se destina o suplemento alimentar.</p>	<p>Autorizada em 20 de novembro de 2018. Esta inserção baseia-se em provas científicas e dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283. Requerente: Armor Protéines S.A.S., 19 bis, rue de la Libération 35460 Saint-Brice-en-Coglès, França. Durante o período de proteção de dados, só a Armor Protéines S.A.S. está autorizada a colocar no mercado da União o novo alimento isolado de proteína básica de soro de leite de bovino, salvo se um requerente posterior obtiver autorização para o novo alimento sem fazer referência às provas científicas ou aos dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283, ou com o acordo da Armor Protéines S.A.S.. Termo do período de proteção de dados: 20 de novembro de 2023.</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Óleo das sementes de <i>Buglossoides arvensis</i>	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de ácido estearidônico (STA)</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «óleo refinado de <i>Buglossoides</i> »		
	Produtos lácteos e seus sucedâneos	250 mg/100 g 75 mg/100 g para bebidas			
	Queijo e produtos de queijo	750 mg/100 g			
	Manteiga e outras emulsões de gorduras e óleos, incluindo pastas para barrar (não para cozinhar ou fritar)	750 mg/100 g			
	Cereais para pequeno-almoço	625 mg/100 g			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE, exceto suplementos alimentares destinados a lactentes e crianças pequenas	500 mg/dia			
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013, exceto alimentos destinados a fins medicinais específicos para lactentes e crianças pequenas	Em conformidade com as necessidades nutricionais específicas das pessoas a que os produtos se destinam			
	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013 e substitutos de refeição para controlo do peso	250 mg/refeição			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	► M29 Proteção de dados ◀
Óleo de <i>Calanus finmarchicus</i>	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «óleo de <i>Calanus finmarchicus</i> (crustáceo)»		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	2,3 g/dia			
Base para goma de mascar (monometoxipolietilenoglicol)	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «goma base (incluindo 1,3-butadieno, 2-metil-homopolímero, maleico, ésteres com éter monometílico de polietilenoglicol)» ou «goma base (incluindo n.º CAS: 1246080-53-4)»		
	Gomas de mascar	8 %			
Base para goma de mascar (copolímero de éter metilvinílico-anidrido maleico)	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «goma base (incluindo copolímero de éter metilvinílico-anidrido maleico)» ou «goma base (incluindo n.º CAS: 9011-16-9)»		
	Gomas de mascar	2 %			
Óleo de chia de <i>Salvia hispanica</i>	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «óleo de chia (<i>Salvia hispanica</i>)»		
	Gorduras e óleos	10 %			
	Óleo de chia puro	2 g/dia			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	2 g/dia			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Sementes de chia (<i>Salvia hispanica</i>)	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	<p>1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «sementes de chia (<i>Salvia hispanica</i>)».</p> <p>2. As sementes de chia (<i>Salvia hispanica</i>) na forma pré-embalada devem conter rotulagem adicional que informe os consumidores de que a dose diária máxima é de 15 g.</p>		
	Produtos de panificação	5 % de sementes de chia inteiras ou moídas			
	Produtos cozidos	10 % de sementes de chia inteiras			
	Cereais para pequeno-almoço	10 % de sementes de chia inteiras			
	Misturas de frutos, nozes e sementes	10 % de sementes de chia inteiras			
	Sumos de frutas e bebidas à base de misturas de frutas e de produtos hortícolas	15 g/dia para a adição de sementes de chia inteiras, esmagadas ou moídas			
	Sementes de chia enquanto tais na forma pré-embalada	15 g/dia de sementes de chia inteiras			
	Produtos para barrar à base de fruta	1 % de sementes de chia inteiras			
	Iogurte	1,3 g de sementes de chia inteiras por 100 g de iogurte ou 4,3 g de sementes de chia inteiras por 330 g de iogurte (porção)			
	Pratos preparados esterilizados à base de grãos de cereais, pseudocereais e/ou leguminosas	5 % de sementes de chia inteiras			
Quitina-glucano de <i>Aspergillus niger</i>	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «quitina-glucano de <i>Aspergillus niger</i> »		
Complexo de quitina-glucano de <i>Fomes fomentarius</i>	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «quitina-glucano de <i>Fomes fomentarius</i> »		
Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	5 g/dia				
Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	5 g/dia				

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Extrato de quitosano de fungos (<i>Agaricus bisporus</i>; <i>Aspergillus niger</i>)	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «extrato de quitosano de <i>Agaricus bisporus</i> » ou «extrato de quitosano de <i>Aspergillus niger</i> »		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	De acordo com a utilização normal nos suplementos alimentares de quitosano de crustáceos			
Sulfato de condroitina	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «sulfato de condroitina derivado de fermentação microbiana e de sulfatação»		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE para a população adulta, exceto mulheres grávidas e lactantes	1 200 mg/dia			
Picolinato de crómio	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de crómio total</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «picolinato de crómio»		
	Alimentos abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 609/2013	250 µg/dia			
	Alimentos fortificados em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1925/2006 (4)				
Erva de <i>Cistus incanus</i> L. Pandalis	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «erva de <i>Cistus incanus</i> L. Pandalis»		
	Infusões de plantas	Dose diária prevista: 3 g de erva/dia (2 chávenas/dia)			
Citicolina	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «citicolina»		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	500 mg/dia	2. Na rotulagem dos alimentos que contenham citicolina deve figurar uma advertência de que o produto não se destina a ser consumido por crianças		
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	250 mg por porção e um nível máximo de consumo diário de 1 000 mg			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Clostridium butyricum	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser « <i>Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)</i> » ou « <i>Clostridium butyricum (CBM 588)</i> »		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	$1,35 \times 10^8$ UFC/dia			

▼M29

D-ribose	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	<p>A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «D-ribose».</p> <p>Na rotulagem dos alimentos que contêm D-ribose deve figurar uma advertência de que os alimentos não devem ser utilizados se forem consumidos no mesmo dia suplementos alimentares que contêm D-ribose.</p>		<p>Autorizado em 16 de abril de 2019. Esta inserção baseia-se em provas científicas e dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283.</p> <p>Requerente: Bioenergy Life Science, Inc., 13840 Johnson St. NE, Minneapolis, Minnesota, 55304, EUA. Durante o período de proteção de dados, só a Bioenergy Life Science, Inc. está autorizada a colocar no mercado da União o novo alimento D-ribose, salvo se um requerente posterior obter autorização para o novo alimento sem fazer referência às provas científicas ou aos dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283, ou com o acordo da Bioenergy Life Science, Inc.</p> <p>Termo do período de proteção de dados: 16 de abril de 2024.</p>
	Barras de cereais	0,20 g/100 g			
	Produtos de padaria e pastelaria fina	0,31 g/100 g			
	Produtos de confeitoraria à base de chocolate (exceto barras de chocolate)	0,17 g/100 g			
	Bebidas lácteas (exceto maltes e batidos)	0,08 g/100 g			
	Bebidas adaptadas a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas, bebidas isotónicas e bebidas energéticas	0,80 g/100 g			
	Barras adaptadas a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas	3,3 g/100 g			
	Substituto de refeição para controlo do peso (na forma de bebidas)	0,13 g/100 g			
	Substituto de refeição para controlo do peso (na forma de barras)	3,30 g/100 g			
	Produtos de confeitoraria	0,20 g/100 g			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀	
Extrato de cacau em pó desengordurado	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	Os consumidores devem receber instruções para não consumirem mais de 600 mg de polifenóis, o que corresponde a 1,1 g de extrato de cacau em pó desengordurado por dia			
	Barras nutritivas	1 g/dia e 300 mg de polifenóis, o que corresponde a 550 mg, no máximo, de extrato de cacau em pó desengordurado numa porção do alimento (ou suplemento alimentar)				
	Bebidas lácteas					
	Quaisquer outros alimentos (incluindo suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE) que se tornaram veículos comumente aceites para ingredientes funcionais e que são tipicamente consumidos por adultos sensibilizados para as questões de saúde					
Extrato de cacau com baixo teor de gordura	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	Os consumidores devem receber instruções para não consumirem mais de 600 mg de flavanóis de cacau por dia			
	Alimentos, incluindo os suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	730 mg por porção e cerca de 1,2 g/dia				
Óleo de semente de coentros de <i>Coriandrum sativum</i>	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «óleo de semente de coentros»			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	600 mg/dia				

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado	Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ▲
<p>▼M15</p> <p>Pó de extrato de airelas</p>	<p><i>Categoría especificada de alimentos</i></p> <p>Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE, para a população adulta</p>	<p><i>Níveis máximos</i></p> <p>350 mg/dia</p>	<p>A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «pó de extrato de airelas».</p>	<p>Autorizado em 20 de novembro de 2018. Esta inserção baseia-se em provas científicas e dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283.</p> <p>Requerente: Ocean Spray Cranberries Inc. One Ocean Spray Drive Lakeville-Middleboro, MA, 02349, EUA.</p> <p>Durante o período de proteção de dados, só a Ocean Spray Cranberries Inc. está autorizada a colocar no mercado da União o novo alimento pó de extrato de airelas, salvo se um requerente posterior obtiver autorização para o novo alimento sem fazer referência às provas científicas ou aos dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283, ou com o acordo da Ocean Spray Cranberries Inc.</p> <p>Termo do período de proteção de dados: 20 de novembro de 2023.</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Fruto seco de <i>Crataegus pinnatifida</i>	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «fruto seco de <i>Crataegus pinnatifida</i> »		
	Infusões de plantas	De acordo com as utilizações alimentares normais de <i>Crataegus laevigata</i>			
	Doces e geleias de acordo com a Diretiva 2001/113/CE ⁽⁵⁾				
	Compotas				
α-Ciclodextrina	Não especificado		A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser « α -ciclodextrina» ou « α -ciclodextrina»		
γ-Ciclodextrina	Não especificado		A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser « γ -ciclodextrina» ou « γ -ciclodextrina»		
▼M21 Grãos descascados de <i>Digitaria exilis</i> (Kippist) Stapf (alimento tradicional de um país terceiro)	Não especificado		A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «Grãos descascados de fônio (<i>Digitaria exilis</i>)»		
▼M9 Preparação de dextrano produzido por <i>Leuconostoc mesenteroides</i>	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «dextrano»		
	Produtos de panificação	5 %			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀			
Óleo de diacilglicerol de origem vegetal	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «óleo de diacilglicerol de origem vegetal (pelo menos 80 % de diacilgliceróis)»					
	Óleos alimentares							
	Gorduras para barrar							
	Guarnições para salada							
	Maionese							
	Substituto de refeição para controlo do peso (na forma de bebidas)							
	Produtos de panificação Produtos de tipo iogurte							
Di-hidrocapsiato (DHC)	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «di-hidrocapsiato» 2. Os suplementos alimentares que contêm di-hidrocapsiato sintético serão rotulados com a menção «não se destinam a crianças até aos 4,5 anos»					
	Barras de cereais	9 mg/100 g						
	Bolachas, biscoitos e bolachas de água-e-sal	9 mg/100 g						
	Snacks à base de arroz	12 mg/100 g						
	Bebidas gaseificadas, bebidas para diluir, bebidas à base de sumos de frutas	1,5 mg/100 ml						
	Bebidas de vegetais	2 mg/100 ml						
	Bebidas à base de café, bebidas à base de chá	1,5 mg/100 ml						
	Água aromatizada – sem gás	1 mg/100 ml						
	Farinha de aveia pré-cozinhada	2,5 mg/100 g						
	Outros cereais	4,5 mg/100 g						
	Gelados, sobremesas lácteas	4 mg/100 g						
	Misturas para pudins (pronto a comer)	2 mg/100 g						

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Produtos à base de iogurte Produtos de confeitoraria à base de chocolate Rebuçados Gomas de mascar sem açúcar Branqueadores para bebidas/substitutos de natas Edulcorantes Sopas (prontas a comer) Guarnições para salada Proteínas vegetais Refeições prontas a comer Substituto de refeição para controlo do peso Substituto de refeição para controlo do peso (na forma de bebidas) Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE Misturas em pó para bebidas não alcoólicas	2 mg/100 g				
	7,5 mg/100 g				
	27 mg/100 g				
	115 mg/100 g				
	40 mg/100 g				
	200 mg/100 g				
	1,1 mg/100 g				
	16 mg/100 g				
	5 mg/100 g				
	3 mg/refeição				
	3 mg/refeição				
	1 mg/100 ml				
	3 mg/dose única 9 mg/dia				
	14,5 mg/kg, equivalente a 1,5 mg/ /100 ml				
▼M13 Partes aéreas secas de <i>Hoodia parviflora</i>	Categoria especificada de alimentos	Níveis máximos	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «partes aéreas secas de <i>Hoodia parviflora</i> »		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE, para a população adulta	9,4 mg/dia			Autorizado em 3 de setembro de 2018. Esta inserção baseia-se em provas científicas e dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283.

▼M13

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado	Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
				<p>Requerente: Desert Labs, Ltd., Kibbutz Yotvata, 88820 Israel.</p> <p>Durante o período de proteção de dados, só a Desert Labs, Ltd. está autorizada a colocar no mercado da União o novo alimento «partes aéreas secas de <i>Hoodia parviflora</i>», salvo se um requerente posterior obtiver autorização para o novo alimento sem fazer referência às provas científicas ou aos dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283, ou com o acordo da Desert Labs, Ltd.</p> <p>Termo do período de proteção de dados: 3 de setembro de 2023.</p>

▼M9

Extrato seco de <i>Lippia citriodora</i> de culturas de células	Categoria especificada de alimentos	Níveis máximos	
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	De acordo com a utilização normal nos suplementos alimentares de um extrato semelhante de folhas de <i>Lippia citriodora</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «extrato seco de <i>Lippia citriodora</i> de culturas de células HTN®Vb»

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Extrato de <i>Echinacea angustifolia</i> de culturas de células	<i>Categoria especificada de alimentos</i>		<i>Níveis máximos</i>		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE		De acordo com a utilização normal nos suplementos alimentares de um extrato semelhante da raiz de <i>Echinacea angustifolia</i>		
▼M31	<i>Categoria especificada de alimentos</i>		<i>Níveis máximos</i>		
Extrato de <i>Echinacea purpurea</i> de culturas de células	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE		De acordo com a utilização normal nos suplementos alimentares de um extrato semelhante de flósculos da inflorescência de <i>Echinacea purpurea</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «extrato seco de <i>Echinacea purpurea</i> de culturas de células EchiPure-PCTM»	
▼M9	<i>Categoria especificada de alimentos</i>		<i>Níveis máximos de ácido estearidônico (STA)</i>		
Óleo de <i>Echium plantagineum</i>	Produtos à base de leite e produtos do tipo iogurte líquido distribuídos em doses individuais		250 mg/100 g; 75 mg/100 g para bebidas	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «óleo de <i>Echium</i> (soagem) refinado»	
	Preparações à base de queijo		750 mg/100 g		
	Gorduras para barrar e guarnições		750 mg/100 g		
	Cereais para pequeno-almoço		625 mg/100 g		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE		500 mg/dia		
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013		Em conformidade com as necessidades nutricionais específicas das pessoas a que os produtos se destinam		
	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013 e substitutos de refeição para controlo do peso		250 mg/refeição		

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
<p>▼M18</p> <p>Hidrolisado de membrana de ovo</p>	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «hidrolisado de membrana de ovo».		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE, destinados à população adulta em geral	450 mg/dia			<p>Autorizado em 25 de novembro de 2018. Esta inserção baseia-se em provas científicas e dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283.</p> <p>Requerente: Biova, LLC., 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa, EUA. Durante o período de proteção de dados, só a Biova, LLC. está autorizada a colocar no mercado da União o novo alimento hidrolisado de membrana de ovo, salvo se um requerente posterior obtiver autorização para o novo alimento sem fazer referência às provas científicas ou aos dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283, ou com o acordo da Biova, LLC.</p> <p>Termo do período de proteção de dados: 25 de novembro de 2023.</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Galato de epigalocatequina como um extrato purificado de folhas de chá verde (<i>Camellia sinensis</i>)	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A rotulagem deve ostentar uma menção indicando que os consumidores não devem consumir mais de 300 mg de extrato por dia		
	Alimentos, incluindo os suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	150 mg de extrato numa porção do alimento ou do suplemento alimentar			
L-Ergotioneína	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «L-ergotioneína»		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	30 mg/dia para a população em geral (exceto mulheres grávidas e lactantes) 20 mg/dia para crianças com mais de 3 anos			
EDTA de sódio férrio	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos (expressos em EDTA anidro)</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «EDTA de sódio férrio»		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	18 mg/dia para crianças 75 mg/dia para adultos			
	Alimentos abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 609/2013	12 mg/100 g			
	Alimentos fortificados em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1925/2006				
Fosfato de amónio ferroso	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «fosfato de amónio ferroso»		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	Utilizar em conformidade com a Diretiva 2002/46/CE, o Regulamento (UE) n.º 609/2013 e/ou o Regulamento (CE) n.º 1925/2006			
	Alimentos abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 609/2013				
	Alimentos fortificados em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1925/2006				

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀			
Péptidos de peixe de <i>Sardinops sagax</i>	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Nível máximo de produto à base de péptidos de peixe</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «péptidos de peixe (<i>Sardinops sagax</i>)»					
	Alimentos à base de iogurte, iogurtes (de beber), produtos lácteos fermentados e leite em pó	0,48 g/100 g (pronto a comer/beber)						
	Água aromatizada e bebidas à base de produtos hortícolas	0,3 g/100 g (pronto a beber)						
	Cereais para pequeno-almoço	2 g/100 g						
	Sopas, guisados e sopas em pó	0,3 g/100 g (pronto a comer)						
Flavonoides de <i>Glycyrrhiza glabra</i>	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	Níveis máximos de flavonoides de <i>Glycyrrhiza glabra</i>	<p>1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «flavonoides de <i>Glycyrrhiza glabra L.</i>»</p> <p>2. A rotulagem dos alimentos aos quais o produto tenha sido adicionado enquanto novo ingrediente alimentar deve ostentar uma menção indicando que:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) O produto não deve ser consumido por mulheres grávidas ou lactantes, crianças e jovens adolescentes; e b) As pessoas que tomam medicamentos sujeitos a receita médica apenas devem consumir o produto sob vigilância médica; c) Devem ser consumidos, no máximo, 120 mg de flavonoides por dia. 	As bebidas que contenham flavonoides devem ser apresentadas ao consumidor final em doses individuais.				
	Bebidas lácteas	120 mg/dia						
	Bebidas à base de iogurte							
	Bebidas à base de frutos ou de produtos hortícolas	120 mg/dia						
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE							
	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	120 mg/dia						
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	120 mg/dia						

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
			3. Deve indicar-se na rotulagem dos géneros alimentícios a quantidade de flavonoides contida no alimento final.		
Extrato de fucoidano da alga <i>Fucus vesiculosus</i>	<i>Categoria especificada de alimentos</i> Alimentos, incluindo os suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE para a população em geral	<i>Níveis máximos</i> 250 mg/dia	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «extrato de fucoidano da alga <i>Fucus vesiculosus</i> »		
Extrato de fucoidano da alga <i>Undaria pinnatifida</i>	<i>Categoria especificada de alimentos</i> Alimentos, incluindo os suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE para a população em geral	<i>Níveis máximos</i> 250 mg/dia	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «extrato de fucoidano da alga <i>Undaria pinnatifida</i> »		
2'-Fucosil-lactose	<i>Categoria especificada de alimentos</i> Produtos à base de leite pasteurizados e esterilizados (incluindo ultrapasteurizados — UHT) não aromatizados Produtos à base de leite fermentados não aromatizados Produtos à base de leite fermentados aromatizados, incluindo os produtos tratados termicamente Sucedâneos de produtos lácteos, incluindo branqueadores para bebidas	<i>Níveis máximos</i> 1,2 g/l 1,2 g/l para bebidas 19,2 g/kg para produtos que não sejam bebidas 1,2 g/l para bebidas 19,2 g/kg para produtos que não sejam bebidas 1,2 g/l para bebidas 12 g/kg para produtos que não sejam bebidas 400 g/kg para os branqueadores	1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «2'-fucosil-lactose». 2. A rotulagem dos suplementos alimentares que contenham 2'-fucosil-lactose deve ostentar uma menção indicando que os suplementos não devem ser utilizados se forem consumidos no mesmo dia outros alimentos com adição de 2'-fucosil-lactose. 3. A rotulagem dos suplementos alimentares que contenham 2'-fucosil-lactose destinados a crianças pequenas deve ostentar uma menção indicando que os suplementos não devem ser utilizados se forem consumidos no mesmo dia leite materno ou outros alimentos com adição de 2'-fucosil-lactose.		

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
	Barras de cereais	12 g/kg			
	Edulcorantes de mesa	200 g/kg			
	Fórmulas para lactentes, tal como definidas no Regulamento (UE) n.º 609/2013	1,2 g/l, estreme ou em combinação com até 0,6 g/l de lacto- <i>N</i> -neotetraose, na proporção de 2:1, no produto final pronto a ser utilizado, comercializado como tal ou reconstituído de acordo com as instruções do fabricante			
	Fórmulas de transição, tal como definidas no Regulamento (UE) n.º 609/2013	1,2 g/l, estreme ou em combinação com até 0,6 g/l de lacto- <i>N</i> -neotetraose, na proporção de 2:1, no produto final pronto a ser utilizado, comercializado como tal ou reconstituído de acordo com as instruções do fabricante			
	Alimentos transformados à base de cereais e alimentos para bebés destinados a lactentes e crianças pequenas, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	12 g/kg para produtos que não sejam bebidas			
		1,2 g/l para alimentos líquidos prontos a serem utilizados, comercializados como tal ou reconstituídos de acordo com as instruções do fabricante			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado	Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀	
	Bebidas lácteas e produtos semelhantes destinados a crianças pequenas	1,2 g/l para bebidas lácteas e produtos semelhantes, quando adicionada estreite ou em combinação com até 0,6 g/l de lacto-N-neotetraose, na proporção de 2:1, no produto final pronto a ser utilizado, comercializado como tal ou reconstituído de acordo com as instruções do fabricante			
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com as necessidades nutricionais específicas das pessoas a que os produtos se destinam			
	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	4,8 g/l para bebidas 40 g/kg para barras			
	Produtos de panificação e massas alimentícias que ostentam menções sobre a ausência ou a presença reduzida de glúten em conformidade com os requisitos do Regulamento de Execução (UE) n.º 828/2014 da Comissão	60 g/kg			
	Bebidas aromatizadas	1,2 g/l			
	Café, chá (excluindo chá preto), infusões de plantas e de frutos, chicória; extratos de chá, de infusões de plantas e de frutos e de chicória; preparações à base de chá, plantas, frutos e cereais para infusões, bem como misturas e misturas instantâneas destes produtos	9,6 g/l - o nível máximo refere-se aos produtos prontos a utilizar			
	Suplementos alimentares tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE, excluindo suplementos alimentares destinados a lactentes	3,0 g/dia para a população em geral 1,2 g/dia para crianças pequenas			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
▼M36 Mistura de 2'-fucosil-lactose/difucosil-lactose («2'-FL/DFL») (fonte microbiana)	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>			
	Produtos à base de leite pasteurizados não aromatizados e esterilizados não aromatizados (incluindo ultrapasteurizados - UHT)	2,0 g/l	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «mistura de 2'-fucosil-lactose/difucosil-lactose».		Autorizado em 19.12.2019. Esta inserção baseia-se em provas científicas e dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283.
	Produtos à base de leite fermentados não aromatizados	2,0 g/l (bebidas) 20 g/kg (produtos que não sejam bebidas)	Na rotulagem dos suplementos alimentares que contêm a mistura de 2'-fucosil-lactose/difucosil-lactose deve figurar a adverténcia de que não devem ser utilizados se forem consumidos no mesmo dia leite materno ou outros alimentos que contenham 2'-fucosil-lactose e/ou difucosil-lactose adicionadas.		Requerente: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Dinamarca. Durante o período de proteção de dados, só a Glycom A/S está autorizada a colocar no mercado da União o novo alimento mistura de 2'-fucosil-lactose/difucosil-lactose, salvo se um requerente posterior obtiver autorização para o novo alimento sem fazer referência às provas científicas ou aos dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283, ou com o acordo da Glycom A/S.
	Produtos à base de leite fermentados aromatizados, incluindo os produtos tratados termicamente	2,0 g/l (bebidas) 20 g/kg (produtos que não sejam bebidas)			
	Bebidas (aromatizadas)	2,0 g/l			
	Barras de cereais	20 g/kg			
	Fórmulas para lactentes, tal como definidas no Regulamento (UE) n.º 609/2013	1,6 g/l no produto final pronto a utilizar, comercializado como tal ou reconstituído de acordo com as instruções do fabricante			
	Fórmulas de transição, tal como definidas no Regulamento (UE) n.º 609/2013	1,2 g/l no produto final pronto a utilizar, comercializado como tal ou reconstituído de acordo com as instruções do fabricante			
	Alimentos transformados à base de cereais e alimentos para bebés destinados a lactentes e crianças pequenas, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	1,2 g/l (bebidas) no produto final pronto a utilizar, comercializado como tal ou reconstituído de acordo com as instruções do fabricante 10 g/kg para produtos que não sejam bebidas			Termo do período de proteção de dados: 19.12.2024.

▼M36

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado	Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	4,0 g/l (bebidas) 40 g/kg (produtos que não sejam bebidas)		
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com as necessidades nutricionais específicas das pessoas a que os produtos se destinam		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE, destinados à população em geral excluindo lactentes	4,0 g/dia		

▼M9

Galacto-oligossacárido	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos (expressos como proporção de kg de galacto-oligossacárido/kg de alimento final)</i>		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	0,333		
	Leite	0,020		
	Bebidas lácteas	0,030		
	Substituto de refeição para controlo do peso (na forma de bebidas)	0,020		
	Bebidas de sucedâneos de produtos lácteos	0,020		
	Iogurte	0,033		
	Sobremesas à base de produtos lácteos	0,043		
	Sobremesas lácteas congeladas	0,043		

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Bebidas de frutas e bebidas energéticas Bebidas substitutas de refeição para lactentes Sumo para bebés Bebidas de iogurte para bebés Sobremesas para bebés <i>Snacks</i> para bebés Cereais para bebés Bebidas adaptadas a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas Sumo Recheios de tarte de frutos Preparações de frutos Barras Cereais Fórmulas para lactentes e fórmulas de transição, tal como definidas no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Bebidas de frutas e bebidas energéticas	0,021			
	Bebidas substitutas de refeição para lactentes	0,012			
	Sumo para bebés	0,025			
	Bebidas de iogurte para bebés	0,024			
	Sobremesas para bebés	0,027			
	<i>Snacks</i> para bebés	0,143			
	Cereais para bebés	0,027			
	Bebidas adaptadas a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas	0,013			
	Sumo	0,021			
	Recheios de tarte de frutos	0,059			
	Preparações de frutos	0,125			
	Barras	0,125			
	Cereais	0,125			
	Fórmulas para lactentes e fórmulas de transição, tal como definidas no Regulamento (UE) n.º 609/2013	0,008			
Glucosamina HCl	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	De acordo com as utilizações alimentares normais da glucosamina de crustáceos		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE				
	Alimentos abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 609/2013				
	Substituto de refeição para controlo do peso				

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
	Alimentos adaptados a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas				
	Alimentos que ostentam menções sobre a ausência ou a presença reduzida de glúten em conformidade com os requisitos do Regulamento de Execução (UE) n.º 828/2014 da Comissão				
Sulfato de glucosamina KCl	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	De acordo com as utilizações alimentares normais da glucosamina de crustáceos			
Sulfato de glucosamina NaCl	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	De acordo com as utilizações alimentares normais da glucosamina de crustáceos			
Goma de guar	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>			
	Produtos lácteos frescos, tais como iogurtes, leites fermentados, queijos frescos e outras sobremesas lácteas	1,5 g/100 g	1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «goma de guar».		
	Géneros alimentícios líquidos à base de fruta ou produtos hortícolas (do tipo «smoothie»)	1,8 g/100 g	2. Uma menção específica dos eventuais riscos de desconforto digestivo associados à exposição de crianças de idade inferior a oito anos à goma de guar deverá figurar de maneira visível no rótulo dos géneros alimentícios que a contenham.		
	Compotas à base de fruta ou produtos hortícolas	3,25 g/100 g	Por exemplo: «O consumo excessivo destes produtos pode originar desconforto digestivo, especialmente em crianças de idade inferior a oito anos».		
	Cereais associados a um produto lácteo numa embalagem com dois compartimentos	10 g/100 g nos flocos de cereais Ausência no produto lácteo associado 1 g/100 g no produto pronto a consumir	3. No caso dos produtos divididos em dois compartimentos (produto lácteo/cereais), as instruções de utilização deverão precisar de maneira visível a necessidade de misturar os flocos de cereais ao		

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado	Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
		produto lácteo antes de os consumir, a fim de ter em conta o eventual risco de obstrução gastrointestinal.		
Produtos lácteos tratados termicamente e fermentados com <i>Bacteroides xylanisolvens</i>	<i>Categoría especificada de alimentos</i> Produtos lácteos fermentados (no estado líquido, semilíquido e em forma de pó seco obtido por atomização)	<i>Níveis máximos</i>		
Hidroxitirosol	<i>Categoría especificada de alimentos</i> Óleos de peixe e óleos vegetais [com exceção de azeite e óleo de bagaço de azeitona, tal como definidos no anexo VII, parte VIII, do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 (º)], colocados no mercado enquanto tais	<i>Níveis máximos</i> 0,215 g/kg	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos produtos alimentares que o contenham deve ser «hidroxitirosol». A rotulagem dos produtos alimentares que contenham hidroxitirosol deve ostentar as seguintes menções: a) «Este produto alimentar não deve ser consumido por crianças com idade inferior a três anos nem por mulheres grávidas ou lactantes;» b) «Este produto alimentar não deve ser utilizado para cozinhar, assar ou fritar.»	
Proteína estruturante de gelo de tipo III HPLC 12	<i>Categoría especificada de alimentos</i> Gelados	<i>Níveis máximos</i> 0,01 %	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «proteína estruturante de gelo»	
Extratos aquosos de folhas secas de <i>Ilex guayusa</i>	<i>Categoría especificada de alimentos</i> Infusões de plantas Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	<i>Níveis máximos</i> De acordo com a utilização normal em infusões de plantas e em suplementos alimentares de um extrato aquoso semelhante de folhas secas de <i>Ilex paraguariensis</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «extratos de folhas secas de <i>Ilex guayusa</i> »	

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Isomalto-oligossacárido	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «isomalto-oligossacárido». 2. Os alimentos que contenham o novo ingrediente devem ser rotulados como «fonte de glucose».		
	Refrigerantes de baixo valor energético	6,5 %			
	Bebidas energéticas	5,0 %			
	Alimentos adaptados a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas (incluindo bebidas isotónicas)	6,5 %			
	Sumos de fruta	5 %			
	Produtos hortícolas transformados e sumos de produtos hortícolas	5 %			
	Outros refrigerantes	5 %			
	Barras de cereais	10 %			
	Bolachas e biscoitos	20 %			
	Barras de cereais para pequeno-almoço	25 %			
	Rebuçados	97 %			
Isomaltulose	Drageias moles/barras de chocolate	25 %	1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «isomaltulose». 2. A designação do novo alimento na rotulagem deve ser acompanhada da indicação «A isomaltulose é uma fonte de glucose e frutose».		
	Substituto de refeição para controlo do peso (na forma de barras ou de base láctea)	20 %			
Lactitol	Não especificado		1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «lactitol».		
▼M14	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos suplementos alimentares que o contenham deve ser «lactitol»		
		Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE (cápsulas, comprimidos ou pó) destinados à população adulta			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Lacto-N-neotetraose	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	<p>1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «lacto-N-neotetraose».</p> <p>2. A rotulagem dos suplementos alimentares que contêm lacto-N-neotetraose deve ostentar uma menção indicando que os suplementos não devem ser utilizados se forem consumidos no mesmo dia outros alimentos com adição de lacto-N-neotetraose.</p> <p>3. A rotulagem dos suplementos alimentares que contêm lacto-N-neotetraose destinados a crianças pequenas deve ostentar uma menção indicando que os suplementos não devem ser utilizados se forem consumidos no mesmo dia leite materno ou outros alimentos com adição de lacto-N-neotetraose.</p>		
	Produtos à base de leite pasteurizados e esterilizados (incluindo ultrapasteurizados — UHT) não aromatizados	0,6 g/l			
	Produtos à base de leite fermentados não aromatizados	0,6 g/l para bebidas 9,6 g/kg para produtos que não sejam bebidas			
	Produtos à base de leite fermentados aromatizados, incluindo os produtos tratados termicamente	0,6 g/l para bebidas 9,6 g/kg para produtos que não sejam bebidas			
	Sucedâneos de produtos lácteos, incluindo branqueadores para bebidas	0,6 g/l para bebidas 6 g/kg para produtos que não sejam bebidas 200 g/kg para os branqueadores			
	Barras de cereais	6 g/kg			
	Edulcorantes de mesa	100 g/kg			
	Fórmulas para lactentes, tal como definidas no Regulamento (UE) n.º 609/2013	0,6 g/l, em combinação com até 1,2 g/l de 2'-fucosil-lactose, na proporção de 1:2, no produto final pronto a ser utilizado, comercializado como tal ou reconstituído de acordo com as instruções do fabricante			
	Fórmulas de transição, tal como definidas no Regulamento (UE) n.º 609/2013	0,6 g/l, em combinação com até 1,2 g/l de 2'-fucosil-lactose, na proporção de 1:2, no produto final pronto a ser utilizado, comercializado como tal ou reconstituído de acordo com as instruções do fabricante			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado	Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
	Alimentos transformados à base de cereais e alimentos para bebés destinados a lactentes e crianças pequenas, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	6 g/kg para produtos que não sejam bebidas 0,6 g/l para alimentos líquidos prontos a serem utilizados, comercializados como tal ou reconstituídos de acordo com as instruções do fabricante		
	Bebidas lácteas e produtos semelhantes destinados a crianças pequenas	0,6 g/l para bebidas lácteas e produtos semelhantes, quando adicionada estreite ou em combinação com 2'-fucosil-lactose, na proporção de 1:2 no produto final pronto a ser utilizado, comercializado como tal ou reconstituído de acordo com as instruções do fabricante		
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com as necessidades nutricionais específicas das pessoas a que os produtos se destinam		
	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	2,4 g/l para bebidas 20 g/kg para barras		
	Produtos de panificação e massas alimentícias que ostentam menções sobre a ausência ou a presença reduzida de glúten em conformidade com os requisitos do Regulamento de Execução (UE) n.º 828/2014 da Comissão	30 g/kg		
	Bebidas aromatizadas	0,6 g/l		

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
	Café, chá (excluindo chá preto), infusões de plantas e de frutos, chicória; extractos de chá, de infusões de plantas e de frutos e de chicória; preparações à base de chá, plantas, frutos e cereais para infusões, bem como misturas e misturas instantâneas destes produtos	4,8 g/l - o nível máximo refere-se aos produtos prontos a utilizar			
	Suplementos alimentares tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE, excluindo suplementos alimentares destinados a lactentes	1,5 g/dia para a população em geral 0,6 g/dia para crianças pequenas			
▼M20 Bagas de <i>Lonicera caerulea</i> L. (haskap) (alimento tradicional de um país terceiro)	Não especificado		A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «bagas de haskap (<i>Lonicera caerulea</i>)».		
▼M9 Extrato de folha de luzerna de <i>Medicago sativa</i>	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «proteínas de luzerna (<i>Medicago sativa</i>)» ou «proteínas de alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)».		
Licopeno	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «licopeno»		
	Bebidas à base de sumos de frutas/produtos hortícolas (incluindo concentrados)	2,5 mg/100 g			
	Bebidas adaptadas a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas	2,5 mg/100 g			
	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013 e substitutos de refeição para controlo do peso	8 mg/refeição			
	Cereais para pequeno-almoço	5 mg/100 g			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
	Gorduras e guarnições	10 mg/100 g			
	Sopas, exceto sopa de tomate	1 mg/100 g			
	Pão (incluindo tostas)	3 mg/100 g			
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com as necessidades nutricionais específicas das pessoas a que os produtos se destinam			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	15 mg/dia			
Licopeno de <i>Bla-</i> <i>keslea trispora</i>	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «licopeno»		
	Bebidas à base de sumos de frutas/produtos hortícolas (incluindo concentrados)	2,5 mg/100 g			
	Bebidas adaptadas a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas	2,5 mg/100 g			
	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013 e substitutos de refeição para controlo do peso	8 mg/refeição			
	Cereais para pequeno-almoço	5 mg/100 g			
	Gorduras e guarnições	10 mg/100 g			
	Sopas, exceto sopa de tomate	1 mg/100 g			
	Pão (incluindo tostas)	3 mg/100 g			
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com as necessidades nutricionais específicas das pessoas a que os produtos se destinam			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	15 mg/dia			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀			
Licopeno de tomate	<i>Categoria especificada de alimentos</i>		A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «licopeno»					
	Bebidas à base de sumos de frutas/produtos hortícolas (incluindo concentrados)							
	Bebidas adaptadas a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas							
	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013 e substitutos de refeição para controlo do peso							
	Cereais para pequeno-almoço							
	Gorduras e guarnições							
	Sopas, exceto sopa de tomate							
	Pão (incluindo tostas)							
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013							
Oleoresina de licopeno de tomate		<i>Categoria especificada de alimentos</i>		<i>Níveis máximos de licopeno</i>				
		Bebidas à base de sumos de frutas/produtos hortícolas (incluindo concentrados)		2,5 mg/100 g				
		Bebidas adaptadas a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas		2,5 mg/100 g				

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Substitutos integrais da dieta para controlo do peso abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 609/2013 e substitutos de refeição para controlo do peso	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 609/2013 e substitutos de refeição para controlo do peso	8 mg/refeição			
	Cereais para pequeno-almoço	5 mg/100 g			
	Gorduras e guarnições	10 mg/100 g			
	Sopas, exceto sopa de tomate	1 mg/100 g			
	Pão (incluindo tostas)	3 mg/100 g			
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com as necessidades nutricionais específicas das pessoas a que os produtos se destinam			
Citrato malato de magnésio	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «citrato malato de magnésio»		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE				
Extrato de casca de magnólia	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «extrato de casca de magnólia»		
	Rebuçados de mentol Gomas de mascar	0,2 % em produtos destinados a refrescar o hálito. Com base num nível máximo de incorporação de 0,2 % e para um peso máximo de 1,5 g de cada goma de mascar/rebuçado, cada porção destes produtos não pode conter mais de 3 mg de extrato de casca de magnólia.			
Óleo de gérmen de milho de elevado teor em matérias não saponificáveis	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «extrato de óleo de gérmen de milho»		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE Gomas de mascar	2 g/dia 2 %			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	► M29 Proteção de dados ◀			
Metilcelulose	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «metilcelulose»	A metilcelulose não deve ser utilizada em alimentos especialmente preparados para crianças pequenas				
	Gelados	2 %						
	Bebidas aromatizadas							
	Produtos lácteos fermentados aromatizados ou não aromatizados							
	Sobremesas frias (à base de produtos lácteos, gordura, frutas, cereais ou ovos)							
	Preparados à base de fruta (polpas, purés e compotas)							
	Sopas e caldos							
Cloreto de 1-metil-nicotinamida	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «cloreto de 1-metilnicotinamida». Os suplementos alimentares que contêm cloreto de 1-metilnicotinamida devem ostentar a seguinte menção: Este suplemento alimentar deve ser consumido apenas por adultos, exceto mulheres grávidas e lactantes	Autorizado em 2 de setembro de 2018. Esta inserção baseia-se em provas científicas e dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283.	Requerente: Pharmena S.A., Wolczanska 178, 90 530 Lodz, Polónia. Durante o período de proteção de dados,			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE, destinados à população adulta, exceto mulheres grávidas e lactantes	58 mg/dia						

▼M11

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado	Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
				só a Pharmena S.A. está autorizada a colocar no mercado da União o novo alimento «cloreto de 1-metilnicotinamida», salvo se um requerente posterior obtiver autorização para o novo alimento sem fazer referência às provas científicas ou aos dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283, ou com o acordo da Pharmena S.A. Termo do período de proteção de dados: 2 de setembro de 2023.
▼M9	Ácido (6S)-5-metiltreta-hidrofólico, sal de glucosamina	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «ácido (6S)-5-metiltreta-hidrofólico, sal de glucosamina» ou «5MTHF-glucosamina»
		Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE como fonte de folato		
Monometilsilanol-triol (silício orgânico)	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de silício</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos suplementos alimentares que o contenham deve ser «silício orgânico (monometilsilanoltriol)»	
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE para a população adulta (sob a forma líquida)	10,40 mg/dia		

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀			
Extrato micelial de cogumelos Shiitake (<i>Lentinula edodes</i>)	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «extrato de cogumelos <i>Lentinula edodes</i> » ou «extrato de cogumelos Shiitake»					
	Produtos de panificação							
	Refrigerantes							
	Refeições preparadas							
	Alimentos à base de iogurte							
Sumo de noni (<i>Morinda citrifolia</i>)	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «sumo de noni» ou «sumo de <i>Morinda citrifolia</i> »					
	Bebidas pasteurizadas à base de fruta e de néctares de fruta							
Pó de sumo de noni (<i>Morinda citrifolia</i>)	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE		A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «pó de sumo de noni» ou «pó de sumo de <i>Morinda citrifolia</i> »					
Puré e concentrado de frutos de noni (<i>Morinda citrifolia</i>)	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser: Para puré de frutos: «puré de frutos de <i>Morinda citrifolia</i> » ou «puré de frutos de noni» Para concentrado de frutos: «concentrado de frutos de <i>Morinda citrifolia</i> » ou «concentrado de frutos de noni»					
	Puré de frutos							
	Produtos de confeitoraria							
	Barras de cereais							
	Misturas em pó para bebidas nutritivas (peso seco)							
	Bebidas gaseificadas							
	Gelados e sorvetes							
	Iogurte							
	Bolachas e biscoitos							

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
	Pãezinhos doces, bolos e outros produtos de pastelaria	53 g/100 g			
	Cereais para pequeno-almoço (integrais)	88 g/100 g			
	Doces e geleias de acordo com a Diretiva 2001/113/CE	133 g/100 g Com base na quantidade prévia ao processamento necessária para produzir 100 g do produto final			
	Pastas doces para barrar, recheios e glacês	31 g/100 g			
	Molhos aromáticos, <i>pickles</i> , molhos de carne e condimentos	88 g/100 g			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	26 g/dia			
		Concentrado de frutos			
	Produtos de confeitoraria	10 g/100 g			
	Barras de cereais	12 g/100 g			
	Misturas em pó para bebidas nutritivas (peso seco)	12 g/100 g			
	Bebidas gaseificadas	3 g/100 g			
	Gelados e sorvetes	7 g/100 g			
	Iogurte	3 g/100 g			
	Bolachas e biscoitos	12 g/100 g			
	Pãezinhos doces, bolos e outros produtos de pastelaria	12 g/100 g			
	Cereais para pequeno-almoço (integrais)	20 g/100 g			
	Doces e geleias de acordo com a Diretiva 2001/113/CE	30 g/100 g			
	Pastas doces para barrar, recheios e glacês	7 g/100 g			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
	Molhos aromáticos, <i>pickles</i> , molhos de carne e condimentos	20 g/100 g			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	6 g/dia			
Folhas de noni (<i>Morinda citrifolia</i>)	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «folhas de noni» ou «folhas de <i>Morinda citrifolia</i> ». 2. Devem ser dadas instruções ao consumidor indicando que uma chávena de infusão não deve ser preparada com mais de 1 g de folhas secas e torradas de <i>Morinda citrifolia</i> .		
Pó de frutos de noni (<i>Morinda citrifolia</i>)	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «pó de frutos de <i>Morinda citrifolia</i> » ou «pó de frutos de noni»		
Microalga <i>Odontella aurita</i>	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «microalga <i>Odontella aurita</i> »		
	Massas alimentícias aromatizadas	1,5 %			
	Sopas de peixe	1 %			
	Terrinas de alimentos marinhos	0,5 %			
	Preparações de caldo	1 %			
	Bolachas de água-e-sal	1,5 %			
	Peixe panado congelado	1,5 %			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado	Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Óleo enriquecido com fitoesteróis/fitoestanóis	<p><i>Categoria especificada de alimentos</i></p> <p><i>Níveis máximos de fitoesteróis/fitoestanóis</i></p>		De acordo com o anexo III, ponto 5, do Regulamento (UE) n.º 1169/2011	
	<p>Matérias gordas para barrar, tal como definidas no anexo VII, parte VII, e no apêndice II, pontos B e C, do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, à exceção de matérias gordas para cozinhar, fritar e barrar à base de manteiga ou de outra gordura animal</p>	<p>1. Os produtos que contenham o novo ingrediente alimentar devem ser apresentados de forma a permitir uma divisão fácil em porções que contenham quer um máximo de 3 g (no caso de uma dose diária) quer um máximo de 1 g (no caso de três doses diárias) de fitoesteróis/fitoestanóis adicionados.</p> <p>2. A quantidade de fitoesteróis/fitoestanóis adicionados a um recipiente de bebidas não deve ultrapassar 3 g.</p> <p>3. As guarnições para salada, a maionese e os molhos à base de especiarias devem ser embalados em doses individuais.</p>		
	<p>Os produtos à base de leite, tais como produtos com base em produtos à base de leite meio-gordos e magros, possivelmente com a adição de frutos e/ou cereais, produtos à base de leite fermentado, tais como o iogurte e produtos à base de queijo (teor de gordura ≤ 12 g por 100 g), nos quais, possivelmente, a gordura láctea tenha sido reduzida, e a gordura ou a proteína tenham sido parcial ou totalmente substituídas por gordura ou proteína vegetal</p>			
	<p>Bebidas à base de soja</p>			
	<p>Guarnições para salada, maionese e molhos à base de especiarias</p>			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Óleo extraído de lulas	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de DHA e EPA combinados</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «óleo de lulas»		
	Produtos lácteos, exceto bebidas lácteas	200 mg/100 g ou, para produtos de queijo, 600 mg/100 g			
	Sucedâneos de produtos lácteos, exceto bebidas	200 mg/100 g ou, para sucedâneos de produtos de queijo, 600 mg/100 g			
	Gorduras para barrar e guarnições	600 mg/100 g			
	Cereais para pequeno-almoço	500 mg/100 g			
	Produtos de panificação (pães e pãezinhos)	200 mg/100 g			
	Barras de cereais	500 mg/100 g			
	Bebidas não alcoólicas (incluindo bebidas lácteas)	60 mg/100 ml			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	3 000 mg/dia para a população em geral 450 mg/dia para mulheres grávidas e lactantes			
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com as necessidades nutricionais específicas das pessoas a que os produtos se destinam			
Preparações à base de frutos produzidas por tratamento de alta pressão	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A expressão «pasteurizadas por tratamento de alta pressão» deve ser mencionada na proximidade imediata do nome das preparações de frutos como tal, bem como em qualquer produto em que estas tenham sido utilizadas		
	Tipos de frutos:	alperces, ameixas, amoras, ananases, bananas, cerejas, figos, framboesas, maçãs, mangas, melões, mirtilos, morangos, cocos, pêssegos, peras, ruiarbos, tangerinas, toranjas, uvas			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado	Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
▼M35 Fenilcapsaicina	<p><i>Categoria especificada de alimentos</i></p> <p>Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013, excluindo alimentos destinados a lactentes, crianças pequenas e crianças com menos de 11 anos de idade</p> <p>Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE, destinados à população em geral, excluindo as crianças com menos de 11 anos de idade</p>	<p><i>Níveis máximos</i></p> <p>2,5 mg/dia</p> <p>2,5 mg/dia »</p>	<p>A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «fenilcapsaicina».</p>	<p>Autorizado em 19 de dezembro de 2019. Esta inserção baseia-se em provas científicas e dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283.</p> <p>Requerente: aXichem AB, Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Suécia. Durante o período de proteção de dados, só a aXichem AB está autorizada a colocar no mercado da União o novo alimento fenilcapsaicina, salvo se um requerente posterior obtiver autorização para o novo alimento sem fazer referência às provas científicas ou aos dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.º do Regulamento (UE) 2015/2283, ou com o acordo da aXichem AB.</p>
▼M9 Amido de milho fosfatado	<p><i>Categoria especificada de alimentos</i></p> <p>Produtos de panificação</p> <p>Massas alimentícias</p> <p>Cereais para pequeno-almoço</p> <p>Barras de cereais</p>	<p><i>Níveis máximos</i></p> <p>15 %</p>	<p>A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «amido de milho fosfatado»</p>	

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Fosfatidilserina de fosfolípidos de peixe	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de fosfatidilserina</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «fosfatidilserina de peixe»		
	Bebidas à base de iogurte	50 mg/100 ml			
	Pós à base de leite em pó	3 500 mg/100 g (equivalente a 40 mg/100 ml prontos a beber)			
	Alimentos à base de iogurte	80 mg/100 g			
	Barras de cereais	350 mg/100 g			
	Produtos de confeitoraria à base de chocolate	200 mg/100 g			
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 609/2013			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	300 mg/dia			
Fosfatidilserina de fosfolípidos de soja	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de fosfatidilserina</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «fosfatidilserina de soja»		
	Bebidas à base de iogurte	50 mg/100 ml			
	Pós à base de leite em pó	3,5 g/100 g (equivalente a 40 mg/100 ml prontos a beber)			
	Alimentos à base de iogurte	80 mg/100 g			
	Barras de cereais	350 mg/100 g			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Produto fosfolípido que contém quantidades iguais de fosfatidilserina e ácido fosfatídico	Produtos de confeitoraria à base de chocolate	200 mg/100 g	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «fosfatidilserina e ácido fosfatídico de soja»	O produto não se destina a ser comercializado para o consumo por grávidas ou lactantes	
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 609/2013			
	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de fosfatidilserina</i>			
	Cereais para pequeno-almoço	80 mg/100 g			
	Barras de cereais	350 mg/100 g			
	Alimentos à base de iogurte	80 mg/100 g			
	Produtos à base de soja semelhantes a iogurte	80 mg/100 g			
	Bebidas à base de iogurte	50 mg/100 g			
	Bebidas à base de soja semelhantes a iogurte	50 mg/100 g			
	Pós à base de leite em pó	3,5 g/100 g (equivalente a 40 mg/100 ml prontos a beber)			
Fosfolípidos de gema de ovo	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>			
	Não especificado				
Fitoglicogénio	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «fitoglicogénio»		
	Alimentos transformados	25 %			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Fitoesteróis/fitoestanóis	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	De acordo com o anexo III, ponto 5, do Regulamento (UE) n.º 1169/2011		
	Bebidas à base de arroz				
	Pão de centeio com farinha que contenha ≥ 50 % de centeio (farinha integral de centeio, grãos de centeio inteiros ou rachados e flocos de centeio) e ≤ 30 % de trigo; e com ≤ 4 % de açúcar adicionado mas sem adição de gordura	1. Devem ser apresentados de forma a permitir uma divisão fácil em porções que contenham quer um máximo de 3 g (no caso de 1 dose/dia) quer um máximo de 1 g (no caso de 3 doses/dia) de fitoesteróis/fitoestanóis adicionados.			
	Guarnições para salada, maionese e molhos à base de especiarias	A quantidade de fitoesteróis/fitoestanóis adicionados a um recipiente de bebidas não deve ultrapassar 3 g.			
	Bebidas à base de soja				
	Produtos de tipo lácteo, tais como produtos de tipo lácteo meio-gordos e magros, possivelmente com a adição de frutos e/ou cereais, nos quais, possivelmente, a gordura láctea tenha sido reduzida, ou a gordura láctea e/ou a proteína tenham sido parcial ou totalmente substituídas por gordura e/ou proteína vegetal	As guarnições para salada, a maionese e os molhos à base de especiarias devem ser embalados em doses individuais			
	Produtos à base de leite fermentado, tais como produtos de tipo iogurte e produtos de tipo queijo (teor de gordura < 12 % por 100 g), nos quais, possivelmente, a gordura láctea tenha sido reduzida, ou a gordura láctea e/ou a proteína tenham sido parcial ou totalmente substituídas por gordura e/ou proteína vegetal				
	Matérias gordas para barrar, tal como definidas no anexo VII, parte VII, e no apêndice II, pontos B e C, do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, à exceção de matérias gordas para cozinhar, fritar e barrar à base de manteiga ou de outra gordura animal				
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	3 g/dia			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Óleo de caroço de ameixa	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>			
	Para fritar e como tempero	De acordo com as utilizações alimentares normais dos óleos vegetais			
Proteínas de batata (coaguladas) e seus hidrolisados	Não especificado		A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «proteínas de batata»		
Protil oligopeptidase (preparação enzimática)	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «protil oligopeptidase»		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE para a população adulta em geral	120 PPU/dia (2,7 g de preparação enzimática/dia) (2×10^6 PPI/dia) PPU – Unidades de protil peptidase ou unidades de prolina protease PPI – Protease Picomole International			
Extrato proteico de rins de porco	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	3 cápsulas/dia; equivalente a 12,6 mg de extrato de rim de porco por dia Teor de diamina oxidase (DAO): 0,9 mg/dia (3 cápsulas com um teor de DAO de 0,3 mg/cápsula)			
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013				

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado	Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
▼M10 Sal dissódico de pirroloquinolina quinona	<i>Categoria especificada de alimentos</i> Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE, destinados à população adulta, exceto mulheres grávidas e lactantes	<i>Níveis máximos</i> 20 mg/dia	 <p>A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «sal dissódico de pirroloquinolina quinona».</p> <p>Os suplementos alimentares que contêm sal dissódico de pirroloquinolina quinona devem ostentar a seguinte menção:</p> <p>Este suplemento alimentar deve ser consumido apenas por adultos, exceto mulheres grávidas e lactantes</p>	 <p>Autorizado em 2 de setembro de 2018. Esta inserção baseia-se em provas científicas e dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.^º do Regulamento (UE) 2015/2283.</p> <p>Requerente: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., Mitsubishi Building 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japão. Durante o período de proteção de dados, só a Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. está autorizada a colocar no mercado da União o novo alimento «sal dissódico de pirroloquinolina quinona», salvo se um requerente posterior obtiver autorização para o novo alimento sem fazer referência às provas científicas ou aos dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.^º do Regulamento (UE) 2015/2283, ou com o acordo da Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.</p> <p>Termo do período de proteção de dados: 2 de setembro de 2023.</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	► M29 Proteção de dados ◀
Óleo de colza com elevado teor de matérias não saponificáveis	<i>Categoria especificada de alimentos</i>		<i>Níveis máximos</i>		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE		1,5 g por dose recomendada para consumo diário	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «extrato de óleo de colza»	
Proteína de colza	Como fonte de proteínas vegetais nos alimentos, exceto nas fórmulas para lactentes e fórmulas de transição			<ol style="list-style-type: none"> 1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «proteína de colza» 2. Qualquer género alimentício que contenha «proteína de colza» deve ostentar uma menção indicando que este ingrediente pode causar reações alérgicas aos consumidores alérgicos à mostarda e aos produtos à base de mostarda. Quando necessário, essa menção deve figurar o mais próximo possível da lista de ingredientes. 	
▼M17	<i>Categoria especificada de alimentos</i>		<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «concentrado de péptido de camarão refinado».	<p>Autorizado em 20 de novembro de 2018. Esta inserção baseia-se em provas científicas e dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.^º do Regulamento (UE) 2015/2283.</p> <p>Requerente: Marealis AS, Stortorget 1, Kystens Hus, 2nd floor, N-9008 Tromsø, Endereço postal: P.O. Box</p>
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE, para a população adulta		1 200 mg/dia		

▼M17

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado	Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀						
				<p>1065, 9261 Tromsø, Noruega. Durante o período de proteção de dados, só a Marealis AS está autorizada a colocar no mercado da União o novo alimento concentrado de péptido de camarão refilado, salvo se um requerente posterior obtiver autorização para o novo alimento sem fazer referência às provas científicas ou aos dados científicos abrangidos por direitos de propriedade protegidos nos termos do artigo 26.^º do Regulamento (UE) 2015/2283, ou com o acordo da Marealis AS.</p> <p>Termo do período de proteção de dados: 20 de novembro de 2023.</p>						
▼M9 Trans-resveratrol	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="406 922 866 1060"><i>Categoría especificada de alimentos</i></th><th data-bbox="866 922 1215 1060"><i>Níveis máximos</i></th><th data-bbox="1215 922 1596 1060"></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="406 1060 866 1391">Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE para a população adulta (sob a forma de cápsulas ou de comprimidos)</td><td data-bbox="866 1060 1215 1391">150 mg/dia</td><td data-bbox="1215 1060 1596 1391"></td></tr> </tbody> </table>	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>		Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE para a população adulta (sob a forma de cápsulas ou de comprimidos)	150 mg/dia		<ol style="list-style-type: none"> 1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos suplementos alimentares que o contêm deve ser «trans-resveratrol». 2. Na rotulagem dos suplementos alimentares que contêm trans-resveratrol deve figurar uma advertência dirigida às pessoas que tomam medicamentos indicando que só devem consumir o produto sob vigilância médica. 		
<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>									
Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE para a população adulta (sob a forma de cápsulas ou de comprimidos)	150 mg/dia									

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Trans-resveratrol (fonte microbiana)	<p><i>Categoria especificada de alimentos</i></p> <p>Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE</p>		<p><i>Níveis máximos</i></p> <p>De acordo com a utilização normal nos suplementos alimentares de resveratrol extraído de poligonácea-japonesa (<i>Fallopia japonica</i>)</p>	<p>1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos suplementos alimentares que o contenham deve ser «<i>trans</i>-resveratrol».</p> <p>2. Na rotulagem dos suplementos alimentares que contêm <i>trans</i>-resveratrol deve figurar uma advertência dirigida às pessoas que tomam medicamentos indicando que só devem consumir o produto sob vigilância médica.</p>	
Extrato de crista de gallo	<p><i>Categoria especificada de alimentos</i></p> <p>Bebidas lácteas</p>		<p><i>Níveis máximos</i></p> <p>40 mg/100 g ou mg/100 ml</p>	<p>A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «extrato de crista de gallo» ou «extrato de crista de galispo»</p>	
	<p>Bebidas lácteas fermentadas</p>		<p>80 mg/100 g ou mg/100 ml</p>		
	<p>Produtos de tipo iogurte</p>		<p>65 mg/100 g ou mg/100 ml</p>		
	<p><i>Queijo fresco</i></p>		<p>110 mg/100 g ou mg/100 ml</p>		
	<p><i>Categoria especificada de alimentos</i></p> <p>Tal como para o óleo de linhaça</p>		<p><i>Níveis máximos</i></p> <p>De acordo com as utilizações alimentares normais do óleo de linhaça</p>	<p>A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «óleo de Sacha inchi (<i>Plukenetia volubilis</i>)»</p>	
Salatrim	<p><i>Categoria especificada de alimentos</i></p> <p>Produtos de panificação e de confeitoraria</p>		<p><i>Níveis máximos</i></p>	<p>1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «gordura de baixo valor energético (salatrim)».</p> <p>2. Deve existir uma menção declarando que o consumo excessivo pode provocar perturbações gastrointestinais.</p> <p>3. Deve existir uma menção declarando que os produtos não se destinam a crianças.</p>	

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀			
Óleo rico em DHA e EPA de <i>Schizochytrium sp.</i>	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de DHA e EPA combinados:</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «óleo rico em DHA e EPA da microalga <i>Schizochytrium sp.</i> »					
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE para a população adulta, exceto mulheres grávidas e lactantes	3 000 mg/dia						
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE para mulheres grávidas e lactantes	450 mg/dia						
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com as necessidades nutricionais específicas das pessoas a que os produtos se destinam						
	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013 e substitutos de refeição para controlo do peso	250 mg/refeição						
	Bebidas lácteas e produtos semelhantes destinados a crianças pequenas	200 mg/100 g						
	Alimentos transformados à base de cereais e alimentos para bebés destinados a lactentes e crianças pequenas, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013							
	Alimentos adaptados a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas							
	Alimentos que ostentam menções sobre a ausência ou a presença reduzida de glúten em conformidade com os requisitos do Regulamento de Execução (UE) n.º 828/2014 da Comissão							
	Produtos de panificação (pães, pãezinhos e bolachas e biscoitos adicionados de edulcorantes)	200 mg/100 g						
	Cereais para pequeno-almoço	500 mg/100 g						

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
	Gorduras para cozinhar	360 mg/100 g			
	Sucedâneos de produtos lácteos, exceto bebidas	600 mg/100 g para queijo; 200 mg/100 g para soja e sucedâneos de produtos lácteos (exceto bebidas)			
	Produtos lácteos, exceto bebidas lácteas	600 mg/100 g para queijo; 200 mg/100 g para produtos lácteos (incluindo leite, queijo fresco e produtos do tipo iogurte; exceto bebidas)			
	Bebidas não alcoólicas (incluindo sucedâneos de produtos lácteos e bebidas lácteas)	80 mg/100 g			
	Barras de cereais ou nutritivas	500 mg/100 g			
	Gorduras para barrar e guarnições	600 mg/100 g			

▼M26

Óleo de <i>Schizochytrium</i> sp. (ATCC PTA-9695)	Categoria especificada de alimentos	Níveis máximos de DHA
	Produtos lácteos, exceto bebidas lácteas	200 mg/100 g ou, para produtos de queijo, 600 mg/100 g
	Sucedâneos de produtos lácteos, exceto bebidas	200 mg/100 g ou, para sucedâneos de produtos de queijo, 600 mg/100 g
	Gorduras para barrar e guarnições	600 mg/100 g
	Cereais para pequeno-almoço	500 mg/100 g
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	250 mg de DHA/dia para a população em geral 450 mg de DHA/dia para mulheres grávidas e lactantes
	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013 e substitutos de refeição para controlo do peso	250 mg/refeição

▼M26

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado	Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
	Bebidas lácteas e produtos semelhantes destinados a crianças pequenas	200 mg/100 g		
	Alimentos adaptados a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas			
	Alimentos que ostentam menções sobre a ausência ou a presença reduzida de glúten em conformidade com os requisitos do Regulamento de Execução (UE) n.º 828/2014 da Comissão			
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013			
	Produtos de panificação (pães, pãezinhos e bolachas e biscoitos adicionados de edulcorantes)			
	Barras de cereais			
	Gorduras para cozinhar			
	Bebidas não alcoólicas (incluindo sucedâneos de produtos lácteos e bebidas lácteas)			
	Fórmulas para lactentes e fórmulas de transição, tal como definidas no Regulamento (UE) n.º 609/2013			
	Alimentos transformados à base de cereais e alimentos para bebés destinados a lactentes e crianças pequenas, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013			
	Puré de frutas/produtos hortícolas			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀																														
▼M24 Óleo de <i>Schizochytrium</i> sp.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 33.33%;"><i>Categoria especificada de alimentos</i></th><th style="text-align: center; width: 33.33%;"><i>Níveis máximos de DHA</i></th><th style="text-align: center; width: 33.33%;"></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Produtos lácteos, exceto bebidas lácteas</td><td style="padding: 5px;">200 mg/100 g ou, para produtos de queijo, 600 mg/100 g</td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Sucedâneos de produtos lácteos, exceto bebidas</td><td style="padding: 5px;">200 mg/100 g ou, para sucedâneos de produtos de queijo, 600 mg/100 g</td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Gorduras para barrar e guarnições</td><td style="padding: 5px;">600 mg/100 g</td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Cereais para pequeno-almoço</td><td style="padding: 5px;">500 mg/100 g</td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;">Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE</td><td style="padding: 5px; vertical-align: top;">250 mg de DHA/dia para a população em geral 450 mg de DHA/dia para mulheres grávidas e lactantes</td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013, e substitutos de refeição para controlo do peso</td><td style="padding: 5px;">250 mg/refeição</td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Bebidas lácteas e produtos semelhantes destinados a crianças pequenas</td><td style="padding: 5px; vertical-align: top;">200 mg/100 g</td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Alimentos transformados à base de cereais e alimentos para bebés destinados a lactentes e crianças pequenas, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013</td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Alimentos adaptados a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas</td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> </tbody> </table>	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de DHA</i>		Produtos lácteos, exceto bebidas lácteas	200 mg/100 g ou, para produtos de queijo, 600 mg/100 g		Sucedâneos de produtos lácteos, exceto bebidas	200 mg/100 g ou, para sucedâneos de produtos de queijo, 600 mg/100 g		Gorduras para barrar e guarnições	600 mg/100 g		Cereais para pequeno-almoço	500 mg/100 g		Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	250 mg de DHA/dia para a população em geral 450 mg de DHA/dia para mulheres grávidas e lactantes		Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013, e substitutos de refeição para controlo do peso	250 mg/refeição		Bebidas lácteas e produtos semelhantes destinados a crianças pequenas	200 mg/100 g		Alimentos transformados à base de cereais e alimentos para bebés destinados a lactentes e crianças pequenas, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013			Alimentos adaptados a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas			A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «óleo da microalga <i>Schizochytrium</i> sp.»			
<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de DHA</i>																																		
Produtos lácteos, exceto bebidas lácteas	200 mg/100 g ou, para produtos de queijo, 600 mg/100 g																																		
Sucedâneos de produtos lácteos, exceto bebidas	200 mg/100 g ou, para sucedâneos de produtos de queijo, 600 mg/100 g																																		
Gorduras para barrar e guarnições	600 mg/100 g																																		
Cereais para pequeno-almoço	500 mg/100 g																																		
Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	250 mg de DHA/dia para a população em geral 450 mg de DHA/dia para mulheres grávidas e lactantes																																		
Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013, e substitutos de refeição para controlo do peso	250 mg/refeição																																		
Bebidas lácteas e produtos semelhantes destinados a crianças pequenas	200 mg/100 g																																		
Alimentos transformados à base de cereais e alimentos para bebés destinados a lactentes e crianças pequenas, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013																																			
Alimentos adaptados a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas																																			

▼M24

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Alimentos que ostentam menções sobre a ausência ou a presença reduzida de glúten em conformidade com os requisitos do Regulamento de Execução (UE) n.º 828/2014					
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com as necessidades nutricionais específicas das pessoas a que os produtos se destinam			
	Produtos de panificação (pães, pãezinhos e bolachas e biscoitos adicionados de edulcorantes)	200 mg/100 g			
	Barras de cereais	500 mg/100 g			
	Gorduras para cozinhar	360 mg/100 g			
	Bebidas não alcoólicas (incluindo sucedâneos de produtos lácteos e bebidas lácteas)	80 mg/100 ml			
	Puré de frutas/produtos hortícolas	100 mg/100 g			

▼M9

Óleo de <i>Schizochytrium</i> sp. (T18)	Categoria especificada de alimentos	Níveis máximos de DHA			
	Produtos lácteos, exceto bebidas lácteas	200 mg/100 g ou, para produtos de queijo, 600 mg/100 g	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «óleo da microalga <i>Schizochytrium</i> sp.»		
	Sucedâneos de produtos lácteos, exceto bebidas	200 mg/100 g ou, para sucedâneos de produtos de queijo, 600 mg/100 g			
	Gorduras para barrar e guarnições	600 mg/100 g			
	Cereais para pequeno-almoço	500 mg/100 g			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	<p>250 mg de DHA/dia para a população em geral</p> <p>450 mg de DHA/dia para mulheres grávidas e lactantes</p>			
	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013 e substitutos de refeição para controlo do peso	250 mg/refeição			
	Bebidas lácteas e produtos semelhantes destinados a crianças pequenas	200 mg/100 g			
	Alimentos adaptados a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas				
	Alimentos que ostentam menções sobre a ausência ou a presença reduzida de glúten em conformidade com os requisitos do Regulamento de Execução (UE) n.º 828/2014 da Comissão				
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com as necessidades nutricionais específicas das pessoas a que os produtos se destinam			
	Produtos de panificação (pães, pãezinhos e bolachas e biscoitos adicionados de edulcorantes)	200 mg/100 g			
	Barras de cereais	500 mg/100 g			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
	Gorduras para cozinhar	360 mg/100 g			
	Bebidas não alcoólicas (incluindo sucedâneos de produtos lácteos e bebidas lácteas)	80 mg/100 ml			
	Fórmulas para lactentes e fórmulas de transição, tal como definidas no Regulamento (UE) n.º 609/2013	Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 609/2013			
	Alimentos transformados à base de cereais e alimentos para bebés destinados a lactentes e crianças pequenas, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	200 mg/100 g			

▼M22

Xarope de <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench (alimento tradicional de um país terceiro) Xarope de <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench. (alimento tradicional de um país terceiro)	<p>Não especificado</p> <p>Descrição/definição O alimento tradicional consiste em xarope de <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench [género, <i>Sorghum</i>; família, <i>Poaceae</i> (alt. <i>Gramineae</i>)]. O xarope é obtido a partir dos caules de <i>S. bicolor</i>, após aplicação de processos de produção como a Trituração, a extração e a evaporação, incluindo um tratamento térmico, a fim de obter um xarope com, pelo menos, 74 °Brix</p> <p>Dados de composição do xarope de <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench</p> <p>Água: 22,7 g/100 g Cinzas: 2,4 Açúcares, total: > 74,0 g/100 g</p>	<p>A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «Xarope de sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)»</p>		
---	---	---	--	--

▼M9

Extrato de soja fermentada	Categoria especificada de alimentos	Níveis máximos	1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «extrato de soja fermentada». 2. Na rotulagem dos suplementos alimentares que contêm extrato de soja fermentada deve figurar uma advertência dirigida às pessoas que tomam medicamentos indicando que só devem consumir o produto sob vigilância médica.		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE (sob a forma de cápsulas, comprimidos ou pós) destinados à população adulta, exceto mulheres grávidas e lactantes	100 mg/dia			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Extrato de gérmen de trigo (<i>Triticum aestivum</i>) rico em espermidina	<i>Categoria especificada de alimentos</i>		<i>Níveis máximos</i>		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE destinados à população adulta, exceto mulheres grávidas e lactantes		Equivalente ao máx. de 6 mg/dia de espermidina		
Sucromalt	<i>Categoria especificada de alimentos</i>		<i>Níveis máximos</i>		
	Não especificado		1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «Sucromalt». 2. A designação do novo alimento na rotulagem deve ser acompanhada da indicação de que o produto é uma fonte de glucose e frutose.		
Fibra de cana-de-açúcar	<i>Categoria especificada de alimentos</i>		<i>Níveis máximos</i>		
	Pão		8 %		
	Produtos de panificação		5 %		
	Produtos à base de carne e músculos		3 %		
	Condimentos e especiarias		3 %		
	Queijo ralado		2 %		
	Alimentos dietéticos especiais		5 %		
	Molhos		2 %		
	Bebidas		5 %		
Extrato de óleo de girassol	<i>Categoria especificada de alimentos</i>		<i>Níveis máximos</i>		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE		1,1 g/dia		

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀			
Liofilizado da microalga <i>Tetraselmis chuii</i>			A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «liofilizado da microalga <i>Tetraselmis chuii</i> » ou «liofilizado da microalga <i>T. chuii</i> ». Os suplementos alimentares que contêm a microalga <i>Tetraselmis chuii</i> liofilizada devem ostentar a seguinte menção: «Contém quantidades negligenciáveis de iodo».					
Categoría especificada de alimentos								
Molhos								
Sais especiais								
<i>Therapon barcoo/Scortum</i>	Condimentos							
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE							
D-Tagatose	Utilização prevista idêntica à do salmão, nomeadamente a preparação de pratos e produtos culinários de peixe, incluindo produtos de peixe cozinhados, crus, fumados e cozidos							
	Categoría especificada de alimentos							
Extrato rico em taxifolina	Não especificado		1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «D-tagatose». 2. A rotulagem de qualquer produto que contenha mais de 15 g de D-tagatose por dose e de todas as bebidas que contenham mais de 1 % de D-tagatose (como consumidas) devem ostentar a menção «um consumo excessivo pode ter efeitos laxativos».					
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE, destinados à população em geral, excluindo lactentes, crianças e crianças pequenas, e adolescentes com idade inferior a 14 anos							
	Categoría especificada de alimentos		A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «extrato rico em taxifolina»					
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE, destinados à população em geral, excluindo lactentes, crianças e crianças pequenas, e adolescentes com idade inferior a 14 anos							

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀	
Trealose	<table border="1" data-bbox="406 287 1215 398"> <tr> <th data-bbox="406 287 848 398"><i>Categoria especificada de alimentos</i></th> <th data-bbox="848 287 1215 398"><i>Níveis máximos</i></th> </tr> </table> <p data-bbox="406 398 1215 759">Não especificado</p>	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «trealose» e deve constar da rotulagem do produto enquanto tal ou da lista de ingredientes dos géneros alimentícios que o contenham. 2. A designação do novo alimento na rotulagem deve ser acompanhada da indicação de que «a trealose é uma fonte de glucose». 		
<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>					
Cogumelos (<i>Agaricus bisporus</i>) tratados com radiação UV	<table border="1" data-bbox="406 759 1215 870"> <tr> <th data-bbox="406 759 848 870"><i>Categoria especificada de alimentos</i></th> <th data-bbox="848 759 1215 870"><i>Níveis máximos de vitamina D₂</i></th> </tr> </table> <p data-bbox="406 870 1215 1389">Cogumelos (<i>Agaricus bisporus</i>)</p>	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de vitamina D₂</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A designação a utilizar no rótulo do novo alimento como tal ou dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «cogumelos (<i>Agaricus bisporus</i>) tratados com radiação UV». 2. A designação a utilizar no rótulo do novo alimento como tal ou dos géneros alimentícios que o contenham deve ser acompanhada de uma indicação de que «foi utilizado um tratamento pela luz controlado para aumentar os níveis de vitamina D» ou «foi utilizado um tratamento com radiação UV para aumentar os níveis de vitamina D₂». 		
<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de vitamina D₂</i>					

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Levedura para padaria (Saccharomyces cerevisiae) tratada com UV	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de vitamina D₂</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «levedura com vitamina D» ou «levedura com vitamina D ₂ »		
	Pães e pãezinhos levedados	5 µg de vitamina D ₂ /100 g			
	Produtos de pastelaria fina levedados	5 µg de vitamina D ₂ /100 g			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	5 µg de vitamina D ₂ /dia			
Pão tratado com UV	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de vitamina D₂</i>	A designação a utilizar no rótulo do novo alimento deve ser acompanhada da indicação «contém vitamina D produzida por tratamento com UV»		
Pães e pãezinhos levedados (sem guarnições)	3 µg de vitamina D ₂ /100 g				
Leite tratado com UV	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de vitamina D₃</i>	1. A designação a utilizar no rótulo do novo alimento deve ser «tratado com radiação UV». 2. Sempre que o leite tratado com UV contiver uma quantidade de vitamina D considerada significativa de acordo com o anexo XIII, parte A, ponto 2, do Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, a designação para a rotulagem deve ser completada pelas menções: «contém vitamina D produzida por tratamento com UV» ou «leite com vitamina D resultante de tratamento com UV».		
	Leite gordo pasteurizado, tal como definido no Regulamento (UE) n.º 1308/2013, para ser consumido como tal	5-32 µg/kg para a população em geral excluindo lactentes			
	Leite meio-gordo pasteurizado, tal como definido no Regulamento (UE) n.º 1308/2013, para ser consumido como tal	1-15 µg/kg para a população em geral excluindo lactentes			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
Vitamina K₂ (menaquinona)	Utilizar em conformidade com a Diretiva 2002/46/CE, o Regulamento (UE) n.º 609/2013 e/ou o Regulamento (CE) n.º 1925/2006		A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «menaquinona» ou «vitamina K ₂ »		
Extrato de farelo de trigo	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Niveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «extrato de farelo de trigo»	O «extrato de farelo de trigo» não pode ser colocado no mercado como suplemento alimentar nem como ingrediente de suplementos alimentares. Também não pode ser adicionado às fórmulas para lactentes.	
	Cerveja e sucedâneos	0,4 g/100 g			
	Cereais prontos a consumir	9 g/100 g			
	Produtos lácteos	2,4 g/100 g			
	Sumos de fruta e de produtos hortícolas	0,6 g/100 g			
	Refrigerantes	0,6 g/100 g			
	Preparados de carne	2 g/100 g			
▼M19 Xilo-oligossacáridos	<i>Categoría especificada de alimentos</i>	<i>Niveis máximos (**)</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «xilo-oligossacáridos».		
	Pão branco	14 g/kg			
	Pão integral	14 g/kg			
	Cereais para pequeno-almoço	14 g/kg			
	Bolachas e biscoitos	14 g/kg			
	Bebidas à base de soja	3,5 g/kg			
	Iogurte (*)	3,5 g/kg			
	Produtos para barrar à base de fruta	30 g/kg			
	Produtos de confeitoraria à base de chocolate	30 g/kg			
	(*) Quando utilizados em produtos lácteos, os xilo-oligossacáridos não podem substituir, total ou parcialmente, qualquer componente do leite.				

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
▼M30 Biomassa da levedura <i>Yarrowia lipolytica</i>	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «biomassa morta pelo calor da levedura <i>Yarrowia lipolytica</i> »		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE, exceto suplementos alimentares destinados a lactentes e crianças pequenas	6 g/dia para crianças a partir dos 10 anos, adolescentes e população adulta em geral 3 g/dia para crianças entre os 3 e os 9 anos			

▼M9

Beta-glucanos de levedura	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos de beta-glucanos puros de levedura (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>)</i>	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «beta-glucanos de levedura (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>)»		
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE, exceto suplementos alimentares destinados a lactentes e crianças pequenas	1,275 g/dia para crianças com mais de 12 anos e para a população adulta em geral 0,675 g/dia para crianças com menos de 12 anos			
	Substitutos integrais da dieta para controlo do peso, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013	1,275 g/dia			
	Alimentos destinados a fins medicinais específicos, tal como definidos no Regulamento (UE) n.º 609/2013, exceto alimentos destinados a fins medicinais específicos para lactentes e crianças pequenas	1,275 g/dia			
	Bebidas à base de sumos de frutas e/ou de produtos hortícolas, incluindo sumos concentrados e desidratados	1,3 g/kg			
	Bebidas com aroma de frutas	0,8 g/kg			
	Pó para preparação de bebidas à base de cacaú	38,3 g/kg (em pó)			
	Outras bebidas	0,8 g/kg (prontas a beber) 7 g/kg (em pó)			
	Barras de cereais	6 g/kg			
	Cereais para pequeno-almoço	15,3 g/kg			

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado		Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
	Cereais para pequeno-almoço integrais e com elevado teor de fibras (preparação instantânea a quente)	1,5 g/kg			
	Biscoitos do tipo <i>cookie</i>	6,7 g/kg			
	Bolachas do tipo água-e-sal	6,7 g/kg			
	Bebidas lácteas	3,8 g/kg			
	Produtos lácteos fermentados	3,8 g/kg			
	Sucedâneos de produtos lácteos	3,8 g/kg			
	Leite desidratado/leite em pó	25,5 g/kg			
	Sopas e preparações para sopas	0,9 g/kg (prontas a comer) 1,8 g/kg (condensadas) 6,3 g/kg (em pó)			
	Chocolate e produtos de confeitoraria	4 g/kg			
	Barras de proteínas e pós proteicos	19,1 g/kg			
	Doces de frutas e outros produtos para barrar à base de fruta	11,3 g/kg			
▼M12	Zeaxantina	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>		
			Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE	2 mg/dia	A designação do novo alimento a utilizar na rotulagem dos géneros alimentícios que o contenham deve ser «zeaxantina».
▼M9	L-Pidotolato de zinco	<i>Categoria especificada de alimentos</i>	<i>Níveis máximos</i>		
			Alimentos abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 609/2013	3 g/dia	
			Bebidas lácteas e produtos semelhantes destinados a crianças pequenas		
			Substituto de refeição para controlo do peso		
			Alimentos adaptados a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas		

▼M9

Novo alimento autorizado	Condições em que o novo alimento pode ser utilizado	Requisitos específicos de rotulagem adicionais	Outros requisitos	►M29 Proteção de dados ◀
	Alimentos que ostentam menções sobre a ausência ou a presença reduzida de glúten em conformidade com os requisitos do Regulamento de Execução (UE) n.º 828/2014 da Comissão			
	Suplementos alimentares, tal como definidos na Diretiva 2002/46/CE			

(¹) Regulamento (UE) n.º 609/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013, relativo aos alimentos para lactentes e crianças pequenas, aos alimentos destinados a fins medicinais específicos e aos substitutos integrais da dieta para controlo do peso e que revoga a Diretiva 92/52/CEE do Conselho, as Diretivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE da Comissão, a Diretiva 2009/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e os Regulamentos (CE) n.º 41/2009 e (CE) n.º 953/2009 da Comissão (JO L 181 de 29.6.2013, p. 35).

(²) Regulamento de Execução (UE) n.º 828/2014 da Comissão, de 30 de julho de 2014, relativo aos requisitos de prestação de informações aos consumidores sobre a ausência ou a presença reduzida de glúten nos géneros alimentícios (JO L 228 de 31.7.2014, p. 5).

(³) Diretiva 2002/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de junho de 2002, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos suplementos alimentares (JO L 183 de 12.7.2002, p. 51).

(⁴) Regulamento (CE) n.º 1925/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, relativo à adição de vitaminas, minerais e determinadas outras substâncias aos alimentos (JO L 404 de 30.12.2006, p. 26).

(⁵) Diretiva 2001/113/CE do Conselho, de 20 de dezembro de 2001, relativa aos doces e geleias de frutos, citrinadas e creme de castanha destinados à alimentação humana (JO L 10 de 12.1.2002, p. 67).

(⁶) Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e que revoga os Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 e (CE) n.º 1234/2007 do Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, p. 671).

►M32 (⁷) Os níveis máximos de utilização no produto final pronto a utilizar, comercializado como tal ou reconstituído de acordo com as instruções do fabricante. ◀

Quadro 2: Especificações

Novo alimento autorizado	Especificações
Ácido N-acetyl-D-neuramínico	<p>Descrição: O ácido N-acetyl-D-neuramínico é um produto pulverulento cristalino, de cor branca a esbranquiçada</p> <p>Definição:</p> <p>Denominação química: Denominação IUPAC: Ácido N-acetyl-D-neuramínico (di-hidrato) Ácido 5-acetamido-3,5-didesoxi-D-glicero-D-galacto-non-2-ulopiranosónico (di-hidrato)</p> <p>Sinónimos: Ácido siálico (di-hidrato)</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Fórmula química: $C_{11}H_{19}NO_9$ (ácido) $C_{11}H_{23}NO_{11}$ ($C_{11}H_{19}NO_9 * 2H_2O$) (di-hidrato)</p> <p>Massa molecular: 309,3 Da (ácido) 345,3 (309,3 + 36,0) (di-hidrato)</p> <p>N.o CAS: 131-48-6 (ácido livre) 50795-27-2 (di-hidrato)</p> <p>Especificações: Descrição: produto pulverulento cristalino, de cor branca a esbranquiçada pH (solução a 5 %, 20 °C): 1,7-2,5 Ácido N-acetyl-D-neuramínico (di-hidrato): > 97,0 % Água (o di-hidrato representa 10,4 %): ≤ 12,5 % (m/m) Cinzas sulfatadas: < 0,2 % (m/m) Ácido acético (como ácido livre e/ou acetato de sódio): < 0,5 % (m/m)</p> <p>Metais pesados: Ferro: < 20,0 mg/kg Chumbo: < 0,1 mg/kg Proteínas residuais: < 0,01 % (m/m)</p> <p>Solventes residuais: 2-Propanol: < 0,1 % (m/m) Acetona: < 0,1 % (m/m) Acetato de etilo: < 0,1 % (m/m)</p> <p>Critérios microbiológicos: <i>Salmonella</i>: ausente em 25 g Contagem total de microrganismos mesófilos aeróbios: < 500 UFC/g</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p><i>Enterobacteriaceae</i>: ausente em 10 g <i>Cronobacter (Enterobacter) sakazakii</i>: ausente em 10 g <i>Listeria monocytogenes</i>: ausente em 25 g <i>Bacillus cereus</i>: < 50 UFC/g Leveduras: < 10 UFC/g Bolores: < 10 UFC/g Endotoxinas residuais: < 10 UE/mg UFC: unidades formadoras de colônias; UE: unidades de endotoxina.</p>
Polpa seca do fruto de <i>Adansonia digitata</i> (embondeiro)	<p>Descrição/definição: Os frutos do embondeiro (<i>Adansonia digitata</i>) são colhidos nas árvores. As cascas são abertas e a polpa é separada das sementes e da casca. A polpa é triturada, separada em lotes grosseiros e finos (dimensão das partículas 3 a 600 µ) e posteriormente embalada.</p> <p>Componentes nutricionais típicos:</p> <p>Humidade (perda por secagem) (g/100 g): 4,5-13,7 Proteína (g/100 g): 1,8-9,3 Gordura (g/100 g): 0-1,6 Hidratos de carbono totais (g/100 g): 76,3-89,5 Açúcares totais (expressos em glucose): 15,2-36,5 Sódio (mg/100 g): 0,1-25,2</p> <p>Especificações analíticas:</p> <p>Matérias estranhas: Não superior a 0,2 % Humidade (perda por secagem) (g/100 g): 4,5-13,7 Cinzas (g/100 g): 3,8-6,6</p>
Extrato de <i>Ajuga reptans</i> de culturas de células	<p>Descrição/definição: Extrato hidroalcoólico das culturas de tecidos de <i>Ajuga reptans</i> L., que é substancialmente equivalente aos extratos das partes aéreas floridas de <i>Ajuga reptans</i> obtidos por culturas tradicionais.</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
L-Alanil-L-glutamina	<p>Descrição/definição:</p> <p>A L-alanil-L-glutamina é produzida por fermentação com uma estirpe geneticamente modificada de <i>Escherichia coli</i>. Durante o processo de fermentação, o ingrediente é excretado no meio de crescimento, a partir do qual é subsequentemente separado e purificado até uma concentração superior a 98 %.</p> <p>Aspetto: produto pulverulento cristalino, de cor branca</p> <p>Pureza: > 98 %</p> <p>Espetroscopia de infravermelho: em conformidade com o padrão de referência</p> <p>Aspetto da solução: incolor e limpida</p> <p>Doseamento (em base seca): 98-102 %</p> <p>Substâncias associadas (cada uma): ≤ 0,2 %</p> <p>Resíduo de incineração: ≤ 0,1 %</p> <p>Perda por secagem: ≤ 0,5 %</p> <p>Rotação ótica: +9,0 - +11,0°</p> <p>pH (1 %; H₂O): 5,0-6,0</p> <p>Amónio (NH₄): ≤ 0,020 %</p> <p>Cloreto (Cl): ≤ 0,020 %</p> <p>Sulfato (SO₄): ≤ 0,020 %</p> <p>Critérios microbiológicos:</p> <p><i>Escherichia coli</i>: ausente/g</p>
Óleo da microalga <i>Ulkenia</i> sp.	<p>Descrição/definição:</p> <p>Óleo da microalga <i>Ulkenia</i> sp.</p> <p>Índice de acidez: ≤ 0,5 mg KOH/g</p> <p>Índice de peróxidos: ≤ 5,0 meq/kg de óleo</p> <p>Humididade e voláteis: ≤ 0,05 %</p> <p>Insaponificáveis: ≤ 4,5 %</p> <p>Ácidos gordos <i>trans</i>: ≤ 1,0 %</p> <p>Teor de DHA: ≥ 32 %</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
--------------------------	----------------

▼M25

Óleo de semente de <i>Allanblackia</i>	<p>Descrição/definição: O óleo de semente de <i>Allanblackia</i> é obtido a partir de sementes da espécie <i>Allanblackia</i>: <i>A. floribunda</i> (sinónimo de <i>A. parviflora</i>) e <i>A. stuhlmannii</i>.</p> <p>Composição em ácidos gordos (em % dos ácidos gordos totais):</p> <p>Ácido láurico — Ácido mirístico — Ácido palmítico (C12:0 – C14:0 – C16:0): soma destes ácidos < 4,0 %</p> <p>Ácido esteárico (C18:0): 45-58 %</p> <p>Ácido oleico (C18:1): 40-51 %</p> <p>Ácidos gordos polinsaturados (AGPI): < 2 %</p> <p>Características:</p> <p>Ácidos gordos livres: máx. 0,1 % dos ácidos gordos totais</p> <p>Ácidos gordos <i>trans</i>: máx. 1,0 % dos ácidos gordos totais</p> <p>Índice de peróxidos: máx. 1,0 meq/kg</p> <p>Matérias insaponificáveis: máx 1,0 % (m/m) do óleo</p> <p>Índice de saponificação: 185-198 mg de KOH/g</p>
---	--

▼M9

Extrato de folha de <i>Aloe macroclada</i> Baker	<p>Descrição/definição: Extrato de gel em pó derivado de folhas de <i>Aloe macroclada</i> Baker, que é substancialmente equivalente ao mesmo gel derivado de folhas de <i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.</p> <p>Cinzas: 25 %</p> <p>Fibras alimentares: 28,6 %</p> <p>Gordura: 2,7 %</p> <p>Humidade: 4,7 %</p> <p>Polissacáridos: 9,5 %</p> <p>Proteínas: 1,63 %</p> <p>Glucose: 8,9 %</p>
---	--

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
▼M23 Óleo de krill-do-antártico de <i>Euphausia superba</i>	<p>Descrição/definição:</p> <p>Para produzir extrato lipídico de krill-do-antártico (<i>Euphausia superba</i>), submete-se o crustáceo ultracongelado triturado ou a farinha de crustáceo seco a extração de lípidos com um solvente de extração autorizado (ao abrigo da Diretiva 2009/32/CE). As suas proteínas e outros componentes são removidos do extrato lipídico por filtração. Os solventes de extração e a água residual são removidos por evaporação.</p> <p>Índice de saponificação: ≤ 230 mg KOH/g</p> <p>Índice de peróxidos: ≤ 3 meq O₂/kg de óleo</p> <p>Estabilidade à oxidação: todos os produtos alimentares que contenham óleo de krill-do-antártico de <i>Euphausia superba</i> devem demonstrar estabilidade à oxidação através de uma metodologia de teste adequada e reconhecida a nível nacional/internacional (por exemplo, AOAC).</p> <p>Humidade e voláteis: ≤ 3 % ou 0,6 expresso em atividade da água a 25 °C</p> <p>Fosfolípidos: ≥ 35 % a < 60 %</p> <p>Ácidos gordos <i>trans</i>: ≤ 1 %</p> <p>EPA (ácido icosapentaenoico): ≥ 9 %</p> <p>DHA (ácido docosa-hexaenoico): ≥ 5 %</p>
▼M9 Óleo rico em fosfolípidos de krill-do-antártico de <i>Euphausia superba</i>	<p>Descrição/definição:</p> <p>O óleo rico em fosfolípidos é produzido a partir de krill-do-antártico (<i>Euphausia superba</i>) por lavagens repetidas com um solvente autorizado (ao abrigo da Diretiva 2009/32/CE), a fim de aumentar o teor de fosfolípidos do óleo. Os solventes são removidos do produto final por evaporação.</p> <p>Índice de saponificação: ≤ 230 mg KOH/g</p> <p>Índice de peróxidos: ≤ 3 meq O₂/kg de óleo</p> <p>Humidade e voláteis: ≤ 3 % ou 0,6 expresso em atividade da água a 25 °C</p> <p>Fosfolípidos: ≥ 60 %</p> <p>Ácidos gordos <i>trans</i>: ≤ 1 %</p> <p>EPA (ácido icosapentaenoico): ≥ 9 %</p> <p>DHA (ácido docosa-hexaenoico): ≥ 5 %</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
Óleo do fungo <i>Mortierella alpina</i> rico em ácido araquidónico	<p>Descrição/definição: O óleo rico em ácido araquidónico, de cor amarela-clara, é obtido por fermentação das estirpes não geneticamente modificadas IS-4, I49-N18, FJRK-MA01 e CBS 210.32 do fungo <i>Mortierella alpina</i> utilizando um líquido adequado. O óleo é depois extraído da biomassa e purificado.</p> <p>Ácido araquidônico: ≥ 40 %, em peso, do teor total de ácidos gordos Ácidos gordos livres: ≤ 0,45 % do teor total de ácidos gordos Ácidos gordos <i>trans</i>: ≤ 0,5 % do teor total de ácidos gordos Matérias insaponificáveis: ≤ 1,5 % Índice de peróxidos: ≤ 5 meq/kg Índice de anisidina: ≤ 20 Índice de acidez: ≤ 1,0 KOH/g Humidade: ≤ 0,5 %</p>
Óleo de argão de <i>Argania spinosa</i>	<p>Descrição/definição: O óleo de argão é o óleo obtido por pressão a frio dos grãos do tipo amêndoas dos frutos de <i>Argania spinosa</i> (L.) Skeels. Os grãos podem ser torrados antes da prensagem, mas sem contacto direto com a chama.</p> <p>Composição: Ácido palmítico (C16:0): 12-15 % Ácido esteárico (C18:0): 5-7 % Ácido oleico (C18:1): 43-50 % Ácido linoleíco (C18:2): 29-36 % Matérias insaponificáveis: 0,3-2 % Esteróis totais: 100-500 mg/100 g Tocoferóis totais: 16-90 mg/100 g Ácido oleico: 0,2-1,5 % Índice de peróxidos: < 10 meq O₂/kg</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
Oleoresina rica em astaxantina da alga <i>Haematococcus pluvialis</i> <p>Descrição/definição:</p> <p>A astaxantina é um carotenoide produzido pela alga <i>Haematococcus pluvialis</i>. Os métodos de produção para o crescimento das algas são variáveis; podem ser utilizados sistemas fechados expostos à luz solar ou com iluminação artificial rigorosamente controlada; em alternativa podem ser utilizados tanques abertos. As células das algas são colhidas e secas; a oleoresina é extraída utilizando quer CO₂ supercrítico quer um solvente (acetato de etilo). A astaxantina é diluída e padronizada para 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % ou 20 % com azeite, óleo de cártamo, óleo de girassol ou triglicéridos de cadeia média.</p> <p>Composição da oleoresina:</p> <p>Gordura: 42,2-99 %</p> <p>Proteínas: 0,3-4,4 %</p> <p>Hidratos de carbono: 0-52,8 %</p> <p>Fibra: < 1,0 %</p> <p>Cinzas: 0,0-4,2 %</p> <p>Especificação dos carotenoides % m/m</p> <p>Astaxantinas totais: 2,9-11,1 %</p> <p>9-cis-Astaxantina: 0,3-17,3 %</p> <p>13-cis-Astaxantina: 0,2-7,0 %</p> <p>Monoésteres de astaxantina: 79,8-91,5 %</p> <p>Diésteres de astaxantina: 0,16-19,0 %</p> <p>β-Caroteno: 0,01-0,3 %</p> <p>Luteína: 0-1,8 %</p> <p>Cantaxantina: 0-1,30 %</p> <p>Critérios microbiológicos:</p> <p>Bactérias aeróbias totais: < 3 000 UFC/g</p> <p>Bolores e leveduras: < 100 UFC/g</p> <p>Coliformes: < 10 UFC/g</p> <p><i>E. coli</i>: Negativo</p> <p><i>Salmonella</i>: Negativo</p> <p><i>Staphylococcus</i>: Negativo</p>	

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
Sementes de manjericão (<i>Ocimum basilicum</i>)	<p>Descrição/definição:</p> <p>O manjericão (<i>Ocimum basilicum L.</i>) pertence à família das <i>Lamiaceae</i> na ordem <i>Lamiales</i>. Após a colheita, as sementes são limpas por meios mecânicos. As flores, folhas e outras partes da planta são removidas. É necessário assegurar um elevado nível de pureza das sementes de manjericão por filtração (ótica, mecânica). O processo de produção de sumos de frutas e de bebidas à base de misturas de frutas e de produtos hortícolas que contêm sementes de manjericão (<i>Ocimum basilicum L.</i>) inclui etapas de pré-hidratação e pasteurização das sementes. São efetuados controlos microbiológicos e estão em vigor sistemas de monitorização.</p> <p>Matéria seca: 94,1 %</p> <p>Proteínas: 20,7 %</p> <p>Gordura: 24,4 %</p> <p>Hidratos de carbono: 1,7 %</p> <p>Fibra alimentar: 40,5 % (Método: AOAC 958.29)</p> <p>Cinzas: 6,78 %</p>

▼M32

Betaína	<p>Descrição/definição</p> <p>A betaína (N,N,N-trimetilglicina ou carboxi-N,N,N-trimetilmetanamínio), nas formas anidra ($\text{CH}_3)_3\text{N}^+\text{CH}_2\text{COO}^-$ (N.º CAS: 107-43-7) e mono-hidrato ($\text{CH}_3)_3\text{N}^+\text{CH}_2\text{COO}^-\cdot\text{H}_2\text{O}$ (N.º CAS: 590-47-6) é obtida através do processamento de beterrabas-sacarinhas (ou seja, melaços, vinassa ou betaína-glicerol).</p> <p>Características/composição</p> <p>Aspetto: Cristais de cor branca fluidos</p> <p>Betaína: $\geq 99,0\%$ (m/m em peso seco)</p> <p>Humidade: $\leq 2,0\%$ (forma anidra); $\leq 15,0\%$ (forma mono-hidrato)</p> <p>Cinzas: $\leq 0,1\%$</p> <p>pH: 5,0-7,0</p> <p>Proteínas residuais: $\leq 1,0\text{ mg/g}$</p> <p>Metais pesados</p> <p>Arsénio: $< 0,1\text{ mg/kg}$</p> <p>Mercúrio: $< 0,005\text{ mg/kg}$</p> <p>Cádmio: $< 0,01\text{ mg/kg}$</p> <p>Chumbo: $< 0,05\text{ mg/kg}$</p>
----------------	---

▼M32

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Critérios microbiológicos</p> <p>Contagem de microrganismos viáveis totais: ≤ 100 UFC/g</p> <p>Coliformes: ausente/10 g</p> <p><i>Salmonella</i> sp.: ausente/25 g</p> <p>Leveduras: ≤ 10 UFC/g</p> <p>Bolores: ≤ 10 UFC/g</p> <p>UFC: unidades formadoras de colónias.</p>

▼M9

Extrato de soja preta fermentada	<p>Descrição/definição:</p> <p>O extrato de soja preta fermentada (extrato de <i>Touchi</i>) é um produto pulverulento fino castanho-claro, rico em proteínas, obtido por extração aquosa de sementes de soja preta (<i>Glycine max (L.) Merr.</i>) fermentadas com <i>Aspergillus oryzae</i>. O extrato contém um inibidor da α-glucosidase.</p> <p>Características:</p> <p>Gordura: ≤ 1,0 %</p> <p>Proteínas: ≥ 55 %</p> <p>Água: ≤ 7,0 %</p> <p>Cinzas: ≤ 10 %</p> <p>Hidratos de carbono: ≥ 20 %</p> <p>Atividade inibidora da α-glucosidase: CI50 no mínimo 0,025 mg/ml</p> <p>Isoflavona de soja: ≤ 0,3 g/100 g</p>
---	---

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
Lactoferrina bovina	<p>Descrição/definição:</p> <p>A lactoferrina bovina é uma proteína que está naturalmente presente no leite de vaca. Trata-se de uma glicoproteína que se liga ao ferro, tem um peso molecular de cerca de 77 kDa e consiste numa única cadeia polipeptídica com 689 aminoácidos.</p> <p>Processo de produção: A lactoferrina bovina é isolada a partir de leite desnatado ou de soro lácteo por operações de troca iônica e subsequente ultrafiltração. Por fim, é seca por liofilização ou atomização, retirando-se, por peneiração, as partículas de grandes dimensões. Produto pulverulento praticamente inodoro, rosa-claro.</p> <p>Propriedades fisico-químicas da lactoferrina bovina:</p> <p>Humidade: < 4,5 %</p> <p>Cinzas: < 1,5 %</p> <p>Arsénio: < 2,0 mg/kg</p> <p>Ferro: < 350 mg/kg</p> <p>Proteínas: > 93 %</p> <p>das quais lactoferrina bovina: > 95 %</p> <p>das quais outras proteínas: < 5,0 %</p> <p>pH (solução a 2 %, 20 °C): 5,2-7,2</p> <p>Solubilidade (solução a 2 %, 20 °C): total</p>
▼M34	<p>Isolado de proteína básica de soro de leite de bovino</p> <p>Descrição</p> <p>O isolado de proteína básica de soro de leite de bovino é um produto pulverulento cinzento amarelado obtido a partir de leite desnatado de bovino através de uma série de etapas de isolamento e purificação.</p> <p>Características/composição</p> <p>Proteína total (m/peso de produto): ≥ 90%</p> <p>Lactoferrina (m/peso de produto): 25-75%</p> <p>Lactoperoxidase (m/peso de produto): 10-40%</p> <p>Outras proteínas (m/peso de produto): ≤ 30%</p> <p>TGF-β2: 12-18 mg/100 g</p> <p>Humidade: ≤ 6,0%</p> <p>pH (solução a 5% m/v): 5,5-7,6</p>

▼M34

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Lactose: ≤ 3,0%</p> <p>Gordura: ≤ 4,5%</p> <p>Cinzas: ≤ 3,5%</p> <p>Ferro: ≤ 25 mg/100 g</p> <p>Metais pesados</p> <p>Chumbo: < 0,1 mg/kg</p> <p>Cádmio: < 0,2 mg/kg</p> <p>Mercúrio: < 0,6 mg/kg</p> <p>Arsénio: < 0,1 mg/kg</p> <p>Critérios microbiológicos</p> <p>Contagem de microrganismos mesófilos aeróbios: ≤ 10 000 UFC/g</p> <p><i>Enterobacteriaceae</i>: ≤ 10 UFC/g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: ausente/g</p> <p>Estafilococos coagulase positivos: ausente/g</p> <p><i>Salmonella</i>: ausente/25 g</p> <p><i>Listeria</i>: ausente/25 g</p> <p><i>Cronobacter</i> spp.: ausente/25 g</p> <p>Bolores: ≤ 50 UFC/g</p> <p>Leveduras: ≤ 50 UFC/g</p> <p>UFC: unidades formadoras de colónias</p>

▼M9

Óleo das sementes de <i>Buglossoides arvensis</i>	<p>Descrição/definição:</p> <p>O óleo refinado de <i>Buglossoides</i> é extraído das sementes de <i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst.</p> <p>Ácido alfa-linolénico: ≥ 35 % m/m dos ácidos gordos totais</p> <p>Ácido estearidónico: ≥ 15 % m/m dos ácidos gordos totais</p> <p>Ácido linoleíco: ≥ 8,0 % m/m dos ácidos gordos totais</p> <p>Ácidos gordos <i>trans</i>: ≤ 2,0 % m/m dos ácidos gordos totais</p>
---	--

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Índice de acidez: ≤ 0,6 mg KOH/g Índice de peróxidos: ≤ 5,0 meq O₂/kg Fração insaponificável: ≤ 2,0 % Teor de proteína (azoto total): ≤ 10 µg/ml Alcaloides de pirrolizidina: Não detetáveis com um limite de deteção de 4,0 µg/kg</p>
Óleo de <i>Calanus finmarchicus</i>	<p>Descrição/definição: O novo alimento é um óleo ligeiramente viscoso de cor rubi, com um leve odor a marisco, extraído do crustáceo <i>Calanus finmarchicus</i> (zooplâncton marinho). O ingrediente é constituído essencialmente por ésteres de cera (> 85 %) com pequenas quantidades de triglicéridos e de outros lípidos neutros.</p> <p>Especificações:</p> <p>Água: < 1,0 % Ésteres de cera: > 85 % Ácidos gordos totais: > 46 % Ácido icosapentaenoico (EPA): > 3,0 % Ácido docosa-hexaenoico (DHA): > 4,0 % Álcoois gordos totais: > 28 % Álcool gordo C20:1 n-9: > 9,0 % Álcool gordo C22:1 n-11: > 12 % Ácidos gordos <i>trans</i>: < 1,0 % Ésteres de astaxantina: < 0,1 % Índice de peróxidos: < 3,0 meq O₂/kg</p>
Base para goma de mascar (monometoxipolietilenoglicol)	<p>Descrição/definição: O novo ingrediente alimentar é um polímero sintético (número da patente WO2006016179). É constituído por polímeros ramificados de monometoxipolietilenoglicol (MPEG) enxertados em poliisopreno enxertado com anidrido maleico (PIP-g-MA) e MPEG que não reagiu (menos de 35 %, em peso).</p> <p>Cor branca a esbranquiçada. N.º CAS: 1246080-53-4</p> <p>Características:</p> <p>Humidade: < 5,0 %</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Alumínio: < 3,0 mg/kg Lítio: < 0,5 mg/kg Níquel: < 0,5 mg/kg Anidrido residual: < 15 µmol/g Índice de polidispersibilidade: < 1,4 Isopreno: < 0,05 mg/kg Óxido de etileno: < 0,2 mg/kg Anidrido maleico livre: < 0,1 % Oligómeros totais (inferior a 1 000 Dalton): ≤ 50 mg/kg Etilenoglicol: < 200 mg/kg Dietilenoglicol: < 30 mg/kg Éter metílico de monoetenoglicol: < 3,0 mg/kg Éter metílico de dietilenoglicol: < 4,0 mg/kg Éter metílico de trietenoglicol: < 7,0 mg/kg 1,4-Dioxano: < 2,0 mg/kg Formaldeído: < 10 mg/kg</p>
Base para goma de mascar (copolímero de éter metilvinílico-anidrido maleico)	<p>Descrição/definição: O copolímero de éter metilvinílico-anidrido maleico é um copolímero anidro de éter metilvinílico e anidrido maleico. Produto pulverulento fluido, de cor branca a esbranquiçada. N.º CAS: 9011-16-9</p> <p>Pureza: Doseamento: Pelo menos 99,5 % na matéria seca Viscosidade específica (1 % MEK): 2-10 Éter metilvinílico residual: ≤ 150 ppm Anidrido maleico residual: ≤ 250 ppm Acetaldeído: ≤ 500 ppm Metanol: ≤ 500 ppm Peróxido de dilauroílo: ≤ 15 ppm Total de metais pesados: ≤ 10 ppm</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Critérios microbiológicos: Microrganismos aeróbios totais (contagem em placa): ≤ 500 UFC/g Bolores/leveduras: ≤ 500 UFC/g <i>Escherichia coli</i>: Ensaio negativo <i>Salmonella</i>: Ensaio negativo <i>Staphylococcus aureus</i>: Ensaio negativo <i>Pseudomonas aeruginosa</i>: Ensaio negativo</p>
Óleo de chia de <i>Salvia hispanica</i>	<p>Descrição/definição: O óleo de chia é produzido a partir de sementes de chia (<i>Salvia hispanica L.</i>) (pureza 99,9 %) por pressão a frio. Não são utilizados solventes e, depois de prensado, o óleo é mantido em tanques de decantação e é aplicado um processo de filtração para a remoção de impurezas. Também pode ser produzido por extração com CO₂ supercrítico.</p> <p>Processo de produção: Produzido por pressão a frio. Não são utilizados solventes e, depois de prensado, o óleo é mantido em tanques de decantação e é aplicado um processo de filtração para a remoção de impurezas.</p> <p>Acidez expressa em ácido oleico: ≤ 2,0 % Índice de peróxidos: ≤ 10 meq/kg Impurezas insolúveis: ≤ 0,05 % Ácido alfa-linolénico: ≥ 60 % Ácido linoleico: 15-20 %</p>
Sementes de chia (<i>Salvia hispanica</i>)	<p>Descrição/definição: A chia (<i>Salvia hispanica L.</i>) é uma planta anual herbácea estival pertencente à família das <i>Labiatae</i>. Após a colheita, as sementes são limpas por meios mecânicos. As flores, folhas e outras partes da planta são removidas.</p> <p>Matéria seca: 90-97 % Proteínas: 15-26 % Gordura: 18-39 % Hidratos de carbono (*): 18-43 % Fibra bruta (**): 18-43 % Cinzas: 3-7 %</p> <p>(*) Os hidratos de carbono incluem o valor das fibras</p> <p>(**) A fibra bruta é a parte da fibra constituída principalmente por celulose, pentosanos e lenhina indigeríveis</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Processo de produção: O processo de produção de sumos de frutas e de bebidas de misturas de sumos de frutas que contêm sementes de chia inclui etapas de pré-hidratação e pasteurização das sementes. São efetuados controlos microbiológicos e estão em vigor sistemas de monitorização.</p>
Quitina-glucano de <i>Aspergillus niger</i>	<p>Descrição/definição: A quitina-glucano é obtida do micélio de <i>Aspergillus niger</i>; trata-se de um produto pulverulento ligeiramente amarelado, inodoro e fluido. Possui um teor de extrato seco de 90 % ou mais. A quitina-glucano é composta essencialmente por dois polissacáridos: — quitina, composta por unidades repetitivas de N-acetyl-D-glucosamina (n.º CAS: 1398-61-4), — beta(1,3)-glucano, composto por unidades repetitivas de D-glucose (n.º CAS: 9041-22-9). Perda por secagem: ≤ 10 % Quitina-glucano: ≥ 90 % Proporção quitina/glucano: 30:70 a 60:40 Cinzas: ≤ 3,0 % Lípidos: ≤ 1,0 % Proteínas: ≤ 6,0 %</p>
Complexo de quitina-glucano de <i>Fomes fomentarius</i>	<p>Descrição/definição: O complexo de quitina-glucano é obtido a partir das paredes celulares do corpo de frutificação do fungo <i>Fomes fomentarius</i>. É constituído essencialmente por dois polissacáridos: — quitina, composta por unidades repetitivas de N-acetyl-D-glucosamina (n.º CAS: 1398-61-4), — beta-(1,3)(1,6)-D-glucano, composto por unidades repetitivas de D-glucose (n.º CAS: 9041-22-9). O processo de produção é constituído por diversas etapas, nomeadamente: limpeza, redução do tamanho e moagem, amolecimento em água e aquecimento numa solução alcalina, lavagem e secagem. Não é realizada hidrólise durante o processo de produção. Aspetto: produto pulverulento de cor castanha, inodoro e insípido Pureza: Humidade: ≤ 15 % Cinzas: ≤ 3,0 % Quitina-glucano: ≥ 90 % Proporção quitina/glucano: 70:20 Hidratos de carbono totais, exceto glucanos: ≤ 0,1 %</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Proteínas: ≤ 2,0 % Lípidos: ≤ 1,0 % Melaninas: ≤ 8,3 % Aditivos: nenhum pH: 6,7-7,5</p> <p>Metais pesados: Chumbo (ppm): ≤ 1,00 Cádmio (ppm): ≤ 1,00 Mercúrio (ppm): ≤ 0,03 Arsénio (ppm): ≤ 0,20</p> <p>Critérios microbiológicos: Bactérias mesófilas totais: ≤ 10³/g Bolores e leveduras: ≤ 10³/g Coliformes a 30 °C: ≤ 10³/g <i>E. coli</i>: ≤ 10/g <i>Salmonella</i> e outras bactérias patogénicas: ausente/25 g</p>
Extrato de quitosano de fungos (<i>Agaricus bisporus</i>; <i>Aspergillus niger</i>)	<p>Descrição/definição: O extrato de quitosano [contendo principalmente poli(D-glucosamina)] é obtido a partir dos pedúnculos de <i>Agaricus bisporus</i> ou a partir do micélio de <i>Aspergillus niger</i>. O processo de produção patenteado é constituído por diversas etapas, nomeadamente: extração e desacetilação (hidrólise) em meio alcalino, solubilização em meio ácido, precipitação em meio alcalino, lavagem e secagem. Sinónimo: poli(D-glucosamina) N.º CAS do quitosano: 9012-76-4 Fórmula do quitosano: (C₆H₁₁NO₄)_n Aspetto: produto pulverulento fino e fluido Cor: de esbranquiçado a ligeiramente acastanhado Odor: inodoro</p> <p>Pureza: Teor de quitosano (% m/m peso seco): ≥ 85 Teor de glucano (% m/m peso seco): ≤ 15 Perda por secagem (% m/m peso seco): ≤ 10 Viscosidade (1 % em ácido acético a 1 %): 1-15</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Grau de desacetilação (em % mol/peso húmido): 0-30 Viscosidade (1 % em ácido acético a 1 %) (mPa.s): 1-14 para quitosano de <i>Aspergillus niger</i>; 12-25 para quitina de <i>Agaricus bisporus</i> Cinzas (% m/m peso seco): ≤ 3,0 Proteínas (% m/m peso seco): ≤ 2,0 Dimensão das partículas: > 100 nm Densidade compactada (g/cm³): 0,7-1,0 Capacidade de ligação a gorduras 800x (m/m peso húmido): superado</p> <p>Metais pesados:</p> <p>Mercúrio (ppm): ≤ 0,1 Chumbo (ppm): ≤ 1,0 Arsénio (ppm): ≤ 1,0 Cádmio (ppm): ≤ 0,5</p> <p>Critérios microbiológicos:</p> <p>Contagem de microrganismos aeróbios (UFC/g): ≤ 10³ Contagem de bolores e leveduras (UFC/g): ≤ 10³ <i>Escherichia coli</i> (UFC/g): ≤ 10 <i>Enterobacteriaceae</i> (UFC/g): ≤ 10 <i>Salmonella</i>: ausente/25 g <i>Listeria monocytogenes</i>: ausente/25 g</p>
Sulfato de condroitina	<p>Descrição/definição:</p> <p>O sulfato de condroitina (sal de sódio) é um produto bioquímico. É obtido por sulfatação química da condroitina derivada da fermentação com a estirpe U1-41 (ATCC 23502) da bactéria <i>Escherichia coli</i> O5:K4:H4.</p> <p>Sulfato de condroitina (sal de sódio) (% em base seca): 95-105 PM_m (média em massa) (kDa): 5-12 PM_n (média em número) (kDa): 4-11 Dispersibilidade (m_h/m_{0,05}): ≤ 0,7 Padrão de sulfatação (ΔDi-6S) (%): ≤ 85 Perda por secagem (%) (105 °C até peso constante): ≤ 10,0 Resíduo de incineração (% em base seca): 20-30 Proteínas (% em base seca): ≤ 0,5 Endotoxinas (UE/mg): ≤ 100 Impurezas orgânicas totais (mg/kg): ≤ 50</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
Picolinato de crómio	<p>Descrição/definição: O picolinato de crómio é um produto pulverulento fluido de cor avermelhada, ligeiramente solúvel em água a pH 7. O sal também é solúvel em solventes orgânicos polares.</p> <p>Denominação química: tris(2-piridinocarboxilato-N,O)crómio(III) ou sal de crómio(III) do ácido 2-piridinocarboxílico N.º CAS: 14639-25-9</p> <p>Fórmula química: Cr(C₆H₄NO₂)₃</p> <p>Características químicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Picolinato de crómio: ≥ 95 % Crómio (III): 12-13 % Crómio (VI): não detetado Água: ≤ 4,0 %
Ervá de <i>Cistus incanus</i> L. Pandalis	<p>Descrição: Ervá de <i>Cistus incanus</i> L. Pandalis; espécie pertencente à família <i>Cistaceae</i> e autóctone da região do Mediterrâneo, península de Chalkidiki.</p> <p>Composição:</p> <ul style="list-style-type: none"> Humidade: 9-10 g/100 g de ervá Proteínas: 6,1 g/100 g de ervá Gordura: 1,6 g/100 g de ervá Hidratos de carbono: 50,1 g/100 g de ervá Fibra: 27,1 g/100 g de ervá Minerais: 4,4 g/100 g de ervá <ul style="list-style-type: none"> Sódio: 0,18 g Potássio: 0,75 g Magnésio: 0,24 g Cálcio: 1,0 g Ferro: 65 mg Vitamina B₁: 3,0 µg Vitamina B₂: 30 µg Vitamina B₆: 54 µg Vitamina C: 28 mg Vitamina A: inferior a 0,1 mg Vitamina E: 40-50 mg

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Alfa-tocoferol: 20-50 mg Beta e Gama-tocoferol: 2-15 mg Delta-tocoferol: 0,1-2 mg</p>
Citicolina	<p>Descrição/definição: A citicolina é produzida por um processo microbiológico. A citicolina é composta por citosina, ribose, pirofosfato e colina. Produto pulverulento cristalino, de cor branca Denominação química: colina citidina 5'-pirofosfato, citidina 5'-(tri-hidrogenodifosfato) P⁺-[2-(trimetilamónio)etyl]éster, sal interno Fórmula química: C₁₄H₂₆N₄O₁₁P₂ Peso molecular: 488,32 g/mol N.º CAS: 987-78-0 pH (solução de amostra de 1 %): 2,5-3,5</p> <p>Pureza: Doseamento: ≥ 98 % de matéria seca Perda por secagem (100 °C durante 4 horas): ≤ 5,0 % Amónio: ≤ 0,05 % Arsénio: não superior a 2 ppm Ácidos fosfóricos livres: ≤ 0,1 % Ácido 5'-citidílico: ≤ 1,0 %</p> <p>Critérios microbiológicos: Contagem total em placa: ≤ 10³ UFC/g Bolores e leveduras: ≤ 10² UFC/g <i>Escherichia coli</i>: ausente em 1 g</p>
<i>Clostridium butyricum</i>	<p>Descrição/definição: O <i>Clostridium butyricum</i> (CBM-588) é uma bactéria Gram-positiva, formadora de esporos, anaeróbia obrigatória, não patogénica, não geneticamente modificada. Número de depósito FERM BP-2789</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Critérios microbiológicos:</p> <p>Contagem de microrganismos aeróbios viáveis totais: $\leq 10^3$ UFC/g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: não detetada em 1 g</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>: não detetado em 1 g</p> <p><i>Pseudomonas aeruginosa</i>: não detetada em 1 g</p> <p>Bolores e leveduras: $\leq 10^2$ UFC/g</p>

▼M29**D-ribose****Descrição**

A D-ribose é um monossacárido aldopentose que é produzida por fermentação com uma estirpe de *Bacillus subtilis* deficiente em transcetolase.

Fórmula química: C₅H₁₀O₅

N.º CAS: 50-69-1

Massa molecular: 150,13 Da

Características/composição

Aspetto: seco com consistência pulverulenta, de cor branca a ligeiramente amarela

Rotação específica $[\alpha]_D^{25}$: - 19,0° a - 21,0°

Pureza da D-ribose (% em base seca):

método de HPLC/RI (8) 98,0-102,0 %

Cinzas: < 0,2 %

Perda por secagem (humididade): < 0,5 %

Limpidez da solução: ≥ 95 % transmitância

Metais pesados

Chumbo: $\leq 0,1$ mg/kg

Arsénio: $\leq 0,1$ mg/kg

Cádmio: $\leq 0,1$ mg/kg

Mercúrio: $\leq 0,1$ mg/kg

Critérios microbiológicos

Contagem total em placa: ≤ 100 UFC (9)/g

Leveduras: ≤ 100 UFC/g

▼M29

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Bolores: ≤ 100 UFC/g Coliformes: ≤ 10 UFC/g <i>Salmonella</i> sp: ausente/25 g</p>

▼M9**Extrato de cacau em pó desengordurado**

Extrato de cacau (*Theobroma cacao* L.)
 Aspetto: produto pulverulento castanho-escuro isento de impurezas visíveis
 Propriedades fisico-químicas:
 Teor de polifenol: mín. 55,0 % de GAE
 Teor de teobromina: máx. 10,0 %
 Teor de cinzas: máx. 5,0 %
 Teor de humidade: máx. 8,0 %
 Densidade aparente: 0,40-0,55 g/cm³
 pH: 5,0-6,5
 Solvente residual: máx. 500 ppm

Extrato de cacau com baixo teor de gordura

Extrato de cacau (*Theobroma cacao* L.) com baixo teor de gordura
 Aspetto: produto pulverulento vermelho-escuro a púrpura
 Extrato de cacau, concentrado: mín. 99 %
 Dióxido de silício (auxiliar tecnológico): máx. 1,0 %
 Flavanóis de cacau: mín. 300 mg/g
 — Epicatequina: mín. 45 mg/g
 Perda por secagem: máx. 5,0 %

▼M28**Óleo de semente de coentros de *Coriandrum sativum*****Descrição/definição:**

O óleo de semente de coentros é um óleo que contém glicéridos de ácidos gordos produzido a partir de sementes de coentros, *Coriandrum sativum* L.
 Cor ligeiramente amarelada, sabor suave
 N.º CAS: 8008-52-4

▼M28

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Composição em ácidos gordos:</p> <p>Ácido palmitíco (C16:0): 2-5 %</p> <p>Ácido esteárico (C18:0): < 1,5 %</p> <p>Ácido petroselínico [<i>cis</i>-C18:1(n-12)]: 60-75 %</p> <p>Ácido oleico [<i>cis</i>-C18:1(n-9)]: 8-15 %</p> <p>Ácido linoleíco (C18:2): 12-19 %</p> <p>Ácido α-linolénico (C18:3): < 1,0 %</p> <p>Ácidos gordos <i>trans</i>: ≤ 1,0 %</p> <p>Pureza:</p> <p>Índice de refração (20 °C): 1,466-1,474</p> <p>Índice de acidez: ≤ 2,5 mg KOH/g</p> <p>Índice de peróxidos: ≤ 5,0 meq/kg</p> <p>Índice de iodo: 88-110 unidades</p> <p>Índice de saponificação: 179-200 mg KOH/g</p> <p>Matérias insaponificáveis: ≤ 15 g/kg</p>

▼M15

<p>Pó de extrato de airelas</p>	<p>Descrição/definição</p> <p>O pó de extrato de airelas é um extrato em pó rico em fenol, solúvel em água, preparado através de uma extração etanólica a partir do concentrado de sumo de bagas maduras e sás de airelas do cultivar <i>Vaccinium macrocarpon</i>.</p> <p>Características/composição</p> <p>Humidade (% m/m): ≤ 4</p> <p>Proantocianidinas - PAC (% m/m peso seco)</p> <ul style="list-style-type: none">— Método OSC-DMAC ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: 55,0-60,0 ou— Método BL-DMAC ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾: 15,0-18,0 <p>Fenóis totais (EAG ⁽⁶⁾, % m/m peso seco) ⁽⁵⁾</p> <ul style="list-style-type: none">— Método Folin-Ciocalteau: > 46,2 <p>Solubilidade (água): 100 %, sem partículas insolúveis visíveis</p>
--	--

▼M15

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Teor de etanol (mg/kg): ≤ 100 Análise granulométrica: 100 % através de um crivo de 30 mesh Aspetto e cheiro, na forma de pó: fluido, de cor vermelha intensa. Aroma terroso sem caráter queimado.</p> <p>Metais pesados Arsénio (ppm): < 3</p> <p>Critérios microbiológicos Leveduras: < 100 UFC (7)/g Bolores: < 100 UFC/g Microrganismos aeróbios (contagem em placa): < 1 000 UFC/g Coliformes: < 10 UFC/g <i>Escherichia coli</i>: < 10 UFC/g <i>Salmonella</i>: ausente em 375 g</p>

▼M9

Fruto seco de <i>Crataegus pinnatifida</i>	<p>Descrição/definição: Frutos secos da espécie <i>Crataegus pinnatifida</i> pertencente à família Rosaceae e autóctone do Norte da China e da Coreia.</p> <p>Composição: Matéria seca: 80 % Hidratos de carbono: 55 g/kg de peso fresco Frutose: 26,5-29,3 g/100 g Glucose: 25,5-28,1 g/100 g Vitamina C: 29,1 mg/100 g de peso fresco Sódio: 2,9 g/100 g de peso fresco As compotas são produtos obtidos por transformação térmica da parte comestível de uma ou mais espécies de frutos inteiros ou em pedaços, peneirados ou não, sem concentração significativa. Podem ser utilizados açúcares, água, cidra, especiarias e sumo de limão.</p>
α-Ciclodextrina	<p>Descrição/definição: Sacárido cílico não redutor constituído por seis unidades de D-glicopiranósil com ligações α-1,4, produzido pela ação da ciclodextrina glucosiltransferase (CGTase, EC 2.4.1.19) sobre o amido hidrolisado. A recuperação e a purificação da α-ciclodextrina podem realizar-se através de um dos</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>seguintes procedimentos: precipitação de um complexo de α-ciclodextrina com 1-decanol, dissolução em água a temperatura elevada e reprecipitação, extração por vapor (<i>stripping</i>) do complexante, e cristalização da α-ciclodextrina a partir da solução; ou cromatografia de troca iônica ou de filtração em gel seguida de cristalização da α-ciclodextrina a partir do licor-mãe purificado; ou métodos de separação por membranas, tais como a ultrafiltração ou a osmose inversa. Descrição: Sólido cristalino de cor branca ou esbranquiçada, praticamente inodoro</p> <p>Sinónimos: α-ciclodextrina, α-dextrina, ciclo-hexa-amilose, ciclomalto-hexaose, α-cicloamilase</p> <p>Denominação química: ciclo-hexa-amilose</p> <p>N.º CAS: 10016-20-3</p> <p>Fórmula química: $(C_6H_{10}O_5)_6$</p> <p>Massa molecular: 972,85</p> <p>Doseamento: $\geq 98\%$ (em base seca)</p> <p>Identificação:</p> <p>Intervalo de fusão: decompõe-se acima de 278 °C</p> <p>Solubilidade: muito solúvel em água; muito ligeiramente solúvel em etanol</p> <p>Rotação específica: $[\alpha]_D^{25}$: entre +145° e +151° (solução a 1 %)</p> <p>Cromatografia: o tempo de retenção para o pico principal num cromatograma da amostra obtido por cromatografia líquida corresponde ao da α-ciclodextrina num cromatograma de referência para essa substância (disponibilizado pelo <i>Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH</i>, Munique, Alemanha, ou por <i>Wacker Biochem Group</i>, Adrian, MI, EUA) nas condições descritas no ponto «Método de doseamento»</p> <p>Pureza:</p> <p>Água: $\leq 11\%$ (método de Karl Fischer)</p> <p>Complexante residual: $\leq 20\text{ mg/kg}$ (1-decanol)</p> <p>Substâncias redutoras: $\leq 0,5\%$ (expresso em glucose)</p> <p>Cinzas sulfatadas: $\leq 0,1\%$</p> <p>Chumbo: $\leq 0,5\text{ mg/kg}$</p> <p>Método de doseamento:</p> <p>Determinação por cromatografia líquida nas seguintes condições:</p> <p>Solução de amostra: pesar rigorosamente cerca de 100 mg da amostra de ensaio num balão volumétrico de 10 ml e adicionar 8 ml de água desionizada. Dissolver completamente a amostra num banho de ultrassons (10-15 min) e perfazer o volume do balão com água desionizada e purificada. Filtrar através de um filtro de 0,45 micron.</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Solução-padrão: pesar rigorosamente cerca de 100 mg de α-ciclodextrina num balão volumétrico de 10 ml e adicionar 8 ml de água desionizada. Dissolver completamente a amostra num banho de ultrassons e perfazer o volume do balão com água desionizada e purificada.</p> <p>Cromatografia: cromatógrafo de fase líquida equipado com um detetor de índice de refração e um integrador.</p> <p>Coluna e enchimento: Nucleosil-100-NH₂ (10 μm) (<i>Macherey & Nagel Co. Düren, Alemanha</i>) ou semelhante.</p> <p>Comprimento: 250 mm</p> <p>Diâmetro: 4 mm</p> <p>Temperatura: 40 °C</p> <p>Fase móvel: acetonitrilo/água (67/33, v/v)</p> <p>Caudal: 2,0 ml/min</p> <p>Volume injetado: 10 μl</p> <p>Procedimento: injetar a solução de amostra no cromatógrafo, registar o cromatograma e medir a área do pico da α-CD. Calcular a percentagem de α-ciclodextrina na amostra de ensaio da seguinte forma:</p> $\% \text{ } \alpha\text{-ciclodextrina (em base seca)} = 100 \times \frac{A_S/A_R}{W_R/W_S}$ <p>em que</p> <p>A_S e A_R são as áreas dos picos para a α-ciclodextrina na solução de amostra e na solução-padrão, respetivamente.</p> <p>W_S e W_R são os pesos (mg) da amostra de ensaio e do padrão de α-ciclodextrina, respetivamente, após correção do teor de água.</p>
γ -Ciclodextrina	<p>Descrição/definição:</p> <p>Sacárido cílico não redutor constituído por oito unidades de D-glicopiranossil com ligações α-1,4, produzido pela ação da ciclodextrina glucosiltransferase (CGTase, EC 2.4.1.19) sobre o amido hidrolisado. A recuperação e a purificação da γ-ciclodextrina podem ser efetuadas por precipitação de um complexo de γ-ciclodextrina com 8-ciclo-hexadecen-1-on, dissolução do complexo em água e n-decano, extração por vapor (<i>stripping</i>) da fase aquosa e recuperação da gama-CD da solução por cristalização.</p> <p>Sólido cristalino de cor branca ou esbranquiçada, praticamente inodoro</p> <p>Sinónimos: γ-ciclodextrina, γ-dextrina, ciclo-octa-amilose, ciclomalto-octaose, γ-ciclo-amilase</p> <p>Denominação química: ciclo-octa-amilose</p> <p>N.º CAS: 17465-86-0</p> <p>Fórmula química: (C₆H₁₀O₅)₈</p> <p>Doseamento: $\geq 98\%$ (em base seca)</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Identificação: Intervalo de fusão: decompõe-se acima de 285 °C Solubilidade: muito solúvel em água; muito ligeiramente solúvel em etanol Rotação específica: $[\alpha]_D^{25}$: entre +174° e +180° (solução 1 %)</p> <p>Pureza: Água: ≤ 11 % Complexante residual [8-ciclo-hexadecen-1-ona (CHDC)]: ≤ 4 mg/kg Solvente residual (n-decano): ≤ 6 mg/kg Substâncias redutoras: ≤ 0,5 % (expresso em glucose) Cinzas sulfatadas: ≤ 0,1 %</p>

▼M21

Grãos descascados de *Digitaria exilis* (Kippist) Stapf (fônio)
(alimento tradicional de um país terceiro)

Descrição/definição
O alimento tradicional consiste no grão descascado (com o farelo removido) de <i>Digitaria exilis</i> (Kippist) Stapf.
A <i>Digitaria exilis</i> (Kippist) Stapf é uma planta herbácea anual que pertence à família das <i>Poaceae</i> .
Componentes nutricionais típicos do grão descascado de fônio
Hidratos de carbono: 76,1 g/100 g de fônio Água: 12,4 g/100 g de fônio Proteínas: 6,9 g/100 g de fônio Lípidos: 1,2 g/100 g de fônio Fibras: 2,2 g/100 g de fônio Cinzas: 1,2 g/100 g de fônio Teor de fitato: ≤ 2,1 mg/g

▼M9

Preparação de dextrano produzido por *Leuconostoc mesenteroides*

- Forma pulverulenta:**
 Hidratos de carbono: 60 % com: (Dextrano: 50 %, Manitol: 0,5 %, Frutose: 0,3 %, Leucrose: 9,2 %)
 Proteínas: 6,5 %

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Lípidos: 0,5 % Ácido láctico: 10 % Etanol: vestígios Cinzas: 13 % Humidade: 10 %</p> <p>2. Forma líquida: Hidratos de carbono: 12 % com: (Dextrano: 6,9 %, Manitol: 1,1 %, Frutose: 1,9 %, Leucrose: 2,2 %) Proteínas: 2,0 % Lípidos: 0,1 % Ácido láctico: 2,0 % Etanol: 0,5 % Cinzas: 3,4 % Humidade: 80 %</p>
Óleo de diacilglicerol de origem vegetal	<p>Descrição/definição: Produzido a partir de glicerol e ácidos gordos derivados de óleos vegetais comestíveis, nomeadamente de óleo de soja (<i>Glycine max</i>) ou de colza (<i>Brassica campestris</i>, <i>Brassica napus</i>), utilizando uma enzima específica.</p> <p>Distribuição dos acilgliceróis: Diacilgliceróis (DAG): ≥ 80 % 1,3-Diacilgliceróis (1,3-DAG): ≥ 50 % Triacilgliceróis (TAG): ≤ 20 % Monoacilgliceróis (MAG): ≤ 5,0 %</p> <p>Composição em ácidos gordos (MAG, DAG, TAG): Ácido oleico (C18:1): 20-65 % Ácido linoleico (C18:2): 15-65 % Ácido linolénico (C18:3): ≤ 15 % Ácidos gordos saturados: ≤ 10 %</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Outros:</p> <p>Índice de acidez: ≤ 0,5 mg KOH/g</p> <p>Humidade e voláteis: ≤ 0,1 %</p> <p>Índice de peróxidos: ≤ 1,0 meq/kg</p> <p>Insaponificáveis: ≤ 2,0 %</p> <p>Ácidos gordos <i>trans</i> ≤ 1,0 %</p> <p>MAG: monoacilgliceróis, DAG: diacilgliceróis, TAG: triacilgliceróis</p>

Di-hidrocapsiato (DHC)	<p>Descrição/definição:</p> <p>O di-hidrocapsiato é sintetizado por esterificação catalisada por enzimas de álcool vanilílico e ácido 8-metilnonanóico. Após a esterificação, o di-hidrocapsiato é extraído com n-hexano.</p> <p>Líquido viscoso, incolor a amarelo</p> <p>Fórmula química: C₁₈ H₂₈ O₄</p> <p>N.º CAS: 205687-03-2</p> <p>Propriedades físico-químicas:</p> <p>Di-hidrocapsiato: > 94 %</p> <p>Ácido 8-metilnonanóico: < 6,0 %</p> <p>Álcool vanilílico: < 1,0 %</p> <p>Outras substâncias relacionadas com o processo de síntese: < 2,0 %</p>
-------------------------------	---

▼M13

Partes aéreas secas de <i>Hoodia parviflora</i>	<p>Descrição/definição:</p> <p>Trata-se da totalidade das partes aéreas secas de <i>Hoodia parviflora</i> N.E.Br. (família <i>Apocynaceae</i>)</p> <p>Características/composição</p> <p>Material vegetal: partes aéreas de vegetais com pelo menos três anos</p> <p>Aspetto: produto pulverulento fino, de cor verde clara a acastanhada</p> <p>Solubilidade (água): > 25 mg/ml</p> <p>Humidade: < 5,5 %</p> <p>A_w: < 0,3</p>
--	---

▼M13

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>pH: < 5,0</p> <p>Proteínas: < 4,5 g/100 g</p> <p>Gordura: < 3 g/100 g</p> <p>Hidratos de carbono (incluindo fibras alimentares): < 80 g/100 g</p> <p>Fibras alimentares: < 55 g/100 g</p> <p>Açúcares totais: < 10,5 g/100 g</p> <p>Cinzas: < 20 %</p> <p>Hoodigósidos</p> <p>P57: 5-50 mg/kg</p> <p>L: 1 000-6 000 mg/kg</p> <p>O: 500-5 000 mg/kg</p> <p>Total: 1 500-11 000 mg/kg</p> <p>Metais pesados:</p> <p>Arsénio: < 1,00 mg/kg</p> <p>Mercúrio: < 0,1 mg/kg</p> <p>Cádmio: < 0,1 mg/kg</p> <p>Chumbo: < 0,5 mg/kg</p> <p>Critérios microbiológicos:</p> <p>Microrganismos aeróbios (contagem em placa): < 10^5 UFC/g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: < 10 UFC/g</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>: < 50 UFC/g</p> <p>Coliformes totais: < 10 UFC/g</p> <p>Leveduras: ≤ 100 UFC/g</p> <p>Bolores: ≤ 100 UFC/g</p> <p>Espécies de <i>Salmonella</i>: ausentes/25 g</p> <p><i>Listeria monocytogenes</i>: ausente/25 g</p> <p>UFC: Unidades formadoras de colónias</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
Extrato seco de <i>Lippia citriodora</i> de culturas de células	Descrição/definição: Extrato seco de <i>Lippia citriodora</i> (Palau) Kunth de culturas de células HTN®Vb.
Extrato de <i>Echinacea angustifolia</i> de culturas de células	Descrição/definição: Extrato de raízes de <i>Echinacea angustifolia</i> obtido a partir da cultura de tecidos vegetais, que é substancialmente equivalente a um extrato de raízes de <i>Echinacea angustifolia</i> obtido em etanol-água titulado a 4 % de equinacósido.

▼M31

Extrato de <i>Echinacea purpurea</i> de culturas de células	Descrição/definição: Extrato seco de <i>Echinacea purpurea</i> de culturas de células EchiPure-PCT™
--	---

▼M9

Óleo de <i>Echium plantagineum</i>	Descrição/definição: O óleo de <i>Echium</i> (soagem) é um produto amarelo-pálido obtido da refinação do óleo extraído das sementes de <i>Echium plantagineum</i> L. Ácido estearidônico: ≥ 10 % m/m dos ácidos gordos totais Ácidos gordos <i>trans</i> : ≤ 2,0 % (m/m dos ácidos gordos totais) Índice de acidez: ≤ 0,6 mg KOH/g Índice de peróxidos: ≤ 5,0 meq O ₂ /kg Fração insaponificável: ≤ 2,0 % Teor de proteína (azoto total): ≤ 20 µg/ml Alcaloides de pirrolizidina: Não detetáveis com um limite de deteção de 4,0 µg/kg
---	---

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
▼M18 Hidrolisado de membrana de ovo <p>Descrição</p> <p>O hidrolisado de membrana de ovo é obtido a partir das membranas de cascas de ovos de galinha. As cascas são sujeitas a uma separação hidromecânica a fim de obter as membranas do ovo, que são posteriormente transformadas utilizando um método de solubilização patenteado. Na sequência do processo de solubilização, a solução é filtrada, concentrada, seca por atomização e embalada.</p> <p>Características/composição</p> <p>Parâmetros químicos</p> <p>Compostos azotados totais (% m/m): ≥ 88 Colagénio (% m/m): ≥ 15 Elastina (% m/m): ≥ 20 Glicosaminoglicanos totais (% m/m): ≥ 5 Cálcio: ≤ 1 %</p> <p>Parâmetros físicos</p> <p>pH: 6,5-7,6 Cinzas (% m/m): ≤ 8 Humidade (% m/m): ≤ 9 Atividade da água: ≤ 0,3 Solubilidade (em água): solúvel Densidade aparente: ≥ 0,6 g/cm³</p> <p>Metais pesados</p> <p>Arsénio ≤ 0,5 mg/kg</p> <p>Critérios microbiológicos</p> <p>Microrganismos aeróbios (contagem em placa): ≤ 2 500 UFC/g <i>Escherichia coli</i>: ≤ 5 NMP/g <i>Salmonella</i>: ausente (em 25 g) Coliformes: ≤ 10 NMP/g <i>Staphylococcus aureus</i>: ≤ 10 UFC/g Contagem de esporos de microrganismos mesófilos: ≤ 25 UFC/g Contagem de esporos de microrganismos termófilos: ≤ 10 UFC/10 g</p>	<p>Métodos</p> <p>Combustão de acordo com AOAC 990.03 e AOAC 992.15 Doseamento do colagénio solúvel SircolTM Doseamento da elastina FastinTM USP26 (método K0032 do sulfato de condroitina)</p>

▼M18

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Leveduras: ≤ 10 UFC/g Bolores: ≤ 200 UFC/g UFC: Unidades formadoras de colónias; NMP = número mais provável; USP: Farmacopeia dos Estados Unidos.</p>

▼M9**Galato de epigalocatequina como um extrato purificado de folhas de chá verde (*Camellia sinensis*)**

	<p>Descrição/definição: Um extrato altamente purificado a partir das folhas de chá verde (<i>Camellia sinensis (L.) Kuntze</i>), sob a forma de um produto pulverulento fino, de cor esbranquiçada a rosa pálido. É composto por um mínimo de 90 % de galato de epigalocatequina (EGCG), e tem um ponto de fusão compreendido entre aproximadamente 210 e 215 °C. Aspetto: produto pulverulento esbranquiçado a rosa pálido Denominação química: polifenol (-) epigalocatequina-3-galato Sinónimos: galato de epigalocatequina (EGCG) N.º CAS: 989-51-5 Denominação INCI: galato de epigalocatequina Massa molecular: 458,4 g/mol Perda por secagem: máx. 5,0 %</p> <p>Metais pesados: Arsénio: máx. 3,0 ppm Chumbo: máx. 5,0 ppm</p> <p>Doseamento: mín. 94 % de EGCG (expresso em matéria seca) máx. 0,1 % de cafeína Solubilidade: O EGCG é bastante solúvel em água, etanol, metanol e acetona</p>
--	--

L-Ergotioneína

	<i>Parâmetro</i>	<i>Especificação</i>	<i>Método</i>
	Aspetto	Produto pulverulento de cor branca	Exame visual
	Rotação ótica	$[\alpha]_D \geq (+) 122^\circ$ ($c = 1$, H_2O) ^{a)}	Polarimetria

Novo alimento autorizado	Especificações	
Pureza química	$\geq 99,5\%$ $\geq 99,0\%$	HPLC [Eur. Ph. 2.2.29] 1H-RMN
Identificação	Em conformidade com a estrutura C: $47,14 \pm 0,4\%$ H: $6,59 \pm 0,4\%$ N: $18,32 \pm 0,4\%$	1H-RMN Análise elementar
Solventes residuais totais (metanol, acetato de etilo, isopropanol, etanol)	[Eur. Ph. 01/2008:50400] $< 1\,000\text{ ppm}$	Cromatografia gasosa [Eur. Ph. 01/2008:20424]
Perda por secagem	Padrão interno $< 0,5\%$	[Eur. Ph. 01/2008:20232]
Impurezas	$< 0,8\%$	HPLC/GPC ou 1H-RMN
Metais pesados^{b) c)}		
Chumbo	$< 3,0\text{ ppm}$	ICP/AES:
Cádmio	$< 1,0\text{ ppm}$	(Pb, Cd)
Mercúrio	$< 0,1\text{ ppm}$	Fluorescência atómica (Hg)
Especificações microbiológicas^{b)}		
Contagem de microrganismos aeróbios viáveis totais	$\leq 1 \times 10^3\text{ UFC/g}$	[Eur. Ph. 01/2011:50104]
Contagem de bolores e leveduras totais	$\leq 1 \times 10^2\text{ UFC/g}$	
<i>Escherichia coli</i>	ausente em 1 g	

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Eur. Ph.: Farmacopeia Europeia; 1H-RMN: ressonância magnética nuclear do protão; HPLC: cromatografia líquida de alta resolução; GPC: cromatografia de filtração em gel; ICP/AES: espetroscopia de emissão atómica com plasma induutivo;</p> <p>UFC: unidades formadoras de colónias.</p> <p>a) Lit. $[\alpha]_D = (+) 126,6^\circ$ ($c = 1$, H_2O)</p> <p>b) Análises realizadas em cada lote</p> <p>c) Limites máximos em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1881/2006</p>
EDTA de sódio férrico	<p>Descrição/definição:</p> <p>O EDTA (ácido etilenodiaminotetracético) de sódio férrico é um produto pulverulento inodoro fluido de cor amarela-acastanhada com uma pureza química superior a 99 % (m/m). É muito solúvel em água.</p> <p>Fórmula química: $C_{10}H_{12}FeN_2NaO_8 * 3H_2O$</p> <p>Características químicas:</p> <p>pH de uma solução a 1 %: 3,5-5,5</p> <p>Ferro: 12,5-13,5 %</p> <p>Sódio: 5,5 %</p> <p>Água: 12,8 %</p> <p>Matéria orgânica (CHNO): 68,4 %</p> <p>EDTA: 65,5-70,5 %</p> <p>Matérias insolúveis em água: $\leq 0,1$ %</p> <p>Ácido nitrilotriacético: $\leq 0,1$ %</p>
Fosfato de amónio ferroso	<p>Descrição/definição:</p> <p>O fosfato de amónio ferroso é um produto pulverulento fino de cor verde acinzentada, praticamente insolúvel em água e solúvel em ácidos minerais diluídos.</p> <p>N.º CAS: 10101-60-7</p> <p>Fórmula química: $FeNH_4PO_4$</p> <p>Características químicas:</p> <p>pH de uma suspensão aquosa a 5 %: 6,8-7,8</p> <p>Ferro (total): ≥ 28 %</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Ferro (II): 22-30 % (m/m) Ferro (III): ≤ 7,0 % (m/m) Amónia: 5-9 % (m/m) Água: ≤ 3,0 %</p>
Péptidos de peixe de <i>Sardinops sagax</i>	<p>Descrição/definição: O novo ingrediente alimentar é uma mistura de péptidos obtida por hidrólise alcalina de músculo de peixe (<i>Sardinops sagax</i>) catalisada por protease, subsequente isolamento da fração peptídica por cromatografia em coluna, concentração em vácuo e secagem por atomização. Produto pulverulento branco-amareulado Péptidos⁽¹⁾ (péptidos de cadeia curta, dipéptidos e tripéptidos com um peso molecular inferior a 2 kDa): ≥ 85 g/100 g Val-Tyr (dipéptido): 0,1-0,16 g/100 g Cinzas: ≤ 10 g/100 g Humidade: ≤ 8 g/100 g ⁽¹⁾ método de Kjeldahl</p>
Flavonoides de <i>Glycyrrhiza glabra</i>	<p>Descrição/definição: Os flavonoides obtidos a partir de raízes ou rizomas de <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. são extraídos com etanol, seguindo-se outra extração desse extrato etanólico com triglicéridos de cadeia média. É um líquido castanho-escuro, contendo 2,5 % a 3,5 % de glabridina. Humidade: < 0,5 % Cinzas: < 0,1 % Índice de peróxidos: < 0,5 meq/kg Glabridina: 2,5-3,5 % de gordura Ácido glicirrícico: < 0,005 % Gordura, incluindo substâncias do tipo polifenol: ≥ 99 % Proteínas: < 0,1 % Hidratos de carbono: não detetáveis</p>
Extrato de fucoidano da alga <i>Fucus vesiculosus</i>	<p>Descrição/definição: O fucoidano da alga <i>Fucus vesiculosus</i> é extraído através de extração aquosa em solução ácida e de processos de filtração sem a utilização de solventes orgânicos. O extrato resultante é concentrado e seco para produzir o extrato de fucoidano com as seguintes especificações:</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Produto pulverulento esbranquiçado a castanho Odor e sabor: odor e sabor suaves Humidade: < 10 % (105 °C durante 2 horas) valor do pH: 4,0-7,0 (suspensão a 1 %, a 25 °C)</p> <p>Metais pesados:</p> <p>Arsénio (inorgânico): < 1,0 ppm Cádmio: < 3,0 ppm Chumbo: < 2,0 ppm Mercúrio: < 1,0 ppm</p>
	<p>Critérios microbiológicos:</p> <p>Contagem de microrganismos aeróbios totais: < 10 000 UFC/g Contagem de bolores e leveduras: < 100 UFC/g Contagem de enterobactérias totais: ausente/g <i>Escherichia coli</i>: ausente/g <i>Salmonella</i>: ausente/10 g <i>Staphylococcus aureus</i>: ausente/g Composição dos dois tipos de extratos autorizados, com base no nível de fucoidano: <i>Extrato 1</i>:</p> <p>Fucoidano: 75-95 % Alginato: 2,0-5,5 % Polifloroglucinol: 0,5-15 % Manitol: 1-5 % Sais naturais/Minerais livres: 0,5-2,5 % Outros hidratos de carbono: 0,5-1,0 % Proteínas: 2,0-2,5 % <i>Extrato 2</i>:</p> <p>Fucoidano: 60-65 %</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Alginato: 3,0-6,0 % Polifloroglucinol: 20-30 % Manitol: < 1,0 % Sais naturais/Minerais livres: 0,5-2,0 % Outros hidratos de carbono: 0,5-2,0 % Proteínas: 2,0-2,5 %</p>
Extrato de fucoidano da alga <i>Undaria pinnatifida</i>	<p>Descrição/definição: O fucoidano da alga <i>Undaria pinnatifida</i> é extraído através de extração aquosa em solução ácida e de processos de filtração sem a utilização de solventes orgânicos. O extrato resultante é concentrado e seco para produzir o extrato de fucoidano com as seguintes especificações: Produto pulverulento esbranquiçado a castanho Odor e sabor: odor e sabor suaves Humidade: < 10 % (105 °C durante 2 horas) valor do pH: 4,0-7,0 (suspenção a 1 %, a 25 °C)</p> <p>Metais pesados: Arsénio (inorgânico): < 1,0 ppm Cádmio: < 3,0 ppm Chumbo: < 2,0 ppm Mercúrio: < 1,0 ppm</p> <p>Microbiologia: Contagem de microrganismos aeróbios totais: < 10 000 UFC/g Contagem de bolores e leveduras: < 100 UFC/g Contagem de enterobactérias totais: ausente/g <i>Escherichia coli</i>: ausente/g <i>Salmonella</i>: ausente/10 g <i>Staphylococcus aureus</i>: ausente/g</p> <p>Composição dos dois tipos de extratos autorizados, com base no nível de fucoidano:</p> <p><i>Extrato 1:</i> Fucoidano: 75-95 % Alginato: 2,0-6,5 %</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Polifloroglucinol: 0,5-3,0 % Manitol: 1-10 % Sais naturais/Minerais livres: 0,5-1,0 % Outros hidratos de carbono: 0,5-2,0 % Proteínas: 2,0-2,5 % <i>Extrato 2:</i> Fucoidano: 50-55 % Alginato: 2,0-4,0 % Polifloroglucinol: 1,0-3,0 % Manitol: 25-35 % Sais naturais/Minerais livres: 8-10 % Outros hidratos de carbono: 0,5-2,0 % Proteínas: 1,0-1,5 %</p>
2'-Fucosil-lactose (sintética)	<p>Definição: Denominação química: α-L-fucopiranosil-(1\rightarrow2)-β-D-galactopiranosil-(1\rightarrow4)- D-glucopiranose Fórmula química: C₁₈H₃₂O₁₅ N.º CAS: 41263-94-9 Peso molecular: 488,44 g/mol</p> <p>Descrição: A 2'-fucosil-lactose é um produto pulverulento, de cor branca a esbranquiçada, que é produzido através de um processo de síntese química.</p> <p>Pureza:</p> <p>2'-Fucosil-lactose: \geq 95 % D-Lactose: \leq 1,0 % m/m L-Fucose: \leq 1,0 % m/m Isómeros de difucosil-D-lactose: \leq 1,0 % m/m 2'-Fucosil-D-lactulose: \leq 0,6 % m/m pH (solução a 5 %, 20 °C): 3,2-7,0 Água (%): \leq 9,0 % Cinzas sulfatadas: \leq 0,2 %</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações						
	<p>Ácido acético: ≤ 0,3 %</p> <p>Solventes residuais (metanol, 2-propanol, acetato de metilo, acetona): ≤ 50,0 mg/kg, estremos, ≤ 200,0 mg/kg, combinados</p> <p>Proteínas residuais: ≤ 0,01 %</p> <p>Metais pesados:</p> <p>Paládio: ≤ 0,1 mg/kg</p> <p>Níquel: ≤ 3,0 mg/kg</p> <p>Critérios microbiológicos:</p> <p>Contagem total de bactérias mesófilas aeróbias: ≤ 500 UFC/g</p> <p>Bolores e leveduras: ≤ 10 UFC/g</p> <p>Endotoxinas residuais: ≤ 10 UE/mg</p>						
2'-Fucosil-lactose (fonte microbiana)	<p>►M27 Definição:</p> <p>Denominação química: α-L-fucopiranosil-(1→2)-β-D-galactopiranosil-(1→4)-D-glucopiranose</p> <p>Fórmula química: C₁₈H₃₂O₁₅</p> <p>N.º CAS: 41263-94-9</p> <p>Peso molecular: 488,44 g/mol</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Fonte: Estirpe geneticamente modificada de <i>Escherichia coli</i> K-12</td><td style="padding: 5px;">Fonte: Estirpe geneticamente modificada de <i>Escherichia coli</i> BL21</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Descrição: A 2'-fucosil-lactose é um produto pulverulento, de cor branca a esbranquiçada, que é produzido por um processo microbiológico.</td><td style="padding: 5px;">Descrição: A 2'-fucosil-lactose é um produto pulverulento, de cor branca a esbranquiçada, e a solução aquosa concentrada (45 % ± 5 % m/v) é límpida, incolor a ligeiramente amarela. A 2'-fucosil-lactose é produzida por um processo microbiológico.</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Pureza: 2'-Fucosil-lactose: ≥ 83 % D-Lactose: ≤ 10,0 % L-Fucose: ≤ 2,0 % Difucosil-D-lactose: ≤ 5,0 % 2'-Fucosil-D-lactulose: ≤ 1,5 % Soma dos sacáridos (2'-fucosil-lactose, D-lactose, L-fucose, difucosil-D-lactose, 2'-fucosil-D-lactulose): ≥ 90 % pH (solução a 5 %, 20 °C): 3,0-7,5 Água: ≤ 9,0 %</td><td style="padding: 5px;">Pureza: 2'-Fucosil-lactose: ≥ 90 % Lactose: ≤ 5,0 % Fucose: ≤ 3,0 % 3-Fucosil-lactose: ≤ 5,0 % Fucosil-galactose: ≤ 3,0 % Difucosil-lactose: ≤ 5,0 %</td></tr> </table>	Fonte: Estirpe geneticamente modificada de <i>Escherichia coli</i> K-12	Fonte: Estirpe geneticamente modificada de <i>Escherichia coli</i> BL21	Descrição: A 2'-fucosil-lactose é um produto pulverulento, de cor branca a esbranquiçada, que é produzido por um processo microbiológico.	Descrição: A 2'-fucosil-lactose é um produto pulverulento, de cor branca a esbranquiçada, e a solução aquosa concentrada (45 % ± 5 % m/v) é límpida, incolor a ligeiramente amarela. A 2'-fucosil-lactose é produzida por um processo microbiológico.	Pureza: 2'-Fucosil-lactose: ≥ 83 % D-Lactose: ≤ 10,0 % L-Fucose: ≤ 2,0 % Difucosil-D-lactose: ≤ 5,0 % 2'-Fucosil-D-lactulose: ≤ 1,5 % Soma dos sacáridos (2'-fucosil-lactose, D-lactose, L-fucose, difucosil-D-lactose, 2'-fucosil-D-lactulose): ≥ 90 % pH (solução a 5 %, 20 °C): 3,0-7,5 Água: ≤ 9,0 %	Pureza: 2'-Fucosil-lactose: ≥ 90 % Lactose: ≤ 5,0 % Fucose: ≤ 3,0 % 3-Fucosil-lactose: ≤ 5,0 % Fucosil-galactose: ≤ 3,0 % Difucosil-lactose: ≤ 5,0 %
Fonte: Estirpe geneticamente modificada de <i>Escherichia coli</i> K-12	Fonte: Estirpe geneticamente modificada de <i>Escherichia coli</i> BL21						
Descrição: A 2'-fucosil-lactose é um produto pulverulento, de cor branca a esbranquiçada, que é produzido por um processo microbiológico.	Descrição: A 2'-fucosil-lactose é um produto pulverulento, de cor branca a esbranquiçada, e a solução aquosa concentrada (45 % ± 5 % m/v) é límpida, incolor a ligeiramente amarela. A 2'-fucosil-lactose é produzida por um processo microbiológico.						
Pureza: 2'-Fucosil-lactose: ≥ 83 % D-Lactose: ≤ 10,0 % L-Fucose: ≤ 2,0 % Difucosil-D-lactose: ≤ 5,0 % 2'-Fucosil-D-lactulose: ≤ 1,5 % Soma dos sacáridos (2'-fucosil-lactose, D-lactose, L-fucose, difucosil-D-lactose, 2'-fucosil-D-lactulose): ≥ 90 % pH (solução a 5 %, 20 °C): 3,0-7,5 Água: ≤ 9,0 %	Pureza: 2'-Fucosil-lactose: ≥ 90 % Lactose: ≤ 5,0 % Fucose: ≤ 3,0 % 3-Fucosil-lactose: ≤ 5,0 % Fucosil-galactose: ≤ 3,0 % Difucosil-lactose: ≤ 5,0 %						

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Cinzas sulfatadas: ≤ 2,0 % Ácido acético: ≤ 1,0 % Proteínas residuais: ≤ 0,01 %</p> <p>Critérios microbiológicos: Contagem total de bactérias mesófilas aeróbias: ≤ 3 000 UFC/g Leveduras: ≤ 100 UFC/g Bolores: ≤ 100 UFC/g Endotoxinas: ≤ 10 UE/mg</p> <p>Glucose: ≤ 3,0 % Galactose: ≤ 3,0 % Água: ≤ 9,0 % (pó) Cinzas sulfatadas: ≤ 0,5 % (pó e líquido) Proteínas residuais: ≤ 0,01 % (pó e líquido)</p> <p>Metais pesados: Chumbo: ≤ 0,02 mg/kg (pó e líquido) Arsénio: ≤ 0,2 mg/kg (pó e líquido) Cádmio: ≤ 0,1 mg/kg (pó e líquido) Mercúrio: ≤ 0,5 mg/kg (pó e líquido)</p> <p>Critérios microbiológicos: Contagem total em placa: ≤ 10⁴ UFC/g (pó), ≤ 5 000 UFC/g (líquido) Bolores e leveduras: ≤ 100 UFC/g (pó); ≤ 50 UFC/g (líquido) <i>Enterobacteriaceae</i>/Coliformes: ausentes em 11 g (pó e líquido) <i>Salmonella</i>: negativa/100 g (pó), negativa/200 ml (líquido) <i>Cronobacter</i>: negativa/100 g (pó), negativa/200 ml (líquido) Endotoxinas: ≤ 100 UE/g (pó), ≤ 100 UE/ml (líquido) Aflatoxina M1: ≤ 0,025 µg/kg (pó e líquido) ◀</p>

▼M36

**Mistura de 2'-fucosil-lactose/difucosil-lactose («2'-FL/DFL»)
(fonte microbiana)**

Descrição/definição:

A mistura de 2'-fucosil-lactose/difucosil-lactose é um produto pulverulento amorfado purificado, de cor branca a esbranquiçada, que é produzido por um processo microbiano. Após a depuração, a mistura de 2'-fucosil-lactose/difucosil-lactose é isolada por secagem por pulverização.

Fonte: Estirpe geneticamente modificada de *Escherichia coli* K-12 DH1

Características/composição

Aspetto: Produto pulverulento ou aglomerados de cor branca a esbranquiçada

Soma de 2'-fucosil-lactose, difucosil-lactose, lactose e fucose (% de matéria seca): ≥ 92,0 % (m/m)

Soma de 2'-fucosil-lactose e difucosil-lactose (% de matéria seca): ≥ 85,0 % (m/m)

2'-Fucosil-lactose (% de matéria seca): ≥ 75,0 % (m/m)

▼M36

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Difucosil-lactose (% de matéria seca): $\geq 5,0\%$ (m/m)</p> <p>D-Lactose: $\leq 10,0\%$ (m/m)</p> <p>L-Fucose: $\leq 1,0\%$ (m/m)</p> <p>2'-Fucosil-D-lactulose: $\leq 2,0\%$ (m/m)</p> <p>Soma de outros hidratos de carbono (⁽¹⁾): $\leq 6,0\%$ (m/m)</p> <p>Humidade: $\leq 6,0\%$ (m/m)</p> <p>Cinzas sulfatadas: $\leq 0,8\%$ (m/m)</p> <p>pH (solução a 5 %, 20 °C): 4,0-6,0</p> <p>Proteínas residuais: $\leq 0,01\%$ (m/m)</p> <p>Critérios microbiológicos:</p> <p>Contagem total em placa de bactérias mesófilas aeróbias: ≤ 1000 UFC/g</p> <p><i>Enterobacteriaceae</i>: ≤ 10 UFC/g</p> <p><i>Salmonella</i> sp.: Ausente/25 g</p> <p>Leveduras: ≤ 100 UFC/g</p> <p>Bolores: ≤ 100 UFC/g</p> <p>Endotoxinas residuais: ≤ 10 UE/mg</p> <p>UFC: unidades formadoras de colónias; UE: unidades de endotoxinas</p>

▼M9

<p>Galacto-oligossacárido</p>	<p>Descrição/definição:</p> <p>O galacto-oligossacárido é produzido a partir da lactose do leite por um processo enzimático utilizando β-galactosidases de <i>Aspergillus oryzae</i>, <i>Bifidobacterium bifidum</i>, <i>Pichia pastoris</i>, <i>Sporobolomyces singularis</i>, <i>Kluyveromyces lactis</i>, <i>Bacillus circulans</i> e <i>Papiliotrema terrestris</i>.</p> <p>GOS: mín. 46 % da matéria seca (MS)</p> <p>Lactose: máx. 40 % da MS</p> <p>Glucose: máx. 27 % da MS</p> <p>Galactose: min. 0,8 % da MS</p> <p>Cinzas: máx. 4,0 % da MS</p> <p>Proteínas: máx. 4,5 % da MS</p> <p>Nitrito: máx. 2 mg/kg</p>
--------------------------------------	--

Novo alimento autorizado	Especificações
Glucosamina HCl de <i>Aspergillus niger</i> e da estirpe geneticamente modificada de <i>E. coli</i> K-12	<p>Produto pulverulento cristalino, de cor branca, inodoro</p> <p>Fórmula molecular: $C_6H_{13}NO_5 \cdot HCl$</p> <p>Massa molecular relativa: 215,63 g/mol</p> <p>D-Glucosamina HCl: 98,0-102,0 % do padrão de referência (HPLC)</p> <p>Rotação específica: +70,0° - +73,0°</p>
Sulfato de glucosamina KCl de <i>Aspergillus niger</i> e da estirpe geneticamente modificada de <i>E. coli</i> K-12	<p>Produto pulverulento cristalino, de cor branca, inodoro</p> <p>Fórmula molecular: $(C_6H_{14}NO_5)_2SO_4 \cdot 2KCl$</p> <p>Massa molecular relativa: 605,52 g/mol</p> <p>Sulfato de D-glucosamina 2KCl: 98,0-102,0 % do padrão de referência (HPLC)</p> <p>Rotação específica: +50,0° a +52,0°</p>
Sulfato de glucosamina NaCl de <i>Aspergillus niger</i> e da estirpe geneticamente modificada de <i>E. coli</i> K-12	<p>Produto pulverulento cristalino, de cor branca, inodoro</p> <p>Fórmula molecular: $(C_6H_{14}NO_5)_2SO_4 \cdot 2NaCl$</p> <p>Massa molecular relativa: 573,31 g/mol</p> <p>D-Glucosamina HCl: 98-102 % do padrão de referência (HPLC)</p> <p>Rotação ótica específica: +52° - +54°</p>
Goma de guar	<p>Descrição/definição:</p> <p>A goma de guar nativa é o endosperma moído de sementes de variedades naturais de guar, <i>Cyamopsis tetragonolobus</i> L. Taub. (família Leguminosae). Consiste num polissacárido de elevado peso molecular, constituído essencialmente por unidades de galactopiranose e manopiranose combinadas através de ligações glicosídicas, o que, do ponto de vista químico, pode ser classificado de galactomanano (teor de galactomanano não inferior a 75 %).</p> <p>Aspetto: produto pulverulento branco a amarelado</p> <p>Peso molecular: entre 50 000-8 000 000 Daltons</p> <p>N.º CAS: 9000-30-0</p> <p>Número EINECS: 232-536-8</p> <p>Pureza: Tal como especificado no Regulamento (UE) n.º 231/2012 da Comissão, que estabelece especificações para os aditivos alimentares enumerados nos anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho⁽¹⁾ e no Regulamento de Execução (UE) 2015/175 da Comissão, de 5 de fevereiro de 2015, que fixa condições especiais aplicáveis às importações de goma de guar originária ou expedida da Índia devido ao risco de contaminação por pentaclorofenol e dioxinas⁽²⁾.</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Propriedades físico-químicas:</p> <p>Produto pulverulento</p> <p>Prazo de validade: 2 anos</p> <p>Cor: branco</p> <p>Odor: ligeiro</p> <p>Diâmetro médio das partículas: 60-70 µm</p> <p>Humidade: máx. 15 %</p> <p>Viscosidade * a 1 hora: —</p> <p>Viscosidade * a 2 horas: mín. 3 600 mPa.s</p> <p>Viscosidade * a 24 horas: mín. 4 000 mPa.s</p> <p>Solubilidade: solúvel em água quente e fria</p> <p>pH para 10 g/l, a 25 °C: 6-7,5</p> <p>Flocos</p> <p>Vida útil: 1 ano</p> <p>Cor: branco/esbranquiçado com ausência ou presença mínima de pontos pretos</p> <p>Odor: ligeiro</p> <p>Diâmetro médio das partículas: 1-10 mm</p> <p>Humidade: máx. 15 %</p> <p>Viscosidade * a 1 hora: mín. 3 000 mPa.s</p> <p>Viscosidade * a 2 horas: —</p> <p>Viscosidade * a 24 horas: —</p> <p>Solubilidade: solúvel em água quente e fria</p> <p>pH para 10 g/l, a 25 °C: 5-7,5</p> <p>(*) As medidas da viscosidade são realizadas nas seguintes condições: 1 %, 25 °C, 20 rpm</p>
<p>Produtos lácteos tratados termicamente e fermentados com <i>Bacteroides xylanisolvans</i></p>	<p>Descrição/definição:</p> <p>Os produtos lácteos tratados termicamente e fermentados são produzidos utilizando <i>Bacteroides xylanisolvans</i> (DSM 23964) como inóculo.</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>O leite meio-gordo (entre 1,5 % e 1,8 % de gordura) ou o leite magro (0,5 % ou menos de gordura) é pasteurizado ou ultrapasteurizado (processo UHT) antes do início da fermentação com <i>Bacteroides xyloisolvans</i> (DSM 23964). O produto lácteo fermentado resultante é homogeneizado e, em seguida, é submetido a tratamento térmico para inativar a <i>Bacteroides xyloisolvans</i> (DSM 23964). O produto final não contém células viáveis de <i>Bacteroides xyloisolvans</i> (DSM 23964)(¹).</p> <p>(¹) DIN EN ISO 21528-2 modificada.</p>
Hidroxitirosol	<p>Descrição/definição: O hidroxitirosol é um líquido viscoso amarelo pálido obtido por síntese química.</p> <p>Fórmula molecular: C₈H₁₀O₃</p> <p>Peso molecular: 154,6 g/mol</p> <p>N.º CAS: 10597-60-1</p> <p>Humidade: ≤ 0,4 %</p> <p>Odor: característico</p> <p>Sabor: ligeiramente amargo</p> <p>Solubilidade (água): miscível com água</p> <p>pH: 3,5-4,5</p> <p>Índice de refração: 1,571-1,575</p> <p>Pureza: Hidroxitirosol: ≥ 99 %</p> <p>Ácido acético: ≤ 0,4 %</p> <p>Acetato de hidroxitirosol: ≤ 0,3 %</p> <p>Soma de ácido homovanílico, ácido iso-homovanílico e 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol: ≤ 0,3 %</p> <p>Metais pesados Chumbo: ≤ 0,03 mg/kg</p> <p>Cádmio: ≤ 0,01 mg/kg</p> <p>Mercúrio: ≤ 0,01 mg/kg</p> <p>Solventes residuais Acetato de etilo: ≤ 25,0 mg/kg</p> <p>Isopropanol: ≤ 2,50 mg/kg</p> <p>Metanol: ≤ 2,00 mg/kg</p> <p>Tetra-hidrofurano: ≤ 0,01 mg/kg</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
Proteína estruturante de gelo de tipo III HPLC 12	<p>Descrição/definição: A preparação de proteína estruturante de gelo (ISP) é um líquido castanho-claro produzido pela fermentação submersa de uma estirpe geneticamente modificada de levedura de padeiro alimentar (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) em cujo genoma foi introduzido um gene sintético para a ISP. A proteína é expressa e excretada no meio de crescimento onde é separada das células de levedura através de microfiltração e concentrada através de ultrafiltração. Em resultado, as células de levedura não são transferidas para a preparação de ISP como tal nem numa forma alterada. A preparação de ISP consiste em ISP nativa, ISP glicosilada e proteínas e péptidos da levedura e açúcares, bem como ácidos e sais normalmente presentes em géneros alimentícios. O concentrado é estabilizado com um tampão de ácido cítrico 10 mM.</p> <p>Doseamento: ≥ 5 g/l ISP ativa pH: 2,5-3,5 Cinzas: ≤ 2,0 % ADN: não detetável</p>
Extractos aquosos de folhas secas de <i>Ilex guayusa</i>	<p>Descrição/definição: Líquido castanho escuro. Extractos aquosos de folhas secas de <i>Ilex guayusa</i>.</p> <p>Composição: Proteínas: < 0,1 g/100 ml Gordura: < 0,1 g/100 ml Hidratos de carbono: 0,2-0,3 g/100 ml Açúcares totais: < 0,2 g/100 ml Cafeína: 19,8-57,7 mg/100 ml Teobromina: 0,14-2,0 mg/100 ml Ácidos clorogénicos: 9,9-72,4 mg/100 ml</p>
Isomalto-oligossacárido	<p>Produto pulverulento: Solubilidade (água) (%): > 99 Glucose (% em base seca): ≤ 5,0 Isomaltose + DP3 a DP9 (% em base seca): ≥ 90 Humidade (%): ≤ 4,0 Cinzas sulfatadas (g/100 g): ≤ 0,3</p> <p>Metais pesados: Chumbo (mg/kg): ≤ 0,5 Arsénio (mg/kg): ≤ 0,5</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Xarope: Sólidos secos (g/100 g): > 75 Glucose (% em base seca): ≤ 5,0 Isomaltose + DP3 a DP9 (% em base seca): ≥ 90 pH: 4-6 Cinzas sulfatadas (g/100 g): ≤ 0,3</p> <p>Metais pesados: Chumbo (mg/kg): ≤ 0,5 Arsénio (mg/kg): ≤ 0,5</p>
Isomaltulose	<p>Descrição/definição: Um dissacárido redutor formado por um grupo glucose e um grupo frutose através duma ligação alfa-1,6-glucosídica. É produzido a partir da sacarose por um processo enzimático. O produto comercial é a forma mono-hidratada. Aspetto: produto cristalino de cor branca ou esbranquiçada, praticamente inodoro e com sabor doce. Denominação química: 6-O-α-D-glucopiranosil-D-frutofuranose, mono-hidrato N.º CAS: 13718-94-0 Fórmula química: C₁₂H₂₂O₁₁ · H₂O Fórmula estrutural</p> <div data-bbox="608 949 1140 1203"></div> <p>Massa molecular: 360,3 (mono-hidrato)</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Pureza: Doseamento: ≥ 98 % em base seca Perda por secagem: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 horas)</p> <p>Metais pesados: Chumbo: ≤ 0,1 mg/kg Fazer a determinação usando uma técnica de absorção atómica apropriada ao nível especificado. A seleção da dimensão da amostra e do método de preparação da amostra pode basear-se nos princípios do método descrito em FNP 5⁽¹⁾, «Métodos instrumentais».</p> <p>(¹) «Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 — Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials» (JECFA), 1991, 322 p., inglês, ISBN 92-5-102991-1.</p>
Lactitol	<p>Descrição/definição: Produto pulverulento cristalino ou solução incolor produzida por hidrogenação catalítica da lactose. Os produtos cristalinos podem apresentar-se nas formas anidra, mono-hidratada ou di-hidratada. Utiliza-se o níquel como catalisador. Denominação química: 4-O-β-D-galactopiranosil-D-glucitol Fórmula química: C₁₂H₂₄O₁₁ Peso molecular: 344,31 g/mol N.º CAS: 585-86-4</p> <p>Pureza: Solubilidade (em água): muito solúvel em água Rotação específica $[\alpha]_D^{20} = +13^\circ$ a $+16^\circ$ Doseamento: ≥ 95 % (peso seco) Água: ≤ 10,5 % Outros polióis: ≤ 2,5 % (peso seco) Açúcares redutores: ≤ 0,2 % (peso seco) Cloreto: ≤ 100 mg/kg (peso seco) Sulfatos: ≤ 200 mg/kg (peso seco) Cinzas sulfatadas: ≤ 0,1 % (peso seco) Níquel: ≤ 2,0 mg/kg (peso seco) Arsénio: ≤ 3,0 mg/kg (peso seco) Chumbo: ≤ 1,0 mg/kg (peso seco)</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
Lacto-N-neotetraose (sintética)	<p>Definição: Denominação química: β-D-galactopiranosil-(1\rightarrow4)-2-acetamido-2-desoxi-β-D-glucopiranosil-(1\rightarrow3)-β-D-galactopiranosil-(1\rightarrow4)-D-glucopiranose Fórmula química: C₂₆H₄₅NO₂₁ N.º CAS: 13007-32-4 Peso molecular: 707,63 g/mol</p> <p>Descrição: A lacto-N-neotetraose é um produto pulverulento, de cor branca a esbranquiçada. Produzida por um processo de síntese química e isolada por cristalização.</p> <p>Pureza:</p> <p>Doseamento (sem água): \geq 96 % D-Lactose: \leq 1,0 % Lacto-N-triose II: \leq 0,3 % Isómero de lacto-N-neotetraose frutose: \leq 0,6 % pH (solução a 5 %, 20 °C): 5,0-7,0 Água: \leq 9,0 % Cinzas sulfatadas: \leq 0,4 % Ácido acético: \leq 0,3 % Solventes residuais (metanol, 2-propanol, acetato de metilo, acetona): \leq 50 mg/kg, estremos, \leq 200 mg/kg, combinados Proteínas residuais: \leq 0,01 % Paládio: \leq 0,1 mg/kg Níquel: \leq 3,0 mg/kg</p> <p>Critérios microbiológicos: Contagem total de bactérias mesófilas aeróbias: \leq 500 UFC/g Leveduras: \leq 10 UFC/g Bolores: \leq 10 UFC/g Endotoxinas residuais: \leq 10 UE/mg</p>
Lacto-N-neotetraose (fonte microbiana)	<p>Definição: Denominação química: β-D-galactopiranosil-(1\rightarrow4)-2-acetamido-2-desoxi-β-D-glucopiranosil-(1\rightarrow3)-β-D-galactopiranosil-(1\rightarrow4)-D-glucopiranose Fórmula química: C₂₆H₄₅NO₂₁ N.º CAS: 13007-32-4 Peso molecular: 707,63 g/mol</p>

▼M33

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Fonte: Estirpe geneticamente modificada de <i>Escherichia coli</i> K-12</p> <p>Descrição: A lacto-<i>N</i>-neotetraose é um produto pulverulento, de cor branca a esbranquiçada, que é produzido por um processo microbiológico.</p> <p>Pureza:</p> <p>Doseamento (sem água): ≥ 80 %</p> <p>D-Lactose: ≤ 10,0 %</p> <p>Lacto-<i>N</i>-triose II: ≤ 3,0 %</p> <p><i>para</i>-Lacto-<i>N</i>-neo-hexaose: ≤ 5,0 %</p> <p>Isómero de lacto-<i>N</i>-neotetraose frutose: ≤ 1,0 %</p> <p>Soma dos sacáridos (lacto-<i>N</i>-neotetraose, D-lactose, lacto-<i>N</i>-triose II, <i>para</i>-lacto-<i>N</i>-neo-hexaose, isómero de lacto-<i>N</i>-neotetraose frutose): ≥ 92 %</p> <p>pH (solução a 5 %, 20 °C): 4,0-7,0</p> <p>Água: ≤ 9,0 %</p> <p>Cinzas sulfatadas: ≤ 0,4 %</p> <p>Solventes residuais (metanol): ≤ 100 mg/kg</p> <p>Proteínas residuais: ≤ 0,01 %</p> <p>Critérios microbiológicos:</p> <p>Contagem total de bactérias mesófilas aeróbias: ≤ 500 UFC/g</p> <p>Leveduras: ≤ 10 UFC/g</p> <p>Bolores: ≤ 10 UFC/g</p> <p>Endotoxinas residuais: ≤ 10 UE/mg</p> <p>UFC: unidades formadoras de colónias; UE: unidades de endotoxinas.</p>

▼M20

**Bagas de *Lonicera caerulea* L.
(haskap)**
(alimento tradicional de um país terceiro)

Descrição/definição:
O alimento tradicional consiste em bagas frescas e congeladas de *Lonicera caerulea* var. *edulis*.
A *Lonicera caerulea* L. é um arbusto de folha caduca pertencente à família das *Caprifoliaceae*.

Componentes nutricionais típicos das bagas de haskap (valores relativos a bagas frescas):

Hidratos de carbono: 12,8 %

Fibras: 2,1 %

Lípidos: 0,6 %

Proteínas: 0,7 %

▼M20

Novo alimento autorizado	Especificações
	Cinzas: 0,4 % Água: 85,5 %

▼M9**Extrato de folha de luzerna de *Medicago sativa*****Descrição/definição:**

A luzerna (*Medicago sativa L.*) é processada no prazo de 2 horas após a colheita. É picada e prensada. Ao passar numa prensa para oleaginosas, a luzerna produz um resíduo fibroso e um sumo (10 % de matéria seca). A matéria seca deste sumo contém cerca de 35 % de proteínas brutas. O sumo obtido por prensagem (pH 5,8-6,2) é neutralizado. O pré-aquecimento e a injeção de vapor permitem coagular as proteínas associadas aos pigmentos carotenoides e clorofílicos. O precipitado de proteínas é separado por centrifugação, procedendo-se posteriormente à respetiva secagem. Após adição de ácido ascórbico, o concentrado proteico de luzerna é granulado e conservado em gás inerte ou em câmara frigorífica.

Composição:

Proteínas: 45-60 %

Gordura: 9-11 %

Hidratos de carbono livres (fibra solúvel): 1-2 %

Polissacáridos (fibra insolúvel): 11-15 %

entre os quais celulose: 2-3 %

Minerais: 8-13 %

Saponinas: ≤ 1,4 %

Isoflavonas: ≤ 350 mg/kg

Couimestrol: ≤ 100 mg/kg

Fitatos: ≤ 200 mg/kg

L-canavanina: ≤ 4,5 mg/kg

Licopeno**Descrição/definição:**

O licopeno sintético é produzido por condensação de Wittig dos produtos intermédios de síntese habitualmente utilizados na produção de outros carotenoides empregues nos alimentos. O licopeno sintético é composto por ≥ 96 % de licopeno e pequenas quantidades de outros carotenoides associados. O licopeno é apresentado quer como pó numa matriz adequada, quer como dispersão em óleo. A sua cor é o vermelho-escuro ou vermelho-violeta. Deve ser assegurada proteção antioxidante.

Denominação química: licopeno

N.º CAS: 502-65-8 (licopeno totalmente *trans*)Fórmula química: C₄₀H₅₆

Massa molecular: 536,85 Da

Novo alimento autorizado	Especificações
Licopeno de <i>Blakeslea trispora</i>	<p>Descrição/definição: O licopeno de <i>Blakeslea trispora</i> purificado é composto por ≥ 95 % de licopeno e ≤ 5 % de outros carotenoides. É apresentado quer como pó numa matriz adequada, quer como dispersão em óleo. A sua cor é o vermelho-escuro ou vermelho-violeta. Deve ser assegurada proteção antioxidante.</p> <p>Denominação química: licopeno N.º CAS: 502-65-8 (licopeno totalmente <i>trans</i>) Fórmula química: C₄₀H₅₆ Massa molecular: 536,85 Da</p>
Licopeno de tomate	<p>Descrição/definição: O licopeno purificado de tomates (<i>Lycopersicon esculantum</i> L.) é composto por ≥ 95 % de licopeno e ≤ 5 % de outros carotenoides. É apresentado quer como pó numa matriz adequada, quer como dispersão em óleo. A sua cor é o vermelho-escuro ou vermelho-violeta. Deve ser assegurada proteção antioxidante.</p> <p>Denominação química: licopeno N.º CAS: 502-65-8 (licopeno totalmente <i>trans</i>) Fórmula química: C₄₀H₅₆ Massa molecular: 536,85 Da</p>
Oleorresina de licopeno de tomate	<p>Descrição/definição: A oleorresina de licopeno de tomate é obtida por extração com solventes de tomates maduros (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.) e subsequente remoção do solvente. É um líquido limpo viscoso, vermelho a castanho-escuro.</p> <p>Licopeno total: 5-15 % do qual licopeno <i>trans</i>: 90-95 % Carotenoides totais (expressos em licopeno): 6,5-16,5 % Outros carotenoides: 1,75 % (Fitoeno/fitoflueno/β-caroteno): (0,5-0,75/0,4-0,65/0,2-0,35 %) Tocoferóis totais: 1,5-3,0 % Matérias insaponificáveis: 13-20 % Ácidos gordos totais: 60-75 % Água (Karl Fischer): ≤ 0,5 %</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
Citrato malato de magnésio	<p>Descrição/definição: O citrato malato de magnésio é um produto pulverulento amorfo, branco a branco-amarelado. Fórmula química: Mg₅ (C₆H₅O₇)₂ (C₄H₄O₅)₂ Denominação química: di-(2-hidroxibutanodioato)-di-(2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato) de pentamagnésio N.º CAS: 1259381-40-2 Peso molecular: 763,99 Daltons (anidro) Solubilidade: muito solúvel em água (cerca de 20 g em 100 ml) Descrição do estado físico: produto pulverulento amorfo Doseamento do magnésio: 12,0-15,0 % Perda por secagem (120 °C durante 4 horas): ≤ 15 % Cor (sólido): branco a branco-amarelado Cor (solução aquosa a 20 %): incolor a amarelado Aspetto (solução aquosa a 20 %): solução límpida pH (solução aquosa a 20 %): aprox. 6,0 Impurezas: Cloreto: ≤ 0,05 % Sulfato: ≤ 0,05 % Arsénio: ≤ 3,0 ppm Chumbo: ≤ 2,0 ppm Cádmio: ≤ 1 ppm Mercúrio: ≤ 0,1 ppm</p>
Extrato de casca de magnólia	<p>Descrição/definição: O extrato de casca de magnólia é obtido a partir da casca da planta <i>Magnolia officinalis</i> L. e produzido com dióxido de carbono supercrítico. A casca é lavada e seca em estufa, a fim de reduzir o teor de humidade, antes de ser triturada e extraída com dióxido de carbono supercrítico. O extrato é dissolvido em etanol de grau medicinal e recristalizado, a fim de produzir extrato de casca de magnólia. O extrato de casca de magnólia é constituído essencialmente por dois compostos fenólicos, o magnolol e o honokiol. Aspetto: produto pulverulento acastanhado-claro Pureza: Magnolol: ≥ 85,2 % Honokiol: ≥ 0,5 %</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Magnolol e honokiol: ≥ 94 % Eudesmol total: ≤ 2 % Humidade: 0,50 % Metais pesados: Arsénio (ppm): ≤ 0,5 Chumbo (ppm): ≤ 0,5 Metil-eugenol (ppm): ≤ 10 Tubocurarina (ppm): ≤ 2,0 Alcaloides totais (ppm): ≤ 100</p>
Óleo de gérmen de milho de elevado teor em matérias não saponificáveis	<p>Descrição/definição: O óleo de gérmen de milho de elevado teor em matérias não saponificáveis é produzido por destilação em vácuo e é diferente do óleo de gérmen de milho refinado no que se refere à concentração da fração não saponificável (1,2 g no óleo de gérmen de milho refinado e 10 g no «óleo de gérmen de milho de elevado teor em matérias não saponificáveis»).</p> <p>Pureza: Matérias não saponificáveis: > 9,0 g/100 g Tocoferóis: ≥ 1,3 g/100 g α-tocoferol (%): 10-25 % β-tocoferol (%): < 3,0 % γ-tocoferol (%): 68-89 % δ-tocoferol (%): < 7,0 % Esteróis, álcoois triterpénicos, metilesteróis: > 6,5 g/100 g Ácidos gordos em triglicéridos: ácido palmítico: 10,0-20,0 % ácido esteárico: < 3,3 % ácido oleico: 20,0-42,2 % ácido linoleico: 34,0-65,6 % ácido linolénico: < 2,0 % Índice de acidez: ≤ 6,0 mg KOH/g Índice de peróxidos: ≤ 10 meq O₂/kg</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Metais pesados: Ferro (Fe): < 1 500 µg/kg Cobre (Cu): < 100 µg/kg</p> <p>Impurezas: Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) benzo(a)pireno: < 2 µg/kg É necessário tratamento com carvão ativado no sentido de garantir que os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) não são enriquecidos na produção de «óleo de gérmen de milho de elevado teor em matérias não saponificáveis».</p>
Metilcelulose	<p>Descrição/definição: A metilcelulose é celulose obtida diretamente a partir de estirpes naturais de material vegetal fibroso, parcialmente eterificado com grupos metilo. Denominação química: Éter metílico de celulose Fórmula química: Os polímeros são constituídos por unidades de anidroglucose substituídas com a seguinte fórmula geral: $C_6H_{10}O_2(OR_1)(OR_2)(OR_3)$ em que R1, R2, R3 podem ser um dos seguintes substituintes: — H — CH₃ ou — CH₂CH₃</p> <p>Peso molecular: Macromoléculas: de cerca de 20 000 (n aproximadamente 100) até cerca de 380 000 g/mol (n aproximadamente 2 000) Doseamento: Teor de grupos metoxilo (-OCH₃) não inferior a 25 % e não superior a 33 % e de grupos hidroxietoxilo (-OCH₂CH₂OH) não superior a 5 % Produto pulverulento granular ou fibroso, inodoro, insípido e ligeiramente higroscópico, de cor branca ou ligeiramente amarelada ou acinzentada. Solubilidade: Aumenta de volume na água, produzindo uma solução coloidal, viscosa, de aspecto límpido a opalescente. Insolúvel em etanol, éter e clorofórmio. Solúvel em ácido acético glacial.</p> <p>Pureza: Perda por secagem: ≤ 10 % (105 °C, 3 horas) Cinzas sulfatadas: ≤ 1,5 % determinado a 800 ± 25 °C pH: ≥ 5,0 e ≤ 8,0 (solução coloidal a 1 %)</p> <p>Metais pesados: Arsénio: ≤ 3,0 mg/kg Chumbo: ≤ 2,0 mg/kg Mercúrio: ≤ 1,0 mg/kg Cádmio: ≤ 1,0 mg/kg</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
--------------------------	----------------

▼M11

Cloreto de 1-metilnicotinamida	<p>Definição: Denominação química: cloreto de 3-carbamol-1-metil-piridínio Fórmula química: C₇H₉N₂OCl N.º CAS: 1005-24-9 Peso molecular: 172,61 Da</p> <p>Descrição O cloreto de 1-metilnicotinamida é um sólido cristalino branco ou esbranquiçado, produzido através de um processo de síntese química.</p> <p>Características/composição Aspetto: sólido cristalino branco - esbranquiçado Pureza: ≥ 98,5 % Trigonalina: ≤ 0,05 % Ácido nicotínico: ≤ 0,10 % Nicotinamida: ≤ 0,10 % Maior impureza desconhecida: ≤ 0,05 % Soma de impurezas desconhecidas: ≤ 0,20 % Soma de todas as impurezas: ≤ 0,50 % Solubilidade: solúvel em água e metanol. Praticamente insolúvel em 2-propanol e diclorometano Humidade: ≤ 0,3 % Perda por secagem: ≤ 1,0 % Resíduo de incineração: ≤ 0,1 %</p> <p>Solventes residuais e metais pesados Metanol: ≤ 0,3 % Metais pesados: ≤ 0,002 %</p> <p>Crítérios microbiológicos: Contagem de microrganismos aeróbios totais: ≤ 100 UFC/g Bolores/leveduras: ≤ 10 UFC/g <i>Enterobacteriaceae</i>: ausente em 1 g <i>Pseudomonas aeruginosa</i>: ausente em 1 g <i>Staphylococcus aureus</i>: ausente em 1 g UFC: Unidades formadoras de colónias</p>
---------------------------------------	---

Novo alimento autorizado	Especificações
Ácido (6S)-5-metiltreto-hidrofólico, sal de glucosamina	<p>Descrição/definição: Denominação química: ácido N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-hexa-hidro-5-metil-4-oxo-6-pteridinil]metil]amino]benzoíl]-L-glutâmico, sal de glucosamina Fórmula química: C₃₂H₅₁N₉O₁₆ Peso molecular: 817,80 g/mol (anidro) N.º CAS: 1181972-37-1 Aspetto: Produto pulverulento de cor creme a castanha-clara</p> <p>Pureza: Pureza diastereoisomérica: pelo menos 99 % de ácido (6S)-5-metiltreto-hidrofólico Doseamento da glucosamina: 34-46 % em base seca Doseamento do ácido 5-metiltreto-hidrofólico: 54-59 % em base seca Água: < 8,0 %</p> <p>Metais pesados: Chumbo: ≤ 2,0 ppm Cádmio: ≤ 1,0 ppm Mercúrio: ≤ 0,1 ppm Arsénio: ≤ 2,0 ppm Boro: ≤ 10 ppm</p> <p>Critérios microbiológicos: Contagem de microrganismos aeróbios totais: ≤ 100 UFC/g Bolores e leveduras: ≤ 100 UFC/g <i>Escherichia coli</i>: ausente em 10 g</p>
Monometilsilanotriol (silício orgânico)	<p>Descrição/definição: Denominação química: Silanotriol, 1-metil- Fórmula química: CH₆O₃Si Peso molecular: 94,14 g/mol N.º CAS: 2445-53-6</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Pureza: Preparação (solução aquosa) de silício orgânico (monometilsilanotriol) Acidez (pH): 6,4-6,8 Silício: 100-150 mg Si/l</p> <p>Metais pesados: Chumbo: ≤ 1,0 µg/l Mercúrio: ≤ 1,0 µg/l Cádmio: ≤ 1,0 µg/l Arsénio: ≤ 3,0 µg/l</p> <p>Solventes: Metanol: ≤ 5,0 mg/kg (presença residual)</p>
Extrato micelial de cogumelos Shiitake (<i>Lentinula edodes</i>)	<p>Descrição/definição: O novo ingrediente alimentar é um extrato aquoso estéril obtido a partir de micélio de <i>Lentinula edodes</i> cultivado em fermentação submersa. Trata-se de um líquido castanho-claro, ligeiramente turvo. O lentinano é um β-(1-3) β-(1-6)-D-glucano com um peso molecular de aproximadamente 5×10^5 Daltons, um grau de ramificação de 2/5 e uma estrutura terciária em tripla hélice.</p> <p>Pureza/Composição do extrato micelial de <i>Lentinula edodes</i>: Humidade: 98 % Matéria seca: 2 % Glucose livre: < 20 mg/ml Proteína total ⁽¹⁾: < 0,1 mg/ml Constituintes contendo azoto ⁽²⁾: < 10 mg/ml Lentinano: 0,8-1,2 mg/ml ⁽¹⁾ método de Bradford⁽²⁾ método de Kjeldahl</p>
Sumo de noni (<i>Morinda citrifolia</i>)	<p>Descrição/definição: Os frutos de noni (frutos de <i>Morinda citrifolia</i> L.) são prensados. O sumo obtido é pasteurizado. Antes ou após a prensagem pode ocorrer uma etapa de fermentação facultativa.</p> <p>Rubiadina: ≤ 10 µg/kg Lucidina: ≤ 10 µg/kg</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
Pó de sumo de noni (<i>Morinda citrifolia</i>)	<p>Descrição/definição: As sementes e a casca dos frutos de <i>Morinda citrifolia</i> secos ao sol são separadas. A polpa obtida é filtrada para separar o sumo do bagaço. A dessecação do sumo produzido ocorre de uma das seguintes formas: quer por atomização utilizando maltodextrinas do milho (esta mistura é obtida mantendo constantes as taxas de influxo do sumo e das maltodextrinas); quer por desidratação utilizando zeólitos (zeodratação) ou secagem, misturando em seguida com um excipiente [este processo permite que o sumo seja inicialmente seco e posteriormente misturado com maltodextrinas (mesma quantidade que a utilizada na atomização)].</p>
Puré e concentrado de frutos de noni (<i>Morinda citrifolia</i>)	<p>Descrição/definição: Os frutos de <i>Morinda citrifolia</i> são colhidos manualmente. As sementes e a casca são separadas mecanicamente dos frutos transformados em puré. Após pasteurização, o puré é embalado em recipientes asséticos e armazenado em câmara frigorífica. O concentrado de <i>Morinda citrifolia</i> é preparado a partir do puré de <i>M. citrifolia</i> por tratamento com enzimas pectinolíticas (50-60 °C durante 1-2 h). O puré é depois aquecido para inativar as pectinases e imediatamente arrefecido. O sumo é separado numa centrifuga decantadora. O sumo é recolhido e pasteurizado antes de ser concentrado num evaporador de vácuo, passando de 6 a 8 graus Brix para 49 a 51 graus Brix no concentrado final.</p> <p>Composição:</p> <p>Puré:</p> <p>Humidade: 89-93 % Proteínas: < 0,6 g/100 g Gordura: ≤ 0,4 g/100 g Cinzas: < 1,0 g/100 g Hidratos de carbono totais: 5-10 g/100 g Frutose: 0,5-3,82 g/100 g Glucose: 0,5-3,14 g/100 g Fibras alimentares: < 0,5-3 g/100 g 5,15-Dimetilmorindol (1): ≤ 0,254 µg/ml Lucidina (1): não detetável Alizarina (1): não detetável Rubiadina (1): não detetável</p> <p>Concentrado:</p> <p>Humidade: 48-53 %</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Proteínas: 3-3,5 g/100 g Gordura: < 0,04 g/100 g Cinzas: 4,5-5,0 g/100 g Hidratos de carbono totais: 37-45 g/100 g Frutose: 9-11 g/100 g Glucose: 9-11 g/100 g Fibras alimentares: 1,5-5,0 g/100 g 5,15-Dimetilmorindol ⁽¹⁾: ≤ 0,254 µg/ml</p> <p>⁽¹⁾ Determinado mediante um método HPLC-UV desenvolvido e validado para a análise de antraquinonas no puré e concentrado de <i>Morinda citrifolia</i>. Limites de deteção: 2,5 ng/ml (5,15-dimetilmorindol); 50,0 ng/ml (lucidina); 6,3 ng/ml (alizarina) e 62,5 ng/ml (rubiadina).</p>
Folhas de noni (<i>Morinda citrifolia</i>)	<p>Descrição/definição: Depois de cortadas, as folhas de <i>Morinda citrifolia</i> são submetidas a secagem e a torrefação. O produto é constituído por partículas cuja dimensão varia entre a de folhas quebradas e a de pó grosso com lascas. A cor é entre o castanho esverdeado e o castanho.</p> <p>Pureza/Composição: Humidade: < 5,2 % Proteínas: 17-20 % Hidratos de carbono: 55-65 % Cinzas: 10-13 % Gordura: 4-9 % Ácido oxálico: < 0,14 % Ácido tânico: < 2,7 % 5,15-Dimetilmorindol: < 47 mg/kg Rubiadina: não detetável, ≤ 10 µg/kg Lucidina: não detetável, ≤ 10 µg/kg</p>
Pó de frutos de noni (<i>Morinda citrifolia</i>)	<p>Descrição/definição: O pó de frutos de noni é produzido por liofilização a partir de frutos de noni (<i>Morinda citrifolia</i> L.) transformados em polpa. Os frutos são transformados em polpa e as sementes são removidas. Após a liofilização, durante a qual a água é removida dos frutos de noni, a polpa de noni restante é moída a pó e encapsulada.</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Pureza/Composição</p> <p>Humidade: 5,3-9 %</p> <p>Proteínas: 3,8-4,8 g/100 g</p> <p>Gordura: 1-2 g/100 g</p> <p>Cinzas: 4,6-5,7 g/100 g</p> <p>Hidratos de carbono totais: 80-85 g/100 g</p> <p>Frutose: 20,4-22,5 g/100 g</p> <p>Glucose: 22-25 g/100 g</p> <p>Fibras alimentares: 15,4-24,5 g/100 g</p> <p>5,15-Dimetilmorindol ⁽¹⁾: ≤ 2,0 µg/ml</p> <p>⁽¹⁾ Determinado mediante um método HPLC-UV desenvolvido e validado para a análise de antraquinonas no pó de frutos de Morinda citrifolia. Limite de deteção: 2,5 ng/ml (5,15-dimetilmorindol)</p>
Microalga <i>Odontella aurita</i>	<p>Silício: 3,3 %</p> <p>Sílica cristalina: máx. 0,1-0,3 % como impureza</p>
Óleo enriquecido com fitoesteróis/fitoestanóis	<p>Descrição/definição: O óleo enriquecido com fitoesteróis/fitoestanóis é composto por uma fração de óleo e uma fração de fitoesterol.</p> <p>Distribuição dos acilgliceróis:</p> <p>Ácidos gordos livres (expressos em ácido oleico): ≤ 2,0 %</p> <p>Monoacilgliceróis (MAG): ≤ 10 %</p> <p>Diacilgliceróis (DAG): ≤ 25 %</p> <p>Triacilgliceróis (TAG): balanço</p> <p>Fração de fitoesteróis:</p> <p>β-Sitosterol: ≤ 80 %</p> <p>β-Sitostanol: ≤ 15 %</p> <p>Campesterol: ≤ 40 %</p> <p>Campestanol: ≤ 5,0 %</p> <p>Estigmasterol: ≤ 30 %</p> <p>Brassicasterol: ≤ 3,0 %</p> <p>Outros esteróis/estanóis: ≤ 3,0 %</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações																					
	<p>Outros:</p> <p>Humidade e voláteis: ≤ 0,5 %</p> <p>Índice de peróxidos: < 5,0 meq/kg</p> <p>Ácidos gordos <i>trans</i>: ≤ 1 %</p> <p>Contaminação/pureza (com GC-FID ou método equivalente) de fitoesteróis/fitoestanóis: os fitoesteróis e fitoestanóis extraídos de outras fontes que não o óleo vegetal adequado para alimentos devem estar isentos de contaminantes, consistindo uma pureza superior a 99 % a melhor garantia.</p>																					
Óleo extraído de lulas	<p>Índice de acidez: ≤ 0,5 KOH/g de óleo</p> <p>Índice de peróxidos: ≤ 5 meq O₂/kg de óleo</p> <p>Valor de p-anisidina: ≤ 20</p> <p>Ensaio de frio a 0 °C: ≤ 3 horas</p> <p>Humidade: ≤ 0,1 % (m/m)</p> <p>Matérias insaponificáveis: ≤ 5,0 %</p> <p>Ácidos gordos <i>trans</i>: ≤ 1,0 %</p> <p>Ácido docosa-hexaenoico: ≥ 20 %</p> <p>Ácido icosapentaenoico: ≥ 10 %</p>																					
Preparações à base de frutos produzidas por tratamento de alta pressão	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 33.33%;"><i>Parâmetros</i></th><th style="text-align: center; width: 33.33%;"><i>Objetivo</i></th><th style="text-align: center; width: 33.33%;"><i>Observações</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Armazenagem dos frutos antes do tratamento de alta pressão</td><td style="text-align: center;">Mínimo 15 dias a - 20 °C</td><td style="text-align: center;">Frutos colhidos e armazenados segundo os princípios de boas práticas agrícolas e de fabrico em matéria de higiene</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Adição de frutos</td><td style="text-align: center;">40 a 60 % de frutos descongelados</td><td style="text-align: center;">Frutos homogeneizados e adicionados a outros ingredientes</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">pH</td><td style="text-align: center;">3,2 a 4,2</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">° Brix</td><td style="text-align: center;">7 a 42</td><td style="text-align: center;">Garantido por adição de açúcar</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>a</i>_w</td><td style="text-align: center;">< 0,95</td><td style="text-align: center;">Garantido por adição de açúcar</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Armazenagem final</td><td style="text-align: center;">Máximo 60 dias a +5 °C no máximo</td><td style="text-align: center;">Equivalente ao regime de armazenagem dos produtos transformados pelos procedimentos clássicos</td></tr> </tbody> </table>	<i>Parâmetros</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Observações</i>	Armazenagem dos frutos antes do tratamento de alta pressão	Mínimo 15 dias a - 20 °C	Frutos colhidos e armazenados segundo os princípios de boas práticas agrícolas e de fabrico em matéria de higiene	Adição de frutos	40 a 60 % de frutos descongelados	Frutos homogeneizados e adicionados a outros ingredientes	pH	3,2 a 4,2		° Brix	7 a 42	Garantido por adição de açúcar	<i>a</i> _w	< 0,95	Garantido por adição de açúcar	Armazenagem final	Máximo 60 dias a +5 °C no máximo	Equivalente ao regime de armazenagem dos produtos transformados pelos procedimentos clássicos
<i>Parâmetros</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Observações</i>																				
Armazenagem dos frutos antes do tratamento de alta pressão	Mínimo 15 dias a - 20 °C	Frutos colhidos e armazenados segundo os princípios de boas práticas agrícolas e de fabrico em matéria de higiene																				
Adição de frutos	40 a 60 % de frutos descongelados	Frutos homogeneizados e adicionados a outros ingredientes																				
pH	3,2 a 4,2																					
° Brix	7 a 42	Garantido por adição de açúcar																				
<i>a</i> _w	< 0,95	Garantido por adição de açúcar																				
Armazenagem final	Máximo 60 dias a +5 °C no máximo	Equivalente ao regime de armazenagem dos produtos transformados pelos procedimentos clássicos																				

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
▼M35 Fenilcapsaicina	<p>Descrição/definição: A fenilcapsaicina (<i>N</i>-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]-7-fenil-hept-6-inamida, C₂₁H₂₃NO₃, n.º CAS: 848127-67-3), é sintetizada quimicamente por meio de um processo de síntese em duas fases que envolve, numa primeira fase, a produção do intermediário do ácido acetilénico através de uma reação do fenilacetíleno com um derivado de ácido carboxílico e, numa segunda fase, uma série de reações do intermediário do ácido acetilénico com o derivado de vanililamina para produzir a fenilcapsaicina.</p> <p>Características/composição:</p> <p>Pureza (% de matéria seca): ≥ 98 %</p> <p>Humidade: ≤ 0,5 %</p> <p>Total dos subprodutos da produção relacionados com a síntese: ≤ 1,0 %</p> <p><i>N,N</i>-dimetilformamida: ≤ 880 mg/kg</p> <p>Diclorometano: ≤ 600 mg/kg</p> <p>Dimetoxietano: ≤ 100 mg/kg</p> <p>Acetato de etilo: ≤ 0,5 %</p> <p>Outros solventes: ≤ 0,5 %</p> <p>Metais pesados</p> <p>Chumbo: ≤ 1,0 mg/kg</p> <p>Cádmio: ≤ 1,0 mg/kg</p> <p>Mercúrio: ≤ 0,1 mg/kg</p> <p>Arsénio: ≤ 1,0 mg/kg</p> <p>Critérios microbiológicos:</p> <p>Contagem total em placa: ≤ 10 UFC/g</p> <p>Coliformes: ≤ 10 UFC/g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: Negativo/10 g</p> <p><i>Salmonella</i> sp.: Ausente/10 g</p> <p>Bolores e leveduras: ≤ 10 UFC/g</p> <p>UFC: unidades formadoras de colónias</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
Amido de milho fosfatado	<p>Descrição/definição: O amido de milho fosfatado (fosfato de amido dissubstituído fosfatado) é um amido resistente, quimicamente modificado, derivado de amido rico em amilose por combinação de tratamentos químicos a fim de criar ligações cruzadas de fosfato entre resíduos de hidratos de carbono e grupos hidroxilo esterificados. O novo ingrediente alimentar é um produto pulverulento branco ou quase branco. N.º CAS: 11120-02-8 Fórmula química: $(C_6H_{10}O_5)_n [(C_6H_9O_5)_2PO_2H]^x [(C_6H_9O_5)PO_3H_2]^y$ n = número de unidades de glucose; x, y = graus de substituição Características químicas do fosfato de amido dissubstituído fosfatado: Perda por secagem: 10-14 % pH: 4,5-7,5 Fibras alimentares: $\geq 70\%$ Amido: 7-14 % Proteínas: $\leq 0,8\%$ Lípidos: $\leq 0,8\%$ Fósforo ligado residual: $\leq 0,4\%$ (expresso em fósforo) «milho rico em amilose» como fonte</p>
Fosfatidilserina de fosfolípidos de peixe	<p>Descrição/definição: O novo ingrediente alimentar é um produto pulverulento de cor amarela a castanha. A fosfatidilserina é obtida a partir de fosfolípidos de peixe por uma transfosforilação enzimática com o aminoácido L-serina.</p> <p>Especificações do produto de fosfatidilserina fabricado a partir de fosfolípidos de peixe:</p> <p>Humidade: < 5,0 % Fosfolípidos: $\geq 75\%$ Fosfatidilserina: $\geq 35\%$ Glicéridos: < 4,0 % L-serina livre: < 1,0 % Tocoferóis: < 0,5 % ⁽¹⁾ Índice de peróxidos: $\leq 5,0$ meq O₂/kg</p> <p>⁽¹⁾ Os tocoferóis podem ser adicionados como antioxidantes em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 1129/2011 da Comissão.</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
Fosfatidilserina de fosfolípidos de soja	<p>Descrição/definição: O novo ingrediente alimentar é um produto pulverulento de cor esbranquiçada a amarela clara. Também está disponível em forma líquida, com uma cor castanha clara a laranja. A forma líquida contém triacilglicéridos de cadeia média (MCT) como agente de transporte. Contém níveis mais baixos de fosfatidilserina, devido ao facto de incluir quantidades significativas de óleo (MCT).</p> <p>A fosfatidilserina de fosfolípidos de soja obtém-se através de transfosfatidilação enzimática de lecitina de soja de elevado teor de fosfatidilcolina com o aminoácido L-serina. A fosfatidilserina consiste num esqueleto de glicerofosfato conjugado com dois ácidos gordos e com L-serina através de uma ligação fosodiéster.</p> <p>Características da fosfatidilserina de fosfolípidos de soja:</p> <p>Forma pulverulenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Humidade: < 2,0 % Fosfolípidos: ≥ 85 % Fosfatidilserina: ≥ 61 % Glicéridos: < 2,0 % L-Serina livre: < 1,0 % Tocoferóis: < 0,3 % Fitoesteróis: < 0,2 % <p>Forma líquida:</p> <ul style="list-style-type: none"> Humidade: < 2,0 % Fosfolípidos: ≥ 25 % Fosfatidilserina: ≥ 20 % Glicéridos: não aplicável L-Serina livre: < 1,0 % Tocoferóis: < 0,3 % Fitoesteróis: < 0,2 %
Produto fosfolípido que contém quantidades iguais de fosfatidilserina e ácido fosfatídico	<p>Descrição/definição: O produto é produzido através da conversão enzimática da lecitina de soja. O produto fosfolípido é uma forma pulverulenta altamente concentrada, amarelo-acastanhado, de partes iguais de fosfatidilserina e ácido fosfatídico.</p> <p>Especificação do produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Humidade: ≤ 2,0 %

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Fosfolípidos totais: ≥ 70 %</p> <p>Fosfatidilserina: ≥ 20 %</p> <p>Ácido fosfátilico: ≥ 20 %</p> <p>Glicéridos: ≤ 1,0 %</p> <p>L-serina livre: ≤ 1,0 %</p> <p>Tocoferóis: ≤ 0,3 %</p> <p>Fitoesteróis: ≤ 2,0 %</p> <p>O dióxido de silício é utilizado com um teor máximo de 1,0 %</p>
Fosfolípidos de gema de ovo	Fosfolípidos de gema de ovo purificados a 85 % e 100 %
Fitoglicogénio	<p>Descrição: produto pulverulento de cor branca a esbranquiçada; polissacárido insípido, incolor e inodoro derivado de milho doce não geneticamente modificado utilizando técnicas convencionais de transformação de alimentos.</p> <p>Definição: Polímero de glucose ($C_6H_{12}O_6$)n com ligações lineares de ligações glicosídicas $\alpha(1 - 4)$ ramificadas a cada 8 a 12 unidades de glucose por ligações glicosídicas $\alpha(1 - 6)$.</p> <p>Especificações:</p> <p>Hidratos de carbono: 97 %</p> <p>Açúcares: 0,5 %</p> <p>Fibra: 0,8 %</p> <p>Gordura: 0,2 %</p> <p>Proteínas: 0,6 %</p>
Fitoesteróis/fitoestanóis	<p>Descrição/definição:</p> <p>Os fitoesteróis e os fitoestanóis são esteróis e estanóis extraídos de plantas que podem ser apresentados como esteróis ou estanóis livres ou esterificados com ácidos gordos de qualidade alimentar.</p> <p>Composição (com GC-FID ou método equivalente):</p> <p>β-Sitosterol: < 81 %</p> <p>β-Sitostanol: < 35 %</p> <p>Campesterol: < 40 %</p> <p>Campestanol: < 15 %</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Estigmasterol: < 30 % Brassicasterol: < 3,0 % Outros esteróis/estanóis: < 3,0 %</p> <p>Contaminação/Pureza (com GC-FID ou método equivalente): os fitoesteróis e fitoestanóis extraídos de outras fontes que não o óleo vegetal adequado para alimentos devem estar isentos de contaminantes, consistindo uma pureza superior a 99 % do ingrediente de fitoesterol/fitoestanol a melhor garantia.</p>
Óleo de caroço de ameixa	<p>Descrição/definição: O óleo de caroço de ameixa é um óleo vegetal obtido por pressão a frio de caroços de ameixa (<i>Prunus domestica</i>).</p> <p>Composição: Ácido oleico (C18:1): 68 % Ácido linoleico (C18:2): 23 % γ-Tocoferol: 80 % de tocoferóis totais β-Sitosterol: 80-90 % de esteróis totais Trioleína: 40-55 % de triglicéridos Ácido cianídrico: máx. 5 mg/kg de óleo</p>
Proteínas de batata (coaguladas) e seus hidrolisados	<p>Matéria seca: ≥ 800 mg/g Proteínas (N * 6,25): ≥ 600 mg/g (matéria seca) Cinzas: ≤ 400 mg/g (matéria seca) Glicoalcalóides (total): ≤ 150 mg/kg Lisinoalanina (total): ≤ 500 mg/kg Lisinoalanina (livre): ≤ 10 mg/kg</p>
Prolil oligopeptidase (preparação enzimática)	<p>Especificação da enzima: Denominação sistemática: prolil oligopeptidase Sinónimos: prolil endopeptidase, endopeptidase específica para prolina, endoprolilpeptidase Peso molecular: 66 kDa Número da Comissão de enzimas: EC 3.4.21.26 N.º CAS: 72162-84-6</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Fonte: Uma estirpe geneticamente modificada de <i>Aspergillus niger</i> (GEP-44)</p> <p>Descrição: a prolil oligopeptidase está disponível como preparação enzimática contendo cerca de 30 % de maltodextrina.</p> <p>Especificações da preparação enzimática de prolil oligopeptidase:</p> <p>Atividade: > 580 000 PPI⁽¹⁾/g (> 34,8 PPU⁽²⁾/g)</p> <p>Aspetto: microgranulado</p> <p>Cor: esbranquiçada a laranja amarelada. A cor pode variar de lote para lote</p> <p>Matéria seca: > 94 %</p> <p>Glúten: < 20 ppm</p> <p>Metais pesados:</p> <p>Chumbo: ≤ 1,0 mg/kg</p> <p>Arsénio: ≤ 1,0 mg/kg</p> <p>Cádmio: ≤ 0,5 mg/kg</p> <p>Mercúrio: ≤ 0,1 mg/kg</p> <p>Critérios microbiológicos:</p> <p>Microrganismos aeróbios totais (contagem em placa): ≤ 10³ UFC/g</p> <p>Leveduras e bolores totais: ≤ 10² UFC/g</p> <p>Anaeróbios sulfito-redutores: ≤ 30 UFC/g</p> <p><i>Enterobacteriaceae</i>: ≤ 10 UFC/g</p> <p><i>Salmonella</i>: ausente em 25 g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: ausente em 25 g</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>: ausente em 10 g</p> <p><i>Pseudomonas aeruginosa</i>: ausente em 10 g</p> <p><i>Listeria monocytogenes</i>: ausente em 25 g</p> <p>Atividade antimicrobiana: ausente</p> <p>Micotoxinas: abaixo dos limites de deteção: aflatoxinas B1, B2, G1, G2 (< 0,25 µg/kg), aflatoxinas totais (< 2,0 µg/kg), ocratoxina A (< 0,20 µg/kg), toxina T-2 (< 5 µg/kg), zearalenona (< 2,5 µg/kg), fumonisina B1 e B2 (< 2,5 µg/kg)</p>

⁽¹⁾ PPI – Protease Picomole Internacional

⁽²⁾ PPU – Unidades de prolil peptidase ou unidades de prolina protease

Novo alimento autorizado	Especificações
Extrato proteico de rins de porco	<p>Descrição/definição:</p> <p>O extrato proteico é obtido a partir de rins de porco homogeneizados através de uma combinação de precipitação de sal e centrifugação a alta velocidade. O precipitado obtido contém essencialmente proteínas com 7 % da enzima diamina oxidase (nomenclatura da enzima E.C. 1.4.3.22) e é ressuspenso num sistema de tampão fisiológico. O extrato de rins de porco obtido é formulado como <i>pellets</i> entéricos, encapsulados e revestidos, a fim de alcançarem os locais ativos de digestão.</p> <p>Produto básico:</p> <p>Especificação: extrato proteico de rim de porco com teor natural de diamina oxidase (DAO)</p> <p>Condição física: líquido</p> <p>Cor: acastanhado</p> <p>Aspetto: solução ligeiramente turva</p> <p>valor do pH: 6,4-6,8</p> <p>Atividade enzimática: > 2 677 kHDU de DAO/ml [REA DAO (Doseamento de DAO por radioextração)]</p> <p>Critérios microbiológicos:</p> <p><i>Brachyspira</i> spp.: negativa (PCR em tempo real)</p> <p><i>Listeria monocytogenes</i>: negativa (PCR em tempo real)</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>: < 100 UFC/g</p> <p>Influenza A: negativa (RT-PCR em tempo real)</p> <p><i>Escherichia coli</i>: < 10 UFC/g</p> <p>Contagem de microrganismos aeróbios totais: < 10^5 UFC/g</p> <p>Contagem de bolores e leveduras: < 10^5 UFC/g</p> <p><i>Salmonella</i>: ausente/10 g</p> <p><i>Enterobacteriaceae</i> resistente aos sais biliares: < 10^4 UFC/g</p> <p>Produto final:</p> <p>Especificação: extrato proteico de rim de porco com teor natural de DAO (E.C. 1.4.3.22) numa formulação entérica revestida</p> <p>Condição física: sólido</p> <p>Cor: amarelo acinzentado</p> <p>Aspetto: <i>micropellets</i></p> <p>Atividade enzimática: 110-220 kHDU de DAO/g de <i>pellet</i> [REA DAO (Doseamento de DAO por radioextração)]</p> <p>Estabilidade ácida: 15 minutos em HCl a 0,1 M, seguidos de 60 minutos em borato a pH = 9,0: > 68 kHDU de DAO/g de <i>pellet</i> [REA DAO (Doseamento de DAO por radioextração)]</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Humidade: < 10 %</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>: < 100 UFC/g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: < 10 UFC/g</p> <p>Contagem de microrganismos aeróbios totais: < 10^4 UFC/g</p> <p>Contagem total combinada de bolores e leveduras: < 10^3 UFC/g</p> <p><i>Salmonella</i>: ausente/10 g</p> <p><i>Enterobacteriaceae</i> resistente aos sais biliares: < 10^2 UFC/g</p>

▼M10**Sal dissódico de pirroloquinolina quinona****Definição:**

Denominação química: 9-carboxi-4,5-dioxo-1*H*-pirrolo[5,4-f]quinolina-2,7-dicarboxilato de dissódio

Fórmula química: C₁₄H₄N₂Na₂O₈

N.º CAS: 122628-50-6

Peso molecular: 374,17 Da

Descrição

O sal dissódico de pirroloquinolina quinona é um produto pulverulento, de cor castanho-avermelhada, produzido pela bactéria não geneticamente modificada *Hyphomicrobium denitrificans*, estirpe CK-275.

Características/composição

Aspetto: produto pulverulento de cor castanho-avermelhada

Pureza: ≥ 99,0 % (peso seco)

Absorvância no ultravioleta (A322/A259): 0,56 ± 0,03

Absorvância no ultravioleta (A233/A259): 0,90 ± 0,09

Humidade: ≤ 12,0 %

Solvente residual

Etanol: ≤ 0,05 %

Metais pesados

Chumbo: < 3 mg/kg

Arsénio: < 2 mg/kg

▼M10

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Critérios microbiológicos:</p> <p>Contagem de células viáveis totais: ≤ 300 UFC/g</p> <p>Bolores/leveduras: ≤ 12 UFC/g</p> <p>Coliformes: ausentes em 1 g</p> <p><i>Hyphomicrobium denitrificans</i>: ≤ 25 UFC/g</p> <p>UFC: Unidades formadoras de colónias</p>

▼M9**Óleo de colza com elevado teor de matérias não saponificáveis**

<p>Descrição/definição:</p> <p>O óleo de colza de elevado teor em matérias não saponificáveis é produzido por destilação em vácuo e é diferente do óleo de colza refinado no que se refere à concentração da fração não saponificável (1 g no óleo de colza refinado e 9 g no «óleo de colza de elevado teor em matérias não saponificáveis»). Há uma ligeira redução de triglicéridos contendo ácidos gordos mono-insaturados e poli-insaturados.</p> <p>Pureza:</p> <p>Matérias não saponificáveis: > 7,0 g/100 g</p> <p>Tocoferóis: > 0,8 g/100 g</p> <p>α-tocoferol (%): 30-50 %</p> <p>γ-tocoferol (%): 50-70 %</p> <p>δ-tocoferol (%): < 6,0 %</p> <p>Esteróis, álcoois triterpénicos, metilesteróis: > 5,0 g/100 g</p> <p>Ácidos gordos em triglicéridos:</p> <p>ácido palmítico: 3-8 %</p> <p>ácido esteárico: 0,8-2,5 %</p> <p>ácido oleico: 50-70 %</p> <p>ácido linoleico: 15-28 %</p> <p>ácido linolénico: 6-14 %</p> <p>ácido erúcico: < 2,0 %</p> <p>Índice de acidez: ≤ 6,0 mg KOH/g</p> <p>Índice de peróxidos: ≤ 10 meq O₂/kg</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Metais pesados: Ferro (Fe): < 1 000 µg/kg Cobre (Cu): < 100 µg/kg</p> <p>Impurezas: Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) benzo(a)pireno: < 2 µg/kg É necessário tratamento com carvão ativado no sentido de garantir que os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) não são enriquecidos na produção de «óleo de colza de elevado teor em matérias não saponificáveis».</p>
Proteína de colza	<p>Definição: A proteína de colza é um extrato aquoso rico em proteínas obtido a partir de bagaço de colza proveniente de <i>Brassica napus</i> L. e <i>Brassica rapa</i> L. não geneticamente modificadas.</p> <p>Descrição: Produto pulverulento, de cor branca a esbranquiçada, seco por atomização Proteína total: ≥ 90 % Proteína solúvel: ≥ 85 % Humidade: ≤ 7,0 % Hidratos de carbono: ≤ 7,0 % Gordura: ≤ 2,0 % Cinzas: ≤ 4,0 % Fibra: ≤ 0,5 % Glucosinolatos totais: ≤ 1 mmol/kg</p> <p>Pureza: Fitato total: ≤ 1,5 % Chumbo: ≤ 0,5 mg/kg</p> <p>Critérios microbiológicos: Contagem de bolores e leveduras: ≤ 100 UFC/g Contagem de bactérias aeróbias: ≤ 10 000 UFC/g Contagem de coliformes totais: ≤ 10 UFC/g <i>Escherichia coli</i>: ausente em 10 g <i>Salmonella</i>: ausente em 25 g</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
▼M17 Concentrado de péptido de camarão refinado Descrição O concentrado de péptido de camarão refinado é uma mistura de péptidos obtida a partir de cascas e cabeças de camarão-ártico (<i>Pandalus borealis</i>) através de uma série de etapas de purificação após a proteólise enzimática utilizando uma protease de <i>Bacillus licheniformis</i> e/ou de <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> . Características/composição Matéria seca total (%): ≥ 95,0 % Péptidos (m/peso de matéria seca): ≥ 87,0 % dos quais péptidos com um peso molecular < 2 kDa: ≥ 99,9 % Gordura (m/m): ≤ 1,0 % Hidratos de carbono (m/m): ≤ 1,0 % Cinzas (m/m): ≤ 15,0 % Cálcio: ≤ 2,0 % Potássio: ≤ 0,15 % Sódio: ≤ 3,5 % Metais pesados Arsénio (inorgânico): ≤ 0,22 mg/kg Arsénio (orgânico): ≤ 51,0 mg/kg Cádmio: ≤ 0,09 mg/kg Chumbo: ≤ 0,18 mg/kg Mercúrio total: ≤ 0,03 mg/kg Critérios microbiológicos Contagem de células viáveis totais: ≤ 20 000 UFC/g <i>Salmonella</i> : ND/25 g <i>Listeria monocytogenes</i> : ND/25 g <i>Escherichia coli</i> : ≤ 20 UFC/g <i>Staphylococcus aureus</i> coagulase positivos: ≤ 200 UFC/g <i>Pseudomonas aeruginosa</i> : ND/25 g Bolores/leveduras: ≤ 20 UFC/g UFC: Unidades formadoras de colónias ND: não detetável	

Novo alimento autorizado	Especificações
Trans-resveratrol	<p>Descrição/definição:</p> <p>Sintético: o trans-resveratrol são cristais de cor esbranquiçada a bege.</p> <p>Denominação química: 5-[(E)-2-(4-hidroxifenil)etenil]benzeno-1,3-diol</p> <p>Fórmula química: C₁₄H₁₂O₃</p> <p>Peso molecular: 228,25 Da</p> <p>N.º CAS: 501-36-0</p> <p>Pureza:</p> <p>Trans-resveratrol: ≥ 98-99 %</p> <p>Total de subprodutos (substâncias relacionadas): ≤ 0,5 %</p> <p>Qualquer substância relacionada individual: ≤ 0,1 %</p> <p>Cinzas sulfatadas: ≤ 0,1 %</p> <p>Perda por secagem: ≤ 0,5 %</p> <p>Metais pesados:</p> <p>Chumbo: ≤ 1,0 ppm</p> <p>Mercúrio: ≤ 0,1 ppm</p> <p>Arsénio: ≤ 1,0 ppm</p> <p>Impurezas:</p> <p>Di-isopropilamina: ≤ 50 mg/kg</p> <p>Fonte microbiana: uma estirpe geneticamente modificada de <i>Saccharomyces cerevisiae</i></p> <p>Aspetto: produto pulverulento de cor esbranquiçada a ligeiramente amarela</p> <p>Dimensão das partículas: 100 % inferior a 62,23 µm</p> <p>Teor de trans-resveratrol: mín. 98 % m/m (peso seco)</p> <p>Cinzas: máx. 0,5 % m/m</p> <p>Humidade: máx. 3 % m/m</p>
Extrato de crista de galو	<p>Descrição/definição:</p> <p>O extrato de crista de galо é obtido de <i>Gallus gallus</i> por hidrólise enzimática da crista dos galos e etapas subsequentes de filtração, concentração e precipitação. Os principais constituintes do extrato de crista de galо são os glicosaminoglicanos: ácido hialurónico, sulfato de condroitina A e sulfato de dermatano (sulfato de condroitina B). Produto pulverulento higroscópico, de cor branca ou esbranquiçada.</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Ácido hialurónico: 60-80 %</p> <p>Sulfato de condroitina A: ≤ 5,0 %</p> <p>Sulfato de dermatano (sulfato de condroitina B): ≤ 25 %</p> <p>pH: 5,0-8,5</p> <p>Pureza:</p> <p>Cloreto: ≤ 1,0 %</p> <p>Azoto: ≤ 8,0 %</p> <p>Perda por secagem: (105 °C durante 6 horas): ≤ 10 %</p> <p>Metais pesados:</p> <p>Mercúrio: ≤ 0,1 mg/kg</p> <p>Arsénio: ≤ 1,0 mg/kg</p> <p>Cádmio: ≤ 1,0 mg/kg</p> <p>Crómio: ≤ 10 mg/kg</p> <p>Chumbo: ≤ 0,5 mg/kg</p> <p>Critérios microbiológicos:</p> <p>Contagem de microrganismos aeróbios viáveis totais: ≤ 10² UFC/g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: ausente em 1 g</p> <p><i>Salmonella</i>: ausente em 1 g</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>: ausente em 1 g</p> <p><i>Pseudomonas aeruginosa</i>: ausente em 1 g</p>
Óleo de Sacha inchi de <i>Plukenetia volubilis</i>	<p>Descrição/definição:</p> <p>O óleo de Sacha inchi é um óleo 100 % vegetal obtido por pressão a frio das sementes de <i>Plukenetia volubilis</i> L. É um óleo brilhante, fluido (líquido) e transparente, à temperatura ambiente. Tem um sabor frutado, leve, e a produtos hortícolas verdes, sem sabores indesejáveis.</p> <p>Aspecto, limpidez, brilho, cor: fluido à temperatura ambiente, límpido, brilhante, amarelo-ouro</p> <p>Odor e sabor: frutado, a produtos hortícolas, sem sabor ou odor inaceitáveis</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Pureza:</p> <p>Água e voláteis: < 0,2 g/100 g</p> <p>Impurezas insolúveis em hexano: < 0,05 g/100 g</p> <p>Ácido oleico: < 2,0 g/100 g</p> <p>Índice de peróxidos: < 15 meq O₂/kg</p> <p>Ácidos gordos <i>trans</i>: < 1,0 g/100 g</p> <p>Ácidos gordos insaturados totais: > 90 %</p> <p>Ácido ómega 3 alfa linolénico (ALA): > 45 %</p> <p>Ácidos gordos saturados: < 10 %</p> <p>Sem ácidos gordos <i>trans</i> (< 0,5 %)</p> <p>Sem ácido erúcico (< 0,2 %)</p> <p>Mais de 50 % de triglicéridos tri-linolenina e di-linolenina</p> <p>Composição e nível de fitoesteróis</p> <p>Sem colesterol (< 5,0 mg/100 g)</p>
Salatrim	<p>Descrição/definição:</p> <p>Salatrim é o acrônimo reconhecido internacionalmente para a expressão <i>short and long chain acyl triglyceride molecules</i> (moléculas de triacilglicéridos de cadeia curta e longa). O salatrim é preparado por inter-esterificação não enzimática de triacetina, tripropionina, tributirina ou pela sua mistura com óleo de colza, de soja, de semente de algodão ou de girassol hidrogenado. Descrição: líquido límpido, de cor ligeiramente âmbar a sólido ceróide de cor clara à temperatura ambiente. Isento de material particulado e de cheiro estranho ou a ranço.</p> <p>Distribuição dos ésteres de glicerol:</p> <p>Triacilgliceróis: > 87 %</p> <p>Diacilgliceróis: ≤ 10 %</p> <p>Monoacilgliceróis: ≤ 2,0 %</p> <p>Composição em ácidos gordos:</p> <p>% molar de AGCL (ácidos gordos de cadeia longa): 33-70 %</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>% molar de AGCC (ácidos gordos de cadeia curta): 30-67 % Ácidos gordos saturados de cadeia longa: < 70 %, em peso Ácidos gordos <i>trans</i>: ≤ 1,0 % Ácidos gordos livres expressos em ácido oleico: ≤ 0,5 % Perfil de triacilglicerol: Triésteres (cadeia curta/cadeia longa entre 0,5 e 2,0): ≥ 90 % Triésteres (cadeia curta/cadeia longa = 0): ≤ 10 % Material insaponificável: ≤ 1,0 % Humidade: ≤ 0,3 % Cinzas: ≤ 0,1 % Cor: ≤ 3,5 vermelho (Lovibond) Índice de peróxidos: ≤ 2,0 meq/kg</p>
Óleo de <i>Schizochytrium</i> sp. rico em DHA e EPA	<p>Índice de acidez: ≤ 0,5 mg KOH/g Índice de peróxidos: ≤ 5,0 meq/kg de óleo Estabilidade à oxidação: todos os produtos alimentares que contenham óleo rico em DHA e EPA de <i>Schizochytrium</i> sp. devem demonstrar estabilidade à oxidação através de uma metodologia de teste adequada e reconhecida a nível nacional/internacional (por exemplo, AOAC). Humidade e voláteis: ≤ 0,05 % Insaponificáveis: ≤ 4,5 % Ácidos gordos <i>trans</i>: ≤ 1 % Teor de DHA: ≥ 22,5 % Teor de EPA: ≥ 10 %</p>
▼M26 Óleo de <i>Schizochytrium</i> sp. (ATCC PTA-9695)	<p>O novo alimento é obtido a partir da estirpe ATCC PTA-9695 da microalga <i>Schizochytrium</i> sp. Índice de peróxidos: ≤ 5,0 meq/kg de óleo Insaponificáveis: ≤ 3,5 % Ácidos gordos <i>trans</i>: ≤ 2,0 % Ácidos gordos livres: ≤ 0,4 % Ácido docosapentaenoico (DPA) n-6: ≤ 7,5 % Teor de DHA: ≥ 35 %</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
Óleo de <i>Schizochytrium</i> sp.	<p>Índice de acidez: ≤ 0,5 mg KOH/g</p> <p>Índice de peróxidos: ≤ 5,0 meq/kg de óleo</p> <p>Humidade e voláteis: ≤ 0,05 %</p> <p>Insaponificáveis: ≤ 4,5 %</p> <p>Ácidos gordos <i>trans</i>: ≤ 1,0 %</p> <p>Teor de DHA: ≥ 32,0 %</p>
Óleo de <i>Schizochytrium</i> sp. (T18)	<p>Índice de acidez: ≤ 0,5 mg KOH/g</p> <p>Índice de peróxidos: ≤ 5,0 meq/kg de óleo</p> <p>Humidade e voláteis: ≤ 0,05 %</p> <p>Insaponificáveis: ≤ 3,5 %</p> <p>Ácidos gordos <i>trans</i>: ≤ 2,0 %</p> <p>Ácidos gordos livres: ≤ 0,4 %</p> <p>Teor de DHA: ≥ 35 %</p>
Extrato de soja fermentada	<p>Descrição/definição:</p> <p>O extrato de soja fermentada é um produto pulverulento inodoro, branco-leitoso. É constituído por 30 % de pó de extrato de soja fermentada e 70 % de dextrina resistente (como transportador) de amido de milho, que é acrescentada durante a transformação. A vitamina K₂ é removida durante o processo de fabrico.</p> <p>O extrato de soja fermentada contém natoquinase isolada do natto, um gênero alimentício produzido por fermentação de sementes de soja não geneticamente modificada [<i>Glycine max</i> (L.)] com uma estirpe selecionada de <i>Bacillus subtilis</i> var. natto.</p> <p>Atividade da natoquinase 20 000-28 000 unidades de degradação da fibrina/g⁽¹⁾</p> <p>Identidade: confirmável</p> <p>Condição: sem odor ou paladar ofensivo</p> <p>Perda por secagem: ≤ 10 %</p> <p>Vitamina K₂: ≤ 0,1 mg/kg</p> <p>Metais pesados:</p> <p>Chumbo: ≤ 5,0 mg/kg</p> <p>Arsénio: ≤ 3,0 mg/kg</p> <p>Critérios microbiológicos:</p> <p>Contagem de microrganismos aeróbios viáveis totais: ≤ 10³ UFC⁽³⁾/g</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Bolores e leveduras: $\leq 10^2$ UFC/g Coliformes: ≤ 30 UFC/g Bactérias formadoras de esporos: ≤ 10 UFC/g <i>Escherichia coli</i>: ausente/25 g <i>Salmonella</i>: ausente/25 g <i>Listeria</i>: ausente/25 g (¹) Método de ensaio descrito por Takaoka <i>et al.</i> (2010).</p>
Extrato de gérmen de trigo (<i>Triticum aestivum</i>) rico em espermidina	<p>Descrição/definição: O extrato de gérmen de trigo rico em espermidina é obtido a partir de gérmen de trigo (<i>Triticum aestivum</i>) não germinado e não fermentado, pelo processo de extração sólido-líquido direcionado especificamente, mas não exclusivamente, para poliaminas. Espermidina: 0,8-2,4 mg/g Espermina: 0,4-1,2 mg/g Tricloreto de espermidina < 0,1 µg/g Putrescina: < 0,3 mg/g Cadaverina: < 0,1 µg/g Micotoxinas: Aflatoxinas (total): < 0,4 µg/kg Critérios microbiológicos: Bactérias aeróbias totais: < 10 000 UFC/g Bolores e leveduras: < 100 UFC/g <i>Escherichia coli</i>: < 10 UFC/g <i>Salmonella</i>: ausente/25 g <i>Listeria monocytogenes</i>: ausente/25 g</p>
Sucromalt	<p>Descrição/definição: O Sucromalt é uma mistura complexa de sacáridos obtida a partir de sacarose e de um hidrolisado de amido através de uma reação enzimática. Neste processo, as unidades de glucose ligam-se aos sacáridos do hidrolisado de amido pela ação de uma enzima produzida pela bactéria <i>Leuconostoc citreum</i> ou por uma estirpe recombinante do organismo produtor <i>Bacillus licheniformis</i>. Os oligossacáridos resultantes caracterizam-se pela presença de compostos glicosídicos α-(1→6) e α-(1→3). O produto é um xarope que, além destes oligossacáridos, contém principalmente frutose, mas também o dissacárido leucrose e outros dissacáridos. Sólidos totais: 75-80 %</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Humidade: 20-25 % Sulfatase: máx. 0,05 % pH: 3,5-6,0 Condutividade < 200 (30 %) Azoto < 10 ppm Frutose: 35-45 % (peso seco) Leucrose: 7-15 % (peso seco) Outros dissacáridos: máx. 3 % Sacáridos com mais de duas unidades: 40-60 % (peso seco)</p>
Fibra de cana-de-açúcar	<p>Descrição/definição: A fibra de cana-de-açúcar é obtida a partir da parede celular seca ou do resíduo fibroso remanescente após a expressão ou extração do sumo de açúcar a partir da cana-de-açúcar de genótipo <i>Saccharum</i>. É constituída principalmente por celulose e hemicelulose. O processo de produção é constituído por diversas etapas, nomeadamente: o estilhaçamento, a digestão alcalina, a remoção de lenhinas e de outros componentes não celulosicos, o branqueamento das fibras purificadas, a lavagem com ácido e a neutralização.</p> <p>Humidade: ≤ 7,0 % Cinzas: ≤ 0,3 % Fibras alimentares totais (AOAC), em base seca (insolúveis): ≥ 95 % das quais: hemicelulose (20-25 %) e celulose (70-75 %) Sílica (ppm): ≤ 200 Proteínas: 0,0 % Gordura: vestígios pH: 4-7</p> <p>Metais pesados:</p> <p>Mercúrio (ppm): ≤ 0,1 Chumbo (ppm): ≤ 1,0 Arsénio (ppm): ≤ 1,0 Cádmio (ppm): ≤ 0,1</p> <p>Critérios microbiológicos:</p> <p>Bolores e leveduras (UFC/g): ≤ 1 000 <i>Salmonella</i>: ausente <i>Listeria monocytogenes</i>: ausente</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
Extrato de óleo de girassol	<p>Descrição/definição: O extrato de girassol é obtido por um fator de concentração de 10 da fração insaponificável do óleo de girassol refinado extraído das sementes de girassol, <i>Helianthus Annuus L.</i></p> <p>Composição:</p> <p>Ácido oleico (C18:1): 20 % Ácido linoleico (C18:2): 70 % Matérias insaponificáveis: 8,0 % Fitoesteróis: 5,5 % Tocoferóis: 1,1 %</p>
Liofilizado da microalga <i>Tetraselmis chuii</i>	<p>Descrição/definição: O produto seco é obtido a partir da microalga marinha <i>Tetraselmis chuii</i>, pertencente à família <i>Chlorodendraceae</i>, cultivada em água do mar estéril em fotobiorreatores fechados e isolados do ar exterior.</p> <p>Pureza/Composição:</p> <p>Identificada mediante o marcador nuclear rDNA 18 S (sequência analisada não inferior a 1 600 pares de bases) na base de dados do <i>National Centre for Biotechnology Information</i> (NCBI): não inferior a 99,9 %</p> <p>Humidade: ≤ 7,0 % Proteínas: 35-40 % Cinzas: 14-16 % Hidratos de carbono: 30-32 % Fibra: 2-3 % Gordura: 5-8 %</p> <p>Ácidos gordos saturados: 29-31 % dos ácidos gordos totais Ácidos gordos monoinsaturados: 21-24 % dos ácidos gordos totais Ácidos gordos polinsaturados: 44-49 % dos ácidos gordos totais</p> <p>Iodo: ≤ 15 mg/kg</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
<i>Therapon barcoo/Scortum</i>	<p>Descrição/definição:</p> <p>O <i>Scortum/Therapon barcoo</i> é uma espécie de peixes da família <i>Terapontidae</i>. É uma espécie endémica de água doce proveniente da Austrália, que é agora criada em explorações piscícolas.</p> <p>Identificação taxonómica: Classe: <i>Actinopterygii</i> > ordem: <i>Perciformes</i> > família: <i>Terapontidae</i> > género: <i>Therapon</i> ou <i>Scortum barcoo</i></p> <p>Composição da carne de peixe:</p> <p>Proteínas (%): 18-25</p> <p>Humidade (%): 65-75</p> <p>Cinzas (%): 0,5-2,0</p> <p>Energia (KJ/Kg): 6000-11500</p> <p>Hidratos de carbono (%): 0,0</p> <p>Gordura (%): 5-15</p> <p>Ácidos gordos (mg/g de filete):</p> <p>Σ PUFA n-3: 1,2-20,0</p> <p>Σ PUFA n-6: 0,3-2,0</p> <p>PUFA n-3/n-6: 1,5-15,0</p> <p>Total de ácidos ómega 3: 1,6-40,0</p> <p>Total de ácidos ómega 6: 2,6-10,0</p>
D-Tagatose	<p>Descrição/definição:</p> <p>A tagatose é produzida por isomerização da galactose por meio de conversão enzimática ou química, ou por epimerização da frutose através de conversão enzimática. Estas conversões são realizadas numa única etapa.</p> <p>Aspetto: cristais de cor branca ou esbranquiçada</p> <p>Denominação química: D-tagatose</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Sinónimo: D-<i>lyxo</i>-Hexulose N.º CAS: 87-81-0 Fórmula química: C₆H₁₂O₆ Massa molecular: 180,16 (g/mol)</p> <p>Pureza: Doseamento: ≥ 98 % (peso seco) Perda por secagem: ≤ 0,5 % (102 °C, 2 horas) Rotação específica: [α]_D²⁰: - 4 a - 5,6° (solução aquosa a 1 %)⁽¹⁾ Intervalo de fusão: 133-137 °C</p> <p>Metais pesados: Chumbo: ≤ 1,0 mg/kg(*)</p> <p>(*) Fazer a determinação usando uma técnica de absorção atómica apropriada ao nível especificado. A seleção da dimensão da amostra e do método de preparação da amostra pode basear-se nos princípios do método descrito em FNP 5. «Métodos instrumentais»⁽¹⁾.</p> <p>⁽¹⁾ «Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 — Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials» (JECFA), 1991, 307 p., inglês, ISBN 92-5-102991-1</p>
Extrato rico em taxifolina	<p>Descrição: O extrato rico em taxifolina da madeira do larício Dahurian [<i>Larix gmelinii</i> (Rupr.) Rupr] é um produto pulverulento de cor branca a amarela pálida, que cristaliza a partir de soluções aquosas quentes.</p> <p>Definição: Denominação química: [(2R,3R)-2-(3,4 di-hidroxifenil)-3,5,7-tri-hidroxi-2,3-di-hidrocromen-4-ona, também denominada (+) <i>trans</i> (2R,3R)-di-hidroqueracetina] Fórmula química: C₁₅H₁₂O₇ Massa molecular: 304,25 Da N.º CAS: 480-18-2</p> <p>Especificações:</p> <p><i>Parâmetro físico</i> Humidade: ≤ 10 %</p> <p><i>Análise do composto</i> Taxifolina (m/m): ≥ 90,0 % do peso seco</p>

Novo alimento autorizado	Especificações																				
	<p><i>Metais pesados, pesticidas</i></p> <p>Chumbo: ≤ 0,5 mg/kg</p> <p>Arsénio: ≤ 0,02 mg/kg</p> <p>Cádmio: ≤ 0,5 mg/kg</p> <p>Mercúrio: ≤ 0,1 mg/kg</p> <p>Diclorodifeniltricloroetano (DDT): ≤ 0,05 mg/kg</p> <p><i>Solventes residuais</i></p> <p>Etanol: < 5 000 mg/kg</p> <p><i>Critérios microbiológicos</i></p> <p>Contagem total em placa (CTP): ≤ 10⁴ UFC/g</p> <p>Enterobactérias: ≤ 100/g</p> <p>Bolores e leveduras : ≤ 100 UFC/g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: ausente/1 g</p> <p><i>Salmonella</i>: ausente/10 g</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>: ausente/1 g</p> <p><i>Pseudomonas</i>: ausente/1 g</p> <p>Intervalo normal de componentes do extrato rico em taxifolina (por matéria seca)</p> <table> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>Componente do extrato</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Teor, intervalo usualmente observado (%)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Taxifolina</td> <td>90-93</td> </tr> <tr> <td>Aromadendrina</td> <td>2,5-3,5</td> </tr> <tr> <td>Eriodictiol</td> <td>0,1-0,3</td> </tr> <tr> <td>Quercetina</td> <td>0,3-0,5</td> </tr> <tr> <td>Naringenina</td> <td>0,2-0,3</td> </tr> <tr> <td>Campferol</td> <td>0,01-0,1</td> </tr> <tr> <td>Pinocembrina</td> <td>0,05-0,12</td> </tr> <tr> <td>Flavonoides não identificados 1-3</td> <td>1 – 3</td> </tr> <tr> <td>Água(*)</td> <td>1,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) A taxifolina na sua forma hidratada e durante o processo de secagem é um cristal. Isto resulta na inclusão de água de cristalização numa quantidade de 1,5 %.</p>	<i>Componente do extrato</i>	<i>Teor, intervalo usualmente observado (%)</i>	Taxifolina	90-93	Aromadendrina	2,5-3,5	Eriodictiol	0,1-0,3	Quercetina	0,3-0,5	Naringenina	0,2-0,3	Campferol	0,01-0,1	Pinocembrina	0,05-0,12	Flavonoides não identificados 1-3	1 – 3	Água(*)	1,5
<i>Componente do extrato</i>	<i>Teor, intervalo usualmente observado (%)</i>																				
Taxifolina	90-93																				
Aromadendrina	2,5-3,5																				
Eriodictiol	0,1-0,3																				
Quercetina	0,3-0,5																				
Naringenina	0,2-0,3																				
Campferol	0,01-0,1																				
Pinocembrina	0,05-0,12																				
Flavonoides não identificados 1-3	1 – 3																				
Água(*)	1,5																				

Novo alimento autorizado	Especificações
Trealose	<p>Descrição/definição: Um dissacárido não redutor formado por dois grupos glucose unidos através duma ligação α-1,1-glucosídica. É produzido a partir de amido liquefeito ou de sacarose por um processo enzimático com várias etapas. O produto comercial é o di-hidrato. Produto cristalino de cor branca ou esbranquiçada, praticamente inodoro e com sabor doce.</p> <p>Sinónimos: α,α-trealose</p> <p>Denominação química: α-D-glucopiranosil-α-D-glucopiranósido, di-hidrato</p> <p>N.º CAS: 6138-23-4 (di-hidrato)</p> <p>Fórmula química: $C_{12}H_{22}O_{11} \cdot 2H_2O$ (di-hidrato)</p> <p>Massa molecular: 378,33 (di-hidrato)</p> <p>Doseamento: $\geq 98\%$ em base seca</p> <p>Fazer a determinação usando uma técnica de absorção atómica apropriada ao nível especificado. A seleção da dimensão da amostra e do método de preparação da amostra pode basear-se nos princípios do método descrito em FNP 5⁽¹⁾, «Métodos instrumentais».</p> <p>Método de doseamento:</p> <p>Princípio: a trealose é identificada por cromatografia líquida e quantificada por comparação com um padrão de referência de trealose</p> <p>Preparação da solução de amostra: pesar rigorosamente cerca de 3 g de amostra seca para um balão volumétrico de 100 ml e adicionar cerca de 80 ml de água desionizada e purificada. Dissolver completamente a amostra e perfazer o volume do balão com água desionizada e purificada. Filtrar através de um filtro de 0,45 micrón.</p> <p>Preparação da solução padrão: dissolver em água uma quantidade rigorosamente pesada de padrão de referência de trealose seco de modo a obter uma solução com uma concentração conhecida de cerca de 30 mg de trealose por ml.</p> <p>Aparelho: cromatógrafo de fase líquida equipado com um detetor de índice de refração e um integrador</p> <p>Condições:</p> <p>Coluna: Shodex Ionpack KS-801 (Showa Denko Co.) ou equivalente</p> <ul style="list-style-type: none"> — comprimento: 300 mm — diâmetro: 10 mm — temperatura: 50 °C <p>Fase móvel: água</p> <p>Caudal: 0,4 ml/min</p> <p>Volume injetado: 8 μl</p> <p>Procedimento: injetar separadamente no cromatógrafo volumes iguais da solução de amostra e da solução padrão.</p> <p>Registar os cromatogramas e medir a dimensão da resposta do pico da trealose.</p> <p>Calcular a quantidade, em mg, de trealose presente em 1 ml da solução de amostra através da seguinte fórmula:</p>

▼M9


Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>% trealose = $100 \times (R_U/R_S) (W_S/W_U)$ em que R_S = área do pico da trealose na solução padrão R_U = área do pico da trealose na solução de amostra W_S = peso, em mg, da trealose na solução padrão W_U = peso da amostra seca em mg</p> <p>Características:</p> <p>Identificação: Solubilidade: muito solúvel em água; muito ligeiramente solúvel em etanol Rotação específica: $[\alpha]_D^{20} = +179^\circ$ (5 % solução aquosa, di-hidrato), $+199^\circ$ (5 % solução aquosa, substância anidra) Ponto de fusão: 97 °C (di-hidrato)</p> <p>Pureza: Perda por secagem: $\leq 1,5\%$ (60 °C, 5 h) Cinzas totais: $\leq 0,05\%$</p> <p>Metais pesados: Chumbo: $\leq 1,0\text{ mg/kg}$</p>
Cogumelos (<i>Agaricus bisporus</i>) tratados com radiação UV	<p>Descrição/definição: Cogumelos <i>Agaricus bisporus</i> cultivados para fins comerciais sujeitos após a colheita a um tratamento por radiação UV. Radiação UV: um processo de radiação com luz ultravioleta no intervalo de comprimentos de onda entre 200 e 800 nm.</p> <p>Vitamina D₂: Denominação química: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol Sinónimo: Ergocalciferol N.º CAS: 50-14-6 Peso molecular: 396,65 g/mol</p> <p>Conteúdo: Vitamina D₂ no produto final: 5-10 µg/100g de peso fresco no final do prazo de validade</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
Levedura para panificação (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) tratada com UV	<p>Descrição/definição: A levedura para panificação (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) é tratada com luz ultravioleta para induzir a conversão de ergosterol em vitamina D₂ (ergocalciferol). O teor de vitamina D₂ no concentrado de levedura varia entre 1 800 000 e 3 500 000 UI de vitamina D/100 g (450-875 µg/g). Grânulos acastanhados fluidos.</p> <p>Vitamina D₂: Denominação química: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol Sinónimo: Ergocalciferol N.º CAS: 50-14-6 Peso molecular: 396,65 g/mol</p> <p>Critérios microbiológicos para o concentrado de levedura: Coliformes: ≤ 10³/g <i>Escherichia coli</i>: ≤ 10/g <i>Salmonella</i>: ausente em 25 g</p>
Pão tratado com UV	<p>Descrição/definição: O pão tratado com UV consiste em pão levedado com fermento (sem guarnição) ao qual é aplicado um tratamento com radiações ultravioleta após a cozedura, a fim de converter o ergosterol em vitamina D₂ (ergocalciferol).</p> <p>Radiação UV: um processo de radiação com luz ultravioleta no intervalo de comprimentos de onda entre 240 e 315 nm durante 5 segundos, no máximo, com intensidade energética de 10-50 mJ/cm².</p> <p>Vitamina D₂: Denominação química: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol Sinónimo: Ergocalciferol N.º CAS: 50-14-6 Peso molecular: 396,65 g/mol</p> <p>Conteúdo: Vitamina D₂ (ergocalciferol) no produto final: 0,75-3 µg/100 g⁽¹⁾ Fermento na massa: 1-5 g/100 g⁽²⁾</p> <p>⁽¹⁾ Norma Europeia EN 12821, 2009. ⁽²⁾ Cálculo da receita.</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
Leite tratado com UV	<p>Descrição/definição: O leite tratado com UV é leite de vaca (gordo e meio-gordo) ao qual é aplicado, após a pasteurização, um tratamento com radiação ultravioleta (UV) através de um escoamento turbulento. O tratamento do leite pasteurizado com radiação UV resulta num aumento das concentrações da vitamina D₃ (colecalciferol) pela conversão do 7-desidrocolesterol em vitamina D₃. Radiação UV: um processo de radiação com luz ultravioleta no intervalo de comprimentos de onda entre 200 e 310 nm com intensidade energética de 1 045 J/l.</p> <p>Vitamina D₃: Denominação química: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metil-heptan-2-il]-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno]-4-metilidenociclo-hexan-1-ol Sinónimo: Colecalciferol N.º CAS: 67-97-0 Peso molecular: 384,6377 g/mol</p> <p>Conteúdo: Vitamina D₃ no produto final: Leite gordo⁽¹⁾: 0,5-3,2 µg/100 g⁽²⁾ Leite meio-gordo⁽¹⁾: 0,1-1,5 µg/100 g⁽²⁾</p> <p>⁽¹⁾ Tal como definido no Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e que revoga os Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 e (CE) n.º 1234/2007 do Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, p. 671).</p> <p>⁽²⁾ HPLC</p>
Vitamina K₂ (menaquinona)	<p>Este novo alimento é produzido por um processo microbiológico ou sintético. A vitamina K₂ (2-metil-3-totalmente-trans-poliprenil-1,4-naftoquinonas), ou série da menaquinona, é um grupo de derivados prenilados da naftoquinona. O número de resíduos de isopreno, em que uma unidade de isopreno consiste em 5 átomos de carbono incluindo a cadeia lateral, é utilizado para caracterizar os homólogos da menaquinona que contêm essencialmente MK-7, e MK-6 em menor quantidade. Série da vitamina K₂ (menaquinonas) em que a menaquinona-7 (MK-7)(n = 6) corresponde a C₄₆H₆₄O₂, a menaquinona-6 (MK-6)(n = 5) corresponde a C₄₁H₅₆O₂ e a menaquinona-4 (MK-4)(n = 3) corresponde a C₃₁H₄₀O₂. Denominação química: (todos-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-heptametyl-2,6,10,14,18,22,26-octacosa-heptaenil)-3-metil-1,4-naftalenodiona N.º CAS: 2124-57-4 Fórmula molecular: C₄₆H₆₄O₂</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Peso molecular: 649 g/mol</p>  <p>2-metil-1,4-naftoquinona (grupo menadiona)</p> <p>Especificações da vitamina K₂ (menaquinona-7) sintética</p> <p>Aspetto: produto pulverulento amarelo</p> <p>Pureza: 6,0 %, no máximo, de isómero <i>cis</i> e 2,0 %, no máximo, de outras impurezas</p> <p>Conteúdo: 97 %-102 % de menaquinona-7 (com pelo menos 92 % de menaquinona-7 totalmente-<i>trans</i>)</p> <p>Especificações da vitamina K₂ (menaquinona-7) produzida microbiologicamente</p> <p>Fonte: <i>Bacillus subtilis</i> spp. natto e <i>Bacillus licheniformis</i></p> <p>Aspetto: produto pulverulento amarelo ou suspensão em óleo</p>
Extrato de farelo de trigo	<p>Descrição/definição:</p> <p>Produto pulverulento cristalino de cor branca obtido por extração enzimática de farelo de <i>Triticum aestivum</i> L., rico em oligossacáridos de arabinoxilano.</p> <p>Matéria seca: mín. 94 %</p> <p>Oligossacáridos de arabinoxilano: mín. 70 % de matéria seca</p> <p>Grau de polimerização médio dos oligossacáridos de arabinoxilano: 3-8</p> <p>Ácido ferúlico (ligado aos oligossacáridos de arabinoxilano): 1-3 % de matéria seca</p> <p>Polí/oligossacáridos totais: mín. 90 %</p> <p>Proteínas: máx. 2 % de matéria seca</p> <p>Cinzas: máx. 2 % de matéria seca</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Parâmetros microbiológicos:</p> <p>Contagem total de bactérias mesófilas: máx. 10 000/g</p> <p>Leveduras: máx. 100/g</p> <p>Fungos: máx. 100/g</p> <p><i>Salmonella</i>: ausente em 25 g</p> <p><i>Bacillus cereus</i>: máx. 1000/g</p> <p><i>Clostridium perfringens</i>: máx. 1000/g</p>

▼M19**Xilo-oligossacáridos****Descrição**

O novo alimento consiste numa mistura de xilo-oligossacáridos (XOS) obtidos a partir de maçaroca de milho (*Zea mays* subsp. *mays*) através de hidrólise por uma xilanase de *Trichoderma reesei*, seguida de um processo de purificação.

Características/composição

Parâmetro	Forma pulverulenta 1	Forma pulverulenta 2	Forma de xarope
Humidade (%)	$\leq 5,0$	$\leq 5,0$	70-75
Proteína (g/100 g)		$< 0,2$	
Cinzas (%)		$\leq 0,3$	
pH		3,5-5,0	
Teor total de hidratos de carbono (g/100 g)	≥ 97	≥ 95	≥ 70
Teor de XOS (base seca) (g/100 g)	≥ 95	≥ 70	≥ 70
Outros hidratos de carbono (g/100 g) ^(a)	2,5-7,5	2-16	1,5-31,5
Monossacáridos totais (g/100 g)	0-4,5	0-13	0-29
Glucose (g/100 g)	0-2	0-5	0-4
Arabinose (g/100 g)	0-1,5	0-3	0-10
Xilose (g/100 g)	0-1,0	0-5	0-15
Dissacáridos totais (g/100 g)	27,5-48	25-43	26,5-42,5

▼M19

Novo alimento autorizado	Especificações							
Xilobiose (XOS DP2) (g/100 g)	25-45	23-40	25-40					
Cellobiose (g/100 g)	2,5-3	2-3	1,5-2,5					
Oligossacáridos totais (g/100 g)	41-77	36-72	32-71					
Xilotriose (XOS DP3) (g/100 g)	27-35	18-30	18-30					
Xilotetraose (XOS DP4) (g/100 g)	10-20	10-20	8-20					
Xilopentaose (XOS DP5) (g/100 g)	3-10	5-10	3-10					
Xilo-hexaoze (XOS DP6) (g/100 g)	1-5	1-5	1-5					
Xilo-heptaose (XOS DP7) (g/100 g)	0-7	2-7	2-6					
Maltodextrina (g/100 g) ^(b)	0	20-25	0					
Cobre (mg/kg)	< 5,0							
Chumbo (mg/kg)	< 0,5							
Arsénio (mg/kg)	< 0,3							
Salmonella [UFC ^(c) / 25 g]	Ausente							
E. coli (NMP ^(d) / 100 g)	Ausente							
Leveduras (UFC/g)	< 10							
Bolores (UFC/g)	< 10							
DP: Grau de polimerização.								
^(a) Outros hidratos de carbono incluem monossacáridos (glucose, xilose e arabinose) e cellobiose.								
^(b) O teor de maltodextrina é calculado em função da quantidade adicionada no processo.								
^(c) UFC: Unidades formadoras de colónias.								
^(d) NMP: número mais provável.								

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
▼M30 Biomassa da levedura <i>Yarrowia lipolytica</i>	<p>Descrição/definição: O novo alimento é a biomassa seca e morta pelo calor da levedura <i>Yarrowia lipolytica</i>.</p> <p>Características/composição:</p> <p>Proteína: 45-55 g/100 g Fibras alimentares: 24-30 g/100 g Açúcares: < 1,0 g/100 g Gordura: 7-10 g/100 g Cinzas totais: ≤ 12 % Teor de água: ≤ 5 % Teor em matéria seca: ≥ 95 %</p> <p>Critérios microbiológicos:</p> <p>Contagem de microrganismos aeróbios totais: ≤ 5×10^3 UFC/g Contagem de bolores e leveduras totais: ≤ 10^2 UFC/g Células viáveis de <i>Yarrowia lipolytica</i> (¹⁰): < 10 UFC/g (ou seja, limite de deteção) Coliformes: ≤ 10 UFC/g <i>Salmonella</i> spp.: ausente em 25 g</p>
▼M9 Beta-glucanos de levedura	<p>Descrição/definição: Os beta-glucanos são polissacáridos complexos de elevada massa molecular (100-200 kDa) que se encontram na parede celular de muitas leveduras e cereais. A denominação química dos «beta-glucanos de levedura» é (1-3),(1-6)-β-D-glucanos.</p> <p>Os beta-glucanos são constituídos por uma cadeia principal de resíduos de glucose com ligações β-1,3, ramificados com ligações β-1,6, a que se ligam quitina e manoproteínas através de ligações β-1,4.</p> <p>Os beta-glucanos são isolados a partir da levedura <i>Saccharomyces cerevisiae</i>.</p> <p>A estrutura terciária da parede celular de glucano da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> consiste em cadeias de resíduos de glucose com ligações β-1,3, ramificadas com ligações β-1,6, formando uma cadeia principal a que se liga a quitina através de ligações β-1,4, β-1,6-glucanos e algumas manoproteínas.</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Este novo alimento está disponível em três formas diferentes: solúvel, insolúvel e insolúvel em água mas dispersível em diversas matrizes líquidas.</p> <p>Características químicas dos beta-glucanos de levedura (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>):</p> <p>Forma solúvel:</p> <p>Hidratos de carbono totais: > 75 % Beta-glucanos (1,3/1,6): > 75 % Cinzas: < 4,0 % Humidade: < 8,0 % Proteínas: < 3,5 % Gordura: < 10 %</p> <p>Forma insolúvel:</p> <p>Hidratos de carbono totais: > 70 % Beta-glucanos (1,3/1,6): > 70 % Cinzas: ≤ 12 % Humidade: < 8,0 % Proteínas: < 10 % Gordura: < 20 %</p> <p>Insolúvel em água mas dispersível em diversas matrizes líquidas:</p> <p>(1,3)-(1,6)-β-D-Glucanos: > 80 % Cinzas: < 2,0 % Humidade: < 6,0 % Proteínas: < 4,0 % Gorduras totais: < 3,0 %</p> <p><i>Dados microbiológicos para a forma insolúvel em água mas dispersível em diversas matrizes líquidas:</i></p> <p>Contagem total em placa: < 1 000 UFC/g <i>Enterobacteriaceae</i>: ≤ 100 UFC/g Coliformes totais: < 10 UFC/g Leveduras: < 25 UFC/g</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Bolores: < 25 UFC/g <i>Salmonella</i>: ausente em 25 g <i>Escherichia coli</i>: ausente em 1 g <i>Bacillus cereus</i>: < 100 UFC/g <i>Staphylococcus aureus</i>: ausente em 1 g Metais pesados para a forma insolúvel em água mas dispersível em diversas matrizes líquidas: ► M31 Chumbo: < 0,2 mg/kg Arsénio: < 0,2 mg/kg Mercúrio: < 0,1 mg/kg Cádmio: < 0,1 mg/kg ◀</p>
Zeaxantina	<p>Descrição/definição: A zeaxantina é um pigmento de xantofila de ocorrência natural e é um carotenoide oxigenado. A zeaxantina sintética apresenta-se quer como pó seco, obtido por pulverização, de base gelatinosa ou amilácea («microesferas») com α-tocoferol e palmitato de ascorbilo adicionados, quer como suspensão em óleo de milho com α-tocoferol adicionado. A zeaxantina sintética é produzida por síntese química em várias fases a partir de moléculas mais pequenas. Produto pulverulento cristalino de cor laranja-avermelhada, com um odor ligeiro ou inodoro. Fórmula química: C₄₀H₅₆O₂ N.º CAS: 144-68-3 Peso molecular: 568,9 Da</p> <p>Propriedades físico-químicas:</p> <p>Perda por secagem: < 0,2 % Zeaxantina totalmente <i>trans</i>: > 96 % <i>cis</i>-Zeaxantina: < 2,0 % Outros carotenoides: < 1,5 % Óxido de trifenilfosfina (N.º CAS: 791-28-6): < 50 mg/kg</p>

Novo alimento autorizado	Especificações
L-Pidotato de zinco	<p>Descrição/definição:</p> <p>O L-pidotato de zinco é um produto pulverulento, de cor branca a esbranquiçada, com odor característico.</p> <p>Denominação comum internacional (INN): Ácido L-piroglutâmico, sal de zinco</p> <p>Sinónimos: 5-oxoprolina de zinco, piroglutamato de zinco, carboxilato de pirrolidona de zinco, PCA de zinco, L-zinco-pidotato</p> <p>N.º CAS: 15454-75-8</p> <p>Fórmula molecular: $(C_5H_6NO_3)_2Zn$</p> <p>Massa molecular relativa anidra: 321,4</p> <p>Aspetto: produto pulverulento, de cor branca a esbranquiçada</p> <p>Pureza:</p> <p>L-Pidotato de zinco (pureza): $\geq 98\%$</p> <p>pH (solução aquosa a 10 %): 5,0-6,0</p> <p>Rotação específica: 19,6°- 22,8°</p> <p>Água: $\leq 10,0\%$</p> <p>Ácido glutâmico: $< 2,0\%$</p> <p>Metais pesados:</p> <p>Chumbo: $\leq 3,0\text{ ppm}$</p> <p>Arsénio: $\leq 2,0\text{ ppm}$</p> <p>Cádmio: $\leq 1,0\text{ ppm}$</p> <p>Mercúrio: $\leq 0,1\text{ ppm}$</p>

▼M9

Novo alimento autorizado	Especificações
	<p>Critérios microbiológicos:</p> <p>Contagem de microrganismos mesófilos viáveis totais: ≤ 1 000 UFC/g</p> <p>Bolores e leveduras: ≤ 100 UFC/g</p> <p>Agentes patogénicos: ausente</p>

(¹) Regulamento (UE) n.º 231/2012 da Comissão, de 9 de março de 2012, que estabelece especificações para os aditivos alimentares enumerados nos anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 83 de 22.3.2012, p. 1).

(²) Regulamento de Execução (UE) 2015/175 da Comissão, de 5 de fevereiro de 2015, que fixa condições especiais aplicáveis às importações de goma de guar originária ou expedida da Índia devido ao risco de contaminação por pentaclorofenol e dioxinas (JO L 30 de 6.2.2015, p. 10).

► **M15** (³) Método OSC-DMAC (4-dimetilaminocinamaldeído) (Ocean Spray Cranberries, Inc) Martin MA, Ramos S, Mateos R, Marais JPJ, Bravo-Clemente, L, Khoo C e Goya L. *Food Res Intl* 2015;71:68-82. Modificado de Cunningham DG, Vannozzi S, O'Shea E, Turk R (2002) Em: Ho C-T, Zheng QY (eds) Quality Management of Nutraceuticals ACS Symposium series 803, Washington DC. *Quantitation of PACs by DMAC Color Reaction* pp 151-166.

(⁴) Método BL-DMAC (4-dimetilaminocinamaldeído) (Brunswick Lab) Validação efetuada em vários laboratórios de um método normalizado para a quantificação de proantocianidinas em pós de airelas. Prior RL, Fan E, Ji H, Howell A, Nio C, Payne MJ, Reed J. *J Sci Food Agric.* 2010 Jul;90(9):1473-8.

(⁵) Os diferentes valores para estes três parâmetros devem-se aos diferentes métodos utilizados.

(⁶) EAG: Equivalentes de ácido gálico.

(⁷) UFC: Unidades formadoras de colónias. ◀

► **M29** (⁸) HPLC/RI: cromatografia líquida de alta resolução com deteção do índice de refração.

(⁹) UFC: Unidades formadoras de colónias. ◀

(¹⁰) A ensaiar imediatamente após a etapa do tratamento térmico. É necessário tomar medidas para evitar a contaminação cruzada com células viáveis de *Yarrowia lipolytica* durante a embalagem e/ou armazenagem do novo alimento.

(¹¹) 3'-fucosil-lactose, 2'-fucosil-galactose, glucose, galactose, manitol, sorbitol, galactitol, tri-hexose, alo-lactose e outros hidratos de carbono estruturalmente relacionados.