

Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

► **B**

PRVÁ SMERNICA KOMISIE

z 18. apríla 1978,

ktorá mení a dopĺňa prílohy smernice 66/401/EHS o obchodovaní s osivom krmovín

(78/386/EHS)

(UL L 113 , 25.4.1978, str. 1)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
► <u>M1</u>	Smernica Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981,	L 67	36	12.3.1981
► <u>M2</u>	Smernica Komisie 82/287/EHS z 13. apríla 1982,	L 131	24	13.5.1982



PRVÁ SMERNICA KOMISIE

z 18. apríla 1978,

ktorá mení a dopĺňa prílohy smernice 66/401/EHS o obchodovaní s osivom krmovín

(78/386/EHS)

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom krmovín ⁽¹⁾, naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 78/55/EHS ⁽²⁾, a najmä na jej článok 21a,

keďže, vo svetle rozvoja vedeckých a technologických poznatkov, prílohy I, II a III smernice by sa mali zmeniť a doplniť z dôvodov ustanovených nižšie;

keďže, s cieľom zlepšiť genetickú hodnotu osív, mali by sa prijať ustanovenia upravujúce kritériá odrodovej čistoty, ktoré musia spĺňať plodiny v prípade určitých druhov;

keďže, vzhľadom na uvedené, v prípade samoopelivých druhov a apomixtických jednoklonových odrôd druhu *Poa*, by sa mali prijať ustanovenia upravujúce kritériá odrodovej čistoty, ktoré musia osivá spĺňať;

keďže by sa mali prijať ustanovenia upravujúce podmienky, ktoré musí spĺňať plodina vzhľadom na prítomnosť škodlivých organizmov redukujúcich využitie osiva;

keďže osobitné kritériá by sa mali ustanoviť vzhľadom na maximálny obsah ďalších nežiadúcich a škodlivých osív, ako je *Agropyron repens*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis*, druh *Melilotus*, *Sinapis arvensis*, *Raphanus raphanistrum* alebo druhy *Rumex* iné ako *Rumex acetosella*, *Rumex crispus* a *Rumex obtusifolius*;

keďže kritériá vzhľadom na minimálnu klíčivosť, minimálnu analytickú čistotu by sa mali prijať vo svetle vývoja kvality osiva dosahovanej bežným spôsobom;

keďže, s cieľom zabezpečiť podmienky na úradné preskúšanie osiva, ktoré sa uskutočňuje v súlade so súčasnými medzinárodnými metódami, je potrebné revidovať niektoré ustanovenia;

keďže opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 66/401/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Príloha I znie takto:

„PRÍLOHA I

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPĽŇAŤ PLODINA

1. Predchádzajúci zber úrody z pestovateľskej plochy by nemal byť v nesúlade s výrobou osiva druhov a odrôd plodiny a pestovateľská plocha by mala byť dostatočne vyčistená od takých rastlín, ktoré sa na nej samovoľne vyskytli počas zberu poslednej úrody.
2. Plodina by mala vyhovovať nasledujúcim kritériám vzhľadom na vzdialenosť od susediacich zdrojov peľu, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k nežiaducemu cudziemu opeleniu:

⁽¹⁾ Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

⁽²⁾ Ú. v. ES L 16, 20.1.1978, s. 23.

▼B

Plodina	Minimálna vzdialenosť
1	2
druh Brassica:	
— na výrobu základného osiva	400 m
— na výrobu certifikovaného osiva	200 m
Druhy alebo odrody iné ako druh Brassica, Pisum arvense, apomyktické jednoklonové odrody druhu Poa:	
— na výrobu osiva určeného na množenie, pestovateľská plocha do dvoch hektárov	200 m
— na výrobu osiva určeného na množenie, pestovateľská plocha väčšia ako dva hektáre	100 m
— na výrobu osiva určeného na výrobu krmiva, pestovateľská plocha do dvoch hektárov	100 m
— na výrobu osiva určeného na výrobu krmiva, pestovateľská plocha väčšia ako dva hektáre	50 m

Tieto vzdialenosti sa neberú do úvahy v prípade, že je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiadúcim cudzím opelením.

3. Rastliny iných druhov, osivá, ktoré je problematické odlišiť od plodiny pri laboratórnom rozbere, by sa mali vyskytovať v malom množstve.

Predovšetkým, ľuľkovité druhy musia spĺňať nasledujúce podmienky: množstvo rastlín ľuľkovitých druhov iných ako sú druhy plodiny nesmie prekročiť:

- jednu na 50 m² pestovateľskej plochy základného osiva,
- jednu na 10 m² pestovateľskej plochy certifikovaného osiva.

4. Plodina musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu. Predovšetkým plodiny druhov alebo odrôd iných ako Pisum arvense alebo apomyktických jednoklonových odrôd druhu Poa musia spĺňať nasledujúce kritériá: množstvo rastlín plodiny, ktoré možno rozpoznať ako zrejme nepatriace k odrode nesmie prekročiť:

- jednu na 30 m² pestovateľskej plochy základného osiva,
- jednu na 10 m² pestovateľskej plochy certifikovaného osiva.

5. Škodlivé organizmy, ktoré znižujú využiteľnosť osiva sa musia vyskytovať na čo možno najnižšej úrovni.

6. Splnenie vyššie uvedených kritérií alebo iných podmienok sa preveruje úradnou kontrolou priamo na pestovateľskej ploche.

Táto kontrola, na pestovateľskej ploche, sa uskutoční v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

- A. Podmienky a štádium vývinu plodiny musia umožňovať dostatočné preverenie.
- B. Malo by sa vykonať aspoň jedna kontrola priamo na pestovateľskej ploche.
- C. Veľkosť, počet a rozdelenie pestovateľskej plochy, ktorá podlieha kontrole s cieľom preveriť splnenie ustanovení tejto prílohy sa určí v súlade s vhodnými metódami.

2. Príloha II znie takto:

„PRÍLOHA II

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPĽŇAŤ OSIVO

I. CERTIFIKOVANÉ OSIVO

1. Osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu. Predovšetkým osivo Pisum arvense alebo apomyktických jednoklonových odrôd druhu Poa musí spĺňať nasledujúce kritériá alebo iné podmienky: minimálna odrodová čistota musí byť 98 %.

Minimálna odrodová čistota sa preveruje hlavne kontrolami na pestovateľskej ploche uskutočňovanými v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe I.

▼B

2. Osivo musí spĺňať nasledujúce kritériá alebo iné podmienky vzhľadom na klíčivosť, analytickú čistotu a obsah osiva iných rastlinných druhov, vrátane osiva druhu Lupin alebo iného farebného alebo horkého osiva druhu Vlčí bôb:

A. Tabulka

Druhy	Klíčivosť		Analytická čistota								Maximálny obsah osiva iného ako rastlinného druhu vo vzorke váhy uvedenej v stĺpci 4 prílohy III (celkom na stĺpec)			Podmienky vzhľadom na obsah osiva druhu Lupin inej farby a horkého osiva druhu Lupin
	Minimálna klíčivosť (% čistého osiva)	Maximálny obsah tvrdých semien (% čistého osiva)	Minimálna analytická čistota (% váhy)	Maximálny obsah osiva iného ako rastlinného druhu (% váhy)										
				Celkom	Jednotlivý druh	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Druh Melilorus	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatus, Avena ludoviciana, Avena sterilis	Druh Cuscuta	Druh Rumex iný ako Rumex acetosella	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OBILNINY														
Agrostis canina druh canina	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2	
Agrostis gigantea	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2	
Agrostis stolonifera	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2	
Agrostis tenuis	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2	
Alopecurus pratensis	70 (a)		75	2,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	10	
Arrhenatherum elatius	75 (a)		90	3,0	1,0 (f)	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	20	
Dactylis glomerata	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	10	
Festuca arundinacea	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	20	
Festuca ovina	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	10	
Festuca pratensis	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	20	
Festuca rubra	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	10	
Lolium multiflorum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	20	
Lolium perenne	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	20	
Lolium X hybridum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	20	
Phleum bertolonii	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5	
Phleum pratense	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5	
Poa annua	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5	
Poa nemoralis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2	
Poa palustris	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2	
Poa pratensis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2	
Poa trivialis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2	

Druhy	Klíčivosť		Analytická čistota								Maximálny obsah osiva iného ako rastlinného druhu vo vzorke váhy uvedenej v stĺpci 4 prílohy III (celkom na stĺpec)			Podmienky vzhľadom na obsah osiva druhu Lupin inej farby a horkého osiva druhu Lupin
	Minimálna klíčivosť (% čistého osiva)	Maximálny obsah tvrdých semien (% čistého osiva)	Minimálna analytická čistota (% váhy)	Maximálny obsah osiva iného ako rastlinného druhu (% váhy)										
				Celkom	Jednotlivý druh	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Druh Melilorus	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatus, Avena ludoviciana, Avena sterilis	Druh Cuscuta	Druh Rumex iný ako Rumex acetosella	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Trisetum flavescens STRUKOVINY	70 (a)		75	3,0	1,0 (f)	0,3	0,3				0 (h)	0 (j) (k)	2	(o) (p)
Hedysarum coronarium	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0			0,3			0	0 (k)	20	
Lotus corniculatus	75 (a) (b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Lupinus albus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
Lupinus angustifolius	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
Lupinus luteu	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
Medicago lupulina	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	20	
Medicago sativa	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	20	
Medicago varia	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	20	
Onobrychis sativa	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0			0,3			0	0 (j)	20	
Pisum arvense	80 (a)		98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	20 (n)	
Trifolium alexandrinum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	20	
Trifolium hybridum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Trifolium incarnatum	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	20	
Trifolium pratense	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	20	
Trifolium repens	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Trifolium resupinatum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Vicia faba druh, odroda equina	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	20 (n)	
Trigonella foenum-graecum	80 (a)		95	1,0	0,5			0,3			0	0 (j)	20	

Druhy	Klíčivosť		Analytická čistota								Maximálny obsah osiva iného ako rastlinného druhu vo vzorke váhy uvedenej v stĺpci 4 prílohy III (celkom na stĺpec)			Podmienky vzhľadom na obsah osiva druhu Lupin inej farby a horkého osiva druhu Lupin
	Minimálna klíčivosť (% čistého osiva)	Maximálny obsah tvrdých semien (% čistého osiva)	Minimálna analytická čistota (% váhy)	Maximálny obsah osiva iného ako rastlinného druhu (% váhy)										
				Celkom	Jednotlivý druh	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Druh Melilorus	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatus, Avena ludoviciana, Avena sterilis	Druh Cuscuta	Druh Rumex iný ako Rumex acerosella	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vicia faba odroda minor	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	20 (n)	
Vicia pannonica	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
Vicia sativa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
Vicia villosa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
INÉ DRUHY														
Brassica napus odroda napobrassica	80 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
Brassica oleracea spoluodroda acephala	75 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
Raphanus sativus druh oleifera	80 (a)		97	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j)	20	

▼B

- B. Kritériá alebo iné podmienky uplatňované v prípade, že je na ne odkaz v tabuľke v oddieli I (2) (A) tejto prílohy:
- a) Všetky svieže a zdravé semená, ktoré neklíčia po predspracovaní sa považujú za klíčivé semená.
 - b) Až do určeného maximálneho množstva, prítomné tvrdé semená sa považujú za semená, ktoré sú schopné klíčenia.
 - c) Maximálne množstvo 0,8 % na váhu osiva iného druhu ako *Poa* sa nepovažuje za nečistotu.
 - d) Maximálne množstvo 1 % na váhu semena *Trifolium pratense* sa nepovažuje za nečistotu.
 - e) Maximálne množstvo 0,5 % na váhu semena *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum arvense*, druh *Vicia faba*, *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa* v iných príslušných druhoch sa nepovažuje za nečistotu.
 - f) Predpísané maximálne percentuálne množstvo na váhu semena jednotlivých druhov sa neuplatňuje na semeno druhu *Poa*.
 - g) Maximálne množstvo dvoch semien *Avena fatua*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis* vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka rovnakej váhy neobsahuje akékoľvek semeno týchto druhov.
 - h) Prítomnosť jedného semena *Avena fatua*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis* vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej váhy neobsahuje akékoľvek semeno týchto druhov.
 - i) Určenie semien *Avena fatua*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis* na množstvo sa nemusí uskutočniť, pokiaľ neexistuje pochybnosť o tom, že podmienky ustanovené v stĺpci 12 sú splnené.
 - j) Určenie semena druhu *Cuscuta* na množstvo sa nemusí uskutočniť, pokiaľ neexistuje pochybnosť o tom, že podmienky ustanovené v stĺpci 13 sú splnené.
 - k) Prítomnosť jedného semena druhu *Cuscuta* vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka rovnakej váhy neobsahuje akékoľvek semeno druhu *Cuscuta*.
 - l) Váha vzorky s cieľom určenia semena druhu *Cuscuta* na množstvo je dvojnásobok váhy uvedenej v stĺpci 4 prílohy III pre príslušné druhy.
 - m) Prítomnosť jedného semena druhu *Cuscuta* vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej váhy neobsahuje akékoľvek semeno druhu *Cuscuta*.
 - n) Určenie semena druhu *Rumex* iného ako *Rumex acetosella* na množstvo sa nemusí uskutočniť, pokiaľ neexistuje pochybnosť o tom, že podmienky ustanovené v stĺpci 14 sú splnené.
 - o) Percentuálne množstvo semien druhu Vlčí bôb inej farby nesmie prekročiť:
 - v horkom osive druhu Vlčí bôb 2 %
 - v inom osive druhu Vlčí bôb ako horkom 1%.
 - p) Percentuálne množstvo horkého semena druhu Vlčí bôb v odrodách iných ako horké sivo druhu Vlčí bôb nesmie prekročiť:
 - v certifikovanom osive prvej generácie po základnom osive 3 %
 - v certifikovanom osive ďalších generácií po základnom osive 5 %.
3. Škodlivé organizmy, ktoré znižujú využiteľnosť osiva sa musia vyskytovať na čo možno najnižšej úrovni.

II. ZÁKLADNÉ OSIVO

Podľa ustanovení uvedených nižšie, podmienky ustanovené v oddieli I tejto prílohy sa uplatňujú na základné osivo:

1. Osivo *Pisum arvense* a apomytické jednoklonové odrody druhu *Poa* musia spĺňať nasledujúce kritériá alebo iné podmienky: minimálna odrodová čistota musí byť 99,7 %.

Minimálna odrodová čistota sa preveruje hlavne kontrolami na pestovateľskej ploche uskutočňovanými v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe I.

▼B

2. Osivo musí spĺňať tieto kritériá alebo iné podmienky:

A. Tabuľka:

Druhy	Maximálne množstvo osiva iných rastlinných druhov						Iné kritériá alebo podmienky
	Celkom (% váhy)	Obsah v množstve vzorky podľa váhy uvedenej v stĺpci 4 prílohy III (celkom vzhľadom na stĺpec)					
		Jednotlivé druhy	Druhy Rumex iné ako Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Druh Melilotuspp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
OBILNINY							
Agrostis canina druh canina	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis tenuis	0,3	20	1	1	1		(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20 (a)	5	5	5		(i) (j)
Dactylis glomerata	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca arundinacea	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca ovina	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca rubra	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium multiflorum	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium perenne	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium X hybridum	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Phleum bertolonii	0,3	20	2	1	1		(j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1		(j)
Poa annua	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa nemoralis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa palustris	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa pratensis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa trivialis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Trisetum flavescens	0,3	20	(c)1	1	1		(i)(j)
STRUKOVINY							
Hedysarum coronarium	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Lotus corniculatus	0,3	20	5			0 (e)	(g)(j)(k)

Druhy	Maximálne množstvo osiva iných rastlinných druhov						Iné kritériá alebo podmienky
	Celkom (% váhy)	Obsah v množstve vzorky podľa váhy uvedenej v stĺpci 4 prílohy III (celkom vzhľadom na stĺpec)					
		Jednotlivé druhy	Druhy Rumex iné ako Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Druh Melilotuspp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Lupinus albus	0,3	20	5			0 (d)	(h)(k)
Lupinus angustifolius	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Lupinus luteu	0,3	20	5			0 (d)	(h)(k)
Medicago lupulina	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago sativa	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago varia	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Onobrychis sativa	0,3	20	5			0 (d)	
Pisum arvense	0,3	20	5			0 (d)	
Trifolium alexandrinum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium hybridum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium pratense	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium repens	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium resupinatum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trigonella foenumgraecum	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba druh, odroda equina	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba odroda minor	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia pannonica	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia sativa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia villosa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
INÉ DRUHY							
Brassica napus odroda napobrassica	0,3	20	5				
Brassica oleracea spoluodroda acephala	0,3	20	5				(j)
Raphanus sativus druh oleifera	0,3	20	5				(j)

▼B

- B. Kritériá alebo iné podmienky uplatňované v prípade, že je na ne odkaz v tabuľke v oddieli II (2) (A) tejto prílohy:
- a) Maximálne množstvo 80 semien druhu *Poa* sa nepovažuje za nečistotu.
 - b) Podmienky ustanovené v stĺpci 3 sa neuplatňujú na semená druhu *Poa*. Maximálne celkové množstvo semien druhu *Poa* iného ako druhov, ktoré sa preverujú nesmie prekročiť v jednej vzorke 500 semien.
 - c) Maximálne množstvo 20 semien druhu *Poa* sa nepovažuje za nečistotu.
 - d) Určenie semien druhu *Melilotus* na množstvo sa nemusí uskutočniť, pokiaľ neexistuje pochybnosť o tom, že podmienky ustanovené v stĺpci 7 sú splnené.
 - e) Prítomnosť jedného semena druhu *Melilotus* vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej váhy neobsahuje akékoľvek semeno druhu *Melilotus*.
 - f) Podmienky písmena c) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatnia.
 - g) Podmienky písmena d) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatnia.
 - h) Podmienky písmena e) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatnia.
 - i) Podmienky písmena f) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatnia.
 - j) Podmienky písmena k) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatnia.
 - k) Percentuálne množstvo horkého osiva druhu *Vlčí bôb* v odrodách iných ako horké osivo druhu *Vlčí bôb* nesmie prekročiť 1 %.

III. Obchodné osivo

Podľa nižšie uvedených ustanovení, podmienky ustanovené v stĺpcoch 5 a 6 tabuľky v oddieli I (2) a (3) tejto prílohy sa uplatňujú na obchodné osivo:

1. Percentuálna sadzba podľa váhy ustanovená v stĺpcoch 5 a 6 tabuľky v oddieli 1 (2) (A) tejto prílohy sa zvyšuje o 1 %.
2. U druhu *Poa annua* sa maximálne celková váha 10 % osiva iného ako druhov *Poa* nepovažuje za nečistotu.
3. U druhu *Poa* iného ako druhu *Poa annua* maximálne celková váha 3 % osiva iných druhov *Poa* sa nepovažuje za nečistotu.
4. U *Hedisarum coronarium* sa maximálne celková váha 1 % semien druhu *Melilotus* nepovažuje za nečistotu.
5. Podmienky písmena d) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatňujú pre *Lotus corniculatus*.
6. Pre druhy *Vlčí bôb*:
 - a) minimálna analytická čistota je na 97% váhy;
 - b) percentuálna sadzba množstva osiva druhu *Vlčí bôb* inej farby nesmie presiahnuť:
 - u horkého osiva druhu *Vlčí bôb* 4%,
 - u osiva druhu *Vlčí bôb* iného ako horkého osiva druhu *Vlčí bôb* 2%;
 - c) percentuálna sadzba množstva horkého osiva druhu *Vlčí bôb* v osive druhu *Vlčí bôb* inom ako horkom osive druhu *Vlčí bôb* nesmie presiahnuť 5%.
7. V druhu *Vicia* maximálne celková váha 6 % osiva *Vicia pannonica*, *Vicia villiosa* alebo príbuzných pestovaných druhov v inom príslušnom druhu sa nepovažuje za nečistotu.
8. U *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villiosa* je minimálna analytická čistota 97 % váhy.

3. Príloha III znie takto:



„PRÍLOHA III

VÁHA DÁVKY A VZORKY

Druhy	Maximálna váha dávky	Minimálna váha vzorky odobratej z dávky (v gramoch)	Váha vzorky na určenie množstva ustanoveného v stĺpcoch 12 až 14 prílohy II (1) (2) (A) a stĺpcoch 3 až 7 prílohy II (II) (2) (A) (v gramoch)
1	2	3	4
OBILNINY			
<i>Agrostis canina</i> druh <i>canina</i>	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i>	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i>	10	50	5
<i>Agrostis tenuis</i>	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i>	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	200	80
<i>Dactylis glomerata</i>	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i>	10	100	50
<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60
<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
<i>Lolium X hybridum</i>	10	200	60
<i>Phleum bertolonii</i>	10	50	10
<i>Phleum pratense</i>	10	50	10
<i>Poa annua</i>	10	50	10
<i>Poa nemoralis</i>	10	50	5
<i>Poa palustris</i>	10	50	5
<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
<i>Trisetum flavescens</i>	10	50	5
STRUKOVINY			
<i>Hedysarum coronarium</i>			
— Ovocie	10	1 000	300
— Osivo	10	400	120
<i>Lotus corniculatus</i>	10	200	30
<i>Lupinus albus</i>	20	1 000	1 000
<i>Lupinus angustifolius</i>	20	1 000	1 000
<i>Lupinus luteu</i>	20	1 000	1 000
<i>Medicago lupulina</i>	10	300	50
<i>Medicago sativa</i>	10	300	50
<i>Medicago varia</i>	10	300	50
<i>Onobrychis sativa</i>			
— Ovocie	10	600	600
— Osivo	10	400	400
<i>Pisum arvense</i>	20	1 000	1 000
<i>Trifolium alexandrinum</i>	10	400	60
<i>Trifolium hybridum</i>	10	200	20
<i>Trifolium incarnatum</i>	10	500	80

▼ **B**

Druhy	Maximálna váha dávky	Minimálna váha vzorky odobratej z dávky (v gramoch)	Váha vzorky na určenie množstva ustanoveného v stĺpcoch 12 až 14 prílohy II (1) (2) (A) a stĺpcoch 3 až 7 prílohy II (II) (2) (A) (v gramoch)
1	2	3	4
<i>Trifolium pratense</i>	10	300	50
<i>Trifolium repens</i>	10	200	20
<i>Trifolium resupinatum</i>	10	200	20
<i>Trigonella foenum- graecum</i>	10	500	450
<i>Vicia faba</i> druh, odroda <i>equina</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia faba</i> odroda <i>minor</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia pannonica</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia sativa</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia villosa</i>	20	1 000	1 000
INÉ DRUHY			
<i>Brassica napus</i> odroda <i>napobrassica</i>	10	200	100
<i>Brassica oleracea</i> spolu- odroda <i>acephala</i>	10	200	100
<i>Raphanus sativus</i> druh <i>oleifera</i>	10	300	300

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s:

▼ **M1**

- ustanovenia článku 1 ods. 1 vzťahujúce sa na prílohu I (3) a (4) 1. januára 1981,
- ustanovenia článku 1 ods. 2 vzťahujúce sa na prílohu II (I) (1) a prílohu II (II) (1) ► **M2** v termíne určenom v neskoršej etape ◀,

▼ **B**

- iné ustanovenia tejto smernice najneskôr do 1. júla 1980.
2. Členské štáty zabezpečia, že osivo krmovín nepodlieha žiadnym obmedzeniam pri obchodovaní vzhľadom na rozdielne dátumy implementácie tejto smernice v súlade s druhou zarážkou odseku 1.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.