

31978L0386

25.4.1978

URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI

L 113/1

PRVA DIREKTIVA KOMISIJE

z dne 18. aprila 1978

o spremembah prilog k Direktivi 66/401/EGS o trženju semena krmnih rastlin

(78/386/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ker je treba določiti posebne standarde glede največje vsebnosti dodatnih nezaželenih ali škodljivih semen, kot so *Agropyron repens*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis*, *Melilotus* spp., *Sinapis arvensis*, *Raphanus raphanistrum* ali vrst *Rumex* razen *Rumex acetosella*, *Rumex crispus* in *Rumex obtusifolius*;

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin ⁽¹⁾, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 78/55/EGS ⁽²⁾, in zlasti člena 21a Direktive,

ker je treba standarde glede najnižje kalivosti in najnižje analitske čistosti prilagoditi glede na razvoj kakovosti semena, ki se navadno dosega;

ker je treba glede na znanstveni in tehnični napredek zaradi spodaj naštetih razlogov spremeniti priloge I, II in III;

ker je treba zaradi izpolnjevanja pogojev za uradno preizkušanje semena, ki se izvaja v skladu z veljavnimi mednarodnimi metodami, nekatere določbe revidirati;

ker je treba zaradi izboljšanja genske vrednosti semen v primeru določenih vrst predvideti standarde glede sortne čistosti, ki jih mora izpolnjevati posevek;

ker so ukrepi iz te direktive v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo,

ker je treba zaradi tega v primeru samooprašnih in apomiktčnih enoklonskih sort *Poa* spp. predvideti standarde glede sortne čistosti, ki jih mora izpolnjevati seme;

ker je treba predvideti pogoje, ki jih mora izpolnjevati posevek glede navzočnosti škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost semena;

⁽¹⁾ UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.

⁽²⁾ UL L 16, 20.1.1978, str. 23.

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 66/401/EGS se spremeni:

1. Priloga I se glasi:

„PRILOGA I

ZAHTEVE, KI JIM MORAJO USTREZATI PRIDELKI

1. Prejšnji posevek na zemljišču ne sme biti nezdružljiv s pridelavo semena rastlinskih vrst in sort tega posevka in zemljišče mora biti brez rastlin, ki so same zrasle iz prejšnjega posevka.
2. Posevek mora biti v skladu z naslednjimi standardi glede oddaljenosti od bližnjih virov peloda, morebitnega povzročitelja nezaželene tuje opravitve:

Posevek	Najmanjša razdalja
1	2
<i>Brassica</i> spp.:	
— za pridelavo osnovnega semena	400 m
— za pridelavo certificiranega semena	200 m
Druge vrste in sorte, razen <i>Brassica</i> spp., <i>Pisum arvense</i> , apomiktične enoklonske sorte <i>Poa</i> spp.:	
— za pridelavo semena, namenjenega razmnoževanju, zemljišča do dveh hektarov	200 m
— za pridelavo semena, namenjenega razmnoževanju, zemljišča nad dvema hektaroma	100 m
— za pridelavo semena, namenjenega pridelavi krmnih rastlin, zemljišča do dveh hektarov	100 m
— za pridelavo semena, namenjenega pridelavi krmnih rastlin, zemljišča nad dvema hektaroma	50 m

To oddaljenost pa je mogoče spregledati, kadar je zemljišče dovolj zavarovano pred kakršno koli nezaželeno tujo opravitvijo.

3. Število rastlin drugih vrst, katerih seme je z laboratorijskimi testi težko razlikovati od semena tega posevka, mora biti majhno.

Še zlasti morajo biti posevki vrst *lolium* v skladu z naslednjimi pogoji: število rastlin vrste *lolium*, drugih kot je vrsta, ki ji pripada posevek, ne sme presegati:

- ene rastline na 50 m² pri pridelavi osnovnega semena,
- ene rastline na 10 m² pri pridelavi certificiranega semena.

4. Posevek mora imeti zadostno sortno pristnost in sortno čistost. Še zlasti morajo biti posevki vrst ali sort, razen *Pisum arvense* ali apomiktičnih enoklonskih sort *Poa* spp., v skladu z naslednjimi standardi: število rastlin vrste posevka, ki očitno niso sortno pristne, ne sme presegati:

- ene rastline na 30 m² pri pridelavi osnovnega semena,
- ene rastline na 10 m² pri pridelavi certificiranega semena.

5. Škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost semena, mora biti čim manj.
6. Izpolnjevanje zgoraj omenjenih standardov ali drugih pogojev se preveri z uradnimi poljskimi pregledi.
Ti poljski pregledi se izvedejo v skladu z naslednjimi pogoji:
 - A. Stanje in stopnja razvoja posevka morata omogočati primeren pregled.
 - B. Obvezen je najmanj en poljski pregled.
 - C. Velikost, število in razporeditev delov zemljišča, ki ga je potrebno pregledati z namenom, da se preveri skladnost z določbami te priloge, se določi v skladu s primernimi metodami.“
2. Priloga II je takale:

„PRILOGA II

POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI SEME

I. CERTIFICIRANO SEME

1. Seme mora imeti zadostno sortno pristnost in čistost. Še zlasti mora biti seme *Pisum arvense* in apomiktičnih enoklonskih sort *Poa* spp. v skladu z naslednjimi standardi ali drugimi pogoji: najnižja sortna čistost mora biti 98 %.

Najnižja sortna čistost se preveri predvsem s poljskimi pregledi, izvedenimi v skladu s pogoji, določenimi v Prilogi I.

2. Seme mora biti v skladu z naslednjimi standardi ali drugimi pogoji glede kalivosti, analitske čistosti in vsebnosti semena drugih rastlinskih vrst, vključno s semenom volčjega boba druge barve in semenom grenkega volčjega boba:

A. Preglednica:

Vrsta	Kalivost		Analitska čistost			
	Najnižja kalivost (% čistih semen)	Najvišja vsebnost trdih zrn (% čistih semen)	Najnižja analitska čistost (utežnih %)	Najvišja vsebnost semena drugih vrst (utežnih %)		
				Skupaj	Posamezne vrste	Agropyron repens
1	2	3	4	5	6	7
TRAVE						
Agrostis canina druh canina	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis gigantea	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis stolonifera	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis tenuis	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Alopecurus pratensis	70 (a)		75	2,5	1,0	0,3
Arrhenatherum elatius	75 (a)		90	3,0	1,0(f)	0,5
Dactylis glomerata	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3
Festuca arundinacea	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca ovina	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5
Festuca pratensis	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca rubra	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5
Lolium multiflorum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium perenne	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium X hybridum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Phleum bertolonii	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
Phleum pratense	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
Poa annua	75 (a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3
Poa nemoralis	75 (a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3
Poa palustris	75 (a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3
Poa pratensis	75 (a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3
Poa trivialis	75 (a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3
Trisetum flavescens	70 (a)		75	3,0	1,0	0,3
METULJNICE						
Hedysarum coronarium	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0	
Lotus corniculatus	75 (a) (b)	40	95	1,8(d)	2,0(d)	
Lupinus albus	80 (a) (b)	20	98	0,5(e)	0,3(e)	
Lupinus angustifolius	75 (a) (b)	20	98	0,5(e)	0,3(e)	
Lupinus luteu	80 (a) (b)	20	98	1,0(e)	0,3(e)	
Medicago lupulina	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Medicago sativa	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Medicago varia	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Onobrychis sativa	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0	
Pisum arvense	80 (a)		98	0,5	0,3	
Trifolium alexandrinum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium hybridum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium incarnatum	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium pratense	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium repens	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Trifolium resupinatum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trigonella foenumgraecum	80 (a)		95	1,0	0,5	
Vicia faba druh, odroda equina	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
Vicia faba odroda minor	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
Vicia pannonica	85 (a) (b)	20	98	1,0(e)	0,5(e)	
Vicia sativa	85 (a) (b)	20	98	1,0(e)	0,5(e)	
Vicia villosa	85 (a) (b)	20	98	2,0(e)	0,5(e)	
DRUGE VRSTE						
Brassica napus odroda napobras-sica	80 (a)		98	1,0	0,5	
Brassica oleracea spoluodroda acephala	75 (a)		98	1,0	0,5	
Raphanus sativus druh oleifera	80 (a)		97	1,0	0,5	

Analitska čistost				Najvišja vsebnost semena drugih vrst v vzorcu teže, določene v stolpcu 4 Priloge III (skupaj na stolpec)			Pogoji glede vsebnosti semena volčjega boba druge barve in grenkega volčjega boba
Najvišja vsebnost semena drugih vrst(utežnih %)							
Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp., razen Rumex acetosella	
8	9	10	11	12	13	14	15
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0(g)	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0(h)	0 (j) (k)	2	
	0,3			0	0 (k)	20	
	0,3			0	0(l) (m)	10	
	0,3			0(i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0(i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0(i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0	0(l) (m)	20	
	0,3			0	0(l) (m)	20	
	0,3			0	0 (j)	20	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0	0(l) (m)	20	
	0,3			0	0(l) (m)	10	
	0,3			0	0(l) (m)	20	
	0,3			0	0(l) (m)	20	
	0,3			0	0(l) (m)	10	
	0,3			0	0(l) (m)	10	
	0,3			0	0 (j)	20	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0(i)	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0(i)	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0(i)	0 (j)	20 (n)	
		0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (j)	20	

B. Standardi ali drugi pogoji, ki veljajo, kadar se nanje sklicuje preglednica iz razdelka I (2) (A) te priloge:

- (a) Vsa sveža in zdrava semena, ki ne kalijo po predhodni obdelavi, se štejejo za semena, ki so vzknila.
- (b) Do največje navedene količine se trda semena štejejo za kaliva semena.
- (c) Do skupaj največ 0,8 utežnega % semen drugih vrst *Poa* se ne šteje za nečistoto.
- (d) Do največ 1 utežni % semen *Trifolium pratense* se ne šteje za nečistoto.
- (e) Do skupaj največ 0,5 utežnega % semen *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum arvense*, *Vicia faba* spp., *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa* v drugi vrsti zadevni se ne šteje za nečistoto.
- (f) Največji predpisani utežni odstotek semen posamezne vrste ne velja za semena *Poa* spp.
- (g) Skupaj največ dve semeni *Avena fatua*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis* v vzorcu predpisane teže se ne štejeta za nečistoto, če je drugi vzorec enake teže brez semen teh vrst.
- (h) Prisotnost enega semena *Avena fatua*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis* v vzorcu predpisane teže se ne šteje za nečistoto, če je drugi vzorec dvakratne predpisane teže brez semen teh vrst.
- (i) Semen *Avena fatua*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis* ni potrebno določiti po številu, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev, določenih v stolpcu 12.
- (j) Semen *Cuscuta* spp. ni potrebno določiti po številu, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev, določenih v stolpcu 13.
- (k) Prisotnost enega semena *Cuscuta* spp. v vzorcu predpisane teže se ne šteje za nečistoto, če je drugi vzorec enake teže brez semen te vrste.
- (l) Teža za določanje semen *Cuscuta* spp. po številu je dvakratna teža vzorca, določena za ustrezno vrsto v stolpcu 4 Priloge III.
- (m) Prisotnost enega semena *Cuscuta* spp. v vzorcu predpisane teže ne velja za nečistoto, če je drugi vzorec dvakratne predpisane teže brez semen vrste *Cuscuta* spp.
- (n) Semen *Rumex* spp., razen *Rumex acetosella*, ni potrebno določiti po številu, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev, določenih v stolpcu 14.
- (o) Odstotek po številu semen volčjega boba druge barve ne sme presegati:
 - pri grenkem volčjem bobu 2%,
 - pri drugih vrstah volčjega boba 1%,

- (p) Odstotek po številu semen grenkega volčjega boba v drugih sortah volčjega boba ne sme presegati:
 - pri certificiranem semenu prve množitve, po osnovnem semenu 3%,
 - pri certificiranem semenu naslednjih množitev, po osnovnem semenu 5%.

- 3. Škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost semen, mora biti čim manj.

II. OSNOVNO SEME

Ob upoštevanju spodnjih določb veljajo pogoji, predpisani v razdelku I te priloge, za osnovno seme:

- 1. Seme *Pisum arvense* in apomiktičnih enoklonskih sort *Poa* spp. mora biti v skladu z naslednjimi standardi ali drugimi pogoji: najnižja sortna čistost mora biti 99,7 %.

Najnižja sortna čistost se preveri predvsem s poljskimi pregledi, izvedenimi v skladu s pogoji, določenimi v Prilogi I.

- 2. Seme mora ustrezati naslednjim standardom ali drugim pogojem:

A. Preglednica:

Vrsta	Najvišja vsebnost semena drugih vrst						Drugi standardi ali pogoji
	Skupaj (utežnih %)	Vsebnost po številu v vzorcu teže, ki je določena v stolpcu 4 Priloge III (skupaj na stolpec)					
		Posamezne vrste	Rumex spp., razen Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
TRAVE							
Agrostis canina ssp. Canina	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis tenuis	0,3	20	1	1	1		(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20(a)	5	5	5		(j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20(a)	5	5	5		(i) (j)
Dactylis glomerata	0,3	20(a)	5	5	5		(j)
Festuca arundinacea	0,3	20(a)	5	5	5		(j)
Festuca ovina	0,3	20(a)	5	5	5		(j)
Festuca pratensis	0,3	20(a)	5	5	5		(j)
Festuca rubra	0,3	20(a)	5	5	5		(j)
Lolium multiflorum	0,3	20(a)	5	5	5		(j)
Lolium perenne	0,3	20(a)	5	5	5		(j)
Lolium X hybridum	0,3	20(a)	5	5	5		(j)
Phleum bertolonii	0,3	20	2	1	1		(j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1		(j)
Poa annua	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Poa nemoralis	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Poa palustris	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Poa pratensis	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Poa trivialis	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Trisetum flavescens	0,3	20(c)	1	1	1		(i) (j)

Vrsta	Najvišja vsebnost semena drugih vrst						Drugi standardi ali pogoji
	Skupaj (utežnih %)	Vsebnost po številu v vzorcu teže, ki je določena v stolpcu 4 Priloge III (skupaj na stolpec)					
		Posamezne vrste	Rumex spp., razen Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
METULJNICE							
Hedysarum coronarium	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Lotus corniculatus	0,3	20	5			0 (e) (g)	(j) (k)
Lupinus albus	0,3	20	5			0 (d)	(h)(k)
Lupinus angustifolius	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Lupinus luteus	0,3	20	5			0 (d)	(h)(k)
Medicago lupulina	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago sativa	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago varia	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Onobrychis sativa	0,3	20	5			0 (d)	
Pisum arvense	0,3	20	5			0 (d)	
Trifolium alexandrinum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium hybridum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium pratense	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium repens	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium resupinatum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trigonella foenumgraecum	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba druh, odroda equina	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba odroda minor	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia pannonica	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia sativa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia villosa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
DRUGE VRSTE							
Brassica napus odroda napobrassica	0,3	20	5				
Brassica oleracea spoluodroda acephala	0,3	20	5				(j)
Raphanus sativus druh oleifera	0,3	20	5				(j)

- B. Standardi ali drugi pogoji, ki veljajo, kadar se nanje sklicuje preglednica iz razdelka II (2) (A) te priloge:
- (a) Do skupaj največ 80 semen *Poa* spp. se ne šteje za nečistoto.
 - (b) Pogoj, določen v stolpcu 3, ne velja za semena *Poa* spp. Skupaj največ eno seme vrste *Poa* spp., razen vrste, ki se preizkuša, sme biti v vzorcu 500 semen.
 - (c) Do skupaj največ 20 semen *Poa* spp. ne velja za nečistoto.
 - (d) Semen vrste *Melilotus* spp. ni potrebno določiti po številu, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev, določenih v stolpcu 7.
 - (e) Navzočnost enega semena *Melilotus* spp. v vzorcu predpisane teže se ne šteje za nečistoto, če je drugi vzorec dvakratne predpisane teže brez semena *Melilotus* spp.
 - (f) Pogoj (c), ki ga določa razdelek I (2) te priloge, ne velja.
 - (g) Pogoj (d), ki ga določa razdelek I (2) te priloge, ne velja.
 - (h) Pogoj (e), ki ga določa razdelek I (2) te priloge, ne velja.
 - (i) Pogoj (f), ki ga določa razdelek I (2) te priloge, ne velja.
 - (j) Pogoja (k) in (m), ki ju določa razdelek I (2) te priloge, ne veljata.
 - (k) Odstotek po številu semen grenkega volčjega boba v drugih sortah volčjega boba ne sme presegati 1 %.

III. KOMERCIALNO SEME

Ob upoštevanju spodnjih določb veljajo pogoji, predpisani v razdelku I (2) in (3) te priloge, za komercialno seme:

1. Utežni odstotki, določeni v stolpcih 5 in 6 preglednice iz razdelka I (2) (A) te priloge, se povečajo za 1 %.
2. Pri *Poa annua* se skupaj največ do 10 utežnih % semen drugih vrst *Poa* ne šteje za nečistoto.
3. Pri *Poa* spp., razen pri vrsti *Poa annua*, se do skupaj največ 3 utežne % semen drugih vrst *Poa* ne šteje za nečistoto.
4. Pri *Hedisarum coronarium* se do skupaj največ 1 utežni % semen *Melilotus* spp. ne šteje za nečistoto.
5. Pogoj (d), ki ga določa razdelek I (2) te priloge, ne velja za *Lotus corniculatus*.

6. Pri vrstah volčjega boba:
- (a) mora biti najnižja analitska čistost 97 utežnih %;
 - (b) delež po številu semen volčjega boba druge barve ne sme presegati:
 - pri grenkem volčjem bobu 4%,
 - pri drugih vrstah volčjega boba 2%;
 - (c) delež po številu semen grenkega volčjega boba v semenu drugih vrst volčjega boba ne sme prese-
gati 5%.
7. Pri *Vicia* spp. se do skupaj največ 6 utežnih % semen *Vicia pannonica*, *Vicia villiosa* ali sorodnih
gojenih vrst v drugi ustrezni vrsti ne šteje za nečistoto.
8. Pri *Vicia pannonica* in *Vicia villiosa* je minimalna analitska čistost 97 utežnih %.
3. Priloga III je takale:

„PRILOGA III

TEŽA PARTIJE IN VZORCA

Vrsta	Največja teža partije(ton)	Najmanjša teža vzorca, odvze- tega iz partije (gramov)	Teža vzorca za določitev po številu, predvidena v stolpcih 12 do 14 Priloge II (I) (2) (A) in v stolpcih 3 do 7 Priloge II (II) (2) (A) (gramov)
1	2	3	4
TRAVE			
<i>Agrostis canina</i> ssp. <i>canina</i>	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i>	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i>	10	50	5
<i>Agrostis tenuis</i>	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i>	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	200	80
<i>Dactylis glomerata</i>	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i>	10	100	50
<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60
<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
<i>Lolium x hybridum</i>	10	200	60
<i>Phleum bertolonii</i>	10	50	10
<i>Phleum pratense</i>	10	50	10
<i>Poa annua</i>	10	50	10
<i>Poa nemoralis</i>	10	50	5
<i>Poa palustris</i>	10	50	5
<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
<i>Trisetum flavescens</i>	10	50	5

Vrsta	Največja teža partije(ton)	Najmanjša teža vzorca, odvze- tega iz partije (gramov)	Teža vzorca za določitev po številu, predvidena v stolpcih 12 do 14 Priloge II (I) (2) (A) in v stolpcih 3 do 7 Priloge II (II) (2) (A) (gramov)
1	2	3	4
METULJNICE			
Hedysarum coronarium			
— plod	10	1 000	300
— seme	10	400	120
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	20	1 000	1 000
Lupinus angustifolius	20	1 000	1 000
Lupinus luteus	20	1 000	1 000
Medicago lupulina	10	300	50
Medicago sativa	10	300	50
Medicago varia	10	300	50
Onobrychis sativa			
— plod	10	600	600
— seme	10	400	400
Pisum arvense	20	1 000	1 000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trigonella foenumgraecum	10	500	450
Vicia faba ssp. var. equina	20	1 000	1 000
Vicia faba var. minor	20	1 000	1 000
Vicia pannonica	20	1 000	1 000
Vicia sativa	20	1 000	1 000
Vicia villosa	20	1 000	1 000
DRUGE VRSTE			
Brassica napus var. napobrassica	10	200	100
Brassica oleracea convar. acephala	10	200	100
Raphanus sativus ssp. oleifera	10	300	300“

Člen 2

- Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev z:
 - določbami člena 1(1) glede Priloge I (3) in (4), člena 1(2) glede Priloge II (I) (1) in Priloge II (II) (1) do 1. januarja 1981,
 - drugimi določbami te direktive najpozneje do 1. julija 1980.
- Države članice zagotavljajo, da zaradi različnih datumov izvedbe te direktive, v skladu z drugo alineo odstavka 1, za semena krmnih rastlin tržne omejitve ne veljajo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. aprila 1978

Za Komisijo
Finn GUNDELACH
Podpredsednik