

DIREKTIVE

DIREKTIVA KOMISIJE 2008/38/ES

z dne 5. marca 2008

o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene

(Besedilo velja za EGP)

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju direktive Sveta 93/74/EGS z dne 13. septembra 1993 o krmi za posebne prehranske namene ⁽¹⁾ in zlasti člena 6(a),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva Komisije 94/39/ES z dne 25. julija 1994 o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene ⁽²⁾ je bila večkrat ⁽³⁾ bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2) Direktiva 93/74/EGS določa vzpostavitev popolnega seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene. Omenjeni seznam mora navajati natančno uporabo, tj. posebni prehranski namen, osnovne prehranske značilnosti, deklaracije o označevanju in, če je primerno, posebne zahteve za označevanje.

(3) Nekaterih prehranskih namenov trenutno ni mogoče vključiti v seznam predvidenih vrst uporabe, ker ne obstajajo metode Skupnosti za nadzor energetske vrednosti hrane za hišne živali ter dietetičnih vlaknin v krmi. Ta seznam je treba dopolniti kar najhitreje po sprejetju omenjenih metod.

(4) Uvedeni seznam se lahko spreminja, če je primerno, v skladu z novimi znanstvenimi in tehničnimi spoznanji.

(5) Ukrepi, predvideni v tej direktivi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(6) Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, določenih v delu B Priloge II –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Države članice zahtevajo, da se krma za posebne prehranske namene v smislu direktive Sveta 93/74/EGS sme tržiti le, če so njene predvidene vrste posebne uporabe, navedene v delu B Priloge I k tej direktivi, in če izpolnjuje druge določbe, predpisane v omenjenem delu Priloge I.

Države članice tudi zagotovijo, da so izpolnjene določbe iz „Splošnih določb“ v delu A Priloge I.

Člen 2

Direktiva 94/39/ES, kakor je bila spremenjena z direktivami, navedenimi v delu A Priloge II, je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, ki so določeni v delu B Priloge II.

Sklici na razveljavljeno direktivo se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi III.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati 31. julija 2008.

⁽¹⁾ UL L 237, 22.9.1993, str. 23. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

⁽²⁾ UL L 207, 10.8.1994, str. 20. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2008/4/ES (UL L 6, 10.1.2008, str. 4).

⁽³⁾ Glej del A Priloge II.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. marca 2008

Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

PRILOGA I

DEL A

Splošne določbe

1. Če je v stolpcu 2 dela B navedena več kot ena skupina prehranskih značilnosti, označena z „in/ali“, za isti prehranski namen, lahko proizvajalec uporabi eno od skupin ali obe skupini bistvenih značilnosti, da izpolni prehranski namen, opredeljen v stolpcu 1. Za vsako od možnosti so ustrezne deklaracije za označevanje navedene nasproti, v stolpcu 4.
2. Če je skupina dodatkov omenjena v stolpcu 2 ali 4 dela B, mora(-jo) biti uporabljen(-i) dodatek(-i) odobren(-i) v Uredbi (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁾ kot ustrezni za opredeljeno osnovno značilnost.
3. Če je v stolpcu 4 dela B treba navesti vir(-e) sestavin ali analitskih sestavin, mora proizvajalec pripraviti natančno deklaracijo (npr. posebno ime sestavin(-e), vrsto živali ali del živali), na podlagi katere je mogoče oceniti skladnost krmila z ustreznimi osnovnimi prehranskimi značilnostmi.
4. Če je v stolpcu 4 dela B treba navesti deklaracijo snovi, ki je odobrena tudi kot dodatek, in če jo spremlja izraz „celokupni“, se mora deklarirana vsebnost, če je primerno, navezovati tudi na količino, prisotno v naravni obliki, če ni dodana nobena snov, ali, z odstopanjem od Direktive Sveta 70/524/EGS ⁽²⁾, celotno količino snovi, prisotne v naravni obliki ter količino, dodano kot dodatek.
5. Deklaracije, zahtevane v stolpcu 4 dela B, z navedbo „če je dodana“ so obvezne, kadar sta sestavina ali dodatek vključena ali je njuna vsebnost povečana izrecno za dosego posebnega prehranskega namena.
6. Deklaracije, ki jih je treba navajati v skladu s stolpcem 4 dela B, o analitskih sestavinah in dodatkih, morajo biti količinsko opredeljene.
7. Priporočen rok uporabe v stolpcu 5 dela B navaja obseg, v katerem je običajno treba doseči prehranski namen. Proizvajalci lahko navedejo natančnejše roke uporabe, v okviru določenih skrajnih meja.
8. Če mora krma ustrezati več kot enemu posebnemu prehranskemu namenu, mora biti v skladu z ustreznimi navedbami v delu B.
9. V primeru dopolnilnih krmnih mešanic za posebne prehranske namene je treba v navodilih za uporabo na zunanji oznaki/nalepki navesti navodila za pripravo uravnoteženih dnevnih obrokov.

⁽¹⁾ UL L 268, 18.10.2003, str. 29.⁽²⁾ UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

1	2	3	4	5	6
Zmanjšanje ponovnega nastanka struvitnih kamnov ⁽³⁾	Lastnosti acidifikacije urina in zmerna stopnja magnezija	Psi in mačke	— Kalcij — Fosfor — Natrij — Magnezij — Kalij — Kloridi — Žveplo — Snovi, ki acidificirajo urin	Do 6 mesecev	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“
Zmanjšanje nastanka uratnih kamnov	Nizka stopnja purinov, nizka stopnja beljakovin, vendar visoke kakovosti	Psi in mačke	Vir(-i) beljakovin	Do 6 mesecev, vendar dosmrtna uporaba v primeru trajnih motenj v presnovi sečne kisline	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“
Zmanjšanje nastanka oksalatnih kamnov	Nizka stopnja kalcija, nizka stopnja vitamina D, in lastnosti alkalizacije urina	Psi in mačke	— Fosfor — Kalcij — Natrij — Magnezij — Kalij — Kloridi — Žveplo — Celokupni vitamin D — Hidroksiprolin — Snovi, ki alkalizirajo urin	Do 6 mesecev	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“
Zmanjšanje nastanka cistinskih kamnov	Nizka stopnja beljakovin, zmerna stopnja žveplovih amino kislin, in lastnosti alkalizacije urina	Psi in mačke	— Celokupne žveplove amino kisline — Natrij — Kalij — Kloridi — Žveplo — Snovi, ki alkalizirajo urin	Na začetku, do 1 leta	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

1	2	3	4	5	6
Zmanjšanje intolerance za sestavine in hranilne snovi ⁽⁴⁾	— Izbrani vir(-i) beljakovin in/ali — Izbrani vir(-i) ogljikovih hidratov	Psi in mačke	— Vir(-i) beljakovin — Vsebnost bistvenih maščobnih kislin (če so dodane) — Vir(-i) ogljikovih hidratov — Vsebnost bistvenih maščobnih kislin (če so dodane)	3 do 8 tednov: če izginejo znaki intolerance, se ta hrana lahko uporablja neomejeno	
Zmanjšanje akutnih motenj absorpcije v črevesju	Zvišana stopnja elektrolitov in hitro prebavljivih sestavin	Psi in mačke	— Hitro prebavljive sestavine, obdelane po potrebi — Natrij — Kalij — Vir(-i) sluznih snovi (če so dodane)	1 do 2 tedna	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: — „V obdobju akutne diareje ter okrevanja po boleznih.“ — „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“
Izravnavanje za slabo presnovo ⁽⁵⁾	Hitro prebavljive sestavine in nizka stopnja maščob	Psi in mačke	Hitro prebavljive sestavine, obdelane po potrebi	3 do 12 tednov, vendar vse življenje v primeru kronične pankreasne insuficience	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“
Pomoč delovanju srca v primeru kronične kardialne insuficience	Nizka stopnja natrija in povečano razmerje K/Na	Psi in mačke	— Natrij — Kalij — Magnezij	Na začetku, do 6 mesecev	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“
Uravnavanje dovajanja glukoze (<i>Diabetes mellitus</i>)	Nizka stopnja ogljikovih hidratov za hitro sproščanje glukoze	Psi in mačke	— Vir(-i) ogljikovih hidratov — Po potrebi obdelani ogljikovi hidrati — Škrob — Celokupni sladkor — Fruktaza (če je dodana) — Vsebnost bistvenih maščobnih kislin (če so dodane) — Vir(-i) maščobnih kislin s kratko in srednjo verigo (če so dodane)	Na začetku, do 6 mesecev	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

1	2	3	4	5	6
Krepitev jetrne funkcije v primeru kroničnega obolenja jeter	Visoko kakovostne beljakovine, zmerna stopnja proteina, visoka stopnja bistvenih maščobnih kislin in visoka stopnja visoko prebavnih ogljikovih hidratov	Psi	- Vir(-i) beljakovin - Vsebina bistvenih maščobnih kislin - Visoko prebavni ogljikovi hidrati vključno z njihovo obdelavo, če je ustrezno - Natrij - Baker skupno	Na začetku, do 6 mesecev	Na pakiranju, vsebniku ali nalepki navesti: „Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo ali podaljšanjem uporabe.“ V navodilih za uporabo navedite: „Voda mora biti vedno na voljo.“
	Visoko kakovostne beljakovine, zmerna stopnja beljakovin, visoka stopnja bistvenih maščobnih kislin	Mačke	- Vir(-i) beljakovin - Vsebina bistvenih maščobnih kislin - Natrij - Baker skupno	Na začetku, do 6 mesecev	Na pakiranju, vsebniku ali nalepki navesti: „Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo ali podaljšanjem uporabe.“ V navodilih za uporabo navedite: „Voda mora biti vedno na voljo.“
Uravnavanje presnove lipidov v primeru hiperlipidemije	Nizka stopnja maščobe in visoka stopnja bistvenih maščobnih kislin	Psi in mačke	- Vsebnost bistvenih maščobnih kislin - Vsebnost maščobnih kislin n-3 (če so dodane)	Na začetku, do 2 mesecev	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“
Znižanje bakra v jetrih	Nizka stopnja bakra	Psi	Celokupni baker	Na začetku, do 6 mesecev	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“
Zmanjšanje prevelike telesne teže	Nizka kaloričnost	Psi in mačke	Energetska vrednost	Dokler se ne doseže ciljna teža	V navodilih za uporabo je treba priporočiti ustrezen dnevni obrok

1	2	3	4	5	6
	ali — Visoka stopnja kalcija v obliki zelo razpoložljivih kalcijevih soli		Celotna vsebina kalcija, viri in zadevna količina kalcija	Prvi odmerek uporabiti ob prvih znakih telitve do dva dni po telitvi	Na pakiranju, vsebniku ali nalepki navedite: — Navodila za uporabo, npr. število odmerkov in kdaj se snov uporablja – pred telitvijo in po njej. — Besedilo „Pred uporabo je priporočljivo poiskati nasvet strokovnjaka.“
Zmanjšanje tveganja za ketozo ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾	Sestavine, ki zagotavljajo vire glukogene energije	Krave in ovce molznice	— Sestavine, ki zagotavljajo vire glukogene energije — Propan-1, 2 diol (če je dodan kot predhodnik glukoze) — Glicerol (če je dodan kot predhodnik glukoze)	3 do 6 tednov po telitvi ⁽⁹⁾ Zadnjih 6 tednov pred jagnjtvijo, in prve 3 tedne po njej ⁽¹⁰⁾	
Zmanjšanje tveganja za tetanijo (hipomagnezijo)	Visoka stopnja magnezija, lahko dostopni ogljikovi hidrati, zmerna stopnja beljakovin in nizka stopnja kalija	Prežvekovalci	— Škrob — Celokupni sladkorji — Magnezij — Natrij — Kalij	3 do 10 tednov v obdobjih hitre rasti trave	V navodilih za uporabo je treba navesti smernice o pripravi uravnoteženega dnevnega obroka, v zvezi z dodajanjem vlaknin in lahko dostopnih virov energije V primeru krmil za ovce navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: „Zlasti za ovce v laktaciji.“
Zmanjšanje tveganja za acidozo	Nizka stopnja lahko fermentirajočih ogljikovih hidratov in visoka sposobnost puferiranja	Prežvekovalci	— Škrob — Celokupni sladkorji	Največ 2 meseca ⁽¹¹⁾	V navodilih za uporabo je treba navesti smernice o pripravi uravnoteženega dnevnega obroka, v zvezi z dodajanjem vlaknin in virov lahko fermentirajočih ogljikovih hidratov V primeru krmil za krave molznice navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: „Zlasti za krave z visoko proizvodnjo mleka.“ V primeru krmil za prežvekovalce za pitanje navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: „Zlasti za intenzivno krmiljenje.“ ⁽¹²⁾

1	2	3	4	5	6
Ohranjanje ravnovesja med vodo in elektroliti	Pretežno elektroliti in lahko absorbirajoči ogljikovi hidrati	Teleta Pujski Jagnjeta Kozlički Žrebata	— Vir(-i) ogljikovih hidratov — Natrij — Kalij — Kloridi	1 do 7 dni (1 do 3 dni, v primeru izključnega krmjenja)	Na pakiranju, vsebniku ali nalepki navedite: — „V primeru tveganja v obdobju prebavnih motenj (diareje), ali med okrevanjem.“ — „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“
Zmanjšanje tveganja za nastanek uratnih kamnov	Nizka stopnja fosforja, magnezija ter lastnosti acidifikacije urina	Prežvekovalci	— Kalcij — Fosfor — Natrij — Magnezij — Kalij — Kloridi — Žveplo — Snovi, ki acidificirajo urin	Do 6 tednov	Na pakiranju, vsebniku ali nalepki navedite: „Zlasti za intenzivno krmljene mlade živali.“ V navodilih za uporabo navedite: „Voda mora biti vedno na voljo.“
Zmanjšanje reakcij na stres	— Visoka stopnja magnezija in/ali — Hitro prebavljivih sestavin	Prašiči	— Magnezij — Hitro prebavljive sestavine, obdelane po potrebi — Vsebnost maščobnih kislin n-3 (če so dodane)	1 do 7 dni	Treba je navesti smernice o razmerah, v katerih je ustrezna uporaba te krme.
Ustalitev fiziološke prebave	— Nizka sposobnost puferiranja, in hitro prebavljive sestavine	Pujski	— Hitro prebavljive sestavine, obdelane po potrebi — Sposobnost puferiranja — Vir(-i) sredstev za strjevanje (če so dodana) — Vir(-i) sluznih snovi (če so dodane)	2 do 4 tedne	Na pakiranju, vsebniku ali nalepki navedite: „V primeru tveganja, v obdobjih, ali med okrevanjem od prebavnih motenj.“

1	2	3	4	5	6
	— Hitro prebavljive sestavine	Prašiči	— Hitro prebavljive sestavine, obdelane po potrebi — Vir(-i) sredstev za strjevanje (če so dodana) — Vir(-i) sluznih snovi (če so dodane)		
Zmanjšanje tveganja zaprtja	Sestavine, ki pospešujejo prehodnost črevesja	Svinje	Sestavine, ki pospešujejo prehodnost črevesja	10 do 14 dni pred prasiatvijo in 10 do 14 dni po prasiatvi	
Zmanjšanje tveganja za sindrom zamašenih jeter	Nizka energija in visok delež energije, ki metabolizira iz lipidov, z visoko stopnjo polinenasičenih maščobnih kislin	Kokoši nesnice	— Energetska vrednost (izračunana po metodi ES) — Odstotek energije, ki metabolizira iz lipidov — Vsebnost polinenasičenih maščobnih kislin	Do 12 tednov	
Izravnavanje za slabo absorpcijo	Nizka stopnja nasičenih maščobnih kislin in visoka stopnja vitaminov, topnih v maščobi	Perutnina, razen gos in golobov	— Odstotek nasičenih maščobnih kislin glede na celokupne maščobne kisline — Celokupni vitamin A — Celokupni vitamin D — Celokupni vitamin E — Celokupni vitamin K	V prvih dveh tednih po izvalitvi	
Izravnavanje za kronično insuficenco delovanja tankega črevesa	Ogljikovi hidrati, beljakovine in maščobe, ki se večinoma prebavijo že pred slepim črevesom	Kopitarji ⁽¹³⁾	— Vir(-i) lahko prebavljivih ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob obdelanih, če je potrebno	Na začetku, do 6 mesecev	V primerih, ko je uporaba te krme ustrezna, morajo biti na voljo navodila za uporabo in nasvet, da jo je potrebno dajati večkrat na dan v majhnih obrokih Na pakiranju, vsebniku ali nalepki navedite: „Pred uporabo ali nadaljevanjem uporabe je priporočljivo poiskati nasvet veterinarja.“

1	2	3	4	5	6
Izravnavna za kronično insuficienčno delovanje debelega črevesa	Lahko prebavljive vlaknine	Kopitarji	— Vir(-i) vlaknin — Vsebnost n-3 maščobnih kislin (če so dodane)	Na začetku, do 6 mesecev	V primerih, ko je uporaba krme ustrežna, je treba predvideti vodenje in svetovati način, kako jo je treba dajati Na pakiranju, vsebniku ali nalepki navedite: „Pred uporabo ali pred nadaljevanjem uporabe je priporočljivo poiskati nasvet veterinarja.“
Zmanjšanje stresne reakcije	Lahko prebavljive vlaknine	Kopitarji	— Magnezij — Lahko prebavljive sestavine obdelane, če je potrebno — Vsebnost n-3 maščobnih kislin (če so dodane)	Dva do štiri tedne	Navodila za krmljenje morajo biti na voljo za točno določene primere, ko je uporaba te krme primerna
Izravnavna izgube elektrolitov po močnem znojenju	Pretežno elektroliti in ogljikovi hidrati, ki se lahko absorbirajo	Kopitarji	— Kalcij — Natrij — Magnezij — Kalij — Kloridi — Glukoza	En dan do tri dni	Navodila za krmljenje morajo biti na voljo za primere, ko je uporaba te krme primerna Kadar krma predstavlja pomemben del dnevnega obroka, morajo biti na voljo navodila, da se prepreči tveganje zaradi nenadnih sprememb lastnosti krme Označite v navodilih za uporabo: „Vedno mora biti na voljo voda.“
Uvajanje normalne prehrane po boleznih, okrevanje	Visoka koncentracija bistvenih hranilnih snovi in lahko prebavljive sestavine	Kopitarji	— Lahko prebavljive sestavine obdelane, če je potrebno — Vsebnost n-3 in n-6 maščobnih kislin (če so dodane)	Do popolnega okrevanja	Navodila za krmljenje morajo biti na voljo v primerih, ko je uporaba te krme primerna Če se posebej zahteva dajanje krme po sondi, na pakiranju, vsebniku ali nalepki navedite: „Uporaba pod nadzorom veterinarja.“

1	2	3	4	5	6
Podpora delovanja jeter v primeru kronične insuficience jeter	Nizka stopnja visoko kakovostnih beljakovin in lahko prebavljivi ogljikovi hidrati	Kopitarji	— Viri beljakovin in vlaknin — Lahko prebavljivi ogljikovi hidrati obdelani po potrebi — Metionin — Holin — Vsebnost n-3 maščobnih kislin (če so dodane)	Na začetku, do 6 mesecev	V primerih, ko je uporaba te krme ustrezna, morajo biti na voljo navodila za uporabo in nasvet, da jo je potrebno dajati večkrat na dan v majhnih obrokih Na pakiranju, vsebniku ali nalepki navedite: „Pred uporabo ali pred nadaljevanjem uporabe je priporočljivo poiskati nasvet veterinarja.“
Podpora delovanju ledvic v primeru kronične ledvične insuficience	Nizka raven visoko kakovostnih beljakovin, nizka raven fosforja	Kopitarji	— Vir(-i) beljakovin — Kalcij — Fosfor — Kalij — Magnezij — Natrij	Na začetku, do 6 mesecev	Na pakiranju, vsebniku ali nalepki navedite: „Pred uporabo ali pred nadaljevanjem uporabe je priporočljivo poiskati nasvet veterinarja.“ Označite v navodilih za uporabo: „Vedno mora biti na voljo voda.“

(1) Če je primerno, lahko proizvajalec priporoča uporabo tudi pri začetni renalni insuficienci.

(2) Če se krma priporoča za začasno renalno insuficienco, je priporočeni rok uporabe dva do štiri tedne.

(3) V primeru hane za mačke se lahko navede „obolenje spodnjega urinarnega trakta pri mačkah“ ali „urološki sindrom pri mačkah F.U.S.“ kot poseben prehranski namen.

(4) V primeru krme za posebno intoleranco lahko navedba posebne intolerance nadomesti „sestavino in hranljivo snov“.

(5) Proizvajalec lahko izpolni posebni prehranski namen z navedbo: „eksokrina pankreasna insuficienca“.

(6) Pri hrani za mačke lahko proizvajalec dopolni nek prehranski namen z navedbo „Hepatična lipidoza mačk“.

(7) Izraz „ketoza“ se lahko nadomesti z „acetonemija“.

(8) Proizvajalci lahko priporočajo uporabo pri okrevanju po ketozi.

(9) V primeru krme za krave molznice.

(10) V primeru krme za plemenske ovce.

(11) V primeru krme za krave molznice: „največ dva meseca po začetku laktacije“.

(12) Navedite kategorijo zadevnih prežvekovalcev.

(13) Pri krmi, posebej pripravljeni za izpolnjevanje posebnih potreb zelo starih živali (lahko prebavljive sestavine), mora navedbo vrste ali kategorije živali dopolnjevati še navedba: „stare živali“.

PRILOGA II

DEL A

Razveljavljena direktiva s seznamom njenih zaporednih sprememb

(iz člena 2)

Direktiva Komisije 94/39/ES	(UL L 207, 10.8.1994, str. 20)
Direktiva Komisije 95/9/ES	(UL L 91, 22.4.1995, str. 35)
Direktiva Komisije 2002/1/ES	(UL L 5, 9.1.2002, str. 8)
Direktiva Komisije 2008/4/ES	(UL L 6, 10.1.2008, str. 4)

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 2)

Direktiva	Roki za prenos
94/39/ES	30. junij 1995
95/9/ES	30. junij 1995
2002/1/ES	20. november 2002
2008/4/ES	30. julij 2008

PRILOGA III

Korelacijska tabela

Direktiva 94/39/ES	Ta direktiva
Člen 1	Člen 1
Člen 2	—
—	Člen 2
Člen 3	Člen 3
—	Člen 4
Priloga	Priloga I
—	Priloga II
—	Priloga III