

IT

ALLEGATO

TABELLA DI CUI ALL'ARTICOLO 2

NOME DELLA MALATTIA ELENcata	CATEGORIA DELLA MALATTIA ELENcata	SPECIE ELENcate	
		SPECIE E GRUPPI DI SPECIE	SPECIE VETTRICI
Afta epizootica	A+D+E	Artiodactyla, Proboscidea	
Infezione da virus della peste bovina	A+D+E	Artiodactyla	
Infezione da virus della febbre della Rift Valley	A+D+E	Perissodactyla, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Proboscidea	Culicidae
Infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>	B+D+E	Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.	
	D+E	Artiodactyla diversi da Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.	
	E	Perissodactyla, Carnivora, Lagomorpha	
Infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> , <i>M. tuberculosis</i>)	B+D+E	Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.	
	D+E	Artiodactyla diversi da Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.	
	E	Mammalia (terrestri)	
Infezione da virus della rabbia	B+D+E	Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae, Camelidae	
	E	Chiroptera	
Infestazione da <i>Echinococcus multilocularis</i>	C+D+E	Canidae	

Infezione virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)	C+D+E	<i>Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae</i>	<i>Culicoides</i> spp.
Infezione da virus della malattia emorragica epizootica	D+E	<i>Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae</i>	<i>Culicoides</i> spp.
Carbonchio ematico	D+E	<i>Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea</i>	
Surra (<i>Trypanosoma evansi</i>)	D+E	<i>Equidae, Artiodactyla</i>	<i>Tabanidae</i>
Malattia da virus Ebola	D+E	Primati non umani (scimmie)	
Paratubercolosi	E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp., <i>Camelidae, Cervidae</i>	
Encefalite giapponese	E	<i>Equidae</i>	<i>Culicidae</i>
Febbre del Nilo occidentale	E	<i>Equidae, Aves</i>	<i>Culicidae</i>
Febbre Q	E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp.	
Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa	A+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	Artropodi ematofagi
Infezione da <i>Mycoplasma mycoides</i> sottospecie <i>mycoides</i> SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)	A+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Syncerus cafer</i>	
Rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva	C+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
	D+E	<i>Camelidae, Cervidae</i>	
Diarrea virale bovina	C+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
Campilobatteriosi genitale bovina	D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
Tricomoniassi	D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
Leucosi bovina enzootica	C+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
Vaiolo degli ovini e dei	A+D+E	<i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp.	

caprini			
Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti	A+D+E	<i>Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae</i>	
Pleuropolmonite contagiosa caprina	A+D+E	<i>Ovis ssp., Capra ssp., Gazella ssp.</i>	
Epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>)	D+E	<i>Ovis ssp., Capra ssp.</i>	
Peste equina	A+D+E	<i>Equidae</i>	<i>Culicoides spp.</i>
Morva (infezione da <i>Burkholderia mallei</i>)	A+D+E	<i>Equidae, Capra ssp., Camelidae</i>	
Infezione da virus dell'arterite equina	D+E	<i>Equidae</i>	
Anemia infettiva equina	D+E	<i>Equidae</i>	<i>Tabanidae</i>
Durina	D+E	<i>Equidae</i>	
Encefalomyelite equina venezuelana	D+E	<i>Equidae</i>	<i>Culicidae</i>
Metrite contagiosa equina	D+E	<i>Equidae</i>	
Encefalomyelite equina (orientale e occidentale)	E	<i>Equidae</i>	<i>Culicidae</i>
Peste suina classica	A+D+E	<i>Suidae, Tayassuidae</i>	
Peste suina africana	A+D+E	<i>Suidae</i>	<i>Ornithodoros</i>
Infezione da virus della malattia di Aujeszky	C+D+E	<i>Suidae</i>	
Infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini	D+E	<i>Suidae</i>	
Influenza aviaria ad alta patogenicità	A+D+E	<i>Aves</i>	
Infezione da virus della malattia di Newcastle	A+D+E	<i>Aves</i>	
Micoplasmosi aviaria (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> e <i>M. meleagridis</i>)	D+E	<i>Gallus gallus, Meleagris gallopavo</i>	
Infezione da <i>Salmonella Pullorum</i> , <i>S. Gallinarum</i> e <i>S. arizonae</i>	D+E	<i>Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.</i>	

Infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità	D+E	Aves	
Clamidiosi aviaria	D+E	Psittaciformes	
Infestazione da <i>Varroa</i> spp. (varroasi)	C+D+E	<i>Apis</i>	
Infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (<i>Aethina tumida</i>)	D+E	<i>Apis</i> , <i>Bombus</i> ssp.	
Peste americana	D+E	<i>Apis</i>	
Infestazione da <i>Tropilaelaps</i> spp.	D+E	<i>Apis</i>	
Infezione da <i>Batrachochytrium salamandrivorans</i>	D+E	<i>Caudata</i>	
Necrosi ematopoietica epizootica	A+D+E	Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), pesce persico (<i>Perca fluviatilis</i>)	Carpa testa grossa (<i>Aristichthys nobilis</i>), carassio dorato (<i>Carassius auratus</i>), carassio comune (<i>Carassius carassius</i>), carpa comune e carpa koi (<i>Cyprinus carpio</i>), carpa argentata (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), cavedano (<i>Leuciscus</i> spp.), rutilo (<i>Rutilus rutilus</i>), scardola (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>), tinca (<i>Tinca tinca</i>)
Setticemia emorragica virale	C+D+E	Aringa (<i>Clupea</i> spp.), coregoni (<i>Coregonus</i> ssp.), luccio (<i>Esox lucius</i>), eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), merluzzo del Pacifico (<i>Gadus macrocephalus</i>), merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), motella (<i>Onos mustelus</i>), salmotrota (<i>Salmo trutta</i>), rombo chiodato (<i>Scophthalmus maximus</i>), spratto (<i>Sprattus sprattus</i>), temolo (<i>Thymallus thymallus</i>), hirame	Storione ladano (<i>Huso huso</i>), storione danubiano (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>), storione sterleto (<i>Acipenser ruthenus</i>), storione stellato (<i>Acipenser stellatus</i>), storione (<i>Acipenser sturio</i>), storione siberiano (<i>Acipenser Baerii</i>), carpa testa grossa (<i>Aristichthys nobilis</i>), carassio dorato (<i>Carassius auratus</i>), carassio comune (<i>Carassius carassius</i>), carpa comune e carpa koi (<i>Cyprinus carpio</i>), carpa argentata (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), cavedano (<i>Leuciscus</i> spp.), rutilo

		(<i>Paralichthys olivaceus</i>), trota marmorata (<i>Salmo marmoratus</i>), salmerino di lago nordamericano (<i>Salvelinus namaycush</i>), labridi (<i>Labridae</i> spp.), ciclotteri (<i>Cyclopteridae</i> spp.)	(<i>Rutilus rutilus</i>), scardola (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>), tinca (<i>Tinca tinca</i>), pesce gatto africano (<i>Clarias gariepinus</i>), luccio (<i>Esox lucius</i>) pesce gatto (<i>Ictalurus</i> spp.), pesce gatto nero (<i>Ameiurus melas</i>), pesce gatto americano (<i>Ictalurus punctatus</i>), pangasio (<i>Pangasius pangasius</i>), luccioperca (<i>Sander lucioperca</i>), siluro (<i>Silurus glanis</i>), spigola o branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>), persicospigola striata (<i>Morone chrysops</i> x <i>Morone saxatilis</i>), cefalo o volpina (<i>Mugil cephalus</i>), ombrina ocellata (<i>Sciaenops ocellatus</i>), ombrina boccadoro (<i>Argyrosomus regius</i>), ombrina (<i>Umbrina cirrosa</i>), tonno (<i>Thunnus</i> spp.), tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>), cernia bianca (<i>Epinephelus aeneus</i>), cernia (<i>Epinephelus marginatus</i>), sogliola atlantica (<i>Solea senegalensis</i>), sogliola (<i>Solea solea</i>), pagello fragolino (<i>Pagellus erythrinus</i>), dentice (<i>Dentex dentex</i>), orata (<i>Sparus aurata</i>), sarago maggiore (<i>Diplodus sargus</i>), pagello (<i>Pagellus bogaraveo</i>), pagro del Giappone (<i>Pagrus major</i>), sarago pizzuto (<i>Diplodus puntazzo</i>), sarago testa nera (<i>Diplodus vulgaris</i>), pagro (<i>Pagrus pagrus</i>), tilapia . (<i>Oreochromis</i> spp.), salmerino di fontana (<i>Salvelinus fontinalis</i>), salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)
Necrosi ematopoietica infettiva	C+D+E	Salmone keta (<i>Oncorhynchus keta</i>), salmone argentato	Storione ladano (<i>Huso huso</i>), storione danubiano (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>),

		(<i>Oncorhynchus kisutch</i>), salmone giapponese (<i>Oncorhynchus masou</i>), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmone rosso (<i>Oncorhynchus nerka</i>), salmone rosa (<i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmone reale (<i>Oncorhynchus tshawytscha</i>), salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>), salmerino di lago (<i>Salvelinus namaycush</i>), trota marmorata (<i>Salmo marmoratus</i>), salmerino di fontana (<i>Salvelinus fontinalis</i>), salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>), salmerino leucomaenis (<i>Salvelinus leucomaenis</i>)	storione sterleto (<i>Acipenser ruthenus</i>), storione stellato (<i>Acipenser stellatus</i>), storione (<i>Acipenser sturio</i>), storione siberiano (<i>Acipenser Baerii</i>), carpa testa grossa (<i>Aristichthys nobilis</i>), carassio dorato (<i>Carassius auratus</i>), carassio comune (<i>Carassius carassius</i>), carpa comune e carpa koi (<i>Cyprinus carpio</i>), carpa argentata (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), cavedano (<i>Leuciscus spp.</i>), rutilo (<i>Rutilus rutilus</i>), scardola (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>), tinca (<i>Tinca tinca</i>), pesce gatto africano (<i>Clarias gariepinus</i>), pesce gatto (<i>Ictalurus spp.</i>), pesce gatto nero (<i>Ameiurus melas</i>), pesce gatto americano (<i>Ictalurus punctatus</i>), pangasio (<i>Pangasius pangasius</i>), luccio perca (<i>Sander lucioperca</i>), siluro (<i>Silurus glanis</i>), halibut (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>), passera (<i>Platichthys flesus</i>), merluzzo nordico (<i>Gadus morhua</i>), eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), gambero europeo (<i>Astacus astacus</i>), gambero americano (<i>Pacifastacus leniusculus</i>), gambero rosso americano (<i>Procambarus clarkii</i>)
Infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione nella regione altamente polimorfica (HPR)	C+D+E	Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>), salmotrota (<i>Salmo trutta</i>)	
Malattia da virus erpetico della carpa Koi	E	Carpa comune e carpa koi (<i>Cyprinus carpio</i>)	Carassio dorato (<i>Carassius auratus</i>), carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idella</i>)
Infezione da <i>Mikrocytos mackini</i>	A+D+E	Ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>), ostrica della Virginia (<i>Crassostrea</i>	

		<i>virginica</i>), ostrica di Olympia (<i>Ostrea conchaphila</i>) e ostrica piatta europea (<i>Ostrea edulis</i>)	
Infezione da <i>Perkinsus marinus</i>	A+D+E	Ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>), ostrica della Virginia (<i>Crassostrea virginica</i>),	Astice (<i>Homarus gammarus</i>), granchio (<i>Brachyura</i> spp.), yabby (<i>Cherax destructor</i>), gambero blu (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>), aragosta (<i>Palinurus</i> spp.), necora (<i>Portunus puber</i>), granchio indopacifico (<i>Scylla serrata</i>), mazzancolla bianca indopacifica (<i>Penaeus indicus</i>), gamberone giapponese (<i>Penaeus japonicus</i>), mazzancolla (<i>Penaeus kerathurus</i>), mazzancolla del Pacifico (<i>Penaeus stylirostris</i>), mazzancolla tropicale (<i>Penaeus vannamei</i>)
Infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>	C+D+E	Ostrica piatta australiana (<i>Ostrea angasi</i>), ostrica cilena (<i>Ostrea chilensis</i>), ostrica piatta europea (<i>Ostrea edulis</i>)	Ostrica concava (<i>Crassostrea angulata</i>), ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>), ostrica della Virginia (<i>Crassostrea virginica</i>)
Infezione da <i>Bonamia ostreae</i>	C+D+E	Ostrica piatta australiana (<i>Ostrea angasi</i>), ostrica cilena (<i>Ostrea chilensis</i>), ostrica di Olympia (<i>Ostrea conchaphila</i>), ostrica asiatica (<i>Ostrea denselammellosa</i>), ostrica piatta europea (<i>Ostrea edulis</i>), ostrica argentina (<i>Ostrea puelchana</i>)	Cuore edule (<i>Cerastoderma edule</i>), tellina (<i>Donax trunculus</i>), cappa molle (<i>Mya arenaria</i>), cappa dura (<i>Mercenaria mercenaria</i>), vongola del Pacifico (<i>Meretrix lusoria</i>), vongola verace (<i>Ruditapes decussatus</i>), vongola filippina (<i>Ruditapes philippinarum</i>), vongola o longone (<i>Venerupis aurea</i>), vongola o longone (<i>Venerupis pullastra</i>), tartufo o noce (<i>Venus verrucosa</i>), cappasanta atlantica (<i>Pecten maximus</i>)

Infezione da <i>Marteilia refringens</i>	C+D+E	Ostrica piatta australiana (<i>Ostrea angasi</i>), ostrica cilena (<i>Ostrea chilensis</i>), ostrica piatta europea (<i>Ostrea edulis</i>), ostrica argentina (<i>Ostrea puelchana</i>)	Cuore edule (<i>Cerastoderma edule</i>), tellina (<i>Donax trunculus</i>), cappa molle (<i>Mya arenaria</i>), cappa dura (<i>Mercenaria mercenaria</i>), vongola del Pacifico (<i>Meretrix lusoria</i>), vongola verace (<i>Ruditapes decussatus</i>), vongola filippina (<i>Ruditapes philippinarum</i>), vongola o longone (<i>Venerupis aurea</i>), vongola o longone (<i>Venerupis pullastra</i>), tartufo o noce (<i>Venus verrucosa</i>)
Infezione da virus della sindrome di Taura	A+D+E	Gambero bianco del Golfo (<i>Penaeus setiferus</i>), gambero blu del Pacifico (<i>Penaeus stylirostris</i>), gambero dalle zampe bianche del Pacifico (<i>Penaeus vannamei</i>)	Mollusco bivalvo (<i>Atrina</i> spp.), buccina (<i>Buccinum undatum</i>), ostrica concava (<i>Crassostrea angulata</i>), cuore edule (<i>Cerastoderma edule</i>), ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>), ostrica della Virginia (<i>Crassostrea virginica</i>), tellina (<i>Donax trunculus</i>), abalone (<i>Haliotis discus hannai</i>), orecchia marina (<i>Haliotis tuberculata</i>), chiocciola di mare (<i>Littorina littorea</i>), cappa dura (<i>Mercenaria mercenaria</i>), vongola del Pacifico (<i>Meretrix lusoria</i>), cappa molle (<i>Mya arenaria</i>), cozza atlantica (<i>Mytilus edulis</i>), cozza o mitilo (<i>Mytilus galloprovincialis</i>), polpo (<i>Octopus vulgaris</i>), ostrica piatta europea (<i>Ostrea edulis</i>), cappasanta atlantica (<i>Pecten maximus</i>), vongola verace (<i>Ruditapes decussatus</i>), vongola filippina (<i>Ruditapes philippinarum</i>), seppia (<i>Sepia officinalis</i>), strombo (<i>Strombus</i> spp.), vongola o longone (<i>Venerupis aurea</i>), vongola o longone (<i>Venerupis pullastra</i>), tartufo o noce (<i>Venus verrucosa</i>), astice (<i>Homarus gammarus</i>), granchio (<i>Brachyura</i> spp.),

			yabby (<i>Cherax destructor</i>), gambero blu (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>), aragosta (<i>Palinurus</i> spp.), necora (<i>Portunus puber</i>), granchio indopacifico (<i>Scylla serrata</i>), mazzancolla bianca indopacifica (<i>Penaeus indicus</i>), gamberone giapponese (<i>Penaeus japonicus</i>), mazzancolla (<i>Penaeus kerathurus</i>)
Infezione da virus della malattia della testa gialla	A+D+E	Gambero nero del Golfo (<i>Penaeus aztecus</i>), gambero rosa (<i>Penaeus duorarum</i>), gambero Kuruma (<i>Penaeus japonicus</i>), gambero tigre nero (<i>Penaeus monodon</i>), gambero bianco del Golfo (<i>Penaeus setiferus</i>), gambero blu del Pacifico (<i>Penaeus stylirostris</i>), gambero dalle zampe bianche del Pacifico (<i>Penaeus vannamei</i>)	Mollusco bivalvo (<i>Atrina</i> spp.), buccina (<i>Buccinum undatum</i>), ostrica concava (<i>Crassostrea angulata</i>), cuore edule (<i>Cerastoderma edule</i>), ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>), ostrica della Virginia (<i>Crassostrea virginica</i>), tellina (<i>Donax trunculus</i>), abalone (<i>Haliotis discus hannai</i>), orecchia marina (<i>Haliotis tuberculata</i>), chiocciola di mare (<i>Littorina littorea</i>), cappa dura (<i>Mercenaria mercenaria</i>), vongola del Pacifico (<i>Meretrix lusoria</i>), cappa molle (<i>Mya arenaria</i>), cozza atlantica (<i>Mytilus edulis</i>), cozza o mitilo (<i>Mytilus galloprovincialis</i>), polpo (<i>Octopus vulgaris</i>), ostrica piatta europea (<i>Ostrea edulis</i>), cappasanta atlantica (<i>Pecten maximus</i>), vongola verace (<i>Ruditapes decussatus</i>), vongola filippina (<i>Ruditapes philippinarum</i>), seppia (<i>Sepia officinalis</i>), strombo (<i>Strombus</i> spp.), vongola o longone (<i>Venerupis aurea</i>), vongola o longone (<i>Venerupis pullastra</i>), tartufo o noce (<i>Venus verrucosa</i>)
Infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (<i>white spot</i>)	C+D+E	Tutti i decapodi (ordine <i>Decapoda</i>)	Mollusco bivalvo (<i>Atrina</i> spp.), buccina (<i>Buccinum undatum</i>), ostrica concava (<i>Crassostrea angulata</i>), cuore

syndrome)			edule (<i>Cerastoderma edule</i>), ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>), ostrica della Virginia (<i>Crassostrea virginica</i>), tellina (<i>Donax trunculus</i>), abalone (<i>Haliotis discus hannai</i>), orecchia marina (<i>Haliotis tuberculata</i>), chiocciola di mare (<i>Littorina littorea</i>), cappa dura (<i>Mercenaria mercenaria</i>), vongola del Pacifico (<i>Meretrix lusoria</i>), cappa molle (<i>Mya arenaria</i>), cozza atlantica (<i>Mytilus edulis</i>), cozza o mitilo (<i>Mytilus galloprovincialis</i>), polpo (<i>Octopus vulgaris</i>), ostrica piatta europea (<i>Ostrea edulis</i>), cappasanta atlantica (<i>Pecten maximus</i>), vongola verace (<i>Ruditapes decussatus</i>), vongola filippina (<i>Ruditapes philippinarum</i>), seppia (<i>Sepia officinalis</i>), strombo (<i>Strombus</i> spp.), vongola o longone (<i>Venerupis aurea</i>), vongola o longone (<i>Venerupis pullastra</i>), tartufo o noce (<i>Venus verrucosa</i>)
-----------	--	--	--